2026학년도 외과 학년말고사 (260414)


* 20문제 중 20문제 복기, 60분 시험(CBT)

1. 외과 수술 중 assistant로 참여하던 본과 3학년 학생이 수술대 아래로 suction 기구가 떨어진 것을 발견하였다. 집도의와 다른 팀원들은 인지하지 못 한 상태이다.
① suction을 다시 집어서 사용한다.
② 해당 사실을 즉시 알린다.
③ 수술이 끝난 후 알린다.
④ 주워서 그대로 다시 올려둔다.
⑤ 일단 상황을 무시하고 수술 보조를 계속한다.

2. 유방초음파가 유방촬영술(mammography)에 비해 갖는 장점으로 옳지 않은 것은?
① 유방촬영술로 애매한 병변에 도움이 될 수 있다.
② 낭종을 확인하는 데 유용하다.
③ 미세석회화를 보는 데 유용하다.
④ 방사선 노출이 없다.
⑤ 임산부에게 안전하다.

3. 수술에서 무균적으로 지켜야 할 것으로 옳은 것은?
① 무균 물품들은 시야에 잘 보이도록 허리 선 위 가슴 높이에 둔다
② 무균 가운 입은 사람끼리는 앞을 맞대고 이동한다
③ 무균장갑을 낀 사람은 대기할 때 손을 겨드랑이 부근에 위치한다.
④ 무균 가운 안 입은 사람이 수술대 위로 물건을 움직인다
⑤ 수술 하는 사람의 등 뒤는 완전무균구역이다.

4. 갑상선 전절제술을 받은 환자. 수술 다음날 온몸이 저리고 손발 끝이 수축하는 양상이 나타났다. 옳은 조치는?



① IV calcium 투여 후 칼슘 농도를 측정한다.
② 일시적인 현상이므로 환자를 안심시키고 경과 관찰한다.
③ 수술 과정 중 잘못된 자세로 신경이 눌려 생긴 현상으로 EMG를 시행한다.
④ 즉시 수술 부위를 열어 이상부위를 직접 교정한다.
⑤ 갑상선 호르몬을 측정하여 얼마나 저하되어 있는지 파악한다.

5. 유방암 조기진단 선별검사는?
① 컴퓨터 유방촬영술
② 유방촬영술
③ 자기공명유방촬영술
④ 유방초음파
⑤ 혈청 암 표지자

6. 65세 여자가 건강검진 상 우연히 발견된 충수돌기 종양으로 절제술 시행한 후 다음과 같은 결과가 나왔다. 향후 치료로 올바른 것은?

- adenocarcinoma, moderately differentiated, tubular with mucinous secretion
- invades soft tissue
- no lymphovascular invasion
- margin negative
- size: 2.3cm x 1.8cm

① 경과관찰
② 우측 대장 절제술
③ 항암치료
④ 방사선치료
⑤ 항암+방사선치료

7. 37세 여성 환자가 복통을 주소로 내원하였다. 환자는 5년 전부터 궤양성 대장염으로 약물 복용 중이었다고 한다. BP 80/50 mmHg, HR 120 회/min, 호흡수 24 회/min, 체온 38.5 도 이 환자에게 적절한 치료는?




① 전결장직장절제술(total proctocolectomy) 및 회장낭-항문 문합술(ileal pouch anal anastomosis)
② 비위관을 통한 응급 감압술
③ 항생제, 수액치료 등 보존적 치료
④ 전결장절제술(total colectomy) 및 회장루 조성술 (ileostomy)

8. 56세 여성 rectosigmoid 이행부 cancer 환자이다. 병변절제 후 직장과 결장을 peritoneal reflexion(복막반전) 위에서 문합하는 수술 이름은?


① Anterior resection
② Low anterior resection
③ Abdominoperineal resection
④ Hartmann
⑤ transanal excision

9. 위절제술을 받은 환자에서 시행한 문합술이다. 문합술의 종류는?




① Roux-en-Y esophagojejunostomy
② Billroth I gastroduodenostomy
③ Billroth II gastroduodenostomy
④ Double tract reconstruction
⑤ Uncut Roux-en-Y gastrojejunostomy

10. 다음은 위원위부절제 수술 사진이다. 표시된 혈관(결찰된)은 무엇인가? (위 사진과 유사한 사진으로 나왔고, 화살표로 가리켰습니다.)



① Splenic artery
② Left gastric artery
③ Right gastric artery
④ Left gastroepiploic artery
⑤ Right gastroepiploic artery


11. Right upper quadrant pain 및 tenderness를 주소로 내원한 56세 여성 환자의 CT이다. 오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 경계부위를 누른 상태에서 숨을 깊게 들이 마시라고 했을 때 환자는 숨을 들이마시다 갑자기 멈췄다. 환자에게 적절한 치료는?



WBC: 15,000, segmented neutrophil: 87% Hb: 14.7, total bilirubin: 1.1 AST: 62, ALT: 74, CRP : 4.2

① IV fluid hydration
② IV antibiotics
③ Endoscopic nasobiliary drainage (ENBD)
④ Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)
⑤ Laparoscopic cholecystectomy

12. 교통사고 후 CT에서 비장 파열이 확인되었다. 주변 장기에는 출혈이 없었으나, 혈관 외 유출이 확인되었다. 압통이 있었다. (반발압통 여부는 언급 X) BP 110/70 mmHg, Hb 11.5 g/dL 였을 때 적절한 치료는?



① 경과관찰
② 비장동맥색전술
③ 비장 부분절제
④ 비장 전체절제

13. 췌장 두부암 환자의 복강경 췌장-십이지장 절제술 수술 후 경과관찰 도중 췌장과 jejunum 연결한 부위에서 문합부 누출 토혈이 있었다. 손상 받았을 가능성이 가장 높은 혈관은?

① Superior pancreaticoduodenal artery
② Gastroduodenal artery
③ Left gastric artery
④ Right gastric artery
⑤ Common hepatic artery

14. GB empyema 및 perforation으로 담낭절제술을 받은 환자의 배액이 담즙색으로 변하였다. Vital sign은 안정할 때 1순위로 해야 할 처치는?


① 경피경간담즙배액술 (PTBD)
② 응급 수술
③ 고주파열치료 (Radiofrequency ablation)
④ 내시경역행췌담관조영술 (ERCP)

15. 생후 4개월 된 아이가 복부 팽만을 주소로 내원하였다. 태어날 때부터 변을 잘 보지 못했고, 관장을 했을 때 태변과 가스가 나왔다. 바륨 조영술 사진은 다음과 같다. 확진을 위한 검사로 가장 적절한 것은?



① 복부 MRI
② 복부 초음파
③ 직장 생검
④ 직장 압력측정
⑤ 상부 위장관 조영술

16. 좌측 서혜부 종물로 복강경 탈장 수술을 시행하였다. 수술 중 촬영한 사진은 다음과 같다. 진단은?



① Direct inguinal hernia
② Indirect inguinal hernia
③ Obturator hernia
④ Femoral hernia

17. 위암으로 위원위부절제술을 받은 환자이다. 다음은 무엇인가?




① 췌장액 유출
② 유미성 복수
③ 장 내용물
④ 혈액
⑤ 농양

18. 수술 중 공기배증 있을 때에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 정맥환류 감소
② 동맥혈압 감소
③ 동맥 이산화탄소 분압 감소
④ FRC 증가
⑤ SVR 감소

19. 다음의 사진은 어떤 봉합술에 해당하는가?



① Simple interrupted suture
② Subcuticular running suture
③ Lock stitch suture
④ Vertical mattress suture
⑤ Purse string suture

20. 서혜부 탈장 수술을 받았다. 이는 wound의 종류 중 어디에 속하는가?

① Clean
② Clean-contaminated
③ Contaminated
④ Dirty