<2019 본 3 학년말고사 – 정신건강의학과>

2018 학년말 고사에서 35 문제 이상 나왔습니다.

총 60 문제 중 58 문제 복원

1. (물활론)(자기중심성) 이것이 중심이 되는 시기는?

   A. 0-2 세

   B. 2-7 세

   C. 7-12 세

   D. 12-18

2. 이웃집 여자와 심하게 다툰 뒤 팔이 움직이지 않는 증상을 호소한 중년 여성이, 이웃이 사과했다는 소식을 듣고 마비 증세가 없어졌다. 다음 중 본 질환의 특성으로 옳은 것은?

   A. 낮은 사회 경제적 계층에서 호발한다.

   B. 신경과적 내과적 질환 동반하는 경우가 적다

   C. 남:여 1:1

   D. 여성에서 반사회적 성격장애 동반될 수 있다.

3. 평소에 엄격하고 근엄한 교장선생님이 갑자기 유치한 농담을 하고 성적 충동을 조절하는 모습을 보인다. 병변의 위치는?

   A. Medial prefrontal

   B. Ventromedial prefrontal

   C. Dorsolateral prefrontal

   D. Occipital

4. 밥을 먹다가 숨이 안쉬어지고 죽을듯한 느낌이 들었다. 그 이후로 두려워서 밥을 먹지 못했다. 관련된 이론은?

   A. 고전적 조건화

   B. 신체화

   C. 조작적 학습

5. 항정신병 약을 복용한 후 입술을 씰룩거리고 혀를 날름날름 했다. 관련된 경로를 고르시오

   A. Mesocortical pathway

   B. Mesolimbic pathway

   C. Nigrostriatal pathway

   D. Central segmental pathway

6. 초등학교 교사가 학부모에게 카카오톡으로 심한 욕설을 들은 이후 심한 불안과 분노가 생겨 내원하였다. 다음 질환에 대해 옳은 것을 고르시오

   A. PTSD 와 증상으로 구분 할 수 있다.

   B. 청소년기에는 진단할 수 없다

   C. 스트레스 유발요인이 없을 수 있다.

   D. 6 개월 이상 지속되는 경우가 드물다.

7. 특정 공포증의 아형 중 프로프라놀롤이 효과 없는 것은?

   A. 상황형

   B. 혈액-주사-신체손상형

   C. 동물형

   D. 자연환경형

   E. 기타형

8. 낮에 너무 졸려 회사에서 자다가 혼났다. 증상에 대한 약물 중 신체적/심리적 의존성이 적은 약물은?

A. Methylphenidate

B. Modafinil

C. Valproate

9. 다음 중 간헐적 폭발장애를 추가적으로 진단할 수 없는 것은?

A. 양극성장애

B. 자폐스펙트럼 장애

C. 품행장애

D. 적대적 반항장애

E. 파괴적 기분 부전장애

10. 다음 중 절정기 장애에 해당하는 것은?


A. 조루증

B. 질경련

C. 발기장애

D. 성욕 혐오증

11. 다음 수술은 정신과적 난치질환에 대한 수술이다. 해당 질환에 대한 치료로 가장 효과가 증명된 것은?



A. 노출과 재발 방지

B. EMDR

C. 지지적 치료

D. 정신분석 치료

12. 여의사가 환자 중 한명인 할머니를 볼 때 마다 자꾸 역전이가 된다. 오진을 2 번이나 냈다. 그래서 치료 당시에 힘들었던 생각에 대해 문제점을 찾고 점수를 매기는 등 논리적으로 접근하였다. 다음 상황에서 활용된 치료 기법은?

A. 인지치료

B. 행동치료

C. 통찰치료

D. 이완치료

13. 환자가 엄마와 사이가 안좋아서 대하기 힘들었다. I statement 를 알려주고 추후에 엄마를 대할 수 있도록 병동에서 솔직한 감정을 마치 엄마에게 대화하듯이 엄마 대역에게 연습을 했다. 다음 치료는?

A. 행동치료

B. 인지치료

C. 싸이코드라마

D. 이완치료

14. 기억을 간헐적으로 까먹어서 자신이 시키지도 않은 택배가 왔는데 자기가 시킨 것이 맞았다. 평소에 주변 사람이 말하길, 어린아이의 성격, 공격적 성격, 등의 성격 변화를 보인다고 했으나 본인은 모른다. 다음 질환 중 옳은 것은?

A. 30-40 대에서 호발한다.

B. 남자가 여자보다 2 배 많다

C. 동양에서 서양에서보다 호발한다.

D. 어릴적 학대와 방임이 요인이다.

15. 다음 중 수면 무호흡증의 위험 요인이 아닌 것은?

A. 턱이 앞으로 나옴

B. 중년

C. 비만

D. 목 둘레가 큼

E. 남성

16. 다음 중 표현형(통찰 지향) 정신 분석의 기법으로 옳은 것은?

A. 제반응

B. 치료 저항

C. 인지 재구성

D. 전이 해석

17. 다음 항 정신병약의 부작용 중 베타 블로커가 효과적인 것은?

A. Akathisia

B. Tardive dyskinesia

C. NMS

D. Parkinsonism

18. 다음 중 외상 후 스트레스 장애/급성 스트레스 장애로 진단할 수 있는 상황은?

A. 본인이 감옥갔다.

B. 교통사고 사망자 목격

C. 동생 자살 소식 들음

D. 본인이 교통 접촉사고

19. 28/F 손톱 모양이 계속 신경 쓰이고, 생각을 그만 둘 수 없고, 그만두고 싶지만 계속 생각이 나서 결국 계속 생각함. 가장 적합한 약물과 용량은?

A. Sertraline 200mg

B. Imipramine 25mg

C. Vortioxetine 10mg

D. Fluoxetine 10mg

E. Bupropion150mg

20. 다음 중 섬망보다는 치매에서 발견되는 소견으로 옳은 것은?

A. 사고의 빈곤

B. 지리멸렬

C. 주의 집중력의 급격한 변화

D. 각성 상태가 과각성부터 다양하게 나타난다.

21. 교통사고로 외과에 입원한 환자이다. 1 주일 후 다음을 주소로 정신과로 의뢰되었다. "사고 장면이 보이고 내가 꿈꾸고 주위가 멀어진 것 같다" 다음 환자에서 진단을 위해 우선적으로 해야하는 것은?

A. 약물 복용력과 신체 상태 및 검사 결과 파악

B. 가족에게 과거력을 물어본다.

C. 당시 상황에 대한 세세한 설명과 그때의 기분에 대해 알아본다

D. 진정제를 투여한다.

22. 다음에서 설명하는 약은 무엇인가?

치료 반응률이 40-50%로 만족스럽지는 못하지만 가장 널리 사용하는 항조증 약물이며 치료시 혈중농도를 0.6-1.5mEq/L 로 유지해야 하므로 정기적인 검사가 필요하다. 급성기 조증에서는

1.0-1.5mEq/L 로 높게 한다.

A. Lithium

B. Valproate

C. Lamotrigine

D. Carbamazepine

E. Olanzapine

23. 다음 증례의 환자에게 가장 적합한 진단은?

3 년 전부터 파킨슨병으로 치료받던 68 세 여자환자가 2 개월 전부터 가족은 괜찮다고 하지만 스스로는 기억력이 떨어진다고 걱정하며 병원에 왔는데 MMSE 는 29 점이었다. 식욕저하와 체중감소도 있었고, 간이정신검사에서 불안, 우울, 정신운동지체, 자살사고, 피해사고 등을 보였다.

A. 조현병

B. 주요우울장애

C. 순환기분장애

D. 정신분열형장애

E. 파킨슨에 의한 치매

24. 10 년 전부터 haloperidol 을매일 10mg 복용해 오던 33 세 남자가 입을 씰룩거리며 게속해서 손과 발을 움직이는 증상을 호소하고 있다. 가설은?

A. 아세틸 콜린 수용체 과민성

B. 노르아드레날린 과민성

C. 히스타민 수용체 과민성

D. 도파민 수용체 과민성

E. 세로토닌 수용체 과민성

25. 다음의 증례에서 가능한 진단명과 관련한 설명으로 옳은 것은?

60 세 여성 김씨는 초등학교 교사로 일하다가 1 년전 명예퇴직 한 직후 남편의 외도를 발견하여 6 개월 전 이혼을 하였고 홀로 지내기 시작하였다. 내원 2 개월 전부터는 청소, 식사 및 개인 위생을 챙기지 못하였다. 자신은 아무것도 못하고 다 자신의 탓이라고 하면서 불안안 초조해하며 안절부절 못하는 모습 보이기 시작하고 자신은 죽어 마땅하다며 수건에 목매는 행동하여 병원에 내원하였다. 내원 당시 환각은 호소하지 않았고 매우 초조한 모습 보이고 있었다.

A. 진단은 제 2 형 양극성 장애이다.

B. 인지기능 장애가 발생할 수 있고 이는 치매로 진단한다.

C. 남성에서 더 많이 발생한다.

D. 자살의 위험도가 높기 때문에 입원하여 보호관찰 치료를 진행하여야 한다.

E. 신체적 질환과는 관련성이 없기에 검사를 진행하지 않아도 된다.

26. 43 세 남자 환자는 15 년 이상 heavy alcoholics 로 내과와 정신과에 입원한 적이 있다. 계속되는 폭음으로 chronic pancreatitis, liver cirrhosis 진단을 받은 상태이다. 최근 2 달간 심화된 폭음으로 지남력의 장애, 한시와 환촉, 경련성 발작 등의 문제가 있어 응급실에 내원하였다. 환자는 치료에 협조가 되지 않고 계속해서 고성과 난동으로 응급검사도 시행하기 어려웠고 흥분된 모습으로 "벌레 봐! 벌레! 저기 뱀도 있어 웬 뱀이 이렇게 많아!" 하면서 껑충껑충 뛰어다니는 상황이다. 가장 먼저 시행되어야 할 조치는?

A. 응급 전해질 검사

B. 항정신성 약물의 정주

C. 자살 위험 평가를 위한 정신과 면담

D. 뇌 기질성 장애 유무를 확인하기 위한 뇌 전산화 단층 촬영

E. 신체 억제대 사용

27. 영미는 초등학교 3 학년 여아로 친구들과 잘 어울리지 못하고 등교를 거부하여 병원에 내원하였다. 영미는 2 녀 중 장녀로, 말이 또래보다 늦게 트여 2 세에 엄마를 처음 말하기 시작하였으나 점차 문장으로도 말을 할 수 있게 되었다. 5 세까지 대소변을 잘 가리지 못해 기저귀를 차고 있었고, 야뇨 증상은 지금까지 지속되고있다. 영미는 사람들과 어울리는 것을 좋아해 친구들을 만나면 껴안으려고 하기도 했다. 초등학교 입학한 이후에는 친구들과 놀고 싶으면 관심을 끌기 위해 한 명을 때리고 웃으며 도망가곤 하였고, 아이들이 이를 일러 여러 번 혼이 나자 어머니에게 "애들이 나랑 안 놀아준다" "선생님은 나만 미워한다"며 이야기하고 등교를 거부하였다. 정신과에서 시행한 평가상 IQ 는 62 였다. 증례에서 가능한 진단명과 관련한 설명으로 옳은 것은?

A. 진단은 의사소통장애이다.

B. 정신연령은 4-8 세 정도에 해당한다.

C. 훈련가능급이라고 불린다.

D. 성적 발달은 늦지 않으나 성적 충동을 조절하는 데 미숙하다.

E. 개인생활을 영위하기 위하여 보호가 반드시 필요하다.

28. 12 세 남아 원래부터 화가 많음. 2 년 전부터 가끔공격성 표출 진단은?

A. 양극성장애

B. 간헐적 폭발성 장애

C. 파괴적 기분조절장애

D. 적대적 반항장애

E. 발달장애

29. B 는 93 세 여성으로 10 년전 부터 부정맥, 치매로 약물치료 중이고 시력이 매우 나쁘다. 빙판에 미끌어지면서 고관절 골절상을 입었고 5 일전 고관절 치환술을 받았다. 낮에는 잠을 자거나 간병인과 간단한 이야기를 하는 모습 보이지만 저녁 시간만 되면 소리치고 감옥에서 나가야 겠다고 하면서 수액 라인을 뽑는 모습 보이기 시작하였다. 남편이 자신을 찾아왔다고 이야기 하면서 남편과 이야기 나누는 모습 보이고 있다. 이 환자의 처치로 부적절한 것은?

A. 주의 깊게 환자의 수분과 식사 공급량을 확인하고, 적절하게 공급한다.

B. 안경이나 보청기를 주어 감각 장애를 교정한다.

C. haloperidol iv 를 사용하여 정신병적 증상을 조절한다.

D. 간병인, 간호사보다 가족이 같이 있는 것이 좋다.

E. 밤시간에 침상 위 조명을 약하게 켜놓는다.

30. 치료자 A 씨는 정신치료를 받는 환자를 볼 때 마다 마음이 아프다. 10 년 전 돌아가신 아버지가 겹쳐 보이기 때문이다. 그래서 환자를 보기가 두렵고 피하려고 한다. 이는 무엇인가?

A. 전이

B. 역전이

C. 저항

D. 자유연상

E. 치료적 동맹

31. 우울증 치료하고 있던 자가 성기능장애, 체중증가의 부작용. 대체할 수 있는 약?

A. Bupropion

B. Fluoxetine

C. Sertraline

D. 아미트립틀린

E. Paroxetine

32. 50 세 여성 자궁에서 악취가 나서 남편이 멀리하고 있는 것 같다고 산부인과 진찰 받았다. 이상이 없다고 하였지만 이상있는 것 같다고 하면서 이번에는 대장이 이상이 있어서 대변을 못 보는 것 같다고 한다.

A. 피해망상
B. 과대망상
C. 신체형망상

33. 69 세 남자가 "아내가 바람을 피운다."라는 근거없는 의심으로 자주 아내를 폭행하였다. 2 년 전부터 자신이 방금 한 말을 잊어 버려 다시 묻는 경우가 많았으며 집을 못 찾아오는 일도 발생하였다. 뇌 자기공명영상에서 양쪽 측두엽과 전두엽과 대뇌 위축 소견을 보였다. 환자의 폭력행위를 감소시키기 위해 적절한 약물은?

A. Donepezil
B. Diazepam
C. Haloperidol
D. Chlorpromazine
E. Fluoxetine

34. 29 세 남자가 반복적으로 오후에 졸리고 힘이 빠지는 것을 주소로 내원하였다. 중요한 회의 도중에도 과도한 수면욕으로 쉽게 잠이 들어 직장 생활이 힘들었다. 이 환자에게 도움이 되는 중독, 의존이 약한 약물은?

A. 메틸페니데이트
B. 모다피닐
C. 카바마제핀
D. 할로페리돌
E. 로라제팜

35. 다음 중 조현병의 불량한 예후인 것은?

A. 유발인자가 없다
B. 환청과 망상이 있다.
C. 기분장애의 가족력
D. 편집형

36. Clozapine 300mg 을 사용하던 환자 WBC 1900, Granulocyte 900 됨. v/s 정상이고 별다른 증상은 없음. 대처는?

A. Clozapine 을 중단한다.
B. Clozapine 을 150mg 으로 감량하고 일주일마다 CBC follow up 한다.
C. Clozapine 용량 유지하면서 일주일마다 CBC follow up 한다.
D. 열 등의 증상이 나타날 때까지 지켜본다.
E. 예방적항생제를 쓴다.

37. 다음 조현병의 증상 중 음성 증상인 것은?

A. 무쾌감증
B. 피해망상
C. 환청
D. 지리멸렬
E. 기이하고 혼란된 행동

38. 만 19 세 여학생의 케이스에서 전형적인 신경성식욕부진의 양상이 아닌것을 고르시오

A. 167cm 에 37kg 이다
B. 힘은 없으나 살을 빼려고 쉬지않고 운동한다
C. 중 3 때부터 월경을 안하고있다
D. 학교 앞 편의점에서 음식을 훔치다 걸린적있고 대마초한다.
E. 이성관계를 활발히 가지나 오래 유지를 못하고, 여태 임신중절을 5 회 했다.

39. 주요우울장애에 나타나는 수면에 대해 옳은 것은?

(KMLE)

- 총 수면시간 길어진다

- REM latency 증가한다

- 3,4 stage 늘어난다

- 첫 REM duration 증가 (답)

- REM 밀도 감소한다

40. 자살하려고 수면제를 과량 복용한 17 세 여자가 응급실에 왔다. 응급처치가 시행된 후 환자를 면담하는 의사의 태도 중 옳지 않은 것은?

A. 환자의 가족을 질책하지 않는다.
B. 보호자를 먼저 만나 자살의 경위를 듣는다.
C. 환자가 행동을 뉘우치며 다시 하지 않겠다고 하면 귀가시킨다.
D. 법적인 문제에 대비해 차트의 기록을 철저히 한다.

41. 남자가 새벽 2 시에 자고 오전 11 시에 일어난다. 관련 있는 부위?

A. 송과체
B. 시상하부
C. 변연계
D. 시상
E. 기저핵

42. 치료자가 여자환자보면 자기 어머니 떠올라서 다음 면담이 꺼려진다

- 역전이

43. 다음과 같은 질문은 무엇을 보기 위한 것인가?

(보기) 사람들이 자신에 대해 이야기를 하거나 험담을 하는 걸 들었는가?

(보기) 잡지나 TV 에서 본인에 대한 말이나 특별한 것을 보았나,

(보기) 특별한 메시지를 전달 받은 적 있나?

- 피해망상

- 관계망상

- 과대망상

- 신체망상

- 사고전파

44. 항정신병약물의 부작용 중에 Propranolol 투여로 호전되는 증상은?

- 정좌불능증

- 지연성운동장애

- 파킨슨

- 급성근긴장이상

45. 37 세남자가 어렸을 때 아버지에게 이유없이 구타당한 일에 대하여 마치 남의 일처럼 아무렇지 않게 이야기를 했다. 이때 사용된 방어기제는?

A. 억제

B. 억압

C. 고립

D. 반동형성

F. 취소

46. 27 세 여자가 3 일전 자살사고로 입원하였다. 169cm 44kg, 최근 7kg 빠졌다고 하였음. 3 개월전 우울으로 진단 받았고, 임신검사를 해보니 임신 10 주로 나옴. 이 환자에게 해줄 치료는?

A. 전기경련치료
B. 광치료
C. 체중증가제

D. Fluoxetine

47. 피해망상 있던 환자, 최근 대인관계 회피, 2 주전부터는 말 시키거나 꼬집어도 아무 반응이 없다. 효과있는약물?

A. 리튬
B. 발프로에이트
C. 할로페리돌
D. SSRI

48. 잠 안자고 계속 조증증상 보이는 여성. 내가 세상을 구원할거라는 망상, 정신과 입원 후 약물 치료중 호전되다가 갑자기 오심, 구역, 구토 증상 나오고 안구운동장애, 경련 등 발생, 생각해야 할 것?

A. 리튬 중독
B. 신경이완악성증후군
C. 항콜린성 섬망
D. Tardive dyskinesia

49.정신질환을 각각의 증상, 예후 등 객관적으로 관찰되는 특징에 따라 기술하고 체계적으로 분류하여 틀을 마련한 사람?

A. E.Krapelin
B. P.Pinel
C. E.Bleuler
D. B.Ruch

50. 16 세 여자 잦은 과식 후 구토 때문에 병원에 왔다. 5 개월 전 피자 4 판과 콜라 2 리터를 한 번에 먹고는 비참해서 엉엉 울다가 모두 토했다. 이후 과식 후 구토를 매주 2 회 이상 반복했다. 한 달 전 부터는 이뇨제를 복용하기 시작했다. 무용과에 진학하기 위해 평소에 철저히 몸무게를 관리하고 있다. 다음 중 우선적으로 생각할 수 있는 치료제는? (KMLE)

A. 피모자이드
B. 부스피론
C. 날트렉손
D. 플루옥세틴
E. 프로프라놀롤

51. 알츠하이머랑 인지기능 감퇴 임상양상이 비슷하면서, 파킨슨병과 유사한 증상이 나타나는 병?

A. Lewy body dementia
B. Frontotemporal dementia
C. Creutzfeldt-Jakob disease

52. 20 대 여성 어느날부터 수면 줄고, ??, 가족들에게 분수에 안맞게 값비싼 선물 을 돌린다. 진단은?

A. 급성 조증
B. 제 2 형 양극성장애
C. 급속순환장애
D. 급성조현병

53. 원래 술 엄청많이 마시는 사람. 2 일 전에 입원함. 입원 후에 혼자 있는 병실에서 벌레가 기어다닌다고 함. 알코올 금단 상태

A. 진전 섬망
B. 알코올 유도성 정신병적 장애
C. 알코올 내성
D. 알코올 금단

54. 50 대 남성, COPD 악화로 입원치료받던 환자, 불면증 있고 천장에 벌레기어다닌다고함. 적절한 처치?

A. 로라제팜 경구투여
B. Phenytoin
C. 밤에 불끄고 혼자있게
D. 가족 면회 못오게

55. 강간 성관련 살인 등 성범죄와 관련이 제일 적은 성도착장애는?

A. 피학적
B. 가학적
C. 노출증

D. 접촉도착

E. 소아성애

56. 다음 중 훈련 가능급으로 알려진 중등도의 정신지체(Moderate MR)는? IQ

A. 85-70

B. 49-35

C. 34-20

D. 34-20

57. 가성치매와 비교되는 알츠하이머 치매의 임상양상?

A. K-MMSE 점수의 갑작스런 변화

B. 증상을 숨기려고 함

58. 다음중 정량 복용시에 불안장애 일으킬 수 있는 약물은?

A. 플록세틴

B. 알프라졸람

C. 테오필린