<2020 본3 학년말고사 – 정신건강의학과>

총 60문제 중 60문제 복원

이전 학년말고사, **당해 본1 기출** 문제 그대로 내거나 약간 변형해서 나온 문제들이 매우 많았습니다.

1. 소아 및 청소년기 정신의학이 중요한 이유 아닌 것은?

① 가족 구성원의 장애는 다른 가족 구성원에게 심대한 영향을 미친다.
② 도움이 필요한 사람의 절반 이상이 아무런 도움을 받지 못한다.
③ 대부분의 정신장애와 문제행동은 일생을 지속한다.
④ 소아 및 청소년기에 정신장애 및 문제행동은 흔하지는 않지만 발생한다면 심각하다.
⑤ 학령기 장애 및 문제 행동과 관련하여 그 개인이나 가족, 사회가 겪는 후유증은 매우 심하다.

2. 26세 남자 6개월 전부터 망상, 환각. 증상이 있었다. 6주동안 3가지 약물 복용했으나 PANSS 점수 떨어지지 않았다. 그래서 약물 교체하려고 한다. 그 전에 해야 할 검사는?

① MEG
② PET
③ SPECT
④ EEG
⑤ MRI

CT는 보기에 없었습니다.

3. 적응장애와 PTSD 공통점은?

① 6개월 이상 지속되면 지속성(만성)으로 분류한다.
② 동일한 스트레스 원인에 의해 발생한다.
③ 원인 스트레스 사라지면 3개월 이상 증상이 지속되는 경우가 드물다.
④ 성격장애가 위험요인이자 공존질환이다.
⑤ 증상 발생 후 1달이 지나야 진단이 가능하다.

4. 노인 섬망의 특징이 아닌 것은? (20본과Y)

① 사망과는 관계가 없다
② 노인에서 빨리 원인치료가 되지 않으면 비가역적인 인지기능 손상을 초래한다
③ 급성으로 발생한다.
④ 원인이 다양하다.
⑤ 밤낮으로 변동한다

5. 다음 중 집단 정신치료를 사용할 수 있는 경우는? (20본과Y)

① 심한 우울증 환자가 자살하려는 경우
② 집단의 환경을 견디지 못하는 경우
③ 피해망상이 심해서 다른 구성원들을 가해집단으로 믿는 경우
④ 조절 불가한 공격적 충동이 있는 경우
⑤ 만성적이고 심한 정신과적 상태

6. 중독환자 가족의 행동양상으로 환자의 중독행동을 받아들이지 못하고 지속시키고 조장하게 됨 (20본과Y)

① 공동의존 (codependency)
② 공동병리 (comorbidity)
③ 의존 (depenence)
④ 금단
⑤ 내성

7. Brain reward circuit의 mesolimbic pathway로 옳은 것은? (20 본과 Y)

① Dopaminergic neuron from ventrotegmental area to nucleus accumbens

② dopaminergic neuron from ventrotegmental area to hipocampus
③ dopaminergic neuron from sunstantia nigra to substantia nigra to putamen/globus pallidus
④ serotonic neuron from ventrotegmental area to caudate putamen
⑤ cholinergic neuron from substantia nigra to nucleus accumbens

8. 언어발달이 또래에 비해 늦은 어린이. 학교에서 친구들과 잘 못 어울리며 눈을 잘 마주치려고 하지 않고 장난감 하나에만 몰두하고 장난감을 혼자 열을 세우고 있었다. 진단은?
① 자폐스펙트럼 장애
② 지적장애

9. 여성 환자가 응급실에 내원하였다. 심박증가, 입마름증이 관찰되었고, 안구 진찰에서 안구 충혈을 보였다.. 환자가 복용한 것으로 추정되는 물질은? (20본과 Y)
① cannabis
② heroin
③ amphetamine
④ alcohol
⑤ opioid

10. 항정신병 약물을 복용한 여성 환자가 젖이 자꾸 흐르는 증상으로 내원하였다. 마지막으로 월경을 한지 3개월이 경과하였다고 한다. 시행해야 하는 검사는?
① 복용약물 혈중 농도 검사
② 혈중 프로락틴

11. 62세 남자가 기억 소실을 주소로 내원하였다. 어제 점심식사 후 갑자기 오전 일이 기억나지 않는다고 했다. 의식은 명료했으나 낮에 무슨 일을 했는지 기억하지 못하고, 부인에게 반복적으로 낮에 무슨 일이 있었는지 물어보았다. 검사실에 올 때 차를 타고 온 것은 기억하고 있었다. 진단은?
① 이인성장애
② 해리성 둔주
③ 해리성 기억상실
④ 일과성 완전 기억상실

12. 다음 중 제 2형 양극성 장애와 관련된 것으로 옳은 것은? (20본과Y)
① 동반장애가 흔하지 않다.
② 주로 경증 삽화로 시작한다.
③ 주로 우울증과 경조증 삽화가 반복된다
④ 조증삽화의 유무로 진단한다
⑤ 아침에 나쁘다가 저녁에 갈수록 기분이 나아진다.

13. 다음중 지속적인 인지장애를 일으키는 물질은? (20본과Y)
① 알코올
② 카페인
③ 니코틴
④ 코카인
⑤ 대마초

14. 노인자살의 특징으로 옳지 않은 것은? (20본과Y)
① 자살의도에 대한 경고가 드물다
② 자살의도의 인지와 개입을 피한다
③ 과거에 자살 시도한 시도력이 흔하다
④ 남자가 여자보다 많다

⑤ 자살률이 높다

15. 다음 중 자살 위험도가 가장 높은 사람은?
① 자살한 아버지가 자꾸 꿈에 나와요
② 옥상에서 뛰어내리려고 자물쇠 절단기 샀어요
③ 요즘 삶에 의욕이 없고 무기력해요
④ 1년전에 수면제 한꺼번에 많이 먹은 적 있어요

16. 다음 증례의 치료로 올바른 것?
[만 7세 남아. 장난을 많이 치고 수업시간에 창밖을 멍하니 바라보고 있고 집중을 잘 못함. 친구들을 좋아하지만 짓궂은 장난을 많이 쳐 잘 어울리지 못함.] (20본과Y)
① 플루오세틴
② 이미프라민
③ 로라제팜
④ 메틸페니데이트

17. 다음 중 주요 우울장애의 감별진단에 대해 옳지 않은 것은? (20본과Y)
① 질문들에 답하는 것을 쉽게 포기한다
② 파킨슨병의 ⅔ 이상에서 우울장애가 나타난다
③ 인지 저하가 서서히 일어난다
④ 갑상선 기능저하증에 우울 삽화가 흔히 동반된다

18. 수면 주기에 따른 물질 변화로 옳지 않은 것은? (20본과Y)
① Cortisol은 새벽에 증가하여 아침에 깨어날 때 많이 분비된다
② 체온은 수면중에 최고로 높아진다.
③ 멜라토닌은 낮에 빛에 의해 분비가 억제된다
④ 성장호르몬은 잠이 가장 깊을 때 최고치로 분비된다
⑤ 프로락틴은 낮보다 밤에 많이 분비된다.

19. 43세 여자 우울증으로 fluoxetine복용 후에도 호전이 없어서 paroxetine으로 바꿔서 치료 중 진전, 좌불안, 고열 부작용이 나타났다. 이에 근육이완제?와 해열제?를 사용하였음에도 나아지지 않고 의식과 혈압이 떨어졌다. 다음을 나타내는 것 중 옳은 것은? (Y)
① 급성 근긴장 이완증
② 신경이완제 악성증후군
③ 세로토닌 증후군
④ 지연성 운동장애

20. 40세 여자가 오줌에 혈액이 나와서 내원하였다. 그런데 소변검사 할 때 자신의 혈액을 한 방울 떨어뜨리는 것이 관찰되었다. 도뇨관 검사했을 때는 혈뇨가 관찰되지 않았고, 환자는 면담에서 시어머니의 병수발 피하기 위해서 한 것이라 하였다. 진단은?
① 꾀병
② 가장성 장애

21. 고소공포증이 있는 환자를 고층건물 1층에서부터 옥상까지 각 층에서 내려다본 사진을 보여주고, 그 후 이완훈련을 한다. 충분한 이완훈련 후, 가장 공포를 적게 일으키는 장면을 20~30초 동안 보여주고, 이 과정을 반복하여, 공포를 느끼지 않을 때 좀 더 두려운 장면으로 넘어가는 등, 가장 경한 것부터 심한 것 순서대로 배열해 치료했다. 다음을 만족하는 치료기법은? (20본과Y)
① 노출요법
② 체계적 탈감작
③ 긍정강화
④ 혐오요법

22. 신경성 폭식증에서 체중유지를 위한 폭식 후 보상 행동으로 가장 흔한 것은? (20본과Y)

① 운동
② 이뇨제 투여
③ 하제 투여
④ 구토
⑤ 갑상샘 호르몬 투여

23.주요 우울 장애의 신경 생화학적 요인으로 옳은 것은? (1번 선지 말고는 약간 불확실) (20본과Y)

① 5-HIAA 농도의 감소
② NMDA 수용체 억제
③ HVA 농도 증가
④ HPA 활동 저하
⑤ GABA 농도 저하

24. 당뇨병 진단받고 이에 대한 교육, 예방법 듣고 온 40대 여자. 이후 부작용이나 합병증 때문에 불안해하고 주부 일을 할 수 있을지에 대해서 걱정함. 가장 의심되는 진단은?

① 범불안장애
② 적응장애
③ PTSD

25. DSM-5에서 신체 증상 장애로 분류되지 않은 것? (20본과Y)

① 인위성 장애
② 신체 이형장애
③ 상상임신
④ 기능성 신경학적 증상 장애
⑤ 신체 증상장애

26. 지역사회 정신 보건이 초기에 제공하는 서비스가 아닌 것은? (20본과Y)

① 입원
② 외래 치료
③ 응급 치료
④ 거주시설
⑤ 자문 및 교육

27. 지역사회 정신 보건의 기본적 개념이 아닌 것은? (20본과Y변형?)

① 지지망 구축
② 치료의 연속성
③ 개별화된 치료
④ 환자 중심을 고수
⑤ 독립적 생활을 위한 한정적 서비스 제공

28. 병적 도벽으로 추정되는 소견은?

① 훔치기 전 2주 전부터 말이 많아지고 잠을 별로 자지 않으며 고양감이 있었다.
② 훔치기 위한 계획을 상세히 수립하였다.
③ 가게 주인에게 앙심을 품고 훔쳤다
④ 평소 갖고 싶다고 생각해오던 물건을 훔쳤다.
⑤ 훔치기 전 긴장이 고조되었고 들킬 것에 대해 걱정하였다.

29. 병적 방화로 추정되는 소견이 아닌 것은?

① 특별한 방화 동기를 찾을 수 없다.
② 소지품에서 방화에 관련된 계획서가 발견되었다.
③ 평소에 보는 방화설비에 관한 책자가 발견되었다.
④ 방화로 2번 째 체포되었다.
⑤ 지능검사에서 IQ가 59로 측정되었다.

30. MMPI에서 다음에 해당하는 항목을 고르시오.
[피해 망상이나 과대 망상이 많이 나타나며, 조현병이나 망상장애 환자에서 높은 수치를 보인다. 수치가 너무 낮을 경우 검사에 대해서 지나치게 경계심을 갖는 것으로 생각할 수 있다.]

① 7 강박형
② 6 편집형
③ 0 내향형
④ 4 반사회적 성격
⑤ 8 조현형

31.ICD의 분류체계에 대해서 맞는 것을 고르시오. (20본과 Y)
① 동일한 경과는 동일한 질병을 의미한다.
② ICD 5는 정신장애를 별도로 다루기 시작했다
③ ICD 9는 기질적 정신장애라는 표현을 제거하였다.
④ ICD 10은 적응양상을 전반적 기능 평가척도로 평가한다.
⑤ ICD 10은 임상진단, 후유장애, 상황적 요인 등 3 축으로 구성된다.

32. 임상심리평가에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 심리평가는 개인의 특성을 파악한다는 점에서 크게 보면 심리검사에 포함된다.
② 심리검사 외에 다른 이용가능한 자료를 사용하여 오류를 줄인다.
③ 심리검사 시 검사할 때의 행동과 태도도 검사에 포함된다.
④ 구조적 검사는 결과가 양적인 수치로 나타난다.
⑤ 비구조적 검사는 구조적 검사에 비해 신뢰도와 타당도가 낮으나, 환자 개인의 특성을 더 잘 파악할 수 있다.

33. MMSE 검사에서 '100-7'은 무엇을 판단하기 위한 항목인가? (Y)
① 주의력과 집중력
② 기억등록
③ 지남력
④ 언어기능
⑤ 기억회상

34. 다음과 가장 관련 있는 불안 장애를 고르시오

미국 평생유병률 5%
동반된 질환 88%
발병 나이 중간값 30세
근육 긴장형 증상

① 사회불안장애
② 공황장애
③ 특정공포증
④ 범불안장애
⑤ 혈액-주사-신체손상형

35. 아래 설명에 해당하는 치료법을 사용할 수 있는 질환을 고르시오.
[환자에게 검사자의 손가락 끝을 보게 하고 손가락을 양 옆으로 흔든다.]
① PTSD

36. DSM-5에 관해서 옳은 것을 고르시오.
① DSM-5는 단축체계이다.
② DSM 5에서 처음으로 차원적 진단체계가 도입되었다.

37. DSM-5에서 지적발달장애, 자폐 스펙트럼장애, 주의력결핍 과잉행동장애, 특정 학습장애 등이 포함된 범주는?

① 소아정신장애
② 기타정신장애
③ 전반적 발달장애
④ 신경발달장애

38. 정신과 전문의 없이도 의사가 입원시킬 수 있는 경우는? (20본과Y)

① 응급입원
② 시장, 군수, 구청장에 의한 입원
③ 보호의무자에 의한 입원
④ 자의입원
⑤ 동의입원

39. 아이가 2년 전부터 틱 같은 증상 있었는데 (몇 가지 운동 증상 주어졌음) '음음' 거리는 소리도 내게 되었다. (진단기준 이상의 기간 충족한 내용들이 주어짐.) 진단은?

① 잠정적 틱장애
② 뚜렛장애

40. 40세 여성이 내원하여 수면제 일주일치를 더 처방해달라고 해서 줬다. 그런데 이걸 한꺼번에 먹고 내원한 뒤 수면제 일주일치를 더 달라고 하였다. 의사가 안 준다고 했더니 당신 때문에 그렇게 됐다고 화를 냈다. 평상시에는 의사에게 존경을 표하고 의존적인 성향을 보였으나 갑자기 화를 내고 의사를 비판했다. 약을 먹은 기억이 나지 않는다고도 하였다. 위 환자의 성격장애에서 가장 흔하게 동반하는 정신 질환은?

① 불안장애
② 우울증
③ 조현병

41. 30 대 남자가 내원했다. 지나치게 순종적이고 감사하는 태도를 보였으며, 의사의 말에 경청하며 잘 따르겠다고 하였다. 하지만 스스로 무언가를 할 의지는 보이지 않았다. 이 환자에게 해당되는 성격장애는? (20본과Y)

① 의존성 성격장애
② 편집성 성격장애
③ 경계성 성격장애

42. 62세 남성이 아내와 함께 내원했다. 남성은 부인이 외도하는 것 같다며 직장에서 틈만 나면 아내에게 전화를 걸어 일거수 일투족을 확인했다고 한다. 아내가 외도를 한다는 증거를 찾기 위해 옷장을 뒤지는 행동도 했다. 이외의 환각이나 인지 장애는 관찰되지 않았다. 이후 따로 면담하였을 때, 부인의 외도 증거를 전혀 찾아볼 수 없었다. 진단은?

① 조현병
② 망상 장애
③ 조현양상 장애

43. 강박 스펙트럼으로 보기 어려운 것은?

① 눈이 계속 깜빡이는데 멈출 수가 없어요
② 필요한 물건을 집에 계속 쌓아둬요.
③ 저도 문제 있는 건 아는데, 머리 뽑는 것을 멈출 수가 없어요.
④ 코로나가 걱정돼서 손 씻는 것을 멈출 수 없어요
⑤ 제 코가 삐뚤어진 것 같아서 자꾸만 거울을 보게 되요

44. XX세 남성이 지하철에서 자신의 성기를 노출한 뒤 여성에게 문지르다 도주 중

검거되었다. 옷 안쪽으로 여성 속옷을 입고 있었으며, 소지품 검사에서 여성의 음모를 모아둔 주머니와 봉지가 발견되었고, 휴대폰에는 화장실에서 몰래 찍은 사진이 발견되었다. 이 환자에 관한 설명으로 가장 관련성이 적은 것은?

① 절시증
② partialism
③ 물품 음란증
④ 접촉 도착증
⑤ 복장도착적 물품 음란증

45. 성별 불쾌감과 관련해 옳지 않은 것은?

① 청소년기에서 이 상태는 임상적으로 현저한 고통이나 손상과 연관된다.
② 소아기에서는 진단시, 이성이 되고 싶은 강한 갈망 또는 자신이 이성이라고 주장하는 것이 반드시 필요하다.
③ 원인이 병리적인 문제가 아님을 인식하는 것으로부터 치료가 시작된다.
④ 성인에서 자신의 일차 또는 이차 성징을 제거하고자 하는 강한 갈망, 이성의 이차 또는 이차 성징에 대한 강한 갈망이 있고 6개월 이상 지속될 경우 진단할 수 있다.
⑤ DSM-IV-TR에서는 성별정체성장애 (gender identity disorder)로 명명되었던 것이 DSM-5에서는 성별 불쾌감이라는 명칭으로 바뀌었다.

46. 79세 여성이 8개월 전부터 기억력이 서서히 떨어져 인지기능검사를 위해 내원했다. 최근에는 외출 후 집을 못 찾아온 경우가 있었다. MMSE는 20점이었고, 뇌 자기공명영상에서는 이상이 없었으나 양전자방출단층촬영에서 양쪽 두정측두엽 포도당섭취 감소가 나타났다. 유전자 검사 결과는 Apo-E4/E4였다. 진단은?

① 루이소체 치매
② 전두측두치매
③ 알쯔하이머 치매
④ 파킨슨 치매
⑤ 혈관성치매

47. 뇌발달에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 출생후 백질은 증가, 회백질은 증가했다 감소양상을 보인다.
② 출생 시 성인보다 많은 수의 시냅스 가지다가 시간 지나면서 Synaptic pruning 거치며 시냅스 수가 줄어든다.
③ 뇌 부분별로 발달속도 다르다.
④ 후기 청소년기까지 뇌 발달이 지속된다.
⑤ 감정을 조절하는 변연계가 가장 나중에 발달한다.

48. 다음 중 제 1 형 양극성 장애에 대한 설명으로 옳은 것은? (20본과Y)

① 과대성은 임상적으로 유의미한 증상은 아니다.
② 주요우울장애보다 늦게 발병한다.
③ 유전학적인 연구에서 강력한 가족력을 나타낸다.
④ 조증삽화를 가질 수도 있고 안 가질 수도 있다.

49. 소아청소년의 면담 및 평가에서 옳지 않은 것은?

① 소아가 말하기 싫은 내용을 물어보면 치료적 관계가 깨질 수 있으므로 묻지 않는다.
② 지적장애 소아청소년은 정신연령대신 실제 연령에 맞게 면담한다.
③ 생명이 위험하지 않은 상황이라면 면담의 비밀을 보장한다.
④ 보호자보다 소아청소년 면담을 먼저 시행한다.

⑤ 대화가 되지 않는 소아의 경우, 놀이나 행동을 지켜보고 평가할 수 있다.

50. 신경성 식욕부진증에서 섭식과 처벌체계 이상관련이 있고 회복후에도 이상이 지속되는 신경전달물질은? (20본과Y)

① 세로토닌
② 노르에피네프린
③ 엔돌핀
④ 옥시토신
⑤ 도파민

51. 19 세 여성이 학업 스트레스가 심했다고 한다. 금일 지하철에 사람들이 많이 타자 나가지 못할 것 같은 불안감이 들며 다리가 풀렸고 죽을 것 같은 공포도 느꼈다. 이러한 증상을 유발할 수 있는 약제로 적절한 것은? (20본과Y)

① Theophylline
② Clonidine
③ Propranolol
④ Diazepam

52. 35세 남성. 2년 전부터 직장에서 직원들과 갈등이 많았다. 직원들이 자신의 험담을 한다고 하며, 집까지 따라와서 험담한다고 한다. 집에 있을 때도 자신을 험담하는 소리가 들렸다고 한다. 직원들이 자신을 싫어한다고 생각하며 직원들과 자주 다투었다고 한다. 진단은?

① 망상장애
② 조현정동장애
③ 조현병
④ 조현형 성격장애
⑤ 주요우울장애

53. 45세 남자가 1년 전부터 우울감이 있어 약물을 복용했으나 입마름, 변비, 성기능장애로 인해 2개월 만에 복용 중단하였다. 현재 정신운동지체, 피로, 식욕감소, 의욕저하 등을 호소하고 있다. 처방해야 할 약물? (Y)

① 플루옥세틴
② 아미트립틸린
③ 부프로피온
④ 이미프라민
⑤ 클로미프라민

54. 다음 중 난폭한 환자를 강박할 때 의무기록에 반드시 적어야 하는 내용이 아닌 것은? (20본과Y)

① 강박의 시행 일시, 시간
② 환자를 강박할 때 쓰인 도구와 장비
③ 강박을 시행한 인원들의 실명
④ 강박을 시행한 이유
⑤ 병명과 증상

55. 노인의 심리특성이 아닌 것은? (20본과Y)

① 남녀특성의 강화
② 우울증
③ 사고의 경직
④ 의존심
⑤ 인색, 돈을 중시

56. 6세 남아가 이전에는 소변을 잘 가리다가 최근 1년동안 일주일에 2~3회, 자는 동안 이불에 소변을 보는 것으로 내원하였다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 요로감염과 감별해야 한다.
② 저녁시간에는 수분 섭취를 줄이고, 밤 중에 확실하게 깨워서 오줌을 누게 한다.
③ 약물 치료가 필요하다면 imipramine이나 desmopressin 등의 약물을 사용할 수 있다.
④ 습관의 문제임을 지적하고 엄격하게 꾸짖는다.

57. 3주 전 교통사고로 인해 다발성 외상으로 수술받은 후 중환자실에서 섬망(증상으로 주어짐) 이 생긴 환자. 만성 질환을 가지고 있고 현재 저혈압, 전해질 불균형이 있는 환자의 불안감과 진정 작용을 위해 어떤 약제를 사용해야 하는가?

① Diazepam
② Haloperiol
③ Chlorpromazine
④ Escitalopram

58. 40세 여성. 국정원에서 달에서 온 자신을 찾고 있다. (어떤 문제였는지 기억이 안 납니다. ㅠㅠ)

59. 뭔가 전화 걸어서 계속 확인했다. (OCD증상들) 치료는?

① Sertraline

60. 눈 감은 각성상태에서의 주된 뇌파의 상태는? (20본과Y)

① 세타파
② 델타파
③ 알파파
④ 베타파
⑤ 고주파의 예파

불확실한 답
24. ① 범불안장애
44. ③ 물품 음란증