<2021 본 3 학년말고사 - 정신과>

총 **56 문제** 중 **56 문제** 복원

이건석, 박선철 교수님 출제 범위에서는 당해 야마 그대로 나온 문제가 많았습니다. 그 외의 범위에서는 야마 문항이 약간 (많이) 변형되어 출제된 듯합니다. (ex. 옳은 것? -> 옳지 않은 것?)

1. 자살을 시도하다가 극적으로 구조된 20 대 남성. 자신이 누군가로부터 뇌를 조종당하고 있었기 때문에 자살할 수밖에 없었다고 진술하였다. 해당 환자에 대한 초기 진찰로써 가장 적절한 것은?
   - 어떤 방법으로 조종당했는지 설명해보시죠
   - 당신처럼 뇌 조종을 당하는 다른 사람들도 본 적 있습니까?
   - 뇌 약물을 드릴 테니 금방 괜찮아지실 겁니다
   - 지금이 몇 년 몇 월 며칠이죠?
   - 그런 일이 있으셔서 많이 힘드셨겠군요

   *그런 일이 있으셔서 많이 힘드셨겠군요의 느낌이었음

2. 남성이 난동을 피우다가 경찰에게 양손 강박 된 채 응급실에 내원하였다. 환자가 다음과 같은 상태였을 때, 올바른 처치는?

   > 환자는 두 손이 강박된 채로, 불안하고 예민한 듯한 상태로 면담실 안을 배회하고 있다.

   - 양팔 강박은 위험하므로 사지강박 한다
   - 양팔 강박을 풀어준다
   - 경찰한테 환자의 상태에 대해서 물어본다
   - 진정제 근육주사
   - 앉아서 차분히 얘기하자고 말한다

3. 21 세 여성이 자신으로부터 분리되어 자신을 관찰하는 증상이 반복되어 내원하였다. 신경과 검사 결과 뇌에는 이상이 없었고, 약물 복용중인 갓도 없으며, 술이나 담배를 하지도 않았다. 이 환자의 면담 내용으로 가장 가능성이 낮은 것은?
   - 현실이 아니라 꿈을 꾸고 있는 것 같아요
   - 마음이 편해지고 이완이 되는 것 같아요
   - 한번 시작되면 2-3 시간 정도 지속되는 것 같아요
   - 제가 제 자신을 연기하고 있는 것 같아요
   - 주변의 사물이 작게 보이는 것 같아요

4. 신체형 장애에 대한 일반적인 치료 방침으로 옳지 않은 것은? (답논란)
   - 과도한 검사에 대해서는 신중히 조치한다
   - 환자 증상에 대해서 자세하게 들어준다
   - 정기적으로 방문하도록 권유한다
   - 향정신 약물의 사용은 최소화한다.
   - 인지행동치료, 정신치료, 집단치료 등은 도움이 되지 않는다.

   *2 번이 답 대한 생각) 강의록에 짧게 자주 진료하고 증상에 너무 집중하지 말고 심리사회적인 요소에 관심 갖도록 유도 라는 말이 적혀있음

5. 53 세 여성이 부부관계 문제로 외래 내원하였다. 이 여성은 성관계에 관심은 있지만 이전과 다르게 여러 자극에도 극치감을 조금밖에 느끼지 못했다고 한다. 6 개월전 교통사고로 골반 골절이 있었다고 하며 이때 골반신경이 손상되었다고 한다. 이 여성의 진단으로 가장 알맞은 것은?
   - 성적 흥미/흥분 장애
   - 성기-골반 통증 장애
   - 비특정 성기능 장애
   - 극치감 장애
   - 물질/약물 유도 성기능 장애

6. 변태 성욕에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   - 상대방에게 고통을 주게 되므로 법적인 문제를 야기한다.
   - 남녀 성비는 물품 음란증을 제외하고 2:1 정도이다.
   - 변태 성욕적인 자극이나 환상 없이도 성적 흥분을 경험 할 수 있다
   - 어린 시절에 변태성욕자에게 당했던 경험이 원인 중 하나일 수 있다.
   - 50% 이상이 20 세 이후에 발생한다.

7. 절도벽(Kleptomania)으로 추정되는 소견은?
   - 가게 주인에게 앙심을 품고 훔친다
   - 체포되는 일이 있고 난 이후로는 병적 도벽의 빈도가 감소한다
   - 평소 갖고 싶다고 생각했던 물건을 훔쳤다.
   - 법적인 문제를 일으킬 수 있다는 것에 괴로워한다.
   - 물건을 훔치기 위해 사전조사와 계획을 세웠다.

8. 병적 방화로 추정되는 소견인 것은?
   - 소지품에서 이번 방화에 관련된 계획서가 발견되었다
   - 특별한 방화동기를 찾을 수 없다
   - 지능검사에서 IQ 가 59 로 측정되었다
   - 방화 첫 번째로 시도하였다
   - 최근 화재 보험에 가입한 정황이 확인되었다.

   *20 학년말 변형문제 로 생각됨



   29. 병적 방화로 추정되는 소견이 아닌 것은?
   ① 특별한 방화 동기를 찾을 수 없다.
   ② 소지품에서 방화에 관련된 계획서가 발견되었다.
   ③ 평소에 보는 방화설비에 관한 책자가 발견되었다.
   ④ 방화로 2번 째 체포되었다.
   ⑤ 지능검사에서 IQ가 59로 측정되었다.

9. **(21Y)** 다음과 같은 증상이 있을 때 적절한 치료 방법은?

> - 낯선 사람을 만날 때 예외없이 얼굴이 붉어지고 불편한 증상이 나타난다
> - 가족이랑 있을 때는 괜찮다.
> - 너무 힘들어서 학교도 그만두었다.

   - 사회발달치료
   - 인지행동치료
   - 지지적 정신치료
   - 사회기술훈련
   - 노출과 반응 방지

10. 다음과 같은 수술을 시행하려면 5 년 이상 약물치료, 정신치료를 시행함에도 호전이 적은 경우 적응증이 된다. 이 질환에 대한 표준정신치료는 무엇인가?

   - 바이오피드백
   - 신체감응훈련
   - 인지치료
   - 노출 및 반응방지
   - 정신분석을 통한 정신치료

11. 비자살성 자해에 대해 옳지 않은 것?
   - 자해에 대한 갈망이 없는 경우가 대부분이다
   - 1 년동안 최소 5 일 이상의 자해 행동이 있다
   - 일부에서는 처벌의 의도로 하기도 한다
   - 대인관계의 어려움을 해소하기 위해 한다
   - 남자에서 보다 여자에서 더 많다

12. 신체증상으로 인한 정신질환에서 나타나는 불안증상으로 가장 흔한 양상은?
   - 전반적 불안
   - 강박증상
   - **공황증상**
   - 외상으로 인한 재경험
   - 건강염려증

13. **(21Y)** 복용 시 다음 증상을 일으킬 수 있는 약물은?

> 복용한 뒤 갑자기 공포감이 느껴지고 숨이 안 쉬어지고 죽을 것 같은 느낌이 들었다. 이 같은 증상은 10 분 후에 자연스럽게 괜찮아졌다.

   - Yohimbine
   - 니코틴
   - 알코올
   - Diazepam
   - 아편제제

14. 다음 중 해당 환자의 상태에 대한 위험인자로 올바른 것은?

> 40 세 여자 수면제 여러 알 먹고 응급실 옴, 직장 내 성추행으로 법정 공방중인 상태이며, 엄마가 정신신체장애로 4 년간 병원을 다니며 치료 중이다.

   - 정신질환의 가족력
   - 40 세
   - 여성
   - 최근의 스트레스 상황
   - 자살시도 방법

15. **(21Y 변형)** 스트레스 상황에서 일시적으로 환청, 망상 등을 겪게 되는 것을 미시적 정신병 증세라고 한다. 이러한 증상이 나타나는 성격장애는?
   - 조현형 성격장애
   - 조현성 성격장애
   - 반사회적 성격장애

- 자기애적 성격장애
- 강박성 성격장애

*선지에 경계성 성격장애는 없었음

16. 말기암 환자 다음과 같은 사고는 어느 단계에 해당하는가?

> 내 병이 어떤 상태이든, 아들 결혼식 때 까지는 내가 살아 있어야겠다.

- 부정
- 분노
- 우울
- 타협
- 수용

17. 중년 남성, 몇 달 전 공장에서 절단 사고를 경험함. 그 이후로 고추가루와 같이 붉은 색이 들어간 음식을 못먹고, 꿈에서도 자신이 다치던 장면이 반복적으로 나오고, 항상 긴장상태로 외출도 어렵다. 사고 후 6 개월이 지났으나 여전히 증상이 지속되는 상태일 때, 환자의 질환에 있어서 위험인자로 작용하는 것은?
- 남성
- 과거 알코올 복용
- 내적 조절상황 인식
- 기존의 정신질환
- 강박성 성격 장애

18. **(19Y)** 우울증 발생에 관여하는 생리학적 물질 중 다음과 같은 조건들과 관련된 호르몬은?

> HPA-axis 기능 항진, DST (Dexamethasone Suppression test)에서 Dexamethasone 에 의한 억제 소실발생, 뇌하수체 및 부신피질 비대

- 코티졸 (cortisol)
- 테스토스테론 (testosterone)
- 에스트로겐 (estrogen)
- 프로락틴 (prolactin)
- 갑상샘호르몬 (thyroid hormone)

19. 조현병 음성증상으로 알맞은 것은?
- 연상의 이완
- 환각
- 망상
- 음향연상
- 정동둔마

20. 환자에게 이름이 뭐에요? 라고 질문하였을 때 환자의 대답이다. 이에 해당하는 정신 병리는?

> 환자 A: 사람들이 제이름을 물어봐서 대답하면 제이름이 정말 특이하다고 하더군요. 하지만 저는 제이름이 이상하다고 생각하지 않아요. 아버지가 지어주신 이름이거든요. 어머니도 아버지와 함께 고민해주셨을 겁니다. 전 그래서 제 이름이 마음에 들어요. 제이름은 ㅇㅇㅇ 입니다.

- 우원증
- 연상의 이완
- 사고의 이탈
- 사고의 비약
- 지리멸렬

21. 32 세 여자가 출산 후 1 주일후부터, 아기가 장기밀매단에게 팔려갔다고 하여 이에 대한 심리적 평가를 위해 병원에 내원하였다. 친정어머니에게조차 아기를 맡기지 않으려고 하고 의심하였다. 2 주동안 병원에서 치료 후 해당 증상은 완전히 치료되었다. 진단으로 옳은 것은?
- 조현병
- 조현양상장애
- 조현정동장애
- 단기정신병적장애

22. 다음 중 치매와 우울증의 감별점 중 우울증의 특징으로 옳은 것은?
- 인지장애의 정도를 부풀려서 호소함
- 인지기능장애가 서서히 진행되고 언제부터인지 모름
- 기분 상태가 변화무쌍함
- 주의력과 집중력이 불완전함
- 인지기능장애가 비교적 일관되게 나타남

23. TFT (갑상샘 기능 검사)를 시행하는 경우와, 그 검사 결과로 옳은 것은?
- 리튬 복용 – 갑상샘 기능 저하
- 우울 - 갑상샘 기능 항진

- 불안, 초조 - 갑상샘 기능 저하
- TRH 통한 TSH 검사 - TSH 저하
- SSRI 복용 시 - 갑상샘기능 항진

24. **(21Y)** 25 세 남성, 직장도 없고 매일 친구들과 밤에 놀다가 늦게 들어온다. 동공축소, 호흡 저하, 위장관 기능 저하의 증상이 관찰되었다. 양 팔에 주사 자국이 있었다.
    - 코카인
    - 암페타민
    - 아편류
    - 대마초
    - 알코올

25. 다음과 관련된 사고내용의 유형은?

    > 25 세 남자가 TV 방송에서 아나운서가 하는 말이 자신과 연관되어 있다고 하며 자신을 은연중에 암시하고 있다고 한다.

    - 관계망상
    - 피해망상
    - 사고전파
    - 과대망상
    - 색정망상

26. 금연의 금단증상이 아닌 것?
    - 불안
    - 우울감
    - 짜증
    - 식욕감소
    - 집중력 저하

27. ECT 의 절대적 금기인 것은?
    - Space occupying CNS lesion
    - Recent MI
    - Increased ICP
    - 임신
    - 답 없음 (None of above)

    *절대적 금기는 없음. 상대적으로 조심해야하는 경우만 있을 뿐. (강의록)

28. **(21Y)** 34 세 여자가 경계성 성격장애 진단 하에 1 주에 2 번씩 내원하여 치료를 받기로 했다. 정기적으로 치료자를 방문한 환자는 치료자가 옛날에 본인이 살던 동네의 오빠와 같이 느껴진다고 하기도 하고, 환자의 이야기를 잘 들어주는 모습에서 이전에는 이런 의사를 만난 적이 없다며 치료자는 환자가 생각하는 이상적인 아버지의 모습이라고 이야기했다. 이와 같은 정신분석의 과정 및 기법 중 환자가 어린 시절 중요한 사람과의 관계에서 나타내었던 행동 양식, 태도, 감정들이 치료자와의 관계에서 재현되는 것에 해당하는 것은?
    - 전이
    - 역전이
    - 투사적 동일시
    - 해석
    - 저항


29. **(21Y)** 다음 중 노인의 정신과적 약물 치료에 관한 설명으로 옳은 것은?

    가. 적은 용량부터 시작해서 서서히 증량한다.
    나. BZD 계열은 반감기가 짧은 것으로 사용한다
    다. 체지방 증가로 지용성 약물의 효과가 오래 갈 수 있다.
    라. 알부민이 감소하므로 복합작용을 신경 쓰지 않아도 된다.
    - 가다
    - 나라
    - 가나다
    - 가나다라
    - 라

30. **(21Y 변형)** 노인우울증과 관련된 것으로 옳은 것은?

    가. 성인기에 비해서 자살률이 낮다
    나. 나이가 들수록 여성에서 더 많이 발병한다
    다. 인지기능이 보존된다 (불확실, 엄청 틀린 선지)
    라. 신체증상 호소가 흔하다
    - 가, 다
    - 나, 라
    - 가, 나, 다
    - 가, 나, 다, 라
    - 라

    *kmle 에 비슷한 문제 있음. 답도 똑같이 나,라



31. **(21Y)** 제 1 형 양극성 장애의 조증 삽화에서 나타나는 증상으로 옳은 것은?
    - 과민성 기분 (Irritable mood)
    - 정신운동지체 (Psychomotor retardation)
    - 사회적 위축 (Social withdrawal)
    - 비정상적인 죄책감 (guilty feeling)
    - 멜랑콜리 (melancholia)

32. **(21Y)** 21 세 여자 2 년 전부터 하루종일 우울하다. 식욕저하, 수면감소, 체중감소, 무가치감 있다. 환자는 '저는 예전부터 원래 이런 상태였습니다'라고 말했다. 최근 조증삽화, 경조증삽화, 주요우울삽화 등은 없었다. 복용 중인 약물도 없다. 진단으로 가장 고려할 수 있는 것은?
    - 지속성 우울장애
    - 양극성 우울장애
    - 급속 순환성 동반 양극성 장애
    - 주요우울장애

33. **(21Y)** 48 세 여성 3 주 전부터 우울감 느꼈다. 식욕도 없고 수면시간도 줄었다. 좋아하던 취미생활에도 흥미를 잃었다. 2 주 전부터 큰 죄를 지었다며 천벌을 받을거라고 말했다. 벌을 주겠다는 목소리가 들리기도 했다. 진단은?
    - 주요우울장애 정신병적 양상 동반
    - 주요우울장애 비전형적 양상 동반
    - 주요우울장애 혼재성 양상 동반
    - 조현정동장애
    - 조현양상장애

34. 75 세 남자가 우울감과 자살시도로 3 회 입원치료 받으며 Paroxetine 복용했던 과거력 있다. 공존질환으로 부정맥, 심근경색 있는 환자이며, 1 달전 우울증 재발하였다. 해당 환자의 치료에 사용할 수 있는 약물은?
    - Fluoxetine
    - Amitriptyline
    - Alprazolam
    - Propranolol
    - Doxepin

35. **(21Y)** 25 세 남자가 6 년전 제 1 형 양극성 장애 진단을 받았지만 기분안정제는 처방받지 않았다. Kindling effect 를 통해 이 환자의 6 년 동안의 예후에 대해 옳게 예측한 것은?
    - 삽화 간격 감소
    - 삽화 간격 증가
    - 인지 증상 감소
    - 재발 위험성 감소
    - 정동 증상 감소

36. **(21Y)** 32 세 여성이 1-2 개월전 우울하고 죽고 싶고 잠이 안오고 입맛이 떨어져 내원하였다. 이 환자는 1 년 전 제 1 형 양극성장애 판정을 받고 valproic acid 를 복용하였다. 이 환자에게 급성기에 추가할 수 있는 약물은?
    - Quetiapine
    - Lamotrigine
    - Topiramate
    - Bupropione
    - Carbamazepine

37. **(21Y)** 23 세 여자 환자가 주요우울장애로 진단받고 플루오세틴, 서트랄린, 파록세틴, 둘록세틴을 처방받았으나 약을 복용해도 호전이 없었다. 전기경련치료를 했음에도 뚜렷한 호전의 경과가 보이지 않았다. 에스케타민을 나잘 스프레이로 복용하자 호전되었다. 에스케타민은 ( ) 신경전달물질의 수용체에 작용해 약효를 나타낸다. ( )는 흥분성 신경 전달 물질로 활성화되면 대뇌피질 위축과 해마 위축을 나타낸다. ( )로 알맞은 것은?
    - 글루타메이트
    - 세로토닌
    - 도파민
    - 히스타민
    - 노르에피네프린

38. **(21Y)** 42 세 여자가 5 일 전부터 잠을 3 시간만 자면서 피곤한줄 모르고 머리가 잘 돌아가서 쉬지

않고 계속 일한다고 왔다. 3 일 전부터 남자와 동거 시작했다. 산만해서 행정적인 일을 처리하는데 조금 어려움이 있었지만 직장생활에 큰 어려움은 없었다. 과거력에서 30 대에 우울증으로 지속적으로 진료를 받아왔다. DSM-5 진단명은?

- 제 2 형 양극성 장애
- 제 1 형 양극성 장애
- 파괴적 기분조절 장애
- 조현정동장애
- 순환성 장애

39. MMPI-2 검사에 대한 설명이다. 해당 환자에서 가장 높게 나올 것으로 보이는 척도로 알맞은 것은?

> 25 세 여성, 직장생활에 어려움을 겪는 것을 주소로 내원하여 심리검사 시행하였다. 직장에 있는 모든 여자 사원들이 나를 시기, 질투하고 남자 사원들이 나만 쫓아다니는 것 같다. 검사 중 임상적으로 불안감이나 우울감은 관찰되지 않았으며, 검사 중간 중간 쉬는 시간을 요청하고 지쳐 하는 모습 보였다. 검사가 종료된 후 검사자의 손을 붙잡고 꼭 해결해달라고 눈물 글썽이는 모습 관찰되었다.

- 척도 3 히스테리성 (Hy)
- 척도 5 남성특성-여성특성 (Mf)
- 척도 4 반사회성 (Pd)
- 척도 8 조현병 (Sc)
- 척도 2 우울증(D)

40. **(21Y)** 신경성 식욕부진증에서 섭식과 처벌체계 이상에 관련이 있고, 회복 이후에도 이상이 지속되는 신경전달물질은?

- 세로토닌
- 노르에피네프린
- 엔도르핀
- 옥시토신
- 도파민

41. **(21Y)** 신경성 폭식증에서 체중 유지를 위한 폭식 후 보상행동으로 가장 흔한 것은?

- 운동
- 구토
- 하제 투여
- 이뇨제 투여
- 갑상샘 호르몬 투여

42. **(21Y)** 눈을 감은 각성상태에서 주된 뇌파의 상태는?

- 고진폭의 예파
- 베타파
- 알파파
- 세타파
- 델타파

43. **(21Y)** 다음 중 기면증의 증상이 아닌 것은?

- 입면 시 환각
- 수면 중 각성
- 수면 마비(Sleep paralysis)
- 탄력 발작(Cataplexy)
- 주간 졸리움

44. **(21Y)** 격리 또는 강박을 시행하였을 때 진료기록부에 기록할 내용이 아닌 것은?

- 사유 및 내용
- 병명 및 증상
- 개시 및 종료시간
- 지시자 및 수행자
- 강박 시 사용한 도구 및 방법

45. **(21Y)** 권리고지에 해당되지 않은 것은?

- 경찰에 신고할 권리
- 입원적합성 심사를 청구할 권리
- 인신보호법에 따른 구제를 청구할 권리
- 국가인권위원회에 진정할 권리
- 정신건강심사위원회에 퇴원을 청구할 권리

46. **(21Y)** 지역사회 정신보건에서 사업의 원칙으로 틀린 것은?

- 치료의 인접성
- 독립적 생활을 위한 한정적 서비스 제공
- 지지망 구축
- 치료 연속성
- 보건의료와 사회복지 서비스 연결

47. **(21Y)** DSM-5 분류에서 신경발달장애에 해당하지 않는 질병은?

- 유분증

- 자폐스펙트럼장애
- 언어장애
- 지적장애
- 주의력결핍과잉행동장애

48. 이 환자의 진단은?

> 30 개월 환아. 언어 발달 느림으로 내원. 눈 잘 마주치려고 하지 않고, 필요할 때 아니면 부모를 딱히 찾지 않는 모습을 보임. 까치발하고 손 펄럭거리기 등의 행동을 보이고, 기차를 계속 일렬로 정렬하려고 함

- 자폐스펙트럼장애
- 지적 장애
- 학습장애
- 언어 장애
- 사회적 의사소통 장애

49. 다음 증례의 치료로 올바른 것은?

> 7 세 남아. 학교 수업 시간에 창 밖을 보거나 집중 못하고 낙서를 함. 친구들을 좋아하지만 짓궂은 장난을 많이 쳐 잘 어울리지 못함.

- 메틸페니데이트 (중추신경활성제)
- 플루옥세틴 (세로토닌재흡수억제제)
- 이미프라민 (삼환계항우울제)
- 리스페리돈 (비정형항정신제)
- 로라제팜 (벤조디아제핀계)

50. 다음 중 뇌발달에 대한 설명으로 옳은 것은?
- 1 세까지 대부분의 발달 완성된다
- 생후 시냅스가 매우 많이 형성되고, 이후 발달과정에서 synaptic pruning 을 통해서 시냅스의 수가 줄어든다
- 생후 발달단계에서 회백질 증가, 백질은 증가했다가 감소한다.
- 인지능력을 담당하는 전두엽이 이른 시기에 먼저 발달한다.

51. **(21Y)** 이 환자의 진단은?

> 6 세 남아. 2 년 전에 눈 깜빡거리는 증상과 입술을 씰룩거리는 증상을 호소했다. 1 년 전에는 헛기침을 하면서 소리를 냈다. 이비인후과와 안과를 방문했는데 모두 이상이 없다고 했다. 일시적으로 증상을 억제할 수는 있었고 wax and wane 의 형태로 나타났다.

- 뚜렛 장애
- 잠정적 틱장애
- 상동행동장애
- 헌팅턴 무도병
- 불수의적 근육장애

52. ADHD 에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ADHD 는 증상이 경하거나 부모에게 반항하는 등 부모와의 관계가 나쁜 경우에는 부모 교육을 할 수 있다.
- ADHD 는 전산화된 주의력 검사를 통해 진단한다.
- ADHD 는 세로토닌에 작용하는 약물이 주 약물치료이다.
- 나이가 들면 주의력 결핍, 과잉행동, 충동성 중 유일하게 주의력 결핍이 호전된다.
- 사춘기에 발생한 ADHD 에서 성인까지 지속되는 경우는 극히 적다.

53. 소아청소년의 정신건강에 대한 설명으로 옳은 것은?
- 학령기 장애와 문제 행동은 그 개인과 가족, 사회에게 끼치는 후유증이 매우 심하다 (질병부담이 크다)
- 성인에 비해 정신과 문턱이 낮아 치료비율이 높다.
- 대부분의 정신장애와 문제행동은 후기 청소년기에 호전된다.
- 소아청소년의 정신장애와 문제행동은 흔하지는 않지만 발생한다면 심각하다.
- 소아청소년의 부모 정신병리 있어도 아이 치료에만 집중한다.

54. 소아청소년 면담 시 유의할 점은?
- 청소년의 경우, 환자와의 신뢰관계 형성 위해 청소년 먼저, 부모 나중에 면담한다.

- 청소년의 경우, 자살사고에 대해 물어볼 경우 자살사고 악화될 수 있으므로 직접 물어보지 않고 부모에게 물어본다.
- 청소년의 경우, 성적인 발달이나 이성관계는 첫 면담에 물어보는 것이 좋다.
- 어린 아동의 경우, 병원에 온 이유 물어보면 불편감 느끼고 치료 동맹 깨지므로 물어보지 않는다.
- 어린 아동의 경우, 진료실에 장난감 두면 면담에 방해되므로 장난감을 놓지 않는 것이 좋다.

55. 노년기 정신장애 중 섬망의 특성에 대하여 틀린 것은?
    - 입원 중 섬망은 사망과는 관계가 없다
    - 여러가지 원인에 의해 발생한다
    - 증상이 수일 또는 수시간에 걸쳐 급성으로 나타난다
    - 밤낮으로 증상 변화가 심하다
    - 원인 치료가 빨리 이루어지지 않으면 비가역적 인지기능 장애가 생길 수 있다.

56. 베르니케 뇌병증(Wernike encephalopathy)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    - 만성적 과음 후 기억상실을 유발한다
    - 불가역적이어서 인지능력 회복이 거의 불가능하다
    - Ataxia, Ophthalmoplegia, Confusion 이 특징적인 증상이다
    - 티아민 결핍으로 인해 발생한다.