<2021 본 3 학년말고사- 정신과>

총 **50 문제** 중 **50 문제** 복원

1. 자살을 시도하다가 극적으로 구조된 20 대 남성. 자신이 누군가로부터 뇌를 조종당하고 있었기 때문에 자살할 수 밖에 없었다고 진술하였다. 해당 환자에 대한 초기 진찰로써 가장 적절한 것은?
   - 어떤 방법으로 조종당했는지 설명해보시죠
   - 당신처럼 뇌 조종을 당하는 다른 사람들도 본 적 있습니까?
   - 뇌 약물을 드릴 테니 금방 괜찮아지실겁니다.
   - 지금이 몇 년 몇 월 몇 일이죠?
   - <u>그런 일이 있으셔서 많이 힘드셨겠군요</u>

2. 다음과 관련된 사고내용의 유형은?

   [25 세 남자가 TV 방송에서 아나운서가 하는 말이 자신과 연관되어 있다고 하며 자신을 은연중에 암시하고 있다고 한다.
   - <u>관계망상</u>
   - 피해망상
   - 사고전파
   - 과대망상
   - 색정망상

3. 32 세 여자 우울증 환자가 정신분석적 정신치료를 받던 중, 10 번째 세션을 한 차례 임의로 중단하였고 이후에 실시한 정신치료의 내용은 다음과 같다. 이처럼 환자가 의식적으로는 증상의 원인과 이유를 찾고 증상의 치유와 완화를 위해 정신치료를 받지만, 역설적으로 의식적인 생각과 반대되는 무의식적인 여러가지 방법을 동원하여 정신치료를 방해하는 것을 무엇이라고 하는가?

   - 치료자 : 지난번에 오지 않은 이유가 있나요?
   - 환자 : 그냥 오기 싫었어요
   - 치료자 : 왜죠?
   - 환자 : 그냥 치료받기가 싫어서요
   - 치료자 : 그래요?
   - 환자 : 저는 아무런 증세가 없거든요
   - 역전이
   - <u>저항</u>
   - 훈습
   - 전이
   - 해석

4. 41 세 여성환자, 3 개월 전부터 복부통증 있다고 호소하였다. 병원에서 내과적, 영상의학과적, 산부인과적 검사상 이상소견은 보이지 않았다. 문진 상 여러 병원에서 수많은 검사들을 받아보았다고 하였다. 기분에 대해 물어보자 기분은 전혀 문제 없다고 대답하였다. 현재 치매를 앓고 있는 부모와 지적장애 동생을 홀로 돌보고 있으며, 5 개월 전에 이혼하였다고 한다. 진료를 하는 중에 자신의 신체 증상에 주목해달라고 의사에게 호소하는 모습을 보였다. 이 환자의 방어기제는?
   - <u>신체화</u>
   - 승화
   - 억제

5. 한자 '들을 청(聽)'은 귀(耳), 눈(目), 마음(心), 밝음(壬)으로 구성되어 있다. 이것이 정신과 면담에 시사하는 바를 가장 적절히 기술한 것은?

   - 귀로 잘 듣고, 눈으로 잘 보고, 마음을 잘 공감한다.
   - 귀로만 잘 듣는다.
   - 마음으로만 잘 동정한다.
   - 눈으로만 잘 본다.
   - 마음으로만 잘 공감한다.

6. 29 세 남자, 대학원 박사과정에 있는자. 방금 복도를 지나가는 저 사람이 본인의 동료인데 여기까지 쫓아왔다고 함. 동료들이 자신을 괴롭히고, 본인의 컴퓨터를 해킹하였다고 하는데 구체적인 시기나 방법등에 대해 떠올리지 못함. K-WAIS 검사결과 지능점수가 119 이나 언어이해 119, 지각추론 129, 작업기억 109, 처리속도 98 으로 항목별 편차가 크다. MMPI-2 검사결과 F 척도 76, 6 번 척도 85 점, 8 번척도 75 점이다. 진단으로 올바른 것은?

   - 조현병
   - 주요우울장애

7. 2. 30 세 남자, 3 년째 조현병 약 사용중이다. 비전형 항정신병약물 3 가지 약제 복용하다가 효과 없어서 약제 변경하면서 CBC 정기추적중이다. 추적해야할 지표는?

   - agranulocytosis
   - RBC
   - WBC
   - Platelet
   - reticulocyte

8. 45 세 여성으로 9 년째 조현병 약 사용중이다. 입 안면이 돌아가는 증상이 나타나고 사지로 증상이 퍼졌다. 무슨 증상인가

   - Acute dystonia
   - Tardive dyskinesia
   - Akathisia
   - Neuroleptic malignant syndrome

9. 32 세 여성이 1-2 개월 전 우울하고 죽고 싶고 잠이 안오고 입맛이 떨어져 내원하였다. 이 환자는 1 년 전 제 I 형 양극성장애 판정을 받고 valproic acid 를 복용하였다. 이 환자에게 급성기에 추가할 수 있는 약물은?

   - Quetiapine
   - Lamotrigine
   - Topiramate
   - Bupropion
   - Carbamazepine

10. 32 세 여성 환자가 2 년 전 아버지를 잃은 후부터 지속적인 우울감으로 병원에 내원하였다. 일상적인 일을 할 때마다 아버지가 계속해서 생각이 나서 우울해지고 아버지께서 힘드셔서 자살을 선택했음에도 돌아가실 때까지 아버지께서 힘드신 걸 알지 못했다는 사실에 삶의 의욕을 잃고 죽고싶었다. 해당 환자의 진단은?

    - 주요우울장애
    - 지연된 애도장애
    - 정상 애도반응
    - 양극성 우울장애
    - 적응장애

11. 25 세 남자가 6 년 전 제 I 형 양극성 장애 진단을 받았지만 기분안정제는 처방 받지 않았다. Kindling effect 를 통해 이 환자의 6 년 동안의 예후에 대해 옳게 예측한 것은?

    - 삽화 간격 감소
    - 삽화 간격 증가
    - 인지 증상 감소
    - 재발 위험성 감소
    - 정동 증상 감소

12. 75 세 남자가 우울감과 자살 시도로 3 회 입원치료 받은 적 있다. 심근경색의 과거력이 있는 환자이며, 1 달 전 우울증 재발 및 자살시도로 내원하였다. 해당 환자에서 사용할 수 있는 치료는?

    - Antipsychotics
    - Benzodiazepine
    - TCA
    - ECT
    - MAOI

13. 22 세 남성이 우울 삽화로 내원하였다. 이 환자는 내향적 성격이며, 삽화는 서서히 발생하였고, 정신이 초조한 증상을 호소하였다. 과수면의 증상 역시 호소하였고, 양극성장애의 가족력은 따로 없다고 한다. 다음 중 단극성(unipolar)에 비해 양극성(bipolar) 우울 장애를 더 시사하는 소견은?

    - 내향적 성격
    - 삽화 서서히 발생
    - 정신 초조증상
    - 과수면
    - 양극성장애 가족력 없음

14. 27 세 여성이 10 시간 이상 자도 피곤하다고 호소하며 내원하였다. 3 개월 전 친한 친구에게 여행가자고 제안했으나 거절당한 뒤로 우울하고 의욕 감소했다고 한다. TV 예능보면 기분 좀 나아졌지만 금세 다시 가라앉는다. 누우면 팔에 힘이 빠지고 몸이 무거워 일어나지 못하며 식욕이 증가하였다고 한다. 진단은?

    - 멜랑콜리아 양상 동반 주요우울장애
    - 비전형적 양상 동반 주요우울장애
    - 긴장증 동반 주요우울장애
    - 계절성 양상 동반 주요우울장애
    - 혼합 양상 동반 주요우울장애

15. 30 대 여성이 불안하고 가슴이 뛰는 증상으로 내원하였을 때 우선적으로 해야 할 검사는?

    - 기능뇌파검사
    - 간기능검사
    - 갑상선 기능검사
    - 신장사구체 여과율
    - 뇌 자기공명검사

16. 17 세 여성 환자가 보호자와 함께 외래로 왔다. 환자는 아이돌연습생으로 평소 체중관리에 관심이 많다. 식이제한을 하며 체중을 감량하여 현재 160cm, 38kg 이다. 6 개월간 무월경상태이다. 부모님이 식이제한을 그만하라고 하지만 체중이 증가하는 것에 강한 거부감을 가지고 있고, 치료도 거부하였다. 환자의 진단은?

    - 신경성 식욕부진증
    - 신경성 폭식증

- 폭식장애
- Pica

17. 20 세 여성이 폭식을 많이 하는 것을 주소로 내원하였다. 환자는 167cm 40kg 이며 최근 6 개월간 무월경이다. 최근에 환자는 죽을 하루에 한끼만 먹었고, 체중이 조금이라도 증가하면 심하게 운동을 하거나 변연화제를 이용하여 체중을 감량하였다. 진단은?
    - 신경성 식욕부진증
    - 신경성 폭식증
    - 폭식장애

18. 35 세 직장인 남성. 최근에 야근 스트레스로 인하여 집에 와서 음식을 많이 먹었다.1 시간만에 치킨 3 마리씩을 먹기도 하였다. 먹고 나서는 속이 더부룩하였고, 식욕을 절제하지 못한 것에 대하여 죄책감이 있었다. 이런 일은 1 주일에 2-3 번 정도 있었고, 먹을 때에는 먹는 것을 절제할 수 없었다. 구토를 하거나 연화제를 사용하지는 않았다. 환자의 진단은?
    - 신경성 식욕부진증
    - 신경성 폭식증
    - 폭식장애
    - 야식 증후군

19. 23 세 남성. 최근에 수업을 듣다가 졸려서 집중을 하지 못하고, 잠들어서 친구들이 깨운 적이 몇번 있었다. 텔레비전을 보다가 웃었을 때 기운이 빠지면서 얼굴이 일그러지는 느낌이 있었다. 환자의 검사 계획은?
    - 근전도
    - 수면다원검사
    - 뇌 MRI

20. 24 세 여성. 환자는 평소에 밤에 잠들 때에는 잘 잠들었으나, 중간에 계속 깬다고 한다. 환자가 복용할 약물은?
    - Diazepam
    - Midazolam
    - Modafinil
    - Alprazolam

21. 35 세 여성, 잠을 제대로 자지 못해서 내원하였다. 반대로 깨어있어야 할 때 졸렸다. 현재 직업 간호사로, 3 교대 근무중이다. 해야할 치료는?
    - 전기경련치료
    - 광치료
    - 뇌심부자극술
    - 안구운동탈민감재처리
    - 멜라토닌

22. 38 세 여성. 불면증으로 약물 치료 받아서 2 주 치료 후 불면증은 해소가 되었으나, 자다가 일어나서 음식을 먹고, 그 사실을 아침에는 기억하지 못하는 모습을 보였다. 환자가 처방받았을 약물은?
    - Midazolam
    - Modafinil
    - Clonazepam
    - Trazodone
    - 졸피뎀

23. 45세 여성. 환자가 잠을 하루에 1시간정도밖에 제대로 자지 못하고 개운하지 않다고 한다. 하지만 남편의 말로는 중간에 깨지 않고 계속 잔다고 하였다. 수면다원검사 결과는 다음과 같다. 추가 계획은?

    Total sleep time : 455min

    Sleep efficiency : 91%

    Sleep latency : 15min

    Arousal index : 5

    Apnea, hypopnea index : 1.1

    Limb movement : 0

    - Clonazepine 처방
    - Multiple latency test
    - CPAP
    - 광치료

24. 23 세 남성. 본인의 눈썹이 비대칭이어서 불만이라고 한다. 하루에 4-5 시간씩 거울을 보면서 눈썹을 다듬으며 시간을 보낸다고 한다. 치료약제와 용량은?

    - Fluoxetine 10mg
    - Bupropion 300mg
    - Sertraline 200mg

25. 40세 여성. 3주 전에 교통사고를 당했다. 그 뒤로는 그 때의 신체증상이 나타나서 차를 타지 못하고, 자동차 근처만 가도 숨차고 주저앉는다고 한다. 환자의 진단은?

    - PTSD
    - 급성 스트레스 장애

26. 20 대 여성이 자신이 아닌 것 같고, 기분이 이상하다는 것을 주소로 내원하였다. 발표 도중에 분명히 자신이 말하고 있는 것은 알지만 기분이 이상하고, 자신이 발표하는 것을 자신이 지켜보는 것 같은 기분이 들었다.

    - 이인성 장애
    - 비현실감
    - 공황장애

27. 50 대 여성이 우울, 불안으로 내원하였다. 교수로 근무하다가 학부모에게 억울하게 멱살을 잡힌 후 우울하고 불안했다. 2 주 전에는 학교에서 퇴직하였다. 이 환자에 관한 옳은 설명은?

    - 1 달 이상 지속시 진단 가능하다
    - 일반적으로 3 개월 이상 지속되지 않는다.
    - 우울형, 불안형, 혼합형이 있다.
    - 증상으로는 -----이 있다.
    - 신체질환, 약물에 의한 것도 포함된다.

28. 30 대 남성이 5 달 전에 이사왔는데, 밑에 집에서 몇번 항의하였다. 그 후 환자는 또 항의할까 하는 두려움에 불안하고, 잠을 못잤다. 진단은?(답 확실하지 않음)

    - 범불안장애
    - PTSD
    - 급성 스트레스 증후군
    - 적응장애
    - 공황장애

29. 21 세 여성이 자신으로부터 분리되어 자신을 관찰하는 증상이 반복되어 내원하였다. 신경과 검사 결과 뇌에는 이상이 없었고, 약물 복용중

인 것도 없으며 술이나 담배를 하지도 않았다. 이 환자의 면담 내용으로 가장 가능성이 낮은 것은?

- 현실이 아니라 꿈을 꾸고 있는 것 같아요
- 마음이 편해지고 이완이 되는 것 같아요
- 한번 시작되면 2-3 시간 정도 지속되는 것 같아요
- 제가 제 자신을 연기하고 있는 것 같아요
- 주변의 사물이 작게 보이는 것 같아요

30. 기억력 저하를 주소로 내원한 환자가 요즘 들어 급작스럽 게 피곤하다 하고, 기분이 계속 좋지 않다고 하였다. 환자는 MMSE 검사에서 27 점을 받았으며, 정신상태 검사를 진행하 려 하자 모른다며 검사를 포기하려 했지만, 겨우 동기를 부여 해주며 검사를 끝마쳤다. 이 환자에게 처방해야 할 약물은?

- 항우울제
- 항불안제
- 기분안정제
- 항정신병약물

31. 베르니케 뇌병증에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 급성 증상이다
- Thiamine 결핍으로 인해 나타나는 증상이다.
- 만성 음주로 인해 인지기억의 저하가 나타난다.
- Confusion, nystagmus, ataxia 의 증상을 나타낸다.
- 불가역적이며 서서히 발생한다.

32. 기억력이 떨어진다며 방문하였다. 6 개월 전 갑자기 기억력 감퇴가 느껴졌으며 이후 계단식으로 기억력이 떨어진다고 하였다. 보호자들은 환자의 기억력이 좋아질 때도 있고 다시 나빠질 때도 있었다고 한다. 왼쪽 손에 가끔씩 저린 느낌이 있었고, 식사 때 음식물을 입에서 흘릴 때도 있었다. 우울하거나 무기력하지는 않았고, 식욕도 괜찮은 편이라고 하였다. 손떨림은 없었고, 보행할 때도 특별한 불편함은 없었다. 4 년전 뇌졸중으로 약물을 복용하다가 2 년전 중단했다고 한다. 고혈압과 당뇨 약은 5 년째 복용 중이었다. 1 개월 전 타 병원에서 시행한 MMSE 점수가 21 점, 이번 방문 당시 시행한 MMSE 점수가 24 점이었다. 뇌 자기공명영상 검사상 오른쪽 기저핵 주변에 국소 허혈성 병변이 관찰되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영 검사상 아밀로이드 축적은 관찰되지 않았다. 기억력 감퇴의 양상으로 볼 때 가장 가능성이 높은 진단은?

- 전두측두엽 치매
- 가성 치매
- 알츠하이머 치매
- 파킨슨 치매
- 혈관성 치매

33. 49 세 여자환자가 잘 알고 있던 단어가 생각이 나지 않는다며 방문하였다. 12 개월 전부터 일상생활에서 사용하던 단어를 기억해내기 어려워졌다고 하며, 더불어 이전에 비해 다소 행동이 충동적으로 변한 것 같다고 가족들이 보고하였다. 음식에 대한 절제가 이전에 비해 어려워지고, 타인의 감정에 다소 둔감해지고 별 일 아닌 일에 예민하게 굴고 화를 내는 경우도 빈번해졌다고 하였다. 우울했던 적은 없으며, 수

면도 적절히 유지된다고 하였다. 보행 문제나 손떨림은 없었다. 시간, 장소, 사람에 대한 지남력은 양호했으며, 단기 및 장기 기억 검사상 등록과 회상에 이상은 관찰되지 않았다. 양치질하는 시늉을 해보라고 요청하자 말로는 표현하나, 행동으로 옮기기에는 어려움을 보였다. MMSE=20, CDR=0.5 로 측정되었다. 뇌 자기공명영상 검사상 양측 전두엽에서 다른 부위에 비해 유의미한 위축이 관찰되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영검사상 아밀로이드 축적은 관찰되지 않았다. 행동 및 검사 양상으로 볼 때 가장 가능성이 높은 진단은?

- 전두측두엽 치매
- 가성 치매
- 알츠하이머 치매
- 파킨슨 치매
- 혈관성 치매

34. 금연의 금단증상이 아닌 것?

- 불안
- 우울감
- 짜증
- 식욕감소
- 집중력 저하

35. 직장도 없고 매일 친구들과 밤에 놀다가 늦게 들어온다. 동공 축소, 호흡 저하, 위장관 기능 저하. 양 팔에 주사 자국 있었다.

- 코카인
- 암페타민
- 아편류
- 대마초
- 알코올

36. 비자살성 자해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 자해에 대한 갈망이 없는 경우가 대부분이다.
- 1 년 동안 최소 5 일 이상의 자해행동이 있다.
- 일부에서는 처벌의 의도로 하기도 한다.
- 대인관계의 어려움을 해소하기 위해 한다.
- 남자보다 여자에서 더 많다.

37. 절도벽으로 추정되는 소견은?

- 가게주인에게 앙심을 품고 훔친다.
- 체포되는 일이 있고 난 후로 빈도가 감소한다.
- 평소 갖고 싶다고 생각했던 물건을 훔쳤다.
- 법적인 문제를 일으킬 수 있다는 것에 괴로워한다.
- 물건을 훔치기 위해 사전조사와 계획을 세웠다.

38. 병적 방화를 시사하는 소견인 것은?

- 이번 방화와 관련된 계획서가 발견되었다.
- 특별한 방화 동기를 찾을 수 없었다.
- IQ 가 59 였다.
- 최근 화재보험에 가입한 정황이 있다.
- 방화 첫 번째로 시도하였다.

39. 41 세 여자 복통으로 내원하였다. 내과적, 영상의학적 검사에서 전부 이상 없었다. 최근 스트레스 받는 일 많이 있었다. 심각한 병이 아닐까 불안해하였으며 의사에게 자신이 아프다는 것을 알아줬으면 한다고 했다.

- 신체화
- 투사
- 억압
- 억제

40. 8 세 아이가 학교 수업을 따라가지 못함을 주소로 내원했다. 친구들과도 잘 못 어울리고, 어릴적 배변훈련도 오래 걸렸고, 운동도 또래보다 못하고 전반적으로 발달이 안좋은 상황을 문제에서 제시해줌. IQ 는 60

- 특정학습장애
- 경도 지적장애
- 전반적발달장애
- 중증도 지적장애
- 자폐스펙트럼

41. 6 세 남아. 학교 수업 시간에 창 밖을 보거나 집중 못하고 낙서를 함. 또래와의 게임에서 지기 싫어하는 모습. 이 아이가 복용하는 약물 중 도파민에 작용하는 약물로 식욕감소 및 기분장애 등의 부작용이 있는 약물은?

- 아토목세틴
- 메틸페니데이트
- 클로니딘
- 암페타민

42. 6 세 남아. 학교 수업 시간에 창 밖을 보거나 집중 못하고 낙서를 함. 또래와의 게임에서 지기 싫어하는 모습. 진단은?

- 주의력 결핍장애
- 품행장애
- 간헐적 폭발장애
- 파괴적 행동장애

43. 8 세 아이. 2 년 전에 눈 깜빡거리는 증상과 입술을 씰룩거리는 증상을 호소했다. 1 년 전에는 헛기침을 하면서 소리를 냈다. 이비인후과와 안과를 방문했는데 모두 이상이 없다고 했다. 일시적으로 증상을 억제할 수는 있었고 wax and wane 의 형태로 나타났다.

- 뚜렛장애
- 잠정적 틱장애
- 상동행동장애
- 헌팅턴 무도병
- 불수의적 근육장애

44. 난폭한 환자가 응급실에 내원하였다. 위험 예방을 위한 대처 원칙으로 맞는 것은?

- 시선을 계속 맞추고 있는다
- 조용히 계속 듣는다
- 억압하지 않을 것이라 안심시킨다
- 침대에 눕히고 서서 얘기한다
- 면담실에서 단둘이 얘기한다

45. 다음의 환자 사례를 통해 알 수 있는 환자의 상태는 무엇인가?

81 세 할아버지가 폐렴으로 입원하였다. 입원한 후 밤에 잠을 못 자고 허공에 손짓을 했다. 학교를 가야한다며 수액줄을 뽑고 침대 밖으로 나가려고 했다.

- 혼란
- 섬망
- 작화증
- 보속증
- 망상

46. 다음 중 노년기 우울증에서 일반적인 성인 우울증에 비해 더 자주 관찰되는 증상에 해당하는 것은?
    - 무기력감
    - 신체증상 호소
    - 슬픔 호소
    - 죄책감
    - 우울증의 가족력

47. 다음 중 노인의 항정신성 약물치료에 관한 것으로 옳은 것은?

    가. 적은 용량부터 시작해서 서서히 증량한다.

    나. 벤조다이아제핀 계열은 반감기가 짧은 것으로 사용한다.

    다. 체지방 증가로 지용성 약물의 효과가 오래 갈 수 있다.


    라. 알부민이 감소하므로 복합 작용을 신경쓰지 않아도 된다.

    - 가,나,다

48. 현행 정신건강복지법 상 정신건강의학과 전문의가 아닌 의사도 입원을 시킬 수 있는 입원의 형태는?
    - 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 의한 입원
    - 동의입원
    - 자의입원
    - 보호의무자에 의한 입원
    - 응급입원

49. 강박 시 기록할 내용이 아닌 것은?
    - 사유 및 내용
    - 병명 및 증상
    - 개시 및 종료시간
    - 지시자 및 수행자
    - 강박 시 사용한 도구 및 방법

50. MMPI-2 그래프 주어지고, F 수치, 2 번,4 번 수치 높아져있는 그래프. 실제 시험에서는 화질 때문에 2,4 번이 높다는 것만 보이고 정확히 어떤 수치인지 글씨가 보이지는 않았음.



- 우울해서 죽고 싶어요
- 불안해요. 술을 매우 마시고 싶어요
- 벌레가 기어다니는 것 같아요
- 사람들이 나를 쳐다보는 거 같아요
- 온몸이 다 아파요.