2023학년도 정신건강의학과 학년말고사 (231030)

* 60분 시험(CBT)

총 **50문항** 중 **50문항** 복기.
총평: 교수님들께서 전반적으로 탈야마 하셨습니다. 최준호P, 김대호P, 노성원P, 김인향P 파트에서 새로운 문제들이 많이 나왔습니다. (야마 탄 파트가 적은 듯...) 최준호P는 초지엽 문제를 내셨습니다.

1. 뇌신경 전달 물질 중 억제성 역할을 하면서 아미노산 계열인 물질은?
① GABA
② Dopamine
③ Norepinephrine
④ Serotonin
⑤ Acetylcholine

2. 리튬 농도와 그에 맞는 부작용으로 알맞게 짝지어진 것은?
① 2.0~2.5mEq/L-vomiting
② 2.0~2.5mEq/L-abdominal pain
③ 2.0~2.5mEq/L-renal failure
④ 1.5~2.0mEq/L-muscle fasciculation
⑤ 2.5mEq/L-general convulsion

3. 며칠 전부터 잠 많이 안자고 크게 떠들고 돈 많이 쓰는 여자(조증삽화). 정신과적 치료를 받은적이 없음. 투여해야 할 리튬 농도?
① 0.3~0.6 mEq/L
② 0.6~1.0 mEq/L
③ 1.0~1.5 mEq/L
④ 1.5~2.0 mEq/L
⑤ 2.0~2.4 mEq/L

4. 불규칙한 월경으로 내원한 여성. 체모 과다, 여성형 탈모, 여드름이 있음. 사용한 약제?
① Carbamazepine
② Lithium
③ Valproate
④ Clozapine
⑤ Escitalopram

5. 조현병 환자 면담하는 지문..
의사의 물음에 환자가 대답하는데 환자가 말하다가 " 의사 이사 상사 검사 장사 농사…." 라고 말함.
다음 중 환자의 증상으로 맞는 것은?
① 음향연상증
② 말비빔
③ 음송증

6. 다음은 혈연관계에 따른 조현병의 발병 위험률을 나타낸 것이다. 빈칸에 들어갈 수치는?

인구군	유병률(%)
일반인구	1.0
조현병 환자의 형제	8.0
부모 중 한사람이 조현병 환자	12.0
조현병 환자의 이란성 쌍둥이	( )
부모 모두 조현병 환자	40.0
조현병 환자의 일란성 쌍둥이	47.0

① 12%
② 13%
③ 14%
④ 15%
⑤ 16%

7. 다음 진찰에서 나타나는 증상은? (선지 옆에 괄호 치고 영어도 같이 줌)

> 의사: 요즘 어떠세요?
> 환자: 요즘 어떠냐구요? 날씨가 추워졌어요. 따뜻한 밥을 먹어야돼요. 따뜻한 밥이 맛있거든요. ~~~ (결국 의사의 질문에 대답 못했음)

① 사고 이탈
② 우원증
③ 연상의 이완

8. 조현병의 음성증상에 대한 설명이다. 해당하는 것은?

> 즐거움을 경험하지 못하고 감정적으로 비어있는 느낌
> 취미활동, 만남 때로는 이성에 대한 관심과 성관계에서도 즐거움을 느끼지 못함
> 사회적 활동이나 관계를 갖지 않고 고립된 생활을 함

① 무쾌감증
② 무의욕증
③ 정동둔마
④ 무언증
⑤ 주의력손상

9. 물질 중 소변검사에서 검출 가능한 시한이 가장 긴 물질은?
① 코카인
② 암페타민
③ 대마초
④ 코데인
⑤ 모르핀

10. 32세 여성이 1~2개월 전 우울하고 죽고 싶고, 잠이 안 오고 입맛이 떨어져 내원하였다. 이 환자는 1년 전 제 1형 양극성 장애 판정을 받아 valproic acid를 복용하였다. 급성기 부가약물은?
① 퀘티아핀
② 아토목세틴
③ 올란자핀
④ 클로자핀
⑤ 라모트리진

11. 조증환자에서 가장 흔한 증상?
① 우울한 기분
② 과민한 기분
③ 불안정한 기분

12. 에스케타민은 마취제의 일종으로 비강 스프레이를 통해 주입한다. (A) 신경전달물질의 수용체에 작용해 약효를 나타낸다. (A)는 흥분성 신경전달 물질로, 활성화시 대뇌 피질 위축과 해마위축을 나타낼 수 있다. (A)에 들어갈 물질은?
① 세로토닌
② 노르에피네프린
③ 글루타메이트
④ 도파민
⑤ 히스타민

13. 29세 여자 환자가 주요우울장애로 진단받았다. 직장 상사가 칭찬하면 기분이 좋아지는 양상이 있었다. 과다수면과 식욕증가가 있었고 팔, 다리가 납으로 된 것처럼 무겁게 느껴졌다. 비정상적으로 들뜬 조증, 경조증의 증상은 없었다. 과민한 반응, 안전부절못함, 통제력 상실의 느낌은 없었다. 망상이랑 환각은 없었다. 우울장애의 명시자는?
① 멜랑콜리아 양상동반
② 혼재성 양상 동반
③ 정신병적 양상 동반
④ 비전형적 양상 동반
⑤ 불안증 양상 동반

14. 사업하는 사람. 경기가 불황이라 사업이 잘 안 되는 것을 걱정하여 잠을 잘 못 이룸. 사업은 실제로는 괜찮게 진행됨. 동반될 가능성이 높은 질환은?
① 관상동맥질환
② 긴장성두통
③ 하지불안증
④ 틱장애

15. 18세 남자. 최근에 게임에서 로그아웃을 하지 않아 해킹당한 적이 있음. 이후로 로그아웃했는지 확인하는데 하루 3시간 이상 사용함. 이때 사용된 방어기제? (영어도 같이 주어짐)
① 반동형성
② 취소
③ 전치
④ 억압

16. 38세 여자. 3개월 전부터 시작된 우울감으로 내원하였음. 사는데 흥미 잃었고, 식욕도 없고 수면시간도 줄었다. 좋아하던 취미생활에도 흥미를 잃었다. 2주 전부터 큰 죄를 지었다며 천벌을 받을 거라고 말했다. 치료는?
① 항우울제 + 항정신병 약물
② 항정신병 약물
③ 항우울제
④ 기분안정제

17. 18세 여학생, 고등학교 진학 후 잠이 늘어서 외래로 내원하였다. 평소 주간에는 7시간, 주말에는 8-10시간 수면을 취한다. 하지만 수업을 하거나 시험을 볼 때, 점심을 먹다가도 갑자기 졸아 학교에서 잠보라는 별명으로 불린다. 잠시 자고나면 증상이 개선되지만 이내 곧 피로감을 느끼며 잠에 든다. 다음 환자에게 시행해야 하는 검사는?
① 주간수면잠복기 반복검사
② 활동추적검사
③ 뇌영상검사
④ 근전도검사
⑤ 유발전위검사

18. 70대 노인 B씨는 물건을 자주 잃어버리고, 요일과 날짜를 잊고, 길을 잃어버려서 병원에 내원하였다. MMSE검사를 시행한 결과는 다음과 같았다. 다음 표를 보고 어느 영역이 손상된 것인지 확인하시오.

	답변	점수
100 - 7	93	0 1(O)
93 - 7	83	0(O) 1
86 - 7	76	0 1(O)
79 - 7	70	0(O) 1
72 - 7	61	0(O) 1
총점		2점 (<5백분위수 미만)

① 기억등록
② 지남력
③ 집중력
④ 언어기능
⑤ 기억회상

19. 니코틴 수용체의 a4b2 partial agonist로 작용하여 도파민 분비시키는 작용을 하는 물질은?
① bupropion
② 니코틴 패치
③ varenicline
④ clonidine

20. 30대 남성, 잠에 들지 못 할까 걱정되어 과다각성, 불안함이 반복되어 악순환되는 양상을 보였다. 다음 중의 환자의 진단으로 적절한 것은?
① 하지불안증후군
② 일주기 리듬 수면각성장애
③ 정신생리적 불면증
④ 수면무호흡증

21. 가장 좋은 수면제는 수면구조(sleep architecture)에 영향을 미치지 않고, 반동 불면이 없어야 한다. 위 조건에 해당하는 수면제는?
① 졸피뎀
② 클로나제팜
③ 알프라졸람
④ 트리아졸람
⑤ 로라제팜

22. 64세 남자환자가 기억력이 떨어진다며 방문하였다. 12년 전부터 기억력 감퇴가 느껴졌으며, 이후 계단식으로 기억력이 떨어진다고 하였다. 왼손에 가끔씩 저린 느낌이 있었고 식사 때 음식물을 입에서 흘릴 때도 있었다. 우울하거나 무기력하지는 않았고, 식욕도 괜찮은 편이라고 하였다. 손 떨림은 없었고, 보행할 때도 특별한 불편함은 없었다. 4년전 뇌졸중으로 약물을 복용하다가 2년전 중단했다고 한다. 1년전 타병원에서 시행한 MMSE점수가 24점, 이번 방문 당시 시행한 MMSE 점수가 20점이었다. 뇌 자기공명영상 검사상 오른쪽 기저핵 주변에 국소 허혈성 병변이 관찰되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영 검사상 아밀로이드 축적은 관찰되지 않았다. 기억력 감퇴의 양상으로 볼 때 가장 가능성이 높은 진단은?
① 전두측두엽치매
② 레이소체치매
③ 알츠하이머치매
④ 파킨슨치매
⑤ 혈관성치매

23. 49세 여자 환자가 잘 알고 있던 단어가 생각이 나지 않는다며 방문하였다. 12개월 전부터 일상생활에서 사용하던 단어를 기억해내기 어려워졌다고 하며, 더불어 이전에 비해 다소 행동이 충동적으로 변한 것 같다고 가족들이 보고하였다. 음식에 대한 절제가 이전에 비해 어려워지고, 타인의 감정에 다소 둔감해지고 별일 아닌 일에 예민하게 굴고 화를 내는 경우도 빈번해졌다고 하였다. 우울했던 적은 없으며, 수면도 적절히 유지된다고 하였다. 보행 문제나 손떨림은 없었다. 시간, 장소, 사람에 대한 지남력은 양호했으며, 단기 및 장기 기억 검사상 등록과 회상에 이상은 관찰되지 않았다. 양치질하는 시늉을 해보라고 요청하자 말로는 표현하나, 행동으로 옮기기에는 어려움을 보였다. MMSE=20, CDR=0.5로 측정되었다. 뇌 자기공명영상 검사상 양측 전두엽에서 다른 부위에 비해 유의미한 위축이 관찰되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영검사상 아밀로이드 축적은 관찰되지 않았다. 행동 및 검사 양상으로 볼 때 가장 가능성이 높은 진단은?
① 전두측두엽치매
② 가성치매
③ 알츠하이머치매
④ 파킨슨치매
⑤ 혈관성치매

24. 다음 중 치매와 가성치매의 차이로 옳게 짝지어진 것은?
① 치매-오래 전 기억 손상 빈번, 가성치매-최근 기억 손상 빈번
② 치매-서서히 진행되는 인지기능저하, 가성치매-갑자기 발생하는 인지기능저하
③ 치매-인지기능저하 기복, 가성치매-인지기능저하 지속적
④ 치매-정신과적 과거력 빈번, 가성치매-정신과적 과거력 드묾
⑤ 치매-인지기능저하를 강조, 가성치매-인지기능저하를 숨기려 노력

25. 다음 중 치매와 우울증의 상관관계에 대한 적절한 설명은?
① 우울감을 호소하는 노년기 환자는 인지기능이 저하되어 있다.
② 우울증은 치매의 전 단계에 해당되면, 소아, 성인기 우울증은 결국 노년기 치매로 이행한다.
③ 치매의 심각도가 증가할수록 우울증의 위험이 높아진다.
④ 우울증과 치매의 병태생리는 동일하므로, 동일한 질환군으로 인식된다.
⑤ 노년기 우울증 환자를 진료할 때 알츠하이머 치매 발생 가능성도 염두에 두어야 한다.

26. 만 6살 여자아이가 이전에는 소변을 잘 가리다가 6개월 전 동생이 생긴 이후로부터 주에 3회씩 밤에 소변을 가리지 못했다. 대변을 가리는 것이나 낮에는 문제는 없었다. 다른 병원에 가서 행동치료도 받아보고 자기 전에 소변을 보라고도 해 봤지만 나아지지 않았다. 약물치료로 옳은 것은?

① Imipramine
② Fluoxetine
③ Methylphenidate
④ Bupropion
⑤ Desmopressin

27. (틱문제) 만 8세 남아가 눈을 깜빡이고 음음 소리를 내는 증상으로 병원에 왔다. 이비인후과와 안과에서 문제를 찾을 수 없었고, 환자는 이 증상이 저절로 발생했다고 하였다. 잠시는 증상을 참을 수 있어서 학교에서는 괜찮지만 집에 오면 심해지는 양상을 보인다. 치료는?

① 아리피프라졸
② 플루옥세틴
③ 데스모프레신
④ 아미트립틸린
⑤ 메틸페니데이트

28. (틱+ADHD) 만 11세 남아가 학습저하와 대인관계 어려움으로 병원에 내원하였다. 집중을 잘 못 해서 수업시간에 친구들과 이야기하고 엎드려 자는 등 수업을 방해하는 행동이 있었으며, 줄을 기다리지 못해 새치기를 하고 게임에서 이기기 위해 속임수를 쓰기도 하였다. 고개를 끄덕거리고 음, 음 하는 소리를 내는 증상이 있었다. 이 환자에게 가장 적합한 약물은?

① 아토목세틴
② 플루옥세틴
③ 아리피프라졸

29. (알코올) 매일 소주 2-3병 먹으며 밥을 제대로 먹지 않는 환자가 다리에 힘이 풀리고 정신을 잃어서 왔다. 환자의 증상이 일어난 이유는?

① 티아민 결핍
② 고마그네슘혈증
③ 저칼슘혈증

30. 만 11세 남아가 학교에서 학습장애가 있었다. 어릴 때부터 말을 배우는 것이 느렸고, 학습을 따라가기 어려워했다고 했다. 동급생들보다 어린아이와 어울리기를 더 좋아했다. 맞는 선지는?

① 2차적으로 불안이나 우울증상이 있으면 치료를 받아야 한다.
② 성인이 되고 정상적인 직업을 가질 수 없다.
③ 반드시 약물 치료를 받아야 한다.
④ 가장 먼저 해야 하는 검사는 뇌 MRI 검사이다.
⑤ 치료 목표는 지능 상승이다.

31. 환자가 아내가 외도를 하는 것 같다고 하며 찾아왔다. 환자는 한 회사에서 오래 일해서 능력을 인정받는 회사원으로, 주변 동료들은 그를 융통성이 없고 농담을 받아들일 줄 모르는 사람이라고 평가한다. 그는 다른 직원들이 놀면서 월급을 타간다고 생각하고, 휴가 일정을 잡을 때 자신보다 열심히 일하지 않은 사람이 자신보다 더 좋은 휴가날짜를 잡았다고 억울해했다. 또 환자의 아내는 무역회사에서 일했는데, 그런 증거가 없음에도 불구하고 환자는 아내가 외도를 한다고 믿고 있었다. 이 환자를 면담할 때 주의해야 할 사항은?

① 환자의 주장을 완전히 긍정한다.
② 환자의 주장을 완전히 반박한다.
③ 환자가 자신의 주장과 현실을 완전하게 구분하도록 한다.
④ 환자의 생각에 집중하지 말고 그 기저에 있는 분노와 불안에 집중한다.
⑤ 선의의 공감을 해서라도 환자의 마음을 편안하게 해주어야 한다.

32. 만 25살 대학원생이 우울하다고 병원에 왔다. 실험을 하다가 자꾸 빠트려서 혼이 난다고 하였고, 신청일자를 맞추지 못해 놓치는 일도 있다고 하였다. 자꾸 읽어도 머리에 들어오지 않아서 두세번 읽어야 했고, 어렸을 때도 집중을 잘 하지 못했다. 아이큐가 91이었다.

① 지적장애
② ADHD
③ 학습장애
④ 주요우울장애

33. 남성이 아내와 성관계를 하다가 갑자기 여기가 어디인지 모르겠다고 하였다. 며칠 전의 일도 제대로 기억하지 못했으나 이름과 주소는 잘 기억했고 지남력은 정상이었다. 환자는 이런 상태에 대해서 몹시 걱정하였으나 3~4시간이 흐른 후에 완전히 회복하였다.

① 일과성 완전 기억상실
② 해리성 기억상실
③ 해리성 주체장애
④ 이인화장애

34. XX세 남성이 지하철에서 자신의 성기를 노출한 뒤 여성에게 문지르다 도주 중 검거되었다. 옷 안쪽으로 여성 속옷을 입고 있었으며, 소지품 검사에서 여성의 음모를 모아 둔 주머니와 봉지가 발견되었고, 휴대폰에는 화장실에서 몰래 찍은 사진이 발견되었다. 이 환자에 관한 설명으로 가장 관련성이 적은 것은?

① 국소적 성애증
② 물품 음란증
③ 접촉 도착증
④ 의상도착장애
⑤ 관음증

35. 20세 여성이 가족들과 함께 내원하였다. 가족들은 이 여성이 치마도 입지 않으려 하고, 머리도 남자처럼 깎고 말투도 남자 같다면 문제가 있냐고 물었다. 여성은 자신에게는 아무런 문제도 없고, 자신이 여자지만 남성적인 것이 더 좋아서 그렇게 한다고 하였다. 이 여성의 문제로서 가장 가능성이 많은 것은?

① 성적정체성
② 성적지남
③ 성정체성
④ 성적역할
⑤ 성행위

36. 정신과적 면담에서 일반적으로 지켜야 할 원칙에 맞지 않는 것은?

① 성생활 등 질문하기 곤란한 주제에 대해서는 환자가 스스로 말하기를 기다린다.
② 초기에는 개방형 질문을 주로 사용한다.
③ 사고의 연상에 대해 평가하기 위해 30초 이상 자유롭게 이야기하도록 한다.
④ 애매모호한 대답에 대해서는 정확한 정보를 얻기 위해 더 자세히 질문한다.
⑤ 자살사고에 대해서는 직접적으로 질문한다.

37. 25세 남자가 자신이 외부에서 자기 몸이 움직이는 것을 바라보고 있는 것 같은 느낌이 자주 일어나 생활이 힘들다며 병원에 왔다. 자신의 생각에 대해서도 다른 사람처럼 생각의 흐름을 관찰하고 있는 경우도 많다고 하였다. 이 남자에게 가장 적절한 진단명은?

① 조현양상장애
② 해리성 둔주
③ 조현형 성격장애
④ 해리성 정체성 장애
⑤ 이인성 장애


38. DSM-5의 해리장애 진단분류에 속하지 않는 것은?

① 해리성 기억 상실
② 해리성 둔주
③ 전환 장애
④ 이인화 장애
⑤ 해리성 주체성 장애

39. 25세 여성. 2개월 전 회식자리에서 직장 상사가 술 따르라는 지시와 신체 부위를 성적으로 희롱하여 충격받았다. 이후 비슷한 나이의 남자를 보면 심장이 떨리고 불안하고, 가족들에게 소리지르며 화를 낸다고 한다. 해당 질환은?

① PTSD
② 적응장애
③ 급성 스트레스 장애
④ Brief psychotic syndrome

40. 30세 여성. 2달 전부터 지하철을 타던 중 갑자기 숨쉬기 힘들어지고 심장이 터질 것 같은 일이 있었다. 다음 그림과 같은 치료방식은?



① 이완 훈련
② 정신 교육
③ 내재적 노출
④ 인지적 재구성
⑤ 상황 노출


41. 정신과적 과거력 없던 35세 여성으로 처음 정신과 약을 처방받았다. 약을 먹으니 심장이 뛰고 쓰러질 것 같은 느낌이 들고 다시는 사람들 앞에 설 수 없을 것 같은 불안감 들었다. 영상 소견, 랩 소견 정상이었는데 약간의 acidosis 있었음. 해당 부작용의 원인인 약은?

① Escitalopram
② Diazepam
③ Olanzapine
④ Lithium
⑤ Amitriptyline

42. 43세 남성 100일 전 공사현장에서 옆에 있던 사람이 철근에 사람이 깔리는 것을 목격하였다. 환자는 다치지 않았지만 사고 장면이 자꾸 떠오르고 공사장 근처 가기를 피했으며 작은 소리에도 깜짝 놀랐다. 환자에게 처방할 수 있는 약물은?
① Methylphenidate
② Clozapine
③ Sertraline
④ Valproate
⑤ Alprazolam

43. 심리검사에서 구조화, 표준화된 자기보고형 설문지를 사용해 정보를 얻고, 정형화된 채점 기준에 따라 결과를 객관적으로 해석하는 검사는?
① 한국 웩슬러 성인용지능검사(K-WAIS-IV)
② 로르샤흐 검사(Rorshach test)
③ 문장완성검사(SCT)
④ 집-사람-나무 검사
⑤ DAP 검사

44. 환자의 관한 설명. A씨는 B 검사를 받았고 아래와 같이 결과가 나왔다. 해당 검사의 이름은?



① KMMSE
② KDST
③ MMPI-2

45. 직장생활하는데 동료들이 집까지 따라온다. 상사가 동료와 단합하여 자신의 진급을 방해하는 것 같다. 환청이 들림.
① Quetiapine

46. 42세 여자가 5일 전부터 잠을 3시간만 자면서 피곤한 줄도 모르고 머리가 잘 안 돌아가져서 쉬지 않고 계속 일한다고 왔다. 3일 전부터 남자와 동거하겠다고 말하고 산만해서 행정적인 일을 처리하는데 조금 어려움이 있었지만 직장생활에 큰 어려움은 없었다. 과거력에서 30대에 우울증으로 지속적으로 진료를 받아왔다. 이전 조증 삽화는 없었다. DSM-5 진단명은?
① 제II형 양극성장애

47. 신경성 식욕부진증에서 섭식과 처벌 체계의 이상과 관련이 있고 회복 후에도 이상이 지속되는 신경전달물질은?
① 세로토닌
② 노르에피네프린
③ 엔도르핀
④ 옥시토신
⑤ 도파민

48. 정신건강의학과 외래 와서 백혈구 수치 검사 주기적으로 받는 여자. 복용 중인 약물은?
① Clozapine

49. (짤야마) 41세 여자 환자, 3개월 전부터 복부 통증 있다고 호소하였다. 병원에서 내과적, 영상의학적, 산부인과적 검사 상 이상 소견은 보이지 않았다. 문진 상 여러 병원에서 수많은 검사들을 받아보았다고 하였다. 기분에 대해 물어보자 기분은 전혀 문제 없다고 대답하였다. 현재 치매를 앓고 있는 부모와 지적장애 동생을 홀로 돌보고 있으며, 5개월 전에 이혼하였다고 한다. 진료를 하는 중에 자신의 신체 증상에 주목해달라고 의사에게 호소하는 모습을 보였다. 이 환자의 방어기제는?
① 신체화
② 승화
③ 억제

50. 다음 중 기면증의 증상이 아닌 것은?
① 입면시 환각
② 수면 중 각성
③ 수면 마비
④ 탄력 발작
⑤ 주간 졸림