2026학년도 정신건강의학과 학년말고사 답지(260413)

* 총 50문항(49문항 복기), 60분 시험(CBT)

1. 70세 할머니, 밤에 자기 전에 혼잣말하고 지남력 떨어지는 것을 주소로 내원했다. 낮에는 증상이 호전되었으며 일주일에 2번 정도 해당 증상이 발생하였다. 중단해야 하는 약물은?
① Lorazepam 2mg
② Citalopram 10mg
③ Donepezil 10mg
④ Amitriptyline 20mg
⑤ Aripiprazole 2mg

2. 일상 용량에서 호흡곤란, 심계항진, 초조 등의 부작용을 일으킬 수 있는 약물은?
① Fluoxetine
② Aminophylline
③ 아편 유사체
④ Lorazepam

3. 60대 남성이 단어가 기억이 나지 않는다는 것을 주소로 내원했다. 이전에는 표현을 풍부하게 했지만 최근 표현이 짧아지고 단어가 잘 기억나지 않는다고 한다. 길을 찾는 등의 일상 기능에는 영향이 없었다고 한다. 시행할 검사로 옳은 것은?
① 서울신경심리검사
② 서울신경심리검사, MCI
③ Kim 전두엽검사
④ MMSE, 조현병
⑤ K-WAIS

4. 26세 남성이 카페에서 공부하다가, 바깥의 소리가 웅웅거리는 듯한 증상이 있으며 자신의 앞에 놓인 물건을 볼 때 눈앞에 두꺼운 유리벽이 있는 것 같은 느낌을 받았다. 실제로 이런 것이 아니라 본인이 느끼는 것에 문제가 있다는 것을 스스로 알고 있으며 이런 증상이 생길 때마다 두려움을 느낀다. 관련된 증상으로 옳은 것은?
① 해리성 둔주
② 비현실감
③ 이인감

5. 인생의 노년 단계로 이행하는 데 어려움을 겪고 있다. 그는 불면증, 무가치한 느낌, 자살충동에 대한 도움을 받기를 위해 정신치료를 받기 원했다. 몇 주간 정신치료가 지난 뒤 우울증상은 호전되었지만 대부분 시간을 어떻게 보내야 할지 여전히 고심하고 있었다. 치료자는 자신이 치료 시간에 지루해하고 졸린 것을 알게 된다. 이 상황을 지칭하는 용어는 무엇일까?
① 전이
② 역전이
③ 저항
④ 해석
⑤ 치료적 동맹

6. 72세 남성, 교장직에서 내려온 후 아내에게 의존하고 쉽게 화를 내며 융통성이 줄어든 모습을 보였다. 옳은 것은?
① 인지 기능이 강화되어 과거 의미 기억이 잘 된다.
② 역할 상실과 노화로 인해 자기 원래 성격이 강화되고 융통성이 떨어졌다.
③ 독립성이 증가한 상태이다.

7. 다음 중 정신건강전문요원 4개에 포함되는 것은?
① 정신건강임상심리사, 정신건강사회복지사, 정신건강작업치료사, 정신건강간호사
② 나머지 선지에 유치원 교사, 간호조무사, 정신건강전문의, 재활치료사, 언어재활사, 정신건강 영양사 등등 추가됨

8. 두부 외상 이후 상황과 상관없이 산만해지고, 천박한 농담을 하게 되었다. 손상된 뇌 부위는?
① Prefrontal cortex
② Motor cortex
③ Premotor cortex

9. 불안, 난폭한 행동과 연관되어 있는 대뇌 부위는?
① Insula
② Hippocampus
③ Amygdala
④ Anterior cingulate cortex
⑤ Entorhinal Cortex

10. 신체가 아픈데 검사는 다 정상으로 나타났다. 환자는 '이렇게 아픈데 정상일리가 없잖아요?'라고 말하며 추가 의학적 검사를 요구했으나, 심리검사에는 소극적이었다. 환자의 증상과 관련하여 MMPI 검사에서 증가되어 있을 척도로 가장 적절한 것은?

① 1(Hs), 3번(Hy) 척도
② 2(D), 7(Pt) 척도
③ 4(Pd), 9(Ma) 척도
④ 0(Si) 척도
⑤ 6(Pa), 8(Sc) 척도

11. 지역사회 정신건강사업의 주요 사업 내용으로 옳은 것은?

① 개인정보를 이웃주민들에게 공개한다.
② 일반국민을 대상으로 정신건강 증진 및 조기 발견 등의 예방을 한다.
③ 정신질환 환자를 10년 동안 격리수용한다.
④ 고강도 전기경련치료를 직접 시행한다.

12. 20살 조현병 환자가 치료받은 후 퇴원하였다. 이 환자에 대해서 정신건강복지센터에서 해줄 것으로 옳은 것?

① 재발 방지 및 지역기반 사회 복귀를 위해 도움을 준다
② 가전제품 풀세트로 지원한다.
③ 이웃주민에게 모든 개인정보를 알려 감시하게 한다.
④ 병원 치료 하지 않고 방치한다.

13. 지역사회 정신건강사업 중 탈수용화에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 환자가 병원 중심의 체계에서 벗어나 지역사회 중심으로 전환하여 환자가 일상에서 재활하고 사회에 복귀하도록 돕는다
② 산속 깊이 보내버린다
③ 병원에서 계속 입원시킨다
④ 병원에 입원하지 않게 하고 계속 방치한다.

14. 1995년 개정된 법으로 지역사회 정신건강복지센터 설립의 근거가 된 법은?

① 정신보건법
② 정신건강복지법
③ 지역사회복지법

15. 28세 남자 환자. 낯선 사람이 있으면 불안하고 대학교 졸업과제가 힘들어 중퇴하였다. 치료로 가장 적절한 것은?

① 지프라시돈
② 프로프라놀
③ 라프라시돈
④ 로라제팜
⑤ 파록세틴

16. 수면제를 다량 먹어 자살시도를 해 응급실로 온 환자. 친구들이랑 쉽게 사귀다가도 쉽게 사이가 멀어지고 분노가 있으면 충동적으로 자살 시도, 자해를 하는데 그 빈도가 최근 증가했다. 치료는?

① 변증법적 치료
② 홍수
③ 탈민감화
④ 노출 및 반응

17. (노성원P PY) 도박 중독으로 인해 가족과 함께 내원하였다. 치료 원칙은?

① 스스로의 힘으로 천천히 빚을 갚아나간다.
② 항갈망제로 도박 욕구 억제
③ 환자의 스트레스를 덜어주기 위해 가족이 대신 빚을 갚아준다.
④ 재발의 위험이 있어 자조 모임에 나가는 것은 권고하지 않는다.

18. 다음 진찰에서 나타나는 증상은?

> 의사: 요즘 어떠세요?
> 환자: 요즘 어떠냐구요? 날씨가 추워졌어요. 따뜻한 밥을 먹어 야돼요. 따뜻한 밥이 맛있거든요. ~~~ (결국 의사의 질문에 대 답 못했음)

① 사고 이탈(Tangentiality)
② 우원증(Circumstantiality)
③ 연상의 이완(Loosening of association)

19. 다음의 치료는 어떤 질환을 치료하는 과정인가?
- 숨을 크게 들이쉬고 빨대로 숨을 15초 불어보세요. 잠시 참아보세요. 지금 불안 점수 몇 점 정도인가요? 이번엔 30초 불어볼까요?

① 공황장애
② 범불안장애
③ 임소공포증

20. 3개월 전 시작된 불안감과 뒷목이 당기고 쉽게 신경질이 나는 환자가 내원했다. 특이 과거력은 없으며, 약물이나 신체 질환에 의한 것이 아니다. 가장 적절한 진단명은?
① 범불안장애
② 기타불안장애
③ 신체화 장애
④ 신체 증상 장애

21. 50대 남성이 모든 것이 불안하다는 것을 주소로 내원했다. MMPI 상 7번(Pt) 척도만 높았다. 시행한 검사와 진단으로 올바르게 연결된 것은?
① 미네소타 다면적 인성검사, 범불안장애
② 미네소타 다면적 인성검사, 주요우울장애
③ 미네소타 다면적 인성검사, 조현병
④ K-WAIS-IV, 지적 장애
⑤ K-WAIS-IV, 경계선 지능

22. 53세 남성 수년간 항정신병약제 복용하던 중, 최근 들어 자신도 모르게 생기는 안면의 불수의적 움직임을 호소하였다. 비정상 불수의 운동 척도 평가 결과, 2점 이상이 2개 이상 있었다. 이 질환의 병태생리로 가장 유력한 가설은 도파민 수용체 과민으로 알려져 있다. 가장 적절한 진단은?
① tardive dyskinesia
② acute dystonia
③ akathisia
④ Neuroleptic malignant syndrome
⑤ Oculogyric crisis

23. 다음 치료는 어떤 질병에 대한 것인가?
- 자 상황을 머리 속에 그려보세요. 그 다음 눈 감고 좌우로 돌려보세요. (20번 정도 한 후) 어떤 생각이 드시나요? (안구운동탈민감재처리 설명)
① PTSD
② 특정공포장애
③ 강박장애

24. 70대 할머니가 최근 기억력이 떨어지고 만사가 귀찮다는 것을 주소로 가족과 함께 내원하였다. 환자는 질문을 하면 머뭇거리다가 '잘 모르겠다'며 대답을 포기하는 모습을 보였다. MMSE 검사 결과 23점으로 나왔다. 가장 염두에 두어야 할 진단은?
① 주요우울장애
② 알츠하이머 치매
③ 혈관성 치매
④ 섬망

25. 70세 여성이 내원하였다. 옷 입기, 식사, 화장실 사용 등의 기능은 보존되어 있으나, 약 복용, 전화기 사용 등의 일은 어려워 며느리의 도움을 받아야 한다. 집안일이 거의 안 되고, 약물 관리, 몸단장, 식사준비, 빨래 등의 기능은 손상되어 있었다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?
① I-ADL이 정상이다
② 화장실을 못가나 말기라 생각하고 장루 수술을 한다.
③ B-ADL이 보존되어 있으므로 I-ADL은 노화로 인한 정상적인 변화라고 간주한다.
④ I-ADL은 사회생활에 필요한 복잡한 기술과 행위를 평가하는 것으로, I-ADL이 손상되어 있으므로 초기 치매라고 생각하고 적극적 개입을 한다.

26. 22세 남성이 우울 삽화로 내원하였다. 이 환자는 내향적 성격이며, 삽화는 6개월 전부터 서서히 발생하였고, 정신이 초조한 증상을 호소하였다. 과수면 증상 역시 호소하였고, 양극성장애의 가족력은 따로 없다고 한다. 다음 중 단극성(unipolar)에 비해 양극성(bipolar) 우울 장애를 더 시사하는 소견은?
① 내향적 성격
② 6개월 전부터 삽화 서서히 발생
③ 정신 초조증상
④ 과다수면
⑤ 양극성장애 가족력 없음

27. 조증환자에서 가장 흔한 증상?
① 우울한 기분
② 과민한 기분
③ 불안정한 기분

28. 29세 여자 환자가 주요우울장애로 진단받았다. 직장 상사가 칭찬하면 기분이 좋아지는 양상이 있었다. 과다수면과 식욕증가가 있었고 팔, 다리가 납으로 된 것처럼 무겁게 느껴졌다. 비정상적으로 들뜬 조증, 경조증의 증상은 없었다. 과민한 반응, 안전부절못함, 통제력 상실의 느낌은 없었다. 망상이랑 환각은 없었다. 우울장애의 명시자는?
① 멜랑콜리아 양상동반
② 혼재성 양상 동반
③ 정신병적 양상 동반
④ 비전형적 양상 동반
⑤ 불안증 양상 동반

29. 니코틴 수용체의 a4b2 partial agonist로 작용하여 도파민 분비시키는 작용을 하는 물질은?
① bupropion
② 니코틴 패치
③ varenicline
④ clonidine

30. 뚜렛 증후군 진단기준에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 음성틱과 운동틱이 모두 1년 이상 지속되어 나타나야한다.
② 3개월 이상 지속되면 진단할 수 있다.
③ 운동틱 하나만 있어도 진단할 수 있다.
④ 의지로 억제하면 완전히 억제할 수 있다.

31. 31세 남성이 직장에서 업무 능력이 떨어지고 지시사항을 자꾸 잊어버린다는 이유로 내원하였다. 성인용 웩슬러 지능검사를 시행하였는데, 검사 시 수치가 떨어지는 것이 확인되었다. 말을 듣고 이해는 했는데 다단계로 진행되는 작업을 할 때 중간 단계를 빠뜨리며 새로운 것을 지시하면 급하게 했다가 잊어버리고 다시 어떤 것을 지시했는지 되묻는 모습을 보였다. 이 환자의 증상과 가장 관련이 깊은 K-WAIS-IV의 두 가지 조합은?
① 언어이해(VCI), 작업기억(WMI)
② 작업기억(WMI), 처리속도(PSI)
③ 작업기억(WMI), 지각추론(PRI)
④ 언어이해(VCI), 처리속도(PSI)

32. ADHD 진단에 대해 옳은 것은?
① 한 번의 검사만으로 확진할 수 있다.
② 무조건 청소년기 이후에 발생해야 한다.
③ 기능의 저하 없이도 진단할 수 있다.
④ 집과 학교 등 여러 장소에서 나타난다.
⑤ 집중력 문제 만으로 진단할 수 있다.

33. 매일 소주 2-3병 먹으며 밥을 제대로 먹지 않는 환자가 다리에 힘이 풀리고 정신을 잃어서 왔다. 환자의 증상이 발생한 원인으로 가장 적절한 것은?
① 티아민 결핍
② 고마그네슘혈증
③ 저칼슘혈증

34. 25세 대학원생이 우울하다고 병원에 왔다. 실험을 하다가 자꾸 빠트려서 혼이 난다고 하였고, 신청일자를 맞추지 못해 놓치는 일도 있다고 하였다. 자꾸 읽어도 머리에 들어오지 않아서 두세번 읽어야 했고, 어렸을 때도 집중을 잘 하지 못했다. 아이큐가 91이었다.
① 지적장애
② ADHD
③ 학습장애
④ 주요우울장애

35. 45세 여성이 4일 전부터 잠을 3시간만 자면서 피곤한 줄도 모르고 머리가 잘 안 돌아가져서 쉬지 않고 계속 일한다고 왔다. 3일 전부터 남자와 동거하겠다고 말하고 산만해서 행정적인 일을 처리하는데 조금 어려움이 있었지만 직장생활에 큰 어려움은 없었다. 30대에 우울증으로 지속적으로 진료를 받아온 이력이 있다. 이전 조증 삽화는 없었다. DSM-5 진단명은?
① 제1양극성 장애
② 제2양극성 장애
③ 파괴적 기분조절 장애
④ 조현정동장애
⑤ 순환성 장애

36. 70대 여성이 집에서만 지내고 행동이 느려진다는 것을 주소로 내원했다. 신경인지기능검사 결과 지남력 5백분위수, 기억력 8백분위수, 전두엽/집행기능 3백분위수로 전반적인 인지 영역에서 유의미한 저하 소견이 있었다. 뇌 MRI 영상검사에서는 백색질 병변이 관찰되었다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 혈관질환이 동반되었을 가능성이 높다.
② 일과성에 의한 단기적 증상으로, 수일 내에 호전될 것이다.
③ 외상이나 대인관계 스트레스로 인한 해리성 기억상실의 가능성이 크다.
④ 죄책감과 허무망상이 특징적이다.
⑤ 항우울제를 투여하면 증상이 급속도로 좋아지고 비가역적 손상이 남지 않는다.

37. 30대 여성이 집과 수백km 떨어진 곳에서 발견되어 응급실로 내원하였다. 이름과 이전의 직업 등은 기억하지 못하나 일상생활 기능에는 문제가 없었다. 찾아본 결과 2주 전 남편이 사망했다. 진단으로 적절한 것은?

① 해리성 둔주

38. 뇌 자기공명영상 검사상 오른쪽 기저핵 주변에 국소 허혈성 병변이 관찰되었다. 아밀로이드 양전자방출단층촬영 검사상 아밀로이드 축적은 관찰되지 않았다. 기억력 감퇴의 양상으로 볼 때 가장 가능성이 높은 진단은?

① 전두측두엽 치매
② 가성 치매
③ 알츠하이머 치매
④ 파킨슨 치매
⑤ 혈관성 치매

39. 20대 남성이 어렸을 적 알코올 사용 장애가 있는 아버지에게 언어적 폭력 및 폭행을 당했으며, 어머니한텐 "내가 너 때문에 참고 산다."라는 원망과 방임을 겪었다. 이후 '탁' 치는 소리에도 과거 기억에 떠올라 불안하고, 누가 쫓아오면 불안함을 느낀다. 과거 기억을 떠올리게 하는 영화를 보지 않으며, 친구들의 사소한 농담에 쉽게 화내고 무기력해 누워만 있고, 누가 친해지려고 하면 '나를 이용하려하나?'라는 생각이 든다. 이 환자에 대해 ICD-11에서 새롭게 분류 체계로 채택한 진단명으로 가장 옳은 것은?

① 애착상실 성격장애
② 만성적응장애
③ 복합 PTSD
④ 탈억제성 사회적 유대감 장애

40. 만 6세 아이가 집에서는 엄마, 형제자매와는 얘기를 잘 하지만, 선생님이 질문하면 끄덕거리기만 하고 대답 하지 않는다는 것을 주소로 내원했다. 학교에서 친구들과도 말을 하지 않는다고 한다. 이 증상은 6개월 이상 지속되었다. 진단명으로 가장 적절한 것은?

① 반응성 애착장애
② 사회불안장애
③ 자폐스펙트럼장애
④ 선택적 함구증
⑤ 언어장애

41. 21세 대학생이 잦은 기분 고양으로 내원하였다. 이전에 다낭성 난소낭종으로 진단받은 적이 있다. 정신병적 증상 없고 조증삽화는 아니다. 적절한 치료는?

① Lithium
② Valproic acid
③ Fluoxetine
④ Haloperidol
⑤ Risperidone

42. 친딸이 암으로 사망하고, 간병했던 어머니가 딸에 대한 그리움과 슬픔을 느끼고 있다. 해당 증상은 1년 6개월 동안 지속되었다고 한다. 진단은?

① 지연된 애도장애
② 정상 반응
③ 외상 후 스트레스 장애
④ 급성스트레스 장애
⑤ 적응장애

43. 27세 남성이 도청장치가 있다는 생각 때문에 신문지로 창문을 가리고 지낸다. 혼잣말 하는 것처럼 보이고, 해당 증상은 7개월 동안 지속되었다. 겉으로 봤을 때 감정이 없어 보인다. 진단은?

① 조현병

44. 55세 여성 환자가 2개월 전 남편 사망 후에 힘들다는 사실을 몰랐다는 죄책감이 계속 있었다는 것을 주소로 내원했다. 2주 전에 직장 그만 두었다. 진단으로 가장 적절한 것은?

① 주요우울장애
② 정상 애도반응
③ 지연된 애도장애
④ 외상 후 스트레스 장애
⑤ 적응장애

45. 8살 남아, 평상시에도 엄마가 아침에 잠 깨우면 화내고 친구들이랑 자주 다툰다는 것을 주소로 내원했다. 선생님이 수학책 50페이지 펼치라고 하면 '싫어요, 제가 왜요'라고 반응하고, 선생님이 뭐라고 하면 화분을 깨거나 친구들의 가방을 쓰레기통에 버리는 행동도 하였다. 위의 증상이 1년 이상 지속되었으나 파괴적 기분 조절 장애는 면담과정에서 배제되었다. 위 환아의 진단이 속하는 상위 분류는?

① 파괴적 충동 조절 품행장애

② 성격장애

③ 양극성 장애

④ 신경인지장애

⑤ 신경발달장애

46. 소아청소년 면담 시 유의해야 할 점은?

① 아동과 부모 모두 면담을 진행해야 한다.

② 청소년 환자에게는 절대적인 비밀 보장을 얘기한다.

③ 부모의 말이 아동의 말보다 중요하다.

④ 아동에게는 대답을 잘하지 못하니까 물어보지 않고 관찰만 한다.

47. 유치원생이 읽고 쓰는 데 어려움이 있었다. 발달력과 사회성은 정상이었다. 다음으로 시행해야 하는 검사는?

① 지능검사

② 뇌 MRI

③ 성격검사

④ 뇌파검사

48. 21세 여성이 가족이랑 다툼이 잦아서 내원하였다. 2년 전부터 기분이 좋으면 잠을 자지 않고 책을 읽기도 하고 기분이 안 좋아지면 아무것도 하지 않고 공부도 하지 않았다. 기분이 평온한 적이 없었다. 조증 삽화, 우울 삽화, 경조증 삽화는 없었다.

① 순환성 장애

49. 78세 남성이 폐렴으로 입원한지 3일차에 '여기가 어디냐'며 혼란스러워 했다. 침대에서 내려와서 배회하며 혼잣말을 한다. 낮에는 비교적 안정적이고 밤에는 악화되는 양상이었다. 보호자에 따르면 입원 전에는 일상생활에 문제가 없었다고 했다. 다음 중 환자의 상태를 파악하기 가장 적절한 평가수단은?

① 혼동평가도구(CAM)

② 해밀턴 불안 평가 척도(HAM-A)

③ 양성 및 음성증후군 척도(PANSS)

④ 정신사회적 기능 평가(GAF)

⑤ 간편정신상태 평정척도(BPRS)