
2020년 정형외과 학기말고사 복기
25문제 중 25문제 복원

(믿었던 정형의 탈야마…)

By 반임엄손전김

1. 20세 남, 당일 새벽에 갑작스럽게 발생한 무릎의 통증 및 열감으로 내원하였다. V/S stable 하였으며 신체검사상, 삼출(effusion), 홍반이 관찰되었다. 무릎 x선과 관절천자 후 편광현미경 검사 결과이다. 진단은?

A. **통풍**
B. 가성통풍
C. 반응성 관절염
D. Septic arthritis
E. 급성 골수염

2. 35세남, 오토바이 사고후 응급실 내원 상하지 근력, 감각이 소실되어있었고 구해면체(bulbocavernous) reflex는 양성이었다. 진단은?

A. **완전 척수 손상**
B. 불완전 척수 손상
C. 척수성 쇼크
D. 마미 증후군
E. 완전척수손상인지 불완전척수손상인지 판단할 수 없다.

3. 40세 남, 6시간전 떨어지는 사고. 사고후 하지의 근력은 소실되었으나 구해면체(bulbocavernous) reflex는 양성이었고, 항문 감각은 남아있었다. x-ray상에서 T10 level에서 척추후방 ~ 탈골? 이 관찰되었다. 진단은?

A. 완전 척수 손상
B. 불완전 척수 손상
C. 척수성 쇼크
D. 마미총 증후군
E. Conus medullaris? 손상

4. 60세 여, 스테로이드 투여 6개월 후 정형외과 내원 하였다. 보행시 심한 왼쪽 고관절 통증을 호소하였다. 약물치료후 반응이 없었다. 고관절 mri 결과다. 치료는?



(화살표는 없었음)

A. 인공관절치환술
B. 경과관찰
C. 다발성 천공술
D. 회전성 절골술
E. 중심감압술

5. 24세남, 교통사고 후 발생한 우측 상완의 나선형 원위 간부 골절로 내원하였다. 도수정복술 후 우측 손목의 신전, 무지 신전이 안 되었다. 손상된 신경은?



A. 척골신경
B. 요골신경


C. 정중신경
D. 근피신경
E. 액와신경

6. 다음 이학적 검사에서 손상 받은 근육은?



A. 우측 중둔근
B. 우측 장요근
C. 우측 ??
D. 좌측 중둔근
E. 좌측 장요근

7. 32세 여성이 3개월 전 시작된 우측 손목 통증으로 내원하였다. 우측 요골 경상돌기에 통증이 있었으며, 엄지를 신전할 때 해당 부위 통증이 있었다. 다음과 같은 이학적 검사 시 손목에 통증이 발생했다. 환자는 2개월 전 출산 후 수유 중이다. 처치는?



A. 제 1 신전부 국소 스테로이드 주사
B. 제 2 신전부 국소 스테로이드 주사
C. 제 1 신전부 유리술
D. 제 2 신전부 유리술
E. 수근관 절개술

8. 환자가 키우던 개에 물려 응급실에 내원하였다. 수배부에 2*2cm^2의 피부 결손이 있고, 일부 연부조직 손상이 있으며 종창, 열감, 통증이 있었다. 처치는?
A. 전층 피부 이식 (Full thickness skin graft)
B. 부분층 피부 이식 (Split skin graft)
C. 피판 이식 (Flap ??)
D. 창상 부위 세척 후 일차 봉합술 (Primary wound closure)
E. 창상 부위 세척 후 이차 봉합술 (Delayed wound closure)

9. 뒤꿈치 통증으로 내원. 후족부이 외반이 심했다. 까치발 들고(heel-raising) 유지하지 못했다. 경골 외측에 통증이 심하였다. 문제가 되는 해부학적 위치를 지나가는 구조물은?



A. 후경골건 Posterior tibial tendon
B. 전경골건 Anterior tibial tendon
C. 장비골근건 Peroneal longus tendon
D. 단비골근건 Peroneal brevis tendon
E. 아킬레스건 Achilles tendon

10. 21세 남성이 고관절 통증으로 내원하였다. 직업은 군인으로 얼마전 행군을 한 후에 통증이 시작되었다고 한다. 방사선 사진에서 골절 소견은 보이지 않았고, MRI에서는 골수 부종 소견이 관찰된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (사진은 없었음)
A. MRI에서 이중선 음영이 관찰된다
B. 체중 부하를 줄이도록 교육하고 일단 경과관찰한다.
C. 대퇴 골두의 부종은 괴사의 전 단계에 해당한다.
D. 예방을 위해 즉시 수술해야한다.

11. 우측 어깨 통증을 주소로 내원하였다. 사진과 같이 배꼽에 손을 올리고 눌러보라고 시켰을 때, 손목을 굴곡하고 어깨의 신전근을 사용하여 결국에는 사진과 같이 팔꿈치가 허리에 닿았다. 원인이 되는 구조는?



A. 소원형건
B. 대원형건
C. 견갑하건
D. 극상건
E. 극하건

12. 80세 여성이 빙판길에서 미끄러져 발생한 손목 통증으로 내원하였다. 손가락을 움직이는 데에는 문제가 없었으나 움직일 때 손목에 통증이 발생하였다. 올바른 처치는?
(실제 사진에는 dislocation 없이 골절선만 보이고 화살표로 이상 있다고 표시되어 있었음)



A. ?? 부목 (Ulnar gutter splint)
B. 무지상 석고 부목 (Thumb spica splint)
C. 설탕집게 부목 (Sugar tong splint)
D. 단상지 부목 (Short arm splinting)
E. 장상지 부목 (Long arm splinting)

13. 엄지와 검지 사이의 감각이 소실되었고, 손목의 신전이 잘 안 되었고 이두근 반사가 감소되어 있었다. 다음 중 가장 의심되는 경추간판 탈출의 위치는?

A. C3~C4 사이
B. C4~C5 사이
C. C5~C6 사이
D. C6~C7 사이
E. C7~T1 사이

14. 다음과 같은 검사를 시행하였을 때 양성(no end-point, mushroom)을 보였다. 원인이 되는 구조물은?



A. Anterior cruciate ligament
B. Posterior cruciate ligament
C. Medial collateral ligament
D. Lateral collateral ligament
E. Anterolateral ligament

15. 우측 중지의 통증을 주소로 내원하였다. 우측 엄지에 통증이 있었고, 구부리려고 하면 잘 안 되었으며 한번 구부러지면 다시 펴기 힘들었다. 증상은 아침에 더 심했고 운동을 하다보면 호전되었다. 움직이려고 할 때 걸리는 느낌이 있다가 펴지는 양상이라고 하였다. 원인이 되는 해부학적 구조는? (중지-엄지 오타 아님)

A. Collateral ligament
B. Extensor pollicis brevis
C. Abductor pollicis brevis
D. A1 pulley
E. Volar plate

16. (야마) 족관절 염좌 재활운동시 강화하는 근육은?

A. Peroneus
B. Soleus
C. Flexor hallucis longus
D. Posterior tibialis
E. Gastrocnemius

17. 척추관 협착증의 증상으로, '주로 양측 하지의 통증, 저린감, 근력악화가 나타나고, 통증은 요배부, 둔부에서 시작하여 무릎쪽으로 퍼지는 양상임. 통증이 걷는 중에 발생하여 앉거나 쉬면 나아지는 것'을 이르는 말은?
    A. 배뇨 장애
    B. 보행 장애
    C. 신경성 간헐적 파행
    D. ??
    E. ??

18. (야마) 적절한 수술 시기 결정하는 데에 가장 중요한 지표는?
    A. Lactate
    B. PaO2
    C. PCO2
    D. PLT count
    E. Hb

19. 젊은 남성이 오토바이 사고 후 응급실로 내원하였다. BP 80/60, RR 가장 먼저 해야할 처치는?



    A. 외고정술
    B. 골견인술 및 침상안정

20. (Distal femur fracture에 내고정한 방사선 사진 주고- 안에 교정한 nailing이 휘어있고, fracture site가 아에 엇나간 듯 보이는 그림, hematoma 형성은 없었음, 비슷한 그림 첨부) 다음 사진과 같이 골절의 불유합이 일어나는 가장 흔한 이유는?



    A. Inadequate fracture stability
    B. Impaired vascularity at fracture site
    C. Comorbid medical condition

21. 좁은 신발 신으면 발에 통증이 있고, 2~3번째 사이에 물갈퀴 압통 있었다. 손상된 구조물은?
    A. Interdigital nerve
    B. Tarsal tunnel
    C. Lisfranc joint

22. 60세 6개월 전부터 무릎통증이 있었다. 걸으면 악화되고 쉬면 나아지는 양상 보였고 엑스레이 소견은 아래와 같을때 진단명은?.



    A. OA
    B. RA

23. 젊은 남성 환자가 축구하다가 왼쪽 무릎 다쳐서 내원하였다. 관절천자에서 다량의 혈액 나왔다. 이상이 생긴 구조물은?



(그나마 비슷한 사진..?
왼쪽 아래에서 기시해서 오른쪽 위로 올라가는 인대가 위쪽에서 완전히 떨어져서 너덜해진 관절경 사진이었음.)

A. ACL
B. PCL
C. MCL
D. LCL

24. (케이스 문제) 견관절 전방 탈구되었던 환자가 견관절 외측 감각은 정상인데 1달이 지나도 팔이 능동으로 올라가지 않고 수동으로 들어올리면 올라간다. deltoid 근력은 정상이었다. 손상된 구조물은?



A. 회전근개 파열
B. 재발성 견갑탈골
C. 액와신경손상

25. 골절 환자 연부조직 손상을 보였다. Pulse있었고 발적 있었으며 수동적 발목관절 신전시 통증 호소하였다. 해야할 처치는?



A. 근막절개 및 외고정술
B. 내고정술
C. 침상에서 안정
D. 부목 고정