2026학년도 정형외과 학년말고사 (260416)

* 60문제 중 59문제 복기, 60분 시험(CBT)

1. (Acromioclavicular joint separation 발생한 X ray 주고) 다음 중 어느 인대가 손상됐는가?



① 오구쇄골인대
② 오구견봉인대
③ 견봉쇄골인대
④ 오구상완인대

2. 다음 중 발병 기전이 다른 것은?
① 견봉하 피막낭염
② 회전근개 건병증
③ 석회성 건염
④ 충돌증후군
⑤ 회전근개 부분파열

3. 20대 남자가 팔씨름 하다가 상완 간부가 골절되어 왔다. 이 환자에서 발생할 수 있는 신경 손상을 감별하기 위해 응급실에서 가장 먼저 확인해야 할 운동은?




① 엄지 내전
② 엄지 굴곡
③ 소지 외전
④ 손목 신전
⑤ 손목 굴곡

4. 요골 원위부 골절 환자. 도수 정복 하고 난 후 요골 단축 ?mm, 배측 경사 2-도, 관절면 계단형 변형(step-off) 3mm 있었음. 손 많이 쓰는 일 하는 환자임. 알맞은 처치는?
① 금속판 고정
② 부목 고정
③ k-강선으로 고정
④ 경과관찰

5. 스키 타던 중 폴에 엄지 손가락이 꺾인 환자. MCP 척측 통증 호소하였고, valgus stress test에서 30도 이상의 불안정성 보이며 end point가 만져지지 않았으며, 발적, 통증 있었음. 우세 손을 자주 사용하는 직업을 가졌다. 시행할 처치로 가장 적절한 것은?
① 측부 인대 봉합
② 부목고정 4주
③ open 해서 신경 보존술
④ 처치 없이 경과관찰

6. 우측 중지의 통증을 주소로 내원하였다. 우측 엄지에 통증이 있었고, 구부리려고 하면 잘 안됐으며 한 번 구부러지면 다시 펴기 힘들었다. 증상은 아침에 더 심했고, 운동을 하다 보면 호전되었다. 움직이려고 할 때 걸리는 느낌이 있다가 펴지는 양상이라고 하였다. 원인이 되는 해부학적 구조는?
① Collateral ligament
② A1 pulley
③ Volar plate
④ Extensor pollicis brevis
⑤ Abductor pollicis brevis

7. 60대, 견관절 전방 탈구 되었던 환자가 견관절 외측 감각은 정상적으로 돌아왔으나 1달이 지나도 팔이 능동으로 올라가지 않고, 수동으로 들어올리면 올라갔다. Deltoid 근력은 정상이었다. 손상된 구조물은 ?



① 회전근개 파열
② 재발성 견갑탈골
③ 액와신경손상
④ 외상성 탈골

8. 당뇨로 치료받고 있는 환자. 어깨 능동 및 수동 운동 다 제한되어있음. (아래와 유사한, 어깨 MRI coronal 보여줌)



① 유착성 관절낭염
② 석회성 건염
③ 회전근개 파열
④ SLAP lesion

9. 6개월 전부터 발생한 팔꿈치 통증을 주소로 내원하였다. 주관절 및 전완부의 전반적 외측 통증을 호소하였고, 주먹을 쥘 때와 능동적으로 신전을 할 때 통증이 심해진다고 하였다. 저항성 회외전 운동과 저항성 신전 운동에서 통증을 더 호소하였다. 다음 중 이상이 있을 구조물을 고르시오.
① Extensor carpi ulnaris
② Extensor carpi radialis longus
③ Extensor carpi radialis brevis
④ Flexor carpi radiali
⑤ Flexor carpi ulnaris

10. 24세 남자 환자가 교통사고 발생한 우측 상완의 나선형 원위 간부 골절로 내원하였다. 도수정복술 및 우측 손목의 신전, 무지 신전이 안되었다. 손상된 신경은?



① 척골신경
② 요골신경
③ 정중신경
④ 근피신경
⑤ 액와신경

11. 석회성 건염 호발부위는?
① 이두장근
② 극상근
③ 극하근
④ 견갑하근
⑤ 소원근

12. 손목 통증 있던 환자로, thenar 부분에 근육 위축 보였음. NSAID 3개월 투여했으나 호전 없음. SNAP 검사 상 진폭 감소되는 양상 보임. 다음 처치는?
① 스테로이드 주사 투여하고 6개월 후 경과관찰
② 수술적 감압

13. (L4-L5 척추 사이 중심성추간판탈출되어 있는 그림 주고) 다음과 같은 상황에서 환자에게 어떤 증상이 있었을까?
① 발등, 하퇴부 내측 감각 저하
② gluteus medius 근력약화
③ gluteus maximus 근력약화
④ 슬관절 반사안됨
⑤ 아킬레스건 반사안됨

14. 80 세 여성이 빙판길에서 미끄러져 발생한 손목 통증을 내원하였다. 손가락을 움직이는 데에는 문제가 없었으나 움직일 때 손목에 통증이 발생하였다. 올바른 처치는?



① 단상지 부목
② 장상지 부목
③ 설탕집게 부목
④ 무지상 석고 부목
⑤ Ulnar gutter splint

15. 어깨 인공관절 수술 한 x-ray 사진 주고 해당 수술한 이유는?



① 관절와순 손상
② 회전근개 파열


16. 요통을 주소로 내원한 환자. 무지 굴곡이 안되고, 아킬레스건 반사가 감소하였다. MRI 상에서 중심 추간판 탈출증이 보였다. 문제가 생긴 위치는?
① L1-L2
② L2-L3
③ L3-L4
④ L4-L5
⑤ L5-S1

17. 35세 남성, 우측 하지 방사통으로 내원하였다. SLR test에서 통증을 보인 위치에서 하지를 든 채로 무릎을 구부려서 통증을 완화시킨 후, 그 상태에서 좌골 신경이 지나는 부위를 눌렀더니 통증이 생겼다. 이 검사 방법의 이름은?
① Bowstring test
② Straight leg raising test
③ Bragard test
④ Laseque test
⑤ Femoral nerve stretch test

18. 40세 남성, 6시간 전 높은 곳에서 떨어지는 사고를 겪었다. 사고 후 하지의 근력은 소실되었으나 구해면체 반사(bulbocavernosus reflex)는 양성이었고, 항문 감각은 남아 있었다. X-ray 상에서 T10 level에 burst fracture가 관찰되었다. 진단은?
① 불완전 척수 손상
② 완전 척추 손상
③ 척수성 쇼크
④ 마미총 증후군
⑤ Conus medullaris 손상

19. 65세 남성이 8개월 전부터 심해진 상지의 근력 저하와 보행장애로 내원하였다. 글씨 잘 쓰지 못하고 단추 잘 채우지 못하고 tongue의 fasciculation은 없었다. DTR은 항진되어 있었으며, Hoffman's sign 양성으로 나타났다. 적절한 진단은?
① 경추 척수증
② 경추 신경근증
③ 다발성 경화증
④ 다발성 골수종
⑤ 근위축성 외측 경화증

20. 다음 X-ray 소견에 대해 맞는 것은?



① Alpha 각이 증가하였다.
② 고관절을 신전 내전 할 때 통증이 발생한다.
③ Pincer type의 대퇴비구 충돌 증후군이다.
④ 비구 전연의 상방이 후연보다 외측에 위치해 있다.
⑤ AVN에 의해 나타난 증상으로 수술을 하여야 한다.

21. 다음 중 고관절 인공치환술할 때 사용하는 재료 조합으로 옳지 않은 것은?
① 금속(골두) - 금속(라이너)
② 세라믹(골두) - 세라믹(라이너)
③ 금속(골두) - 폴리에틸렌(라이너)
④ 세라믹(골두) - 폴리에틸렌(라이너)
⑤ 세라믹(골두) - 금속(라이너)

22. 대퇴골에 혈액을 공급하는 것은 medial femoral circumflex a., lateral femoral circumflex a., ligament teres a. 가 있다. 그 중 ( )은 대퇴 골두의 뒤쪽으로 돌아서 neck을 감아 돌아서 환형을 이룬다. 빈 칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
① 내측대퇴회선동맥
② 외측대퇴회선동맥
③ 대퇴골두인대동맥
④ 폐쇄동맥

23. 고관절 인공관절 탈구에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 굴곡, 외전, 내회전할 때 탈구가 잘 된다.
② 전염각이 클수록 후방으로 탈구된다.
③ 다리길이를 맞추면서 탈구를 줄이기 위해 경간각이 작은 스템을 사용하기도 한다.
④ 전방도달법을 하였을 때 탈구가 잘 일어난다.
⑤ 골두가 클수록 잘 발생한다.

24. 고관절 인공관절 치환술에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 지르코니아 함량 감소한 4세대 세라믹 등장으로 세라믹 골절이 감소했다.
② 관절운동은 비구컵과 비구라이너 사이에서 일어난다.
③ 인공관절 치환술에서 가장 중요한 것은 삽입물의 고정 안정이다.

25. 당뇨발로 인한 궤양으로 내원한 환자. 시행할 처치로 가장 적절한 것은?
① 압력 감소 + 감염 조절 + 혈관 평가
② 항상 Amputation 해야 한다.

26. 어떤 남성이 아침에 일어나서 앉아 있는 자세를 했을 때 뒤꿈치에 통증을 느꼈다. 일어나서 걷게 되면 통증이 괜찮아졌다. 가장 우선적으로 진단해야 하는 것은?
① Plantar fasciitis
② Achilles tendonitis
③ Retrocalcaneal bursitis

27. 아킬레스건 파열로 내원하였을 때 증상으로 옳은 것은?
① Thompson test 할 때 발바닥 굴곡이 안된다.
② 발목 외측 통증이 있다.
③ Dorsiflexion이 안 된다.
④ 슬관절 반사가 되지 않는다.

28. 무지외반증(Hallus valgus)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 엄지발가락이 내측으로 이동한다.
② 제1중족골이 내측으로 이동한다.
③ 제1중족골이 외측으로 이동한다.
④ 통증이 없다.

29. 족관절 염좌 시 가장 빈번하게 손상 입는 구조물은?
① posterior talofibular ligament
② anterior talofibular ligament
③ calcaneofibular ligament
④ deltoid ligament
⑤ retromalleolar ligament

30. 환지(ring finger)를 칼에 베인 환자가 내원했다. 칼에 베인 위치는 proximal digital crease에 가까운 곳이었다. DIP 굴곡은 불가능하며, PIP 굴곡 근력 약화되어 있었고 감각은 보존되어 있으며 맥박도 촉지되었다. 알맞은 치료는?
① Zone II 굴곡건 손상 - 지연봉합
② Zone II 심굴곡건 및 천굴곡건 손상 - 수술실에서 현미경하 봉합 및 조기 재활
③ Zone I 굴곡건 손상 - 응급감압술
④ 단순 봉합 후 경과관찰
⑤ 부목 고정


31. 40대 정원일 하다가 가시 찔려서 손가락 부종 및 tendon 따라 압통 발생. 손가락 살짝 굴곡되어있고 신전 시 통증 호소. 체온 38.2도, WBC 14,200. 알맞은 처치는?
① IV 항생제 투여 후 응급 절개배농
② NSAID 투여
③ 경구 항생제 투여 후 외래에서 추적관찰

32. 28세 남자가 교통사고 후 응급실에 왔다. 우측하지에 부목고정을 한 상태였다. 우측 하퇴부 및 족부에 심한 부종, 통증 및 이상감각을 호소하였다. 동반된 손상은 없었다. 하퇴부 X ray 사진이다. 진단은?



① 외상성 반사성 교감신경 이영양증
② 석고증후군
③ 압궤증후군
④ 구획증후군
⑤ 지방색전증

33. 젊은 남성이 오토바이 사고 후 응급실로 내원하였다. BP 80/60, RR 120/분 가장 먼저 해야할 처치는?




① 관혈적 정복 및 내고정술
② 부목고정
③ 골견인술 및 침상안정
④ 혈관색전술
⑤ 외고정술

34. 환자가 키우던 개에 물려 응급실에 내원하였다. 손 dorsum 부위에 2*2의 피부 결손이 있고, 일부 연부조직 손상이 있었고 종창 열감 통증이 있었다. 처치는?
① 전층 피부 이식(Full thickness skin graft)
② 부분층 피부 이식(Split skin graft)
③ 피판이식(Flap)
④ 창상 부위 세척 후 일차 봉합술(Primary wound closure)
⑤ 창상 부위 세척 후 이차 봉합술(Delayed wound closure)

35. Absolute stability가 필요한 골절은?
① 관절면 침범한 골절
② 전위 없는 쇄골 골절
③ 분쇄 골절
④ 쇄골 근위부 골절

36. 골절의 치료 방법 중 다음과 같이 direct bone healing을 유도하는 치료 방법은?



① 골수내 금속
② 압박 금속 고정판
③ 외고정
④ 최소 침습적 금속판 고정술

37. 유방암 치료받고 있는 환자에서 병적 골절이 발생할 수 있는데 이러한 skeletal-related event를 예방하기 위한 약물은?
① Denosumab
② Teriparatide
③ calcitriol
④ vit. D

38. 30대 오토바이 사고로 인해 응급실 내원하였다. 건측에 비해 환측 요골동맥이 약하게 촉지된다. 다음으로 시행할 처치로 가장 적절한 것은?



① 구획압 측정
② 외고정술
③ 금속판 고정
④ MIPO
⑤ Open reduction 관련 선지

39. 30대 남성 전구 갈다가 떨어져서 경골 골절 및 5cm 개방성 창상 발생하였다. 사용할 경험적 항생제는?
① Aminoglycoside
② Penicillin
③ 1세대 cephalosporin
④ 3세대 cephalosporin
⑤ 4세대 cephalosporin

40. 위축성 불유합의 원인으로 적절한 것은?
① poor vascularization
② 비만
③ 고혈당

41. 다발성 골절이 단발성 골절에 비해 motion tolerance가 좋은 이유로 알맞은 것은?
① strain이 분산돼서
② 혈관 분포가 많아서
③ 연부조직 손상이 적어서
④ 골절면끼리 간격이 좁아서


42. (Tibia 관절면 침범한 골절 x-ray 사진 주고) 적절한 치료는?



① 부목
② 외고정
③ 관혈적 정복 및 내고정
④ 최소 침습적 금속판 고정

43. Fat embolism을 예방하기 위한 방법으로 적절한 것은?
① 조기 골절 교정
② 항혈전제
③ 고압 산소
④ 고농도 스테로이드
⑤ 부목

44. 다음 중 골절 시 가장 잘 떨어지는 부위를 고르시오.



① a
② b
③ c
④ d
⑤ e


45. 3개월 아기 고관절에서 소리나는 것을 주소로 내원했다.(x-ray랑 초음파 사진 제시 - DDH). 처치는?



① Pavlik 보장구
② 6개월까지 경과관찰
③ 도수 정복 후 석고 붕대
④ 외전 보조기


46. 7세 소아가 3일 전 시작된 고관절 통증으로 내원, 며칠 지나도 발열 및 통증이 사라지지 않았다. 체온 40도, CRP 5.03이었다. (대퇴 골두에 low signal intensity 있는 coronal MRI 제시됨) 진단으로 가장 적절한 것은?
① 세균성 관절염
② 일과성 활액막염
③ 무혈성 괴사
④ 골절

47. Posterior cruciate liagment의 posterolateral 불안전성을 검사하는 검사는?



① Posterolateral drawer test
② **dial test**
③ Pivot stress test
④ Ballottement test
⑤ Posterior drawer test

48. Meniscus를 검사하는 다음 술기의 이름?




① pivot stress
② Mcmurray
③ **apley test**

49. 21세 남자가 축구를 하다가 좌측 슬관절 통증과 동통을 느껴 병원을 방문하였다. 슬관절 천자를 해보니 피가 가득 차 있었다. 남성은 어떤 증상을 앓고 있는가?


① hemangioma
② Osteoarthritis
③ **anterior cruciate ligament rupture**
④ Tibia의 medial shaft의 fracture

50. 다음 중 슬관절 내 활액 양을 판별하기 위한 신체진찰로 옳은 것은?


①



②



③




④



⑤



51. 다음 해부학적 구조물의 이름은 무엇인가?



① 반월 연골판 meniscus
② 전방십자인대 anterior cruciate ligament
③ 후방십자인대 posterior cruciate ligament
④ 내측 측부인대 medial collateral ligament
⑤ 내측 추벽 medial plica

52. 83 세 남성이 무릎 통증 및 열감으로 내원하였다. V/S stable 하였으며 신체검사상 삼출, 홍반 부종이 관찰되었다. 무릎 X-ray 와 관절천자 후 편광현미경 검사 결과이다. 진단은?



① OA
② RA
③ 통풍
④ 가성통풍
⑤ AVN

53. 다음 X-ray 사진의 진단은?



① Anterior knee dislocation
② Posterior knee dislocation
③ Multidirectional instability
④ Subluxation

54. 20세 여자가 우측 슬관절 통증을 호소하여 병원을 방문하였다. 검사 시행 결과 양성 판정을 받았다. 어떤 증상을 앓고 있는가?




① Anterior cruciate ligament rupture
② Posterior cruciate ligament rupture
③ Medial collateral ligament rupture
④ Lateral collateral ligament rupture
⑤ Anterolateral ligament rupture

55. 60세 여성 6개월 전부터 무릎 통증이 있었다. 걸으면 악화되고 쉬면 나아지는 양상이었다. X-ray 소견은 다음과 같았다. 가장 적절한 예방 방법은?



① 금연
② 금주
③ 체중감량
④ 저퓨린식단
⑤ 저칼륨식단

56. 15세 남성 환자가 축구를 하다가 좌측 무릎을 다쳐서 내원하였다. 관절 천자에서 다량의 혈액이 나왔다. MRI 검사 소견이다. 진단은?



① Anterior cruciate ligament rupture
② Posterior cruciate ligament rupture
③ Patellar dislocation
④ Meniscal tear

57. 슬개골 횡골절에서 tension band wiring의 역할은 무엇인가?

① tensile force를 compression으로 전환
② neutralization
③ rotation
④ distraction

58. 다음과 같은 검사에서 양성이었다. 원인이 되는 구조물은?



① Anterior cruciate ligament
② Posterior cruciate ligament
③ Medial collateral ligament
④ Lateral collateral ligament
⑤ Anterolateral ligament

59. (배근형 교수님 PY) 41세, 영상에서 다음과 같은 소견이 보이는 환자. 양성 소견으로 시멘트 수술 진행하였으며, 수술 중에 시행한 frozen biopsy에서 악성 종양 의심 소견이 확인되었다. 올바른 처치는?

① 지혈 하고 수술 마무리 후 최종 조직 검사 결과 기다린다
② 시멘트 수술 그대로 진행
③ 완전 절제한다