Catalogue des semences

MÉLANGES KREÖN · COMPOSITIONS, DOSAGES, PÉRIODES ET ENTRETIEN

Chaque mélange est choisi selon l'usage, l'exposition et l'eau disponible. Les compositions ci-dessous sont nos bases de travail ; les variétés exactes (cultivars) dépendent des disponibilités fournisseur et figurent sur le devis.

Nos 3 mélanges phares

Mélange	Pour qui	Dose pour 100 m²	Semis
Rustique Méditerranée	Jardins de particuliers, usage familial	3 à 3,5 kg	Sept.–oct., mars–avr.
Talus anti-érosion	Talus, pentes, remblais	2 à 3 kg	Sept.–oct., mars–avr.
Prairie fleurie	Fonds de jardin, entreprises, collectivités	0,8 à 1,5 kg	Sept.–oct., mars–avr.

Les doses sont ajustées par règle de trois selon la surface : pour 450 m² en Rustique Méditerranée, 4,5 × 3,5 kg = 15,75 kg.

★ Rustique Méditerranée

Composition	Fétuque élevée 70 %, ray-grass anglais 20 %, pâturin des prés 10 %
Dose de semis	30 à 35 g/m², soit 3 à 3,5 kg pour 100 m²
Levée	8 à 14 jours selon la température du sol
Période de semis	Mi-septembre à fin octobre (idéal), mars à avril
Hauteur de tonte	5 à 7 cm
Entretien	Arrosage quotidien court pendant la levée, puis 2 à 3 arrosages profonds par semaine l'été. Tonte haute (6 cm) en été. Engrais au printemps et à l'automne.
Profil	Sécheresse ●●●○ · Piétinement ●●●○ · Finesse ●●○○
Usage	Jardin familial, enfants, chiens. Notre mélange de référence sous le climat du Gard.

★ Talus anti-érosion

Composition	Fétuque élevée, ray-grass anglais, fétuque rouge, lotier corniculé et trèfle blanc
Dose de semis	20 à 30 g/m², soit 2 à 3 kg pour 100 m²
Levée	8 à 15 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre (idéal), mars à avril
Hauteur de tonte	Fauche 1 à 2 fois par an
Entretien	Arrosage d'appoint pendant la levée si possible, puis aucun en temps normal. Fauche haute en fin de printemps, pas de tonte rase.
Profil	Ancrage racinaire ●●●● · Sécheresse ●●●○
Usage	Talus de lotissement et de remblai. Associé à un mulch renforcé et, sur forte pente, à un géotextile jute ou coco.

★ Prairie fleurie

Composition	Graminées fines 75 % et fleurs annuelles et vivaces 25 % (bleuet, coquelicot, marguerite, achillée, trèfle). Mélanges Végétal local sur demande
Dose de semis	8 à 15 g/m², soit 0,8 à 1,5 kg pour 100 m²
Levée	10 à 25 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre, ou mars à avril
Hauteur de tonte	Fauche 1 à 2 fois par an
Entretien	Arrosage seulement pendant la levée. Fauche en fin d'été après montée en graines, foin exporté. Aucun engrais.
Profil	Sécheresse ●●●○ · Biodiversité ●●●●
Usage	Fonds de jardin, talus doux, abords d'entreprises et de collectivités.

Ornemental

Composition	Fétuque rouge traçante 40 %, fétuque rouge demi-traçante 30 %, fétuque ovine 20 %, agrostide 10 %
Dose de semis	25 à 30 g/m², soit 2,5 à 3 kg pour 100 m²
Levée	10 à 18 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre, mars à avril
Hauteur de tonte	3 à 5 cm
Entretien	Arrosage régulier, tonte fréquente et basse, engrais 3 fois par an.
Profil	Sécheresse ●●○○ · Piétinement ●○○○ · Finesse ●●●●
Usage	Pelouse d'agrément au tapis fin. Demande arrosage et tontes régulières.

Sport et jeux

Composition	Ray-grass anglais 70 %, pâturin des prés 30 %
Dose de semis	30 à 35 g/m², soit 3 à 3,5 kg pour 100 m²
Levée	7 à 18 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre, mars à mai
Hauteur de tonte	3 à 5 cm
Entretien	Arrosage régulier l'été, regarnissage des zones usées à l'automne.
Profil	Sécheresse ●●○○ · Piétinement ●●●● · Finesse ●●●○
Usage	Jeux de ballon, passages intenses. Récupère vite après usure.

Ombre et mi-ombre

Composition	Fétuque rouge 50 %, fétuque élevée 30 %, pâturin des bois 20 %
Dose de semis	30 g/m², soit 3 kg pour 100 m²
Levée	10 à 20 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre (avant la chute des feuilles), mars à avril
Hauteur de tonte	6 à 7 cm
Entretien	Ramasser les feuilles, tonte haute, arrosage modéré (l'ombre garde l'humidité).
Profil	Sécheresse ●●○○ · Piétinement ●●○○ · Ombre ●●●○
Usage	Sous les arbres, côté nord des maisons.

Sec et faible entretien

Composition	Fétuque élevée 60 %, fétuque ovine durette 30 %, ray-grass anglais 10 %
Dose de semis	30 g/m², soit 3 kg pour 100 m²
Levée	10 à 16 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre
Hauteur de tonte	6 à 8 cm
Entretien	Arrosage de levée puis très peu. Accepte de jaunir en pleine canicule et repart aux pluies.
Profil	Sécheresse ●●●● · Piétinement ●●○○ · Entretien ●○○○
Usage	Grands terrains peu arrosés, résidences secondaires.

Gazon chaleur (cynodon)

Composition	Cynodon dactylon (chiendent pied-de-poule) pur
Dose de semis	5 à 10 g/m², soit 0,5 à 1 kg pour 100 m²
Levée	10 à 21 jours, sol au-dessus de 18 °C
Période de semis	Mai à juillet uniquement
Hauteur de tonte	2 à 4 cm
Entretien	Très peu d'eau l'été. Tonte basse et fréquente en saison. Repos hivernal : pelouse paille, c'est normal.
Profil	Chaleur ●●●● · Sécheresse ●●●● · Piétinement ●●●●
Usage	Terrains très exposés, faible arrosage estival. Attention : jaunit et entre en repos de novembre à mars.

Bassins de rétention

Composition	Fétuque élevée, agrostide stolonifère, fétuque rouge, lotier
Dose de semis	25 à 30 g/m², soit 2,5 à 3 kg pour 100 m²
Levée	10 à 18 jours selon la température du sol
Période de semis	Septembre à octobre, mars à avril
Hauteur de tonte	Fauche 1 à 2 fois par an
Entretien	Fauche annuelle, contrôle après chaque gros épisode de pluie.
Profil	Submersion temporaire ●●●○ · Érosion ●●●●
Usage	Talus internes et fonds de bassins, noues et fossés.

Dosages hydroensemencement. Les semences sont projetées avec 150 à 350 g/m² de mulch de fibres de bois et un fixateur, selon la pente. Voir la fiche technique mulch.