


## 0.1 Addisjon

### Addisjon med mengder; å legge til


Når vi har en mengde og skal legge til mer, bruker vi **plusstegnet**  $+$ . Har vi 2 og skal legge til 3, skriver vi

$$2 + 3 = 5$$



Rekkefølgen vi legger sammen tallene på har ikke noe å si; å starte med 2 og så legge til 3 er det samme som å starte med 3 og så legge til 2:

$$3 + 2 = 5$$



#### Språkboksen

Et addisjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **sum**. I regnestykket

$$2 + 3 = 5$$

er både 2 og 3 ledd, mens 5 er summen.

Vanlige måter å si  $2 + 3$  på er

- "2 pluss 3"
- "2 addert med 3"
- "2 og 3 lagt sammen"

Det å legge sammen tall kalles også å *summere*.

## 0.1 Addisjon er kommutativ

Summen er den samme uansett rekkefølge på leddene.

### Eksempel

$$2 + 5 = 7 = 5 + 2$$


$$6 + 3 = 9 = 3 + 6$$

## Addisjon på tallinja; Vandring mot høyre

På en tallinje vil addisjon med positive tall innebære vandring *mot høyre*:


### Eksempel 1

$$2 + 7 = 9$$



### Eksempel 2

$$4 + 11 = 15$$



## Betydningen av =

**+** gir oss muligheten til å uttrykke tall på mange forskjellige måter, for eksempel er  $5 = 2 + 3$  og  $5 = 1 + 4$ . I denne sammenhengen vil **=** bety "har samme verdi som". Dette gjelder også ved subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, som vi skal se på i de neste tre seksjonene.

## 0.2 Subtraksjon

### Subtraksjon med mengder: Å trekke ifra

Når vi har en mengde og tar bort en del av den, bruker vi **minustegnet**  $-$ . Har vi 5 og skal ta bort 3, skriver vi

$$5 - 3 = 2$$

A visual representation of the subtraction 5 - 3 = 2 using colored blocks. On the left, there are five blue blocks arranged in a row. In the middle is a minus sign. To the right of the minus sign are three red blocks arranged in a row. Further right is an equals sign, followed by two blue blocks arranged in a row. This illustrates that removing three units from five units leaves two units.

#### Språkboksen

Et subtraksjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **differanse**. I subtraksjonsstykket

$$5 - 3 = 2$$

er både 5 og 3 ledd og 2 er differansen.

Vanlige måter å si  $5 - 3$  på er

- "5 minus 3"
- "5 fratrekt 3"
- "3 subtrahert fra 5"

#### En ny tolkning av 0

Innledningsvis i denne boka nevnte vi at 0 kan tolkes som "ingenting". Subtraksjon gir oss muligheten til å uttrykke 0 via andre tall. For eksempel er  $7 - 7 = 0$  og  $19 - 19 = 0$ .

## Subtraksjon på tallinja: Vandring mot venstre


I [seksjon 0.1](#) har vi sett at  $+$  (med positive tall) innebærer at vi skal gå *mot høyre* langs tallinja. Med  $-$  gjør vi omvendt, vi går *mot venstre*<sup>1</sup>:

### Merk

I *Eksempel 1* og *Eksempel 2* under går vi i motsatt retning av den som pila peker i. Dette kan først virke litt rart, men spesielt i [kapittel ??](#) vil det lønne seg å tenke slik.

### Eksempel 1

$$6 - 4 = 2$$



### Eksempel 2

$$12 - 7 = 5$$



---

<sup>1</sup>I figurer med tallinjer vil rødfargede piler indikere at man starter ved pilspissen og vandrer til andre enden.

## 0.3 Multiplikasjon (ganging)

### Ganging med heltall; innledende definisjon

Når vi legger sammen like tall, kan vi bruke **gangetegnet**  $\cdot$  for å skrive regnestykkene våre kortere:

#### Eksempel

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5$$

#### Språkboksen

Et gangestykke består av to eller flere **faktorer** og ett **produkt**. I gangestykket

$$4 \cdot 3 = 12$$

er 4 og 3 faktorer, mens 12 er produktet.

Vanlige måter å si  $4 \cdot 3$  på er

- "4 ganger 3"
- "4 ganget med 3"
- "4 multiplisert med 3"

Mange nettstedet og bøker på engelsk bruker symbolet  $\times$  i steden for  $\cdot$ . I de fleste programmeringsspråk er  $*$  symbolet for multiplikasjon.

### Ganging av mengder

La oss nå bruke en figur for å se for oss gangestykket  $2 \cdot 3$ :

$$2 \cdot 3 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Og så kan vi legge merke til produktet av  $3 \cdot 2$ :

$$3 \cdot 2 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

## 0.2 Multiplikasjon er kommutativ

Produktet er det samme uansett rekkefølge på faktorene.

### Eksempel

$$3 \cdot 4 = 12 = 4 \cdot 3$$

$$6 \cdot 7 = 42 = 7 \cdot 6$$


$$8 \cdot 9 = 72 = 9 \cdot 8$$

## Ganging på tallinja

Vi kan også bruke tallinja for å regne ut gangestykker. For eksempel kan vi finne hva  $2 \cdot 4$  er ved å tenke slik:

” $2 \cdot 4$  betyr å vandre 2 plasser *mot høyre*, 4 ganger.”


$$2 \cdot 4 = 8$$



Også tallinja kan vi bruke for å overbevise oss om at rekkefølgen i et gangestykke ikke har noe å si:

” $4 \cdot 2$  betyr å vandre 4 plasser *mot høyre*, 2 ganger.”

$$4 \cdot 2 = 8$$



## Endelig definisjon av ganging med positive heltall

Det ligger kanskje nærmest å tolke "2 ganger 3" som "3, 2 ganger". Da er

$$\text{"2 ganger 3"} = 3 + 3$$

På side 5 presenterete vi  $2 \cdot 3$ , altså "2 ganger 3", som  $2 + 2 + 2$ . Med denne tolkningen vil  $3 + 3$  svare til  $3 \cdot 2$ , men nettopp det at multiplikasjon er en kommutativ operasjon ([regel 0.2](#)) gjør at den ene tolkningen ikke utelukker den andre;  $2 \cdot 3 = 2 + 2 + 2$  og  $2 \cdot 3 = 3 + 3$  er to uttrykk med samme verdi.

### 0.3 Ganging som gjentatt addisjon

Ganging med et positivt heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon.

#### Eksempel 1

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5 = 5$$

#### Merk

At ganging med positive heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon, utelukker ikke andre uttrykk. Det er ikke feil å skrive at  $2 \cdot 3 = 1 + 5$ .

## 0.4 Divisjon (deling)

**:** er **divisjonstegnet**. I praksis har divisjon tre forskjellige betydninger, her eksemplifisert ved regnestykket  $12 : 3$ :

### 0.4 Divisjon sine tre betydninger

- **Inndeling av mengder**  
 $12 : 3 =$  "Antallet i hver gruppe når 12 deles inn i 3 like store grupper"
- **Antall ganger**  
 $12 : 3 =$  "Antall ganger 3 går på 12"
- **Omvendt operasjon av multiplikasjon**  
 $12 : 3 =$  "Tallet man må gange 3 med for å få 12"

### Språkboksen

Et divisjonsstykke består av en **dividend**, en **divisor** og en **kvotient**. I divisjonsstykket

$$12 : 3 = 4$$

er 12 dividenden, 3 er divisoren og 4 er kvotienten.

Vanlege måtar å uttale  $12 : 3$  på er

- "12 delt med/på 3"
- "12 dividert med/på 3"
- "12 på 3"


I noen sammenhenger blir  $12 : 3$  kalt "**forholdet** mellom 12 og 3". Da er 4 **forholdstallet**.

Ofte brukes **/** i steden for **:**, spesielt i programmeringsspråk.



## Divisjon av mengder


Regnestykket  $12 : 3$  forteller oss at vi skal dele 12 inn i 3 like store grupper:



Vi ser at hver gruppe inneholder 4 ruter, dette betyr at

$$12 : 3 = 4$$


## Antall ganger




3 går 4 ganger på 12, altså er  $12 : 3 = 4$ .

## Omvendt operasjon av multiplikasjon

Vi har sett at hvis vi deler 12 inn i 3 like grupper, får vi 4 i hver gruppe. Altså er  $12 : 3 = 4$ . Om vi legger sammen igjen disse gruppene, får vi naturligvis 12:



Men dette er det samme som å gange 4 med 3. Altså; om vi vet at  $4 \cdot 3 = 12$ , så vet vi også at  $12 : 3 = 4$ . I tillegg vet vi da at  $12 : 4 = 3$ .



### **Eksempel 1**

Siden  $6 \cdot 3 = 18$ , er

$$18 : 6 = 3$$

$$18 : 3 = 6$$

### **Eksempel 2**

Siden  $5 \cdot 7 = 35$ , er

$$35 : 5 = 7$$

$$35 : 7 = 5$$