

## Übungsserie 1

Erstellen Sie für ihre manuelle Lösung für die Aufgaben 2a) eine PDF-Datei *Name\_S1\_Aufg2a.pdf* und fassen Sie diese mit Ihren Python-Skripts *Name\_S1\_Aufg1.py* und *Name\_S1\_Aufg2b.py* für die Aufgaben 1 und 2b) in einer ZIP-Datei *Name\_S1.zip* zusammen. Laden Sie dieses File vor der Übungsstunde nächste Woche auf Moodle hoch.

### Aufgabe 1 (ca. 60 Minuten):

Arbeiten Sie das Jupiter Notebook `flaechen.ipynb` durch, um zu sehen, wie Sie Flächen mit Python darstellen können. Weiterführende Informationen bietet Ihnen zum Beispiel auch das Tutorial

[https://matplotlib.org/mpl\\_toolkits/mplot3d/tutorial.html](https://matplotlib.org/mpl_toolkits/mplot3d/tutorial.html) an.

Schreiben Sie ein Skript *Name\_S1\_Aufg1.py*, welches Ihnen jede der folgenden Funktionen in a) und b)

- einmal dreidimensional mit `plot_wireframe()` darstellt
- einmal dreidimensional mit `plot_surface()` und passender Colormap darstellt
- einmal in zwei Dimensionen mit den Höhenlinien darstellt

Versehen Sie jede Abbildung mit passenden Achsenbeschriftungen und einem Titel.

a) Die Funktion  $W = W(v_0, \alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$  beschreibt die Wurfweite  $W$  eines Körpers, der mit der Anfangsgeschwindigkeit  $v_0 [\frac{m}{s}]$  unter einem Winkel  $\alpha$  gegen die Horizontal abgeworfen wird. Nehme Sie für die Erdbeschleunigung  $g = 9.81 [\frac{m}{s^2}]$  an. Für die Anfangsgeschwindigkeit soll gelten  $v_0 \in [0, 100]$ . Wählen Sie selbst einen vernünftigen Definitionsbereich für  $\alpha$ . Bei welchem Winkel  $\alpha$  erreicht  $W$  für gegebens  $v_0$  sein Maximum? Schreiben Sie dies als Kommentar in Ihr Skript.

b) Die Zustandsgleichung  $pV = RT$  für 1 Mol (entspricht  $6.022 \cdot 10^{23}$  Molekülen) eines idealen Gases beschreibt den Zusammenhang zwischen den Grössen  $p$  (Druck, in  $\frac{N}{m^2}$ ),  $V$  (Volumen in  $m^3$ ) und  $T$  (absolute Temperatur in Kelvin) des Gases, wobei die Gaskonstante  $R = 8.31 \dots$  (in  $\frac{J}{molK}$ ) ist. Daraus ergeben sich die folgenden Abhängigkeiten. Stellen Sie jede der drei Funktionen dar innerhalb der angegebenen Defintionsbereiche für  $p$ ,  $V$  und  $T$ .

- $p = p(V, T) = \frac{RT}{V}$  für  $V \in [0, 0.2]$ ,  $T \in [0, 1e4]$
- $V = V(p, T) = \frac{RT}{p}$  für  $p \in [1e4, 1e5]$ ,  $T \in [0, 1e4]$
- $T = T(p, V) = \frac{pV}{R}$  für  $p \in [1e4, 1e6]$ ,  $V \in [0, 10]$

### Aufgabe 2 (ca. 60 Minuten):

Die Auslenkung  $w = w(x, t)$  einer schwingenden Welle (z.B. einer Saite, einer Schall- oder Lichtwelle) in einer räumlichen Dimension wird in Abhängigkeit der Ortskoordinate  $x$  und der Zeitkoordinate  $t$  durch die eindimensionale Wellengleichung beschrieben

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

Dabei ist  $c$  die (konstante) Geschwindigkeit der Welle und  $\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial w}{\partial t} \right)$  bzw.  $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)$ .

a) Zeigen Sie durch manuelles partielles Ableiten, dass die folgenden Funktionen die Wellengleichung erfüllen:

$$\text{a1) } w(x, t) = \sin(x + ct) \quad \text{a2) } v(x, t) = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$$

b) Schreiben Sie ein Skript `Name_S1_Aufg2b.py`, welches Ihnen die Funktionen  $w(x, t)$  und  $v(x, t)$  dreidimensional mittels `plot_wireframe()` darstellt (für  $c = 1$ ).

a1)  $w(x, t) = \sin(x + ct)$  Kettenregel beim Ableiten!

$$f'_x(x, t) = \cos(x + ct) \cdot 1 = \cos(x + ct) \quad f''_x(x, t) = -\sin(x + ct) = \frac{\partial^2 w}{\partial^2 x}$$

$$f'_t(x, t) = \cos(x + ct) \cdot c = \frac{\partial w}{\partial t} \quad f''_t(x, t) = -\sin(x + ct) \cdot c^2 = \frac{\partial^2 w}{\partial^2 t}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

$$-\sin(x + ct) \cdot c^2 = c^2(-\sin(x + ct)) \Rightarrow \text{erfüllt}$$

a2)  $v(x, t) = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$

$$f'_x(x, t) = \cos(x + ct) - 2\cos(2x + 2ct)$$

$$f''_x(x, t) = -\sin(x + ct) - 4\cos(2x + 2ct) = \frac{\partial^2 w}{\partial^2 x}$$

$$f'_t(x, t) = \cos(x + ct) \cdot c - \cos(2x + 2ct) \cdot 2c$$

$$f''_t(x, t) = -\sin(x + ct) \cdot c^2 - \cos(2x + 2ct) \cdot 4c^2 = \frac{\partial^2 w}{\partial^2 t}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

$$-\sin(x + ct) \cdot c^2 - \cos(2x + 2ct) \cdot 4c^2 = c^2(-\sin(x + ct) - 4\cos(2x + 2ct)) \Rightarrow \text{erfüllt}$$