CIRUGÍA ORAL GENERAL

POST CIRUGÍA ORAL - PROTOCOLO A SEGUIR
RECOMENDACIONES GENERALES TRAS UNA CIRUGÍA ORAL

Después de cualquier acto de cirugía bucal (extracciones, etc.) es necesario que siga estos consejos:

Aplicar **Clorhexidina Lacer® Spray**
Aplicar **Gel Bioadhesivo Lacer® Mucorepair**, 3–4 veces al día, en esa zona.

Inmediatamente después de la cirugía:

- ✓ Aplicar hielo en la zona intervenida, durante 2 días de manera intermitente. Puede hacerse a intervalos de 15', separados por períodos de descanso de 5'.
- ✓ No enjuagar la boca, ni siquiera con agua, y no utilizar ningún tipo de colutorio para no levantar coágulos ni provocar hemorragias.
- ✓ Si aparece sangrado, doblar una gasa enjuagada en colutorio y colocar en la herida haciendo presión sobre la misma, durante al menos 45'.
- ✓ No conducir ni manipular máquinas.
- ✓ Mantener la cabeza más alta que el cuerpo (dormir con 2 almohadas para evitar el edema).

Días posteriores:

- ✓ No ingerir alimentos cuya dureza pueda herir las encías: evitar pan tostado y corteza de pan, frutos secos, etc. Mejor ingerir alimentos líquidos o semilíquidos.
- ✓ Evitar la comida caliente, mejor ingerir alimentos fríos.
- ✓ Evitar el tabaco, en caso de ser fumador, y las bebidas alcohólicas o carbónicas.
- ✓ Evitar cualquier esfuerzo físico, al menos durante los 3 primeros días posteriores.
- ✓ Si lleva prótesis dentales, póngasela solo por motivos estéticos y para hacer vida social, para no dañar la herida.
- ✓ Extremar la higiene bucodental:

Enjuagar con **Clorhexidina Lacer® Colutorio 0,12%,** después de cada comida, al menos durante 3 días.

Cepillar 3 veces al día, con **Cepillo GingiLacer** o **Cepillo Lacer Quirúrgico** y **Clorhexidina Lacer® Pasta Dentífrica**.

Si hay dolor moderado/agudo (medicación prescrita por su médico):



- ❑ Ibuprofeno 600 mg/ 8 horas durante 5 días.
- ❑ Paracetamol 1 g/ 8 horas durante 5 días.
- ❑ Amoxicilina 750 mg. 1/12 horas durante 7 días.
  (En caso de alergias Clindamicina 300mg/8 horas durante 7 días).

Si se le cayesen los puntos de sutura durante la primera semana, o tuviera sangrado persistente, póngase en contacto con nuestra consulta.
Es normal que se produzca un edema o hinchazón en la zona de la cirugía.

Lacer Bocas sanas