

Antoine Hugounet

Idéaux de Carmichael et primalité

travail encadré de recherche
encadré par Alain Kraus (IMJ-PRG)
de janvier à juin 2020

Sorbonne Université



Introduction	2
1 Délices de la théorie	3
2 Corps quadratiques	6
2.1 Vers un possible test de primalité	6
2.1.1 Un résultat prometteur	6
2.1.2 Un pas en arrière	8
2.2 Idéaux de Carmichael et extensions	9
3 Corps cyclotomiques	10
3.1 Horizon	10
3.2 Pratique	11
3.3 Technique	12
A Produire des contre-exemples	13

Introduction

Ce mémoire s'applique à étudier les idéaux de Carmichael dans les corps de nombres et évaluer la viabilité de cette jeune théorie pour fournir un test de primalité. Le point de départ est l'article de G.A. Steele *Carmichael numbers in number rings* [1]. Commençons par quelques énoncés.

Le test de primalité non naïf le plus simple est le *test de primalité de Fermat*. Étant donné un entier n dont on veut tester la primalité, ce dernier affirme que s'il existe un entier a vérifiant $a^n \not\equiv a \pmod{n}$, alors n est composé. Il existe cependant des entiers n **composés** vérifiant

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout entier a . On les appelle *entiers de Carmichael* et le test de Fermat est incapable de prouver leur composition. Pire encore, il existe une infinité de tels entiers. On peut les caractériser ainsi.

Proposition 0.1. *Soit n un entier. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (a) *n est un entier de Carmichael ;*
- (b) *n est composé, sans facteur carré et pour tout nombre premier p divisant n , on a*

$$p - 1 \mid n - 1 ;$$

- (c) *on a*

$$\lambda(n) \mid n - 1,$$

la fonction λ étant l'indicatrice de Carmichael.

L'assertion (b) de la proposition est appelée *critère de Korselt* et est l'outil théorique le plus couramment utilisé pour démontrer qu'un entier donné est de Carmichael. Le lecteur désireux d'une preuve de cette proposition pourra se référer au *cours d'algèbre* de M. Demazure [2] §3.3, p. 89. Dans l'article susnommé [1], la notion d'entier de Carmichael est étendue à la notion d'*idéal de Carmichael* dans l'anneau d'entiers d'un corps de nombres.

Définition 0.2. Soient K un corps de nombres et I un idéal de \mathcal{O}_K . On dit que I est un idéal de Carmichael si pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, la congruence

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I} \tag{*}$$

est vérifiée.

Remarque 0.3. Un entier de Carmichael peut donc être vu comme un idéal de Carmichael du corps de nombres \mathbb{Q} .

Cette définition est le point de départ d'un formalisme fructueux. Ce dernier donne naissance à une réciproque au petit théorème de Fermat 1.3 et à plusieurs tests de primalité théoriques. L'auteur de l'article, après quelques énoncés généraux, s'intéresse spécifiquement aux corps quadratiques et aux corps cyclotomiques ; nous suivrons ces traces. Tout en assurant une base solide à sa théorie, l'auteur soulève de nombreuses questions, notamment la question fondamentale suivante.

Question 0.4. Soient n un entier de Carmichael et K un corps de nombre. Dans quel mesure n est-il de Carmichael dans K ?

Nous nous proposons de répondre nous même à une partie de ces questions au fil de ce mémoire.

À noter que l'auteur du présent texte a choisi de ne pas y incorporer les preuves des énoncés de l'article. Celles-ci sont claires et nous n'aurions rien d'autre à apporter que de la paraphrase. Nous jugeons plus opportun de commenter ces dernières, ce que nous faisons dans des environnements intitulés *Un mot sur la preuve*.

Donnons dès à présent la liste des vingt-neuf premiers entiers de Carmichael.
Nous l'étudierons beaucoup dans la suite de ce mémoire¹.

$$\left\{ \begin{array}{l} 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, \\ 15841, 29341, 41041, 46657, 52633, 62745, 63973, \\ 75361, 101101, 115921, 126217, 162401, 172081, \\ 188461, 252601, 278545, 294409, 314821, 334153, \\ 340561, 399001, 410041, 449065, 488881, 512461 \end{array} \right\} \quad (\mathfrak{C})$$

1 Délices de la théorie

Fort heureusement, certaines propriétés fondamentales des *entiers* de Carmichael restent vraies dans le cadre plus général des *idéaux* de Carmichael. Tout d'abord, le petit

1. C'est l'entrée A002997 de l'encyclopédie en ligne des séquences d'entiers : <https://oeis.org/A002997>.

théorème de Fermat se généralise aux corps de nombres galoisiens : dans une telle extension, un nombre premier engendre un idéal qui est soit premier, soit de Carmichael. Plus formellement, vient ceci.

Théorème 1.1 (petit théorème de Fermat généralisé, 2.3 dans l'article). *Soient p un nombre premier et K un corps de nombre galoisien tel que $p \nmid \text{Disc}(K)$. Alors, pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(p)} \equiv \alpha \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

Fait tout à fait remarquable, l'auteur de l'article fournit une réciproque au petit théorème de Fermat dans ce nouveau cadre des idéaux de Carmichael.

Théorème 1.2 (réciproque du petit théorème de Fermat généralisé, 2.3 dans l'article). *Soit $n > 2$ un entier composé. Alors il existe un corps quadratique K vérifiant $n \nmid \text{Disc}(K)$ et un entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tels que*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Un mot sur la preuve. À l'instar de beaucoup d'autres résultats de l'article, la preuve de cet énoncé jouit à la fois d'une complexité technique raisonnable et d'une grande ingéniosité. Connaissant un diviseur p premier de n , l'auteur construit un corps quadratique $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}p}\right)$ dans lequel n n'est pas de Carmichael. Ce dernier point se démontre avec des techniques de base de la ramification.

Nous pouvons de plus mettre à bout ces deux résultats pour fournir cette délicieuse équivalence.

Théorème 1.3 (petit théorème de Fermat généralisé et sa réciproque). *Soit $n > 2$ un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps quadratique K vérifiant $n \nmid \text{Disc}(K)$ et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Au delà de sa force théorique, cette énoncé semble porter une valeur historique majeure. Le test de primalité de Fermat était le seul test de primalité à ne pas disposer d'une réciproque (pour le test d'Euler par exemple, c'est une équivalence). Cette absence de réciproque semblait bien être le prix à payer pour sa simplicité et son efficacité. Il aura certes fallu aller chercher la réciproque dans les corps de nombres, mais l'énoncé prouve que les corps quadratiques. Ces objets ne sont d'ailleurs pas si loin de l'arithmétique classique : Gauss les étudiait déjà.

Un autre résultat d'importance (démontré avant le petit théorème de Fermat généralisé dans l'article) est la généralisation du critère de Korselt 0.1. C'est ce résultat que l'on utilise en premier lieu pour déterminer si un entier est de Carmichael.

Théorème 1.4 (critère de Korselt généralisé, 2.2 dans l'article). *Soient K un corps de nombres et I un idéal de \mathcal{O}_K . On prend garde à supposer que I est composé. Alors I est de Carmichael si, et seulement si, I est sans facteurs carrés et pour tout idéal premier \mathfrak{P} divisant I , on a*

$$N(\mathfrak{P}) - 1 \mid N(I) - 1.$$

Un mot sur la preuve. La preuve du critère de Korselt généralisé est étonnamment proche de celle du critère de Korselt dans \mathbb{Q} . Une savante utilisation du théorème chinois permet de prouver que I est sans facteurs carrés. L'auteur se sert en suite de cela pour montrer l'identité sur les normes.

Remarque 1.5. Le critère de Korselt que nous connaissons dans le cadre de l'arithmétique se déduit immédiatement du critère de Korselt généralisé en prenant $K = \mathbb{Q}$.

Remarque 1.6. Il faut ici se montrer vigilant avec la nomenclature. Un idéal I est de Carmichael dans un corps de nombres K si I est un idéal **composé** qui *en plus de cela*, vérifie l'identité \star pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$.

Si l'on a un corps de nombres L et un idéal J de \mathcal{O}_K , montrer que $N(\mathfrak{P}) - 1 \mid N(J) - 1$ pour tout idéal premier \mathfrak{P} de \mathcal{O}_L divisant J ne suffit pas. La preuve du critère de Korselt généralisé 1.4 nous enseigne que si J est premier, J vérifie également cette identité. Il faut donc indépendamment montrer que J est composé si l'on veut montrer que J est un idéal de Carmichael. Là est le cœur du problème. L'auteur de l'article fait lui-même une petite erreur en oubliant cette hypothèse dans l'énoncé du théorème 2.7 : il doit y supposer n composé.

Avant de poursuivre, donnons un lemme qui permettra d'alléger les énoncés de l'article.

Lemme 1.7. *Soient n un entier et K un corps de nombres. Si n est de Carmichael dans K , alors n et $\text{Disc}(K)$ sont premiers entre eux.*

Démonstration. Si n et $\text{Disc}(K)$ ne sont pas premiers entre eux, n a un facteur premier qui se ramifie dans \mathcal{O}_K . L'idéal $n\mathcal{O}_K$ a donc un facteur carré, ce qui l'empêche d'être un idéal de Carmichael d'après le critère de Korselt généralisé 1.4. \square

Ces résultats fournissent un début de théorie confortable, qui nous laisse envisager l'avenir avec espoir. Nous pouvons dès à présent nous confronter à une étude plus spécifique, celle des corps quadratiques.

2 Corps quadratiques

2.1 Vers un possible test de primalité

2.1.1 Un résultat prometteur

Entrons dès à présent dans le vif du sujet. L'un de nos objectifs principaux de répondre à la question 0.4. Le théorème 2.5 de l'article y apporte de premiers éléments de réponse.

Théorème 2.1 (2.5 dans l'article). *Soit n un entier impair sans facteurs carrés. S'il existe un diviseur premier p de n tel que*

$$p^2 - 1 \nmid n^2 - 1,$$

alors il existe une infinité de corps quadratiques K dans lesquels n n'est pas de Carmichael.

Un mot sur la preuve. On présage dès l'énoncé la nature de la preuve : c'est le critère de Korselt généralisé 1.4. On commence par s'assurer que n est sans facteurs carrés de sorte de contrôler la décomposition de $n\mathcal{O}_K$ dans un corps quadratique K donné. Du reste, comme la norme d'un idéal premier au dessus de $n\mathcal{O}_K$ est un nombre premier p divisant n , on sent bien que la condition de non-divisibilité va empêcher être n d'être de Carmichael dans les corps quadratiques² bien choisis. La partie réellement inventive de la preuve consiste à trouver les bons corps quadratiques. Cette partie est hautement non triviale et est basée sur la connaissance d'un nombre premier p comme dans les hypothèses du théorème et sur une savante utilisation du théorème chinois. Les techniques de base de la ramification permettent encore une fois de s'assurer que les corps construits vérifient bien ce qu'on leur demande de vérifier.

Bien que cet énoncé ne semble pas optimal en pratique³, certains nombres de Carmichael vérifient ces hypothèses. C'est le cas par exemple du nombre de 512461 et de son facteur premier 271. Il existe ainsi une infinité de corps quadratiques dans lequel 512461 n'est pas de Carmichael. Mieux encore, nous avons numériquement exhibé pour chaque entier de Carmichael de la liste \mathfrak{C} une liste de corps quadratiques dans lequel ledit entier n'est pas de Carmichael. **ajouter liste**

Complément. Une liste bien plus dense exhibée par l'auteur de ce mémoire est disponible sur sa page GitHub : https://github.com/kryzar/ter-carmichael/blob/master/scripts/results_carmichael_not_carmichael_in_quad_field.txt.

2. Les carrés ne sont ni plus ni moins que les normes de p et de n dans toute extension quadratique.

3. Il n'y a à ce jour (3 juin 2020) pas d'algorithme efficace pour déterminer si un entier est sans facteurs carrés. Les algorithmes passent souvent par la décomposition en produit de facteurs premiers, ce qui ne nous arrange pas. **sourcer**.

Malgré cela, l'algorithme que nous avons utilisé pour trouver ces corps est sans doute très sous-optimal. Utilisant le critère de Korselt généralisé 1.4, il impose de décomposer l'idéal $n\mathcal{O}_K$ en produit d'idéaux premiers⁴. Dans l'exemple 2.6 de l'article, l'auteur ouvre une voix bien plus intéressante. Il montre que $n = 561$ est composé en exhibant le corps quadratique $K = \mathbb{Q}(\sqrt{13})$ puis l'entier algébrique $\alpha = 2 + 1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right) \in \mathcal{O}_K$. Comme

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$$

et que n et 13 sont premiers entre eux, cela prouve la composition de n . Le point clé est que l'auteur ne semble pas utiliser le critère de Korselt (il n'a pas donné les détails et nous ne pouvons en conséquence pas en être sûrs). Cette approche nous invite à étudier l'algorithme *probabiliste* suivant. Soit n un entier impair (potentiellement de Carmichael).

```

Entrées :  $b$  (borne coordonnées  $\alpha$ )
pour chaque  $d \in \mathbb{N}$  sans facteurs carrés faire
     $K \leftarrow \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 
     $\theta \leftarrow$  un générateur de  $\mathcal{O}_K$ 
    si  $d$  et  $n$  sont premiers entre eux alors
        pour chaque  $\alpha = x + y\theta$ ,  $x, y \in \llbracket 1, b \rrbracket$  faire
            si  $\alpha^{n^2} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$  alors
                retourner  $n$  est composé
            fin du programme
        fin
    fin
fin

```

Pour que cet algorithme soit viable en pratique, il conviendra de définir la notion de *témoin de Carmichael* et d'étudier finement leur répartition, à la manière du test de primalité de Rabin-Miller (voir § 2.3.7, p.69 de [2]). L'auteur de ce présent mémoire est pleinement conscient du travail à accomplir. Par ailleurs, il n'y aucune preuve que l'algorithme termine en l'état.

Il peut en outre être tentant d'utiliser cet algorithme pour déterminer la primalité de n avec une certitude morale, toujours dans l'esprit test de primalité de Rabin-Miller. L'idée serait que si n vérifie la congruence $\alpha^{N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$ pour un nombre suffisamment grand de corps quadratiques $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ de discriminant premier avec n et d'entiers algébriques $\alpha \in \mathcal{O}_K$, nous aurions une certitude morale de la primalité de n . Mais

4. **Si possible, donner un mot sur la complexité de l'algo de décomposition dans un extension**

l'existence d'entiers h qui sont de Carmichael *dans tout corps quadratique de discriminant premier avec h* est un problème majeur qui empêche de considérer cette voie. C'est le propos de la prochaine sous-section.

2.1.2 Un pas en arrière

Revenons un pas en arrière. Nous avons évoqué la réciproque du petit théorème de Fermat (1.3). Il faut bien faire attention au fait que l'énoncé suivant est faux !

Énoncé faux 2.2 (réciproque erronée du petit théorème de Fermat généralisé). *Soit $n > 2$ un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps quadratique K vérifiant $\text{pgcd}(n, \text{Disc}(K)) = 1$ et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Si l'on veut prouver qu'un entier $n > 2$ est premier, montrer que la congruence précédente est vérifiée pour tous les corps quadratiques de discriminant premier avec n ne suffit pas. Il faut s'assurer pour tous les corps quadratiques de discriminant non divisé par n . Même si ces notions sont les mêmes lorsque n est effectivement premier, cette condition est beaucoup plus forte ! Everett W. Howe a ainsi exhibé en 2000 un entier h qui est de Carmichael non seulement dans \mathbb{Q} , mais aussi dans tout corps quadratique de discriminant premier avec h . Il est donné par

$$h = 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 43 \cdot 89 \cdot 97 \cdot 167 \cdot 331.$$

Un tel entier est appelé *entier de Carmichael rigide d'ordre 2* (2 étant le degré d'un corps quadratique sur \mathbb{Q}). Plus généralement, l'auteur prouve même le résultat suivant.

Théorème 2.3 (2.7 dans l'article). *Soient n un entier composé sans facteur carré et $d > 1$ un entier. Si pour tout diviseur p de n et tout entier $1 \leq i \leq d$ la division*

$$p^i - 1 \mid n^d - 1$$

est vérifiée, alors n est de Carmichael dans tout corps de nombres de degré d de discriminant premier avec n .

Remarque 2.4. Ce résultat est en réalité une équivalence.

Définition 2.5. Un entier n vérifiant les hypothèses du théorème 2.3 est dit *rigide d'ordre d* .

À la lumière de ces troublants résultats, si l'on veut pouvoir trouver un test de primalité *alla* Rabin-Miller comme évoqué dans la sous-section précédente, il faudra modifier l'algorithme (2) en la version suivante.

Entrées : I (intervalle d'entiers d sans facteurs carrés), b (borne coordonnées α)
pour chaque $d \in \mathbb{N}$ *sans facteurs carrés dans I* **faire**
 $K \leftarrow \mathbb{Q}(\sqrt{d})$
 $\theta \leftarrow$ un générateur de \mathcal{O}_K
 si $n \nmid \text{Disc}(K)$ *sont premiers entre eux* **alors**
 pour chaque $\alpha = x + y\theta$, $x, y \in \llbracket 1, b \rrbracket$ **faire**
 si $\alpha^{n^2} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$ **alors**
 retourner n *est composé*
 fin du programme
 fin
 fin
fin
retourner n *a une certitude morale d'être premier*

Il y a de nouveau un travail substantiel à faire pour s'assurer de la viabilité de cette direction. Enchaînons désormais avec deux résultats nous renseignant beaucoup sur la question 0.4.

2.2 Idéaux de Carmichael et extensions

Dans toute cette sous-section, nous nous donnons

$$\mathbb{Q} \subset K \subset L$$

une tour de corps de nombres et

- $I \subset \mathcal{O}_K$ un idéal de Carmichael de K ;
- $J \subset \mathcal{O}_L$ un idéal de Carmichael de L .

Question 2.6. L'idéal étendu $I\mathcal{O}_L$ est-il de Carmichael dans L et l'idéal restreint $J \cap \mathcal{O}_K$ est-il de Carmichael dans K ?

Nous avons déjà montré la première partie de la question sans la sous-section précédente ! En prenant $K = \mathbb{Q}$ et un corps quadratique pour L , nous avons établi que pour tout entier n de Carmichael de la liste \mathfrak{C} , il existait plusieurs corps quadratiques dans lesquels n n'est pas de Carmichael.

Proposition 2.7. *Il existe des tours de corps de nombres $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ et des idéaux de Carmichael I de K pour lesquels l'idéal étendu $I\mathcal{O}_L$ qui ne sont pas de Carmichael dans L .*

Intéressons nous à la deuxième partie de la question.

Proposition 2.8. *Il existe des tours de corps de nombres $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ et des idéaux de Carmichael J de L pour lesquels l'idéal restreint $J \cap \mathcal{O}_K$ n'est pas de Carmichael dans K .*

Avant de se lancer dans cette étude, il convient d'aller explorer le royaume des corps cyclotomiques, ce qui s'avérera porteur d'espoir pour l'élaboration d'un test de primalité.

Il n'aura pas fallu aller chercher bien loin pour trouver des exemples de tels corps et idéaux. Prendre $K = \mathbb{Q}$ et un corps quadratique pour L aura suffi. Si l'on dispose d'un idéal de Carmichael dans un corps de nombres donné et d'une extension finie de ce corps de nombres, il s'avère difficile de déterminer si l'idéal reste de Carmichael dans le grand corps de nombres.

3 Corps cyclotomiques

3.1 Horizon

L'étude des idéaux de Carmichael dans les corps cyclotomiques est porteuse d'espoir et fournit de beaux résultats susceptibles d'être à la base de tests de primalité, notamment le théorème 3.6. Commençons par un résultat théorique.

Théorème 3.1 (3.1 dans l'article). *Pour tout entier naturel n composé, il existe une infinité de corps de nombres abéliens K de discriminant premier avec n dans lesquels n n'est pas de Carmichael.*

Un nombre de Carmichael étant composé, il vérifie les hypothèses du théorème. Cela fournit une nouvelle réciproque au petit théorème de Fermat, plus contraignante que la précédente.

Théorème 3.2 (deuxième réciproque). *Soit n un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps de nombres abélien K de discriminant premier avec n et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n\mathcal{O}_K)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Le résultat le plus à même d'aboutir à un test de primalité est le théorème suivant.

Théorème 3.3 (3.6 dans l'article). *Soit n un entier composé ayant au moins trois facteurs premiers distincts. Alors il existe une infinité de corps cyclotomiques K de la forme $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, tels que $\text{Disc}(K)$ est premier avec n et n n'est pas de Carmichael dans K .*

Un nombre de Carmichael ayant toujours au moins trois diviseurs premiers distincts, il est aisé d'aboutir à ce corollaire.

Corollaire 3.4 (3.7 dans l'article). *Soit n un entier composé. Il existe au moins un corps cyclotomique de la forme $\mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, de discriminant premier avec n dans lequel n n'est pas de Carmichael.*

Ce corollaire a bien entendu droit à sa réciproque du théorème de Fermat.

Théorème 3.5 (troisième réciproque). *Soit n un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps cyclotomique K de la forme $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n\mathcal{O}_K)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

3.2 Pratique

Armé du corollaire 3.4, l'auteur a pu implémenter un algorithme SageMath apportant dans certains cas une réponse à la question centrale de l'article (0.4). Ici, nous nous donnons des nombres de Carmichael n et cherchons des corps cyclotomiques K de la forme $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, dans lesquels n n'est pas de Carmichael. Nous testons les entiers de Carmichael de la liste \mathfrak{C} **ajouter référence** avec l'algorithme suivant.

```

Entrées : borne_q
pour chaque  $n$  dans liste_entiers_Carmichael faire
  pour chaque  $q$  nombre premier dans  $\llbracket 3, \text{borne\_q} \rrbracket$  faire
     $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$  ;
    si  $\text{pgcd}(q, n) = 1$  alors
      si  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $K$  alors
        exporter le couple  $(n, q)$  dans un fichier texte ;
      fin
    fin
  fin
fin

```

Remarque 3.6. Pour tester si un nombre est de Carmichael dans un corps de nombres de donné, nous implémentons le critère de Korselt dans une fonction dédiée. Pour plus de détails sur l'implémentation de ces algorithmes, nous invitons le lecteur à se référer à l'annexe A.

Pour chacun des nombres n de la liste \mathfrak{C} , cet algorithme a pu exhiber de nombreux corps cyclotomiques dans lesquels n n'est pas de Carmichael, prouvant que n est composé ! Par exemple,

— 561 n'est pas de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\zeta_5)$;

- 1729 n'est pas de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$;
- 512461 n'est pas de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\zeta_{83})$.

Nombre d'autres résultats sont disponibles sur la page GitHub de l'auteur : https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Scripts/Results_Corollary_3-7.txt.

Cet algorithme permet aussi de prouver que l'entier de Howe est composé ! Notons h cet entier. Mentionné après le théorème 2.7 de l'article, h vaut

$$h = 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 43 \cdot 89 \cdot 97 \cdot 167 \cdot 331$$

et est de Carmichael non seulement dans \mathbb{Q} , mais aussi dans tout corps quadratique dont le discriminant est premier avec h (on dit que h est un nombre de Carmichael *rigide d'ordre 2*). Notre algorithme exhibe toutefois de nombreux corps cyclotomiques dans lesquels h n'est pas de Carmichael, comme $\mathbb{Q}(\zeta_{199})$. La liste complète des résultats trouvés est cette fois disponible à https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Scripts/Results_Howe_cyclotomic.txt.

3.3 Technique

A Produire des contre-exemples

Question : soient $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ une tour de corps de nombres et $n \in \mathbb{Z}$ un entier, si n est de Carmichael dans \mathcal{O}_L , l'est-il dans \mathcal{O}_K ? Nous affirmons que cette assertion est fausse en exhibant un contre exemple à l'aide du critère de Korselt généralisé ([1], théorème 2.2). Ce critère impose une condition sur les facteurs de $n\mathcal{O}_K$ ($n\mathcal{O}_K$ doit être sans facteurs carrés) et une condition sur les normes des diviseurs premiers de $n\mathcal{O}_K$ ($N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) - 1$ doit diviser $N_{K/\mathbb{Q}}(n\mathcal{O}_K) - 1$ pour tout idéal premier de \mathcal{O}_L divisant $n\mathcal{O}_K$). L'enjeu est de comprendre si ces propriétés vraies dans \mathcal{O}_L sont transmises à $n\mathcal{O}_K$.

Remarque 1.1. Si n est premier, il peut très bien être de Carmichael dans un anneau d'entiers, mais ne le sera jamais dans l'anneau \mathbb{Z} , car un nombre de Carmichael est composé. Nous pouvons donc supposer n composé.

Se convainquant rapidement que les hypothèses demandées sont trop fortes pour être transmises, nous décidons d'écrire un algorithme naïf pour chercher ledit contre-exemple dans des corps quadratiques. L'idée est simple : passer en revue une liste d'entiers d sans facteur carré qui engendrent ces corps et pour chaque tel d , tester parmi une liste arbitraire d'entiers naturels, lesquels engendrent un idéal de Carmichael sans être un nombre de Carmichael.

Il est facile avec un outil de calcul formel de déterminer si un entier n est de Carmichael dans un corps quadratique $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d étant sans facteurs carrés. Posons $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ et $I = \mathcal{O}_K$. Le logiciel SageMath⁵ est capable de donner la décomposition de I en produit d'idéaux premiers de \mathcal{O}_K et calculer des normes d'idéaux. Pour tester si I est de Carmichael, on demande à SageMath sa décomposition, on regarde s'il est sans facteurs carrés et si c'est le cas on teste si $N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) - 1$ divise $N_{K/\mathbb{Q}}(I) - 1$ pour tout idéal premier \mathfrak{p} de \mathcal{O}_K divisant I . Comme l'extension considérée est quadratique, I a au plus deux facteurs premiers. La norme $N_{K/\mathbb{Q}}(I)$ est quant à elle donnée par n^2 .

Il reste à déterminer si n est un entier de Carmichael. Comme nous n'allons pas chercher bien loin⁶ — plutôt que d'effectuer des calculs coûteux et inutiles avec le critère de Korselt — il est préférable de regarder si n est dans la (maigre) liste des entiers de Carmichael inférieurs à 10000 :

$$\{561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911\}.$$

Pour l'implémentation, nous écrivons séparément une fonction testant si I est de Carmichael et l'invoquons pour tout couple (d, n) . L'algorithme est donc le suivant ; son

5. Voir <https://www.sagemath.org> et plus particulièrement http://doc.sagemath.org/html/en/reference/number_fields/sage/rings/number_field/number_field.html.

6. Nous nous sommes limités à $d \in \llbracket -100, 100 \rrbracket$ et $n \in \llbracket 2, 10000 \rrbracket$.

implémentation est disponible sur le compte GitHub de l'auteur (<https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Script/Script.sage>).

```

Entrées : a, b, c
pour chaque  $d \in \llbracket a, b \rrbracket$  et  $d$  est sans facteur carré faire
     $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$  ;
    pour chaque  $n \in \llbracket 2, c \rrbracket$  faire
        si  $n$  n'est pas de Carmichael et  $n\mathcal{O}_K$  est un idéal de Carmichael alors
            exporter  $(d, n)$  dans un fichier texte ;
        fin
    fin
fin

```

Nous avons pu exhiber de nombreux contre-exemples, comme le couple

$$(d, n) = (11, 35).$$

L'entier 35 n'est pas de Carmichael, mais il engendre un idéal de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\sqrt{11})$.
Le couple

$$(d, n) = (95, 8029)$$

est un autre contre-exemple, avec la particularité que $8029 = 7 \cdot 31 \cdot 37$ est le produit de trois nombres premiers (on rappelle qu'un nombre de Carmichael a au moins trois facteurs premiers). De même, 8029 n'est pas un entier de Carmichael, mais il engendre un idéal de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\sqrt{95})$.

Références

- [1] G. ANDER SEELE. « Carmichael numbers in number rings ». In : *Journal of Number Theory* 128 (2008), p. 910-917. URL : <https://core.ac.uk/download/pdf/82709152.pdf>.
- [2] Michel DEMAZURE. *Cours d'algèbre*. 2^e éd. Cassini, 2008.
- [3] Alain KRAUS. *Corps locaux et applications. Cours accéléré de DEA, Université Pierre et Marie Curie*. Sept. 2000.
- [4] Pierre SAMUEL. *Théorie algébrique des nombres*. 2^e éd. Hermann Paris, oct. 1971.

Todo

- ajouter des liens vers les fonctions implémentées depuis les algorithmes.
- ajouter des titres aux algorithmes
- label les énoncés de l'introduction avec des lettres et non des 0.x
- numéro de page de titre