

Antoine Hugounet

Idéaux de Carmichael et primalité

travail encadré de recherche
encadré par Alain Kraus (IMJ-PRG)
de janvier à juin 2020

Sorbonne Université



Introduction	2
1 Délices de la théorie	4
2 Corps quadratiques	7
2.1 Vers le test de Fermat	7
2.2 Un pas en arrière	9
3 Corps cyclotomiques	10
3.1 Théorie	10
3.2 Simulation	12
3.2.1 Test de Fermat	12
3.2.2 Critère de Korselt	13
4 Bilan des simulations	18
Conclusion	19
A Produire des contre-exemples	20

Introduction

Ce mémoire s'applique à étudier les idéaux de Carmichael dans les corps de nombres et évaluer la viabilité de cette jeune théorie pour fournir un test de primalité. Le point de départ est l'article de G.A. Steele *Carmichael numbers in number rings* [1]. Commençons par quelques énoncés.

Le test de primalité non naïf le plus simple est le *test de primalité de Fermat*. Étant donné un entier n dont on veut tester la primalité, ce dernier affirme que s'il existe un entier a vérifiant $a^n \not\equiv a \pmod{n}$, alors n est composé. Il existe cependant des entiers n **composés** vérifiant

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

pour tout entier a . On les appelle *entiers de Carmichael* et le test de Fermat est incapable de prouver leur composition. Pire encore, il existe une infinité de tels entiers. On peut les caractériser ainsi.

Proposition 0.1. *Soit n un entier. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (a) *n est un entier de Carmichael ;*
- (b) *n est composé, sans facteur carré et pour tout nombre premier p divisant n , on a*

$$p - 1 \mid n - 1 ;$$

- (c) *on a*

$$\lambda(n) \mid n - 1,$$

la fonction λ étant l'indicatrice de Carmichael.

L'assertion (b) de la proposition est appelée *critère de Korselt* et est l'outil théorique le plus couramment utilisé pour démontrer qu'un entier donné est de Carmichael. Le lecteur désireux d'une preuve de cette proposition pourra se référer au *cours d'algèbre* de M. Demazure [2] §3.3, p. 89. Dans l'article susnommé [1], la notion d'entier de Carmichael est étendue à la notion d'*idéal de Carmichael* dans l'anneau d'entiers d'un corps de nombres.

Définition 0.2. Soient K un corps de nombres et I un idéal de \mathcal{O}_K . On dit que I est un idéal de Carmichael si pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, la congruence

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I} \tag{1}$$

est vérifiée.

Remarque 0.3. Un entier de Carmichael peut donc être vu comme un idéal de Carmichael du corps de nombres \mathbb{Q} .

Cette définition est le point de départ d'un formalisme fructueux. Ce dernier donne naissance à une réciproque au petit théorème de Fermat ?? et à plusieurs tests de primalité théoriques. L'auteur de l'article, après quelques énoncés généraux, s'intéresse spécifiquement aux corps quadratiques et aux corps cyclotomiques ; nous suivrons ces traces. Tout en assurant une base solide à sa théorie, l'auteur soulève de nombreuses questions, notamment la question fondamentale suivante.

Question 0.4. Soient n un entier de Carmichael et K un corps de nombre. Dans quel mesure n est-il de Carmichael dans K ?

Nous nous proposons de répondre nous même à une partie de ces questions au fil de ce mémoire.

À noter que l'auteur du présent texte a choisi de ne pas y incorporer toutes les preuves des énoncés de l'article : ne sont données que celles des théorèmes 2.2, 2.3 et 3.6. Les démonstrations de l'auteur de l'article sont claires et nous n'aurions rien d'autre à apporter que de la paraphrase. Nous jugeons plus opportun de commenter ces dernières, ce que nous faisons dans des environnements intitulés *Un mot sur la preuve*.

Donnons dès à présent la liste des vingt-neuf premiers entiers de Carmichael. Nous l'étudierons beaucoup dans la suite de ce mémoire¹.

$$\left\{ \begin{array}{l} 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, \\ 15841, 29341, 41041, 46657, 52633, 62745, 63973, \\ 75361, 101101, 115921, 126217, 162401, 172081, \\ 188461, 252601, 278545, 294409, 314821, 334153, \\ 340561, 399001, 410041, 449065, 488881, 512461 \end{array} \right\} \quad (2)$$

1. C'est l'entrée A002997 de l'encyclopédie en ligne des séquences d'entiers : <https://oeis.org/A002997>.

1 Délices de la théorie

Fort heureusement, certaines propriétés fondamentales des *entiers* de Carmichael restent vraies dans le cadre plus général des *idéaux* de Carmichael. Tout d'abord, le petit théorème de Fermat se généralise aux corps de nombres galoisiens : dans une telle extension, un nombre premier engendre un idéal qui est soit premier, soit de Carmichael. Plus formellement, vient ceci.

Théorème 1.1 (petit théorème de Fermat généralisé, 2.3 dans l'article). *Soient p un nombre premier et K un corps de nombre galoisien tel que $p \nmid \text{Disc}(K)$. Alors, pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(p)} \equiv \alpha \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

Démonstration. Comme $p \nmid \text{Disc}(K)$, le nombre premier p n'est pas ramifié dans \mathcal{O}_K . Comme l'extension K/\mathbb{Q} est galoisienne, les indices de ramifications et degrés résiduels des idéaux de \mathcal{O}_K au dessus de \mathfrak{p} sont égaux. L'idéal $p\mathcal{O}_K$ est donc de la forme

$$p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_r.$$

Soit donc f ce degré résiduel. On a $ef = [K : \mathbb{Q}]$ et surtout que f divise $[K : \mathbb{Q}]$. Ainsi, pour tout indice $1 \leq i \leq r$, il vient

$$N(\mathfrak{p}_i) - 1 = p^f - 1 \mid p^{[K:\mathbb{Q}]} - 1 = N(p\mathcal{O}_K) - 1.$$

L'idéal \mathcal{O}_K vérifie donc le critère de Korselt généralisé 1.4. Il est donc soit premier, soit de Carmichael. \square

Fait tout à fait remarquable, l'auteur de l'article fournit une réciproque au petit théorème de Fermat dans ce nouveau cadre des idéaux de Carmichael.

Théorème 1.2 (réciproque du petit théorème de Fermat généralisé, 2.3 dans l'article). *Soit $n > 2$ un entier composé. Alors il existe un corps quadratique K vérifiant $n \nmid \text{Disc}(K)$ et un entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$ tels que*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Un mot sur la preuve. À l'instar de beaucoup d'autres résultats de l'article, la preuve de cet énoncé jouit à la fois d'une complexité technique raisonnable et d'une grande ingéniosité. Connaissant un diviseur p premier de n , l'auteur construit un corps quadratique $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}p}\right)$ dans lequel n n'est pas de Carmichael. Ce dernier point se démontre avec des techniques de base de la ramification.

Nous pouvons de plus mettre à bout ces deux résultats pour fournir cette délicieuse équivalence.

Théorème 1.3 (petit théorème de Fermat généralisé et sa réciproque). *Soit $n > 2$ un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps quadratique K vérifiant $n \nmid \text{Disc}(K)$ et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Au delà de sa force théorique, cette énoncé semble porter une valeur historique majeure. Le test de primalité de Fermat était le seul test de primalité à ne pas disposer d'une réciproque (pour le test d'Euler par exemple, c'est une équivalence). Cette absence de réciproque semblait bien être le prix à payer pour sa simplicité et son efficacité. Il aura certes fallu aller chercher la réciproque dans les corps de nombres, mais l'énoncé prouve que les corps quadratiques. Ces objets ne sont d'ailleurs pas si loin de l'arithmétique classique : Gauss les étudiait déjà.

Un autre résultat d'importance (démontré avant le petit théorème de Fermat généralisé dans l'article) est la généralisation du critère de Korselt 0.1. C'est ce résultat que l'on utilise en premier lieu pour déterminer si un entier est de Carmichael.

Théorème 1.4 (critère de Korselt généralisé, 2.2 dans l'article). *Soient K un corps de nombres et I un idéal de \mathcal{O}_K . On prend garde à supposer que I est composé. Alors I est de Carmichael si, et seulement si, I est sans facteurs carrés et pour tout idéal premier \mathfrak{P} divisant I , on a*

$$N(\mathfrak{P}) - 1 \mid N(I) - 1.$$

Démonstration. Commençons par le sens réciproque. Soit $\alpha \in \mathcal{O}_K$ un entier algébrique et \mathfrak{p} un idéal premier de \mathcal{O}_K divisant I . Si $\alpha \notin \mathcal{O}_K$, viennent $\alpha^{N(\mathfrak{p})-1} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}$ et donc

$$\alpha^{N(I)-1} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}},$$

car $N(\mathfrak{p}) - 1 \mid N(I) - 1$ par hypothèse. Si désormais $\alpha \in \mathfrak{p}$, la dernière congruence est toujours vérifiée. L'idéal I étant de plus sans facteurs carrés (hypothèse), il est de la forme $I = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r$, les \mathfrak{p}_i étant des idéaux premiers distincts de \mathcal{O}_K . Ces idéaux sont même maximaux (anneau de Dedekind) et donc comaximaux, d'où un isomorphisme d'anneaux

$$\mathcal{O}_K / (\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r) \simeq \mathcal{O}_K / \mathfrak{p}_1 \times \cdots \times \mathcal{O}_K / \mathfrak{p}_r$$

et la congruence

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I}.$$

Démontrons cette fois le sens direct. La preuve se fait en deux temps, on montre les relations de divisibilité puis que I est sans facteur carré. Écrivons $I = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$, les

\mathfrak{p}_i étant des idéaux premiers de \mathcal{O}_K distincts. Pour tout indice $1 \leq i \leq r$ donnons nous $\alpha_i \in \mathcal{O}_K$ un élément dont la classe modulo \mathfrak{p}_i engendre le groupe quotient $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i)^\times$. Un tel élément existe car $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$ est un corps fini et que le groupe des inversibles d'un corps fini est cyclique. En particulier, α_i n'est *pas* dans \mathfrak{p}_i . On a alors

$$\alpha_i^{N(I)-1} \equiv \alpha_i \pmod{\mathfrak{p}_i}$$

(comme dans le paragraphe précédent) puis que l'ordre de α_i modulo \mathfrak{p}_i divise $N(I) - 1$ (théorème de Lagrange). Cet ordre étant $N(\mathfrak{p}_i) - 1$, on en déduit la division désirée.

Démontrons désormais que I est sans facteurs carrés. Supposons qu'il existe un idéal premier \mathfrak{p} de \mathcal{O}_K tel que $p^2 \mid \mathcal{O}_K$ et posons

$$H = (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}^2)^\times.$$

On a

$$|H| = N(\mathfrak{p})(N(\mathfrak{p}) - 1).$$

Soit $p \in \mathbb{Z}$ l'unique nombre premier tel que $p\mathbb{Z} = \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$. L'entier $N(\mathfrak{p})$ est une puissance de p , d'où $p \mid N(\mathfrak{p})$ et

$$p \mid |H|.$$

Le théorème de Cauchy abélien assure alors qu'il existe un élément $\alpha \in H$ d'ordre p . Comme I est de Carmichael par hypothèse et que $\alpha \notin \mathfrak{p}^2$, on a $\alpha^{N(I)-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ puis $\alpha^{N(I)-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ et

$$p \mid N(I) - 1.$$

Comme $p \mid N(I)$, cela constitue une contradiction. L'idéal I est donc sans facteur carré. \square

Remarque 1.5. Le critère de Korselt que nous connaissons dans le cadre de l'arithmétique se déduit immédiatement du critère de Korselt généralisé en prenant $K = \mathbb{Q}$.

Remarque 1.6. Il faut ici se montrer vigilant avec la nomenclature. Un idéal I est de Carmichael dans un corps de nombres K si I est un idéal **composé** qui *en plus de cela*, vérifie l'identité 1 pour tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$.

Si l'on a un corps de nombres L et un idéal J de \mathcal{O}_K , montrer que $N(\mathfrak{P}) - 1 \mid N(J) - 1$ pour tout idéal premier \mathfrak{P} de \mathcal{O}_L divisant J ne suffit pas. La preuve du critère de Korselt généralisé 1.4 nous enseigne que si J est premier, J vérifie également cette identité. Il faut donc indépendamment montrer que J est composé si l'on veut montrer que J est un idéal de Carmichael. Là est le cœur du problème. L'auteur de l'article fait lui-même une petite erreur en oubliant cette hypothèse dans l'énoncé du théorème 2.7 : il doit y supposer n composé.

Avant de poursuivre, donnons un lemme qui permettra d'alléger les énoncés de l'article.

Lemme 1.7. *Soient n un entier et K un corps de nombres. Si n est de Carmichael dans K , alors n et $\text{Disc}(K)$ sont premiers entre eux.*

Démonstration. Si n et $\text{Disc}(K)$ ne sont pas premiers entre eux, n a un facteur premier qui se ramifie dans \mathcal{O}_K . L'idéal $n\mathcal{O}_K$ a donc un facteur carré, ce qui l'empêche d'être un idéal de Carmichael d'après le critère de Korselt généralisé 1.4. \square

Ces résultats fournissent un début de théorie confortable, qui nous laisse envisager l'avenir avec espoir. Nous pouvons dès à présent nous confronter à une étude plus spécifique, celle des corps quadratiques.

2 Corps quadratiques

2.1 Vers le test de Fermat

Entrons dès à présent dans le vif du sujet. L'un de nos objectifs principaux de répondre à la question 0.4. Le théorème 2.5 de l'article y apporte de premiers éléments de réponse.

Théorème 2.1 (2.5 dans l'article). *Soit n un entier impair sans facteurs carrés. S'il existe un diviseur premier p de n tel que*

$$p^2 - 1 \nmid n^2 - 1,$$

alors il existe une infinité de corps quadratiques K dans lesquels n n'est pas de Carmichael.

Un mot sur la preuve. On présage dès l'énoncé la nature de la preuve : c'est le critère de Korselt généralisé 1.4. On commence par s'assurer que n est sans facteurs carrés de sorte de contrôler la décomposition de $n\mathcal{O}_K$ dans un corps quadratique K donné. Du reste, comme la norme d'un idéal premier au dessus de $n\mathcal{O}_K$ est un nombre premier p divisant n , on sent bien que la condition de non-divisibilité va empêcher être n d'être de Carmichael dans les corps quadratiques² bien choisis. La partie réellement inventive de la preuve consiste à trouver les bons corps quadratiques. Cette partie est hautement non triviale et est basée sur la connaissance d'un nombre premier p comme dans les hypothèses du théorème et sur une savante utilisation du théorème chinois. Les techniques de base de la ramification permettent encore une fois de s'assurer que les corps construits vérifient bien ce qu'on leur demande de vérifier.

2. Les carrés ne sont ni plus ni moins que les normes de p et de n dans toute extension quadratique.

Bien que cet énoncé ne semble pas optimal en pratique³, certains nombres de Carmichael vérifient ces hypothèses. On vérifie numériquement que c'est même le cas de tous les nombres de Carmichael de la liste 2 ! On peut par exemple prendre l'entier de Carmichael 512461 de son facteur premier 271 : il existe ainsi une infinité de corps quadratiques dans lequel 512461 n'est pas de Carmichael.

Dans l'exemple 2.6 de l'article, l'auteur ouvre une voix intéressante : celle du test de Fermat dans les corps quadratiques. Il montre que $n = 561$ est composé en exhibant le corps quadratique $K = \mathbb{Q}(\sqrt{13})$ puis l'entier algébrique $\alpha = 2 + 1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right) \in \mathcal{O}_K$. Comme

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$$

et que n et 13 sont premiers entre eux, cela prouve la composition de n , d'après le théorème 1.1. Bien qu'il ne donne pas les détails, cela laisse penser que plutôt que d'utiliser le critère de Korselt⁴, ce dernier a directement cherché un entier algébrique α ne vérifiant pas la congruence 1. Cet algorithme est appelé *test de Fermat dans les corps quadratiques* et est un critère de composition. Étant donné un entier n dont on veut prouver la composition, une version simple du test est la suivante.

Algorithme 1 : Test de Fermat dans les corps quadratiques

Entrées : S_d (ensemble générateurs des $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, S_α (ensemble coordonnées α)

```

1 pour chaque  $d \in S_d$  faire
2   si  $d$  et  $n$  sont premiers entre eux alors
3      $K \leftarrow \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 
4      $\theta \leftarrow$  un générateur de  $\mathcal{O}_K$ 
5     pour chaque  $\alpha = x + y\theta$ ,  $x, y \in S_\alpha$  faire
6       si  $\alpha^{n^2} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$  alors
7         retourner  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$  et est composé
8         arrêter le programme
```

L'auteur du présent texte a donc implémenté⁵ cet algorithme et l'a testé sur tous les

3. Il n'y a à ce jour (3 juin 2020) pas d'algorithme efficace pour déterminer si un entier est sans facteurs carrés. Les algorithmes passent souvent par la décomposition en produit de facteurs premiers, ce qui ne nous arrange pas. **sourcer**.

4. Ce qui nécessiterait de décomposer l'idéal $561\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{13})}$.

5. **dire que détails dans annexe**

entiers de la liste 2, en choisissant ⁶ le corps quadratique

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{43}).$$

En reprenant les notations de l'algorithme 1, on se fixe

$$S_\alpha = \llbracket -3, +3 \rrbracket$$

et $\theta = \sqrt{43}$. Nous avons pu exhiber des K -témoins de Fermat pour beaucoup d'entiers de la liste : pour 561 nous trouvons $\alpha = 1 + 2\theta$, pour 2821 nous trouvons $\alpha = -3 + 2\theta$. Il y a toutefois des entiers pour lesquels nous ne trouvons aucun témoin avec ces paramètres. C'est le cas de 6601. En changeant de corps et en prenant arbitrairement $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$, nous trouvons un K -témoin de Fermat pour 6601 mais pas pour 2465. Utiliser le test de Fermat—quadratique nécessiterait donc plus de finesse que cette version naïve de l'algorithme. **rajouter temps de calcul**

Il peut enfin être tentant d'utiliser cet algorithme pour déterminer la primalité de n avec une certitude morale, dans l'esprit test de primalité de Rabin-Miller (voir [2], §3.3.7, p. 68). L'idée serait que si n vérifie la congruence $\alpha^{N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$ pour un nombre suffisamment grand de corps quadratiques $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ de discriminant premier avec n et d'entiers algébriques $\alpha \in \mathcal{O}_K$, nous aurions une certitude morale de la primalité de n . Nous allons voir dans la prochaine sous-section qu'un tel test ne peut exister.

2.2 Un pas en arrière

Nous avons évoqué la réciproque du petit théorème de Fermat (1.3). Il faut bien faire attention au fait que l'on ne peut pas remplacer l'hypothèse « $n \nmid \text{Disc}(K)$ » par l'hypothèse « n et $\text{Disc}(K)$ sont premiers entre eux »⁷ ! Le mathématicien E.W. Howe montre en effet le résultat suivant.

Théorème 2.2 (Howe, 200). *Il existe un entier h qui soit à la fois composé et de Carmichael dans tout corps quadratique de discriminant premier avec h .*

En guise de preuve, Howe exhibe un tel nombre, l'entier

$$h = 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 43 \cdot 89 \cdot 97 \cdot 167 \cdot 331 = 443372888629441. \quad (3)$$

Nous l'appellerons dans la suite *entier de Howe*. L'existence de cet entier signifie que — comme dans \mathbb{Q} — le test de Fermat ?? ne peut pas prouver qu'un entier est composé simplement parce qu'il n'a pas de témoins de Fermat. Plus généralement, l'auteur de l'article montre le théorème suivant.

6. L'entier 43 est le premier nombre premier impair qui ne soit facteur d'aucun entier de la liste 2. Le discriminant de $\mathbb{Q}(\sqrt{43})$ sera donc premier à tout tel entier, ce qui est nécessaire pour appliquer le théorème 1.1.

7. Cela peut être contre intuitif : si n est un entier et K un corps de nombres, le fait que n soit de Carmichael dans K implique que n et $\text{Disc}(K)$ sont premiers entre eux.

Théorème 2.3 (2.7 dans l'article). *Soient n un entier composé sans facteur carré et $d \geq 1$ un entier. Si pour tout diviseur p de n et tout entier $1 \leq i \leq d$ la division*

$$p^i - 1 \mid n^d - 1$$

est vérifiée, alors n est de Carmichael dans \mathbb{Q} et tout corps de nombres de degré d de discriminant premier avec n .

Définition 2.4. Un entier n vérifiant les hypothèses du théorème 2.3 pour un certain entier $d \geq 1$ est appelé *nombre de Carmichael rigide d'ordre d* .

L'entier de Howe 3 est donc un nombre de Carmichael rigide d'ordre 2. Ces troublants résultats nous enseignent que les corps quadratiques ne peuvent pas fournir un test de Fermat fiable. Forts de ce constat, nous partons étudier les corps cyclotomiques, dont l'étude s'avérera porteuse d'espoir.

3 Corps cyclotomiques

3.1 Théorie

Dans cette section, nous nous intéressons aux corps cyclotomiques de la forme $\mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant un nombre premier. Commençons par un résultat théorique.

Théorème 3.1 (3.1 dans l'article). *Pour tout entier naturel n composé, il existe une infinité de corps de nombres abéliens de discriminant premier avec n dans lesquels n n'est pas de Carmichael.*

Un mot sur la preuve. Les preuves des énoncés sur les corps cyclotomiques sont autrement plus sophistiquées que celles sur les corps quadratiques et l'auteur y utilise à volonté des résultats de théorie analytique des nombres. Ces derniers assurent de l'existence d'objets mais ne les construisent pas, à l'image des lemmes 3.3 et 3.4 de l'article. Pour ce théorème, la construction des corps se fait avec la correspondance de Galois et la vérification et la vérification qu'ils vérifient les bonnes propriétés nécessite des arguments sophistiqués de ramification (groupes de décomposition et d'inertie, Frobenius d'un élément). Nous verrons ces arguments plus en détails dans la preuve du théorème 3.6 de l'article (n°3.3 chez nous).

Un nombre de Carmichael étant composé, il vérifie les hypothèses du théorème. Cela fournit une nouvelle réciproque au petit théorème de Fermat, plus contraignante que la précédente.

Théorème 3.2 (deuxième réciproque). *Soit n un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps de nombres abélien K de discriminant premier avec n et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Le résultat le plus à même d'aboutir à un test de primalité est le crucial théorème suivant. Il nous enseigne qu'il faut aller chercher du côté des corps cyclotomiques. Nous en donnons la démonstration.

Théorème 3.3 (3.6 dans l'article). *Soit n un entier composé ayant au moins trois facteurs premiers distincts. Alors il existe une infinité de corps cyclotomiques K de la forme $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, tels que $\text{Disc}(K)$ est premier avec n et n n'est pas de Carmichael dans K .*

Démonstration. **placeholder** □

Un nombre de Carmichael ayant toujours au moins trois diviseurs premiers distincts (voir [2], Proposition 3.35, p. 90), il vérifiera toujours les hypothèses du théorème. Ce résultat est donc en théorie bien plus puissant que le théorème 2.1 (2.5 dans l'article), puisque nous avons vu que le test de primalité naïf qui en découlait ne détectait pas tous les entiers de Carmichael, comme par exemple l'entier de Howe 3. Nous avons par ailleurs le corollaire suivant, qui montre lui aussi la supériorité des corps cyclotomiques pour détecter des corps dans lesquels un entier de Carmichael n'est pas de Carmichael.

Corollaire 3.4 (3.7 dans l'article). *Soit n un entier composé. Il existe au moins un corps cyclotomique de la forme $\mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, de discriminant premier avec n dans lequel n n'est pas de Carmichael.*

Démonstration. Distinguons trois cas.

- Si n a un unique facteur premier, étant composé, il a un facteur carré et ne sera jamais de Carmichael, d'après le critère de Korselt généralisé 1.4.
- Si n a deux uniques facteurs premiers distincts, il n'est pas de Carmichael dans \mathbb{Q} , le corps cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_2)$ (voir [2], Proposition 3.35, p. 90).
- Si n a au moins trois facteurs premiers distincts, nous appliquons le théorème précédent.

□

Ce corollaire a bien entendu droit à sa réciproque du théorème de Fermat.

Théorème 3.5 (troisième réciproque). *Soit n un entier. Alors n est premier si, et seulement si, pour tout corps cyclotomique K de la forme $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, et tout entier algébrique $\alpha \in \mathcal{O}_K$, on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(n)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Remarque 3.6. Dans les deux réciproques que nous venons de donner, l'hypothèse sur le discriminants est que n et K doivent être premiers entre eux. C'est une hypothèse bien plus forte que de demander à ce que n ne divise pas le discriminant de K comme dans les corps quadratiques (1.3). Cela permet de tester beaucoup moins de corps.

Passons désormais aux simulations numérique.

3.2 Simulation

3.2.1 Test de Fermat

Revenons au théorème 3.3, duquel nous voulons tirer un critère de primalité. Étant donné un entier de Carmichael n , la version « cyclotomique » du test de Fermat serait la suivante.

Algorithme 2 : Test de Fermat dans les corps cyclotomiques	
Entrées : S_q (ensemble de nombres premiers q), S_α (ensemble coordonnées α)	
1	pour chaque $q \in S_q$ faire
2	si n et q sont premiers entre eux alors
3	$K \leftarrow \mathbb{Q}(\zeta_q)$;
4	pour chaque $\alpha = x_0 + x_1\zeta + \cdots + x_{p-1}\zeta^{p-1}$, $x_0, \dots, x_{p-1} \in S_\alpha$ faire
5	si $\alpha^{n^2} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$ alors
6	retourner n n'est pas de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ et est composé
7	arrêter le programme

L'auteur du présent texte a — comme pour les corps quadratiques — implémenté et testé cet algorithme. Force est de constater que cet algorithme s'est montré extrêmement lent et semble inutilisable. En posant $n = 561$, $K = \mathbb{Q}(\zeta_5)$ et $S_\alpha = \{-1, 0, +1\}$, l'algorithme n'a toujours pas terminé après avoir tourné pendant une heure sur l'ordinateur personnel de l'auteur. Ce n'est finalement pas si étonnant. On aura

$$N(n\mathcal{O}_K) = 561^4 = 99049307841$$

et si l'on prend par exemple l'entier algébrique de coordonnées $(1, 1, 0, 0)$

$$\alpha = 1 + \zeta,$$

l'ordinateur portable de l'auteur n'a toujours pas su calculer $\alpha^{N(n\mathcal{O}_K)}$ après trente minutes de calculs⁸. Les coordonnées ont pourtant été choisies pour être les plus petites

8. Wolfram alpha n'a pas fait mieux.

possibles, mais le coût du calcul de $\alpha^{N(n\mathcal{O}_K)}$ est prohibitif. Plus généralement, si n est un nombre dont on veut prouver la composition avec le test de Fermat cyclotomique et q un nombre premier, on a

$$N(n\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\zeta_q)}) = n^{q-1},$$

un nombre qui sort rapidement des capacités d'un ordinateur personnel standard.

3.2.2 Critère de Korselt

Comme dans la section sur les corps quadratiques, nous cherchons ici — pour tout entier n de la liste 2 — un corps cyclotomique de la forme $\mathbb{Q}(\zeta_q)$, q étant premier, dans lequel il n'est pas de Carmichael. Nous reprenons donc l'algorithme ???. Cet algorithme est en mesure de donner très rapidement, et pour *tout* élément n de la liste, plusieurs corps cyclotomiques dans lesquels n n'est pas de Carmichael, prouvant sa composition. Voici les résultats pour l'entier $n = 561$.

Fichier 561_cyclotomic.txt

```

1 561 is Carmichael in Q(zeta5): False, 561 and 5 are coprime
2 561 is Carmichael in Q(zeta7): False, 561 and 7 are coprime
3 561 is Carmichael in Q(zeta13): False, 561 and 13 are coprime
4 561 is Carmichael in Q(zeta19): False, 561 and 19 are coprime
5 561 is Carmichael in Q(zeta23): False, 561 and 23 are coprime
6 561 is Carmichael in Q(zeta29): False, 561 and 29 are coprime
7 561 is Carmichael in Q(zeta31): False, 561 and 31 are coprime
8 561 is Carmichael in Q(zeta37): False, 561 and 37 are coprime
9 561 is Carmichael in Q(zeta41): False, 561 and 41 are coprime
10 561 is Carmichael in Q(zeta43): False, 561 and 43 are coprime
11 561 is Carmichael in Q(zeta47): False, 561 and 47 are coprime
12 561 is Carmichael in Q(zeta53): False, 561 and 53 are coprime
13 561 is Carmichael in Q(zeta59): False, 561 and 59 are coprime
14 561 is Carmichael in Q(zeta61): False, 561 and 61 are coprime
15 561 is Carmichael in Q(zeta67): False, 561 and 67 are coprime
16 561 is Carmichael in Q(zeta71): False, 561 and 71 are coprime
17 561 is Carmichael in Q(zeta73): False, 561 and 73 are coprime
18 561 is Carmichael in Q(zeta79): False, 561 and 79 are coprime
19 561 is Carmichael in Q(zeta83): False, 561 and 83 are coprime
20 561 is Carmichael in Q(zeta89): False, 561 and 89 are coprime
21 561 is Carmichael in Q(zeta97): False, 561 and 97 are coprime
22 561 is Carmichael in Q(zeta101): False, 561 and 101 are coprime
23 561 is Carmichael in Q(zeta103): False, 561 and 103 are coprime
24 561 is Carmichael in Q(zeta107): False, 561 and 107 are coprime
25 561 is Carmichael in Q(zeta109): False, 561 and 109 are coprime
26 561 is Carmichael in Q(zeta113): False, 561 and 113 are coprime
27 561 is Carmichael in Q(zeta127): False, 561 and 127 are coprime
28 561 is Carmichael in Q(zeta131): False, 561 and 131 are coprime
29 561 is Carmichael in Q(zeta137): False, 561 and 137 are coprime
30 561 is Carmichael in Q(zeta139): False, 561 and 139 are coprime

```

```

31 561 is Carmichael in Q(zeta149): False, 561 and 149 are coprime
32 561 is Carmichael in Q(zeta151): False, 561 and 151 are coprime
33 561 is Carmichael in Q(zeta157): False, 561 and 157 are coprime
34 561 is Carmichael in Q(zeta163): False, 561 and 163 are coprime
35 561 is Carmichael in Q(zeta167): False, 561 and 167 are coprime
36 561 is Carmichael in Q(zeta173): False, 561 and 173 are coprime
37 561 is Carmichael in Q(zeta179): False, 561 and 179 are coprime
38 561 is Carmichael in Q(zeta181): False, 561 and 181 are coprime
39 561 is Carmichael in Q(zeta191): False, 561 and 191 are coprime
40 561 is Carmichael in Q(zeta193): False, 561 and 193 are coprime
41 561 is Carmichael in Q(zeta197): False, 561 and 197 are coprime
42 561 is Carmichael in Q(zeta199): False, 561 and 199 are coprime
43 561 is Carmichael in Q(zeta211): False, 561 and 211 are coprime
44 561 is Carmichael in Q(zeta223): False, 561 and 223 are coprime
45 561 is Carmichael in Q(zeta227): False, 561 and 227 are coprime
46 561 is Carmichael in Q(zeta229): False, 561 and 229 are coprime
47 561 is Carmichael in Q(zeta233): False, 561 and 233 are coprime
48 561 is Carmichael in Q(zeta239): False, 561 and 239 are coprime
49 561 is Carmichael in Q(zeta241): False, 561 and 241 are coprime
50 561 is Carmichael in Q(zeta251): False, 561 and 251 are coprime
51 561 is Carmichael in Q(zeta257): False, 561 and 257 are coprime
52 561 is Carmichael in Q(zeta263): False, 561 and 263 are coprime
53 561 is Carmichael in Q(zeta269): False, 561 and 269 are coprime
54 561 is Carmichael in Q(zeta271): False, 561 and 271 are coprime
55 561 is Carmichael in Q(zeta277): False, 561 and 277 are coprime
56 561 is Carmichael in Q(zeta281): False, 561 and 281 are coprime
57 561 is Carmichael in Q(zeta283): False, 561 and 283 are coprime
58 561 is Carmichael in Q(zeta293): False, 561 and 293 are coprime

```

Nous avons testé 561 dans les corps cyclotomiques $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ où q parcourt l'ensemble des nombres premiers compris entre 1 et 300. Il n'y a qu'un seul corps cyclotomique pour lequel 561 reste de Carmichael : c'est $\mathbb{Q}(\zeta_3)$! Dans tous les autres, il n'est pas de Carmichael. Le fichier présenté ici correspond au fichier `561_cyclotomic.txt`, disponible à [url](#).

Cet algorithme permet aussi de prouver que l'entier de Howe 3 est composé ! Voici le fichier avec les résultats.

```

_____ 443372888629441_cyclotomic.txt (entier de Howe) _____
1 443372888629441 is Carmichael in Q(zeta3): True, 443372888629441 and 3 are coprime
2 443372888629441 is Carmichael in Q(zeta5): False, 443372888629441 and 5 are
  ↪ coprime
3 443372888629441 is Carmichael in Q(zeta7): False, 443372888629441 and 7 are
  ↪ coprime
4 443372888629441 is Carmichael in Q(zeta11): False, 443372888629441 and 11 are
  ↪ coprime
5 443372888629441 is Carmichael in Q(zeta13): False, 443372888629441 and 13 are
  ↪ coprime

```

6 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}19)$: False, 443372888629441 and 19 are
 \hookrightarrow coprime
 7 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}23)$: False, 443372888629441 and 23 are
 \hookrightarrow coprime
 8 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}29)$: False, 443372888629441 and 29 are
 \hookrightarrow coprime
 9 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}37)$: False, 443372888629441 and 37 are
 \hookrightarrow coprime
 10 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}47)$: False, 443372888629441 and 47 are
 \hookrightarrow coprime
 11 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}53)$: False, 443372888629441 and 53 are
 \hookrightarrow coprime
 12 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}59)$: False, 443372888629441 and 59 are
 \hookrightarrow coprime
 13 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}61)$: False, 443372888629441 and 61 are
 \hookrightarrow coprime
 14 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}67)$: False, 443372888629441 and 67 are
 \hookrightarrow coprime
 15 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}71)$: False, 443372888629441 and 71 are
 \hookrightarrow coprime
 16 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}73)$: False, 443372888629441 and 73 are
 \hookrightarrow coprime
 17 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}79)$: False, 443372888629441 and 79 are
 \hookrightarrow coprime
 18 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}83)$: False, 443372888629441 and 83 are
 \hookrightarrow coprime
 19 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}101)$: False, 443372888629441 and 101 are
 \hookrightarrow coprime
 20 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}103)$: False, 443372888629441 and 103 are
 \hookrightarrow coprime
 21 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}107)$: False, 443372888629441 and 107 are
 \hookrightarrow coprime
 22 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}109)$: False, 443372888629441 and 109 are
 \hookrightarrow coprime
 23 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}113)$: False, 443372888629441 and 113 are
 \hookrightarrow coprime
 24 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}127)$: False, 443372888629441 and 127 are
 \hookrightarrow coprime
 25 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}131)$: False, 443372888629441 and 131 are
 \hookrightarrow coprime
 26 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}137)$: False, 443372888629441 and 137 are
 \hookrightarrow coprime
 27 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}139)$: False, 443372888629441 and 139 are
 \hookrightarrow coprime
 28 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}149)$: False, 443372888629441 and 149 are
 \hookrightarrow coprime
 29 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}151)$: False, 443372888629441 and 151 are
 \hookrightarrow coprime

30 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}157)$: False, 443372888629441 and 157 are
 \hookrightarrow coprime

31 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}163)$: False, 443372888629441 and 163 are
 \hookrightarrow coprime

32 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}173)$: False, 443372888629441 and 173 are
 \hookrightarrow coprime

33 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}179)$: False, 443372888629441 and 179 are
 \hookrightarrow coprime

34 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}181)$: False, 443372888629441 and 181 are
 \hookrightarrow coprime

35 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}191)$: False, 443372888629441 and 191 are
 \hookrightarrow coprime

36 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}193)$: False, 443372888629441 and 193 are
 \hookrightarrow coprime

37 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}197)$: False, 443372888629441 and 197 are
 \hookrightarrow coprime

38 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}199)$: False, 443372888629441 and 199 are
 \hookrightarrow coprime

39 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}211)$: False, 443372888629441 and 211 are
 \hookrightarrow coprime

40 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}223)$: False, 443372888629441 and 223 are
 \hookrightarrow coprime

41 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}227)$: False, 443372888629441 and 227 are
 \hookrightarrow coprime

42 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}229)$: False, 443372888629441 and 229 are
 \hookrightarrow coprime

43 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}233)$: False, 443372888629441 and 233 are
 \hookrightarrow coprime

44 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}239)$: False, 443372888629441 and 239 are
 \hookrightarrow coprime

45 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}241)$: False, 443372888629441 and 241 are
 \hookrightarrow coprime

46 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}251)$: False, 443372888629441 and 251 are
 \hookrightarrow coprime

47 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}257)$: False, 443372888629441 and 257 are
 \hookrightarrow coprime

48 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}263)$: False, 443372888629441 and 263 are
 \hookrightarrow coprime

49 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}269)$: False, 443372888629441 and 269 are
 \hookrightarrow coprime

50 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}271)$: False, 443372888629441 and 271 are
 \hookrightarrow coprime

51 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}277)$: False, 443372888629441 and 277 are
 \hookrightarrow coprime

52 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}281)$: False, 443372888629441 and 281 are
 \hookrightarrow coprime

53 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}283)$: False, 443372888629441 and 283 are
 \hookrightarrow coprime

54 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}293)$: False, 443372888629441 and 293 are
 \hookrightarrow coprime

55 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}307)$: False, 443372888629441 and 307 are
 \hookrightarrow coprime

56 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}311)$: False, 443372888629441 and 311 are
 \hookrightarrow coprime

57 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}313)$: False, 443372888629441 and 313 are
 \hookrightarrow coprime

58 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}317)$: False, 443372888629441 and 317 are
 \hookrightarrow coprime

59 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}337)$: False, 443372888629441 and 337 are
 \hookrightarrow coprime

60 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}347)$: False, 443372888629441 and 347 are
 \hookrightarrow coprime

61 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}349)$: False, 443372888629441 and 349 are
 \hookrightarrow coprime

62 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}353)$: False, 443372888629441 and 353 are
 \hookrightarrow coprime

63 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}359)$: False, 443372888629441 and 359 are
 \hookrightarrow coprime

64 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}367)$: False, 443372888629441 and 367 are
 \hookrightarrow coprime

65 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}373)$: False, 443372888629441 and 373 are
 \hookrightarrow coprime

66 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}379)$: False, 443372888629441 and 379 are
 \hookrightarrow coprime

67 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}383)$: False, 443372888629441 and 383 are
 \hookrightarrow coprime

68 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}389)$: False, 443372888629441 and 389 are
 \hookrightarrow coprime

69 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}397)$: False, 443372888629441 and 397 are
 \hookrightarrow coprime

70 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}401)$: False, 443372888629441 and 401 are
 \hookrightarrow coprime

71 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}409)$: False, 443372888629441 and 409 are
 \hookrightarrow coprime

72 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}419)$: False, 443372888629441 and 419 are
 \hookrightarrow coprime

73 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}421)$: False, 443372888629441 and 421 are
 \hookrightarrow coprime

74 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}431)$: False, 443372888629441 and 431 are
 \hookrightarrow coprime

75 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}433)$: False, 443372888629441 and 433 are
 \hookrightarrow coprime

76 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}439)$: False, 443372888629441 and 439 are
 \hookrightarrow coprime

77 443372888629441 is Carmichael in $Q(\text{zeta}443)$: False, 443372888629441 and 443 are
 \hookrightarrow coprime

78	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{449})$: False, 443372888629441 and 449 are ↪ coprime
79	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{457})$: False, 443372888629441 and 457 are ↪ coprime
80	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{461})$: False, 443372888629441 and 461 are ↪ coprime
81	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{463})$: False, 443372888629441 and 463 are ↪ coprime
82	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{467})$: False, 443372888629441 and 467 are ↪ coprime
83	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{479})$: False, 443372888629441 and 479 are ↪ coprime
84	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{487})$: False, 443372888629441 and 487 are ↪ coprime
85	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{491})$: False, 443372888629441 and 491 are ↪ coprime
86	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{499})$: False, 443372888629441 and 499 are ↪ coprime
87	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{503})$: False, 443372888629441 and 503 are ↪ coprime
88	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{509})$: False, 443372888629441 and 509 are ↪ coprime
89	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{521})$: False, 443372888629441 and 521 are ↪ coprime
90	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{523})$: False, 443372888629441 and 523 are ↪ coprime
91	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{541})$: False, 443372888629441 and 541 are ↪ coprime
92	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{547})$: False, 443372888629441 and 547 are ↪ coprime
93	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{557})$: False, 443372888629441 and 557 are ↪ coprime
94	443372888629441 is Carmichael in $\mathbb{Q}(\zeta_{563})$: False, 443372888629441 and 563 are ↪ coprime

Nous avons cette fois testé l'entier de Howe dans les corps cyclotomiques $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ où q parcourt l'ensemble des nombres premiers compris entre 1 et 600. Comme pour 561, $\mathbb{Q}(\zeta_3)$ est l'unique corps testé dans lequel il reste de Carmichael!

4 Bilan des simulations

Dans toute cette sous-section, nous nous donnons

$$\mathbb{Q} \subset K \subset L$$

une tour de corps de nombres et

- $I \subset \mathcal{O}_K$ un idéal de Carmichael de K ;
- $J \subset \mathcal{O}_L$ un idéal de Carmichael de L .

Question 4.1. L'idéal étendu $I\mathcal{O}_L$ est-il de Carmichael dans L et l'idéal restreint $J \cap \mathcal{O}_K$ est-il de Carmichael dans K ?

Nous avons déjà montré la première partie de la question sans la sous-section précédente ! En prenant $K = \mathbb{Q}$ et un corps quadratique pour L , nous avons établi que pour tout entier n de Carmichael de la liste 2, il existait plusieurs corps quadratiques dans lesquels n n'est pas de Carmichael.

Proposition 4.2. *Il existe des tours de corps de nombres $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ et des idéaux de Carmichael I de K pour lesquels l'idéal étendu $I\mathcal{O}_L$ qui ne sont pas de Carmichael dans L .*

Intéressons nous à la deuxième partie de la question.

Proposition 4.3. *Il existe des tours de corps de nombres $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ et des idéaux de Carmichael J de L pour lesquels l'idéal restreint $J \cap \mathcal{O}_K$ n'est pas de Carmichael dans K .*

Avant de se lancer dans cette étude, il convient d'aller explorer le royaume des corps cyclotomiques, ce qui s'avérera porteur d'espoir pour l'élaboration d'un test de primalité.

Il n'aura pas fallu aller chercher bien loin pour trouver des exemples de tels corps et idéaux. Prendre $K = \mathbb{Q}$ et un corps quadratique pour L aura suffi. Si l'on dispose d'un idéal de Carmichael dans un corps de nombres donné et d'une extension finie de ce corps de nombres, il s'avère difficile de déterminer si l'idéal reste de Carmichael dans le grand corps de nombres.

Conclusion

A Produire des contre-exemples

Question : soient $\mathbb{Q} \subset K \subset L$ une tour de corps de nombres et $n \in \mathbb{Z}$ un entier, si n est de Carmichael dans \mathcal{O}_L , l'est-il dans \mathcal{O}_K ? Nous affirmons que cette assertion est fausse en exhibant un contre exemple à l'aide du critère de Korselt généralisé ([1], théorème 2.2). Ce critère impose une condition sur les facteurs de $n\mathcal{O}_K$ ($n\mathcal{O}_K$ doit être sans facteurs carrés) et une condition sur les normes des diviseurs premiers de $n\mathcal{O}_K$ ($N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) - 1$ doit diviser $N_{K/\mathbb{Q}}(n\mathcal{O}_K) - 1$ pour tout idéal premier de \mathcal{O}_L divisant $n\mathcal{O}_K$). L'enjeu est de comprendre si ces propriétés vraies dans \mathcal{O}_L sont transmises à $n\mathcal{O}_K$.

Remarque 1.1. Si n est premier, il peut très bien être de Carmichael dans un anneau d'entiers, mais ne le sera jamais dans l'anneau \mathbb{Z} , car un nombre de Carmichael est composé. Nous pouvons donc supposer n composé.

Se convainquant rapidement que les hypothèses demandées sont trop fortes pour être transmises, nous décidons d'écrire un algorithme naïf pour chercher ledit contre-exemple dans des corps quadratiques. L'idée est simple : passer en revue une liste d'entiers d sans facteur carré qui engendrent ces corps et pour chaque tel d , tester parmi une liste arbitraire d'entiers naturels, lesquels engendrent un idéal de Carmichael sans être un nombre de Carmichael.

Il est facile avec un outil de calcul formel de déterminer si un entier n est de Carmichael dans un corps quadratique $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d étant sans facteurs carrés. Posons $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ et $I = \mathcal{O}_K$. Le logiciel SageMath⁹ est capable de donner la décomposition de I en produit d'idéaux premiers de \mathcal{O}_K et calculer des normes d'idéaux. Pour tester si I est de Carmichael, on demande à SageMath sa décomposition, on regarde s'il est sans facteurs carrés et si c'est le cas on teste si $N_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}) - 1$ divise $N_{K/\mathbb{Q}}(I) - 1$ pour tout idéal premier \mathfrak{p} de \mathcal{O}_K divisant I . Comme l'extension considérée est quadratique, I a au plus deux facteurs premiers. La norme $N_{K/\mathbb{Q}}(I)$ est quant à elle donnée par n^2 .

Il reste à déterminer si n est un entier de Carmichael. Comme nous n'allons pas chercher bien loin¹⁰ — plutôt que d'effectuer des calculs coûteux et inutiles avec le critère de Korselt — il est préférable de regarder si n est dans la (maigre) liste des entiers de Carmichael inférieurs à 10000 :

$$\{561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911\}.$$

Pour l'implémentation, nous écrivons séparément une fonction testant si I est de Carmichael et l'invoquons pour tout couple (d, n) . L'algorithme est donc le suivant ; son

9. Voir <https://www.sagemath.org> et plus particulièrement http://doc.sagemath.org/html/en/reference/number_fields/sage/rings/number_field/number_field.html.

10. Nous nous sommes limités à $d \in \llbracket -100, 100 \rrbracket$ et $n \in \llbracket 2, 10000 \rrbracket$.

implémentation est disponible sur le compte GitHub de l'auteur (<https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Script/Script.sage>).

```

Entrées : a, b, c
1 pour chaque  $d \in \llbracket a, b \rrbracket$  et  $d$  est sans facteur carré faire
2    $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$  ;
3   pour chaque  $n \in \llbracket 2, c \rrbracket$  faire
4     si  $n$  n'est pas de Carmichael et  $n\mathcal{O}_K$  est un idéal de Carmichael alors
5       exporter  $(d, n)$  dans un fichier texte ;

```

Nous avons pu exhiber de nombreux contre-exemples, comme le couple

$$(d, n) = (11, 35).$$

L'entier 35 n'est pas de Carmichael, mais il engendre un idéal de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\sqrt{11})$. Le couple

$$(d, n) = (95, 8029)$$

est un autre contre-exemple, avec la particularité que $8029 = 7 \cdot 31 \cdot 37$ est le produit de trois nombres premiers (on rappelle qu'un nombre de Carmichael a au moins trois facteurs premiers). De même, 8029 n'est pas un entier de Carmichael, mais il engendre un idéal de Carmichael dans $\mathbb{Q}(\sqrt{95})$.

Références

- [1] G. ANDER SEELE. « Carmichael numbers in number rings ». In : *Journal of Number Theory* 128 (2008), p. 910-917. URL : <https://core.ac.uk/download/pdf/82709152.pdf>.
- [2] Michel DEMAZURE. *Cours d'algèbre*. 2^e éd. Cassini, 2008.
- [3] Alain KRAUS. *Corps locaux et applications. Cours accéléré de DEA, Université Pierre et Marie Curie*. Sept. 2000.
- [4] Pierre SAMUEL. *Théorie algébrique des nombres*. 2^e éd. Hermann Paris, oct. 1971.

Todo

- ajouter des titres aux algorithmes
- label les énoncés de l'introduction avec des lettres et non des 0.x
- numéro de page de titre
- refaire annexe
- dissocier composé / pas composé dans les critères de Korselt
- conclusion
- "un regard à la fois théorique et pratique"
- dire plus ce que l'on fait dans l'intro et mettre l'accent sur l'implémentation
- définir K -témoin de Fermat