

Antoine Hugounet

# Idéaux de Carmichael et test de primalité de Fermat dans les corps de nombres

Travail de recherche encadré par Alain Kraus (IMJ-PRG)  
Sorbonne Université  
de janvier à juin 2020



<b>Rappels de définitions et notations</b>	<b>2</b>
<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>1 Délices de la théorie</b>	<b>5</b>
<b>2 Corps quadratiques</b>	<b>9</b>
2.1 Théorie . . . . .	9
2.2 Expérimentations numériques . . . . .	12
<b>3 Idéaux de Carmichael et extensions de corps</b>	<b>13</b>
3.1 Deux résultats . . . . .	13
3.2 Un peu d'arithmétique . . . . .	15
<b>4 Corps cyclotomiques</b>	<b>16</b>
4.1 Théorie . . . . .	16
4.2 Expérimentations numériques . . . . .	21
<b>Conclusion</b>	<b>23</b>
<b>Remerciements</b>	<b>24</b>
<b>Bibliographie</b>	<b>24</b>

## Rappels de définitions et notations

Les prérequis pour ce texte (ainsi que pour [Ste06]) sont les bases de la théorie algébrique des nombres et quelques éléments de théorie de Galois. Pour la théorie algébrique des nombres, le lecteur pourra se référer à [Sam71, ch. II, III, V et VI] ou [Kra00, ch. II, III et IV]. Pour la théorie de Galois, le lecteur pourra se référer à [Ber18, ch. XXIII à XVII]. Rappelons à présent des notations cruciales.

**Rappel A** (Corps de nombres [Sam71, ch. II § 8]). On appelle *corps de nombres* toute extension finie de  $\mathbb{Q}$ . Les corps de nombres sont le plus souvent désignés par  $K$  ou  $L$ .

**Rappel B** (Anneaux d'entiers d'un corps de nombres [Sam71, ch. II]). Soit  $K$  un corps de nombres. On appelle *anneau d'entiers de  $K$*  et l'on note  $\mathcal{O}_K$  l'anneau formé des éléments de  $K$  annulés par un polynôme unitaire à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ .

**Rappel C** (Trace et norme d'un élément relativement à une extension [Sam71, ch. II § 6]). Soient  $K$  un corps de nombres,  $\alpha \in K$  et  $\mu_\alpha$  l'endomorphisme  $\mathbb{Q}$ -linéaire de multiplication par  $\alpha$

$$\begin{aligned} \mu_\alpha : K &\longrightarrow K \\ x &\longmapsto x\alpha. \end{aligned}$$

- (i) On appelle *norme de  $K$  sur  $\mathbb{Q}$  de  $\alpha$*  et l'on note  $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$  le déterminant de  $\mu_\alpha$ . Si  $\alpha = n$  est un entier rationnel, on a notamment

$$N_{K/\mathbb{Q}}(n) = n^{[K:\mathbb{Q}]}.$$

- (ii) On appelle *trace de  $K$  sur  $\mathbb{Q}$  de  $\alpha$*  et l'on note  $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$  la trace de  $\mu_\alpha$ . Si  $\alpha = n$  est un entier rationnel, on a notamment

$$\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(n) = n \cdot [K : \mathbb{Q}].$$

Ce sont des cas particuliers de traces et normes relativement à une algèbre sur un anneau.

**Rappel D** (Discriminant d'un corps de nombres [Sam71, ch. II § 3, ch. V § 3]). Soient  $K$  un corps de nombres de degré  $d$  sur  $\mathbb{Q}$  et  $(x_1, \dots, x_d)$  une  $\mathbb{Z}$ -base de  $\mathcal{O}_K$ . On appelle *discriminant de  $K$*  et l'on note  $\text{Disc}(K)$  le déterminant

$$\text{Disc}(K) = \det \left( \left( \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_i x_j) \right)_{1 \leq i, j \leq d} \right).$$

C'est une quantité bien définie qui ne dépend pas du choix de la base. Cela nous servira car un nombre premier  $p$  se ramifie dans  $K$  (i.e. l'idéal  $p\mathcal{O}_K$  admet un facteur carré) si, et seulement si,  $p$  divise  $\text{Disc}(K)$ .

**Rappel E** (Norme d'idéaux [Sam71, ch. III § 5]). Soient  $K$  un corps de nombres et  $I$  un idéal *non nul* de  $\mathcal{O}_K$ . On appelle *norme de l'idéal*  $I$  et l'on note  $N(I)$  le cardinal

$$N(I) = |\mathcal{O}_K/I|.$$

Si  $n$  est un entier rationnel, on a notamment

$$|N_{K/\mathbb{Q}}(n)| = N(n\mathcal{O}_K).$$

## Introduction

Ayant pour point de départ l'article *Carmichael numbers in number rings* [Ste06] de G.A. Steele, ce mémoire s'applique à en redonner les résultats, les tester numériquement, répondre à quelques questions soulevées et essayer d'en tirer un critère de composition.

Le test de primalité non naïf le plus simple est le *test de primalité de Fermat*. Étant donné un entier rationnel  $n$  dont on veut tester la primalité, ce dernier affirme que s'il existe un entier rationnel  $a$  vérifiant  $a^n \not\equiv a \pmod{n}$ , alors  $n$  est composé. On dit alors que  $a$  est un *témoin de Fermat pour*  $n$ . Il existe cependant des entiers rationnels  $n$  **composés** n'ayant aucun témoin de Fermat. On les appelle *entiers de Carmichael* et le test de Fermat est incapable de prouver leur composition. Pire encore, il existe une infinité de tels entiers (voir [AGP94]), que l'on peut caractériser ainsi.

**Proposition I.1.** *Soit  $n$  un entier rationnel. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *l'entier  $n$  n'a aucun témoin de Fermat ;*
- (ii) *l'entier  $n$  est sans facteurs carrés et chacun de ses facteurs premiers  $p$  vérifie la relation*

$$p - 1 \mid n - 1.$$

- (iii) *la relation*

$$\lambda(n) \mid n - 1$$

*est vérifiée, où  $\lambda$  est la fonction indicatrice de Carmichael, qui à tout entier  $m \geq 1$  associe l'exposant du groupe  $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ .*

Un entier rationnel  $n$  est donc de Carmichael si, et seulement si, **il est composé** et vérifie l'une des assertions de I.1. L'assertion (ii) de la proposition est appelée *critère de Korselt* et est l'outil théorique le plus couramment utilisé pour démontrer qu'un entier rationnel donné est de Carmichael. Le lecteur désireux d'une preuve de cette proposition pourra se référer à [Dem08, §3.3 p. 89]. Dans l'article susnommé [Ste06], la notion d'entier de Carmichael est étendue à la notion d'*idéal de Carmichael* dans l'anneau d'entiers d'un corps de nombres.

**Définition I.2** ([Ste06, déf. 2.1]). Soient  $K$  un corps de nombres et  $I$  un idéal de  $\mathcal{O}_K$ . On dit que  $I$  est un idéal de Carmichael dans  $\mathcal{O}_K$  si  $I$  est **composé** et pour tout entier  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ , la congruence

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I}$$

est vérifiée, où  $N(I)$  est la norme de l'idéal  $I$  comme définie au rappel E.

**Remarque I.3.** Un entier de Carmichael peut donc être vu comme un idéal de Carmichael dans  $\mathbb{Z}$ , i.e. relatif au corps de nombres  $\mathbb{Q}$ .

Étant donné  $n$  un entier rationnel et  $K$  un corps de nombres, nous dirons que  $n$  est de Carmichael dans  $K$  si l'idéal  $n\mathcal{O}_K$  est de Carmichael dans  $\mathcal{O}_K$ . De tels idéaux existent et cette définition est le point de départ d'un formalisme fructueux. L'auteur de l'article commence par généraliser le critère de Korselt et le petit théorème de Fermat ; il en donne notamment une fameuse réciproque. Il étudie ensuite les corps quadratiques, puis cyclotomiques, cadres dans lesquels il démontre plusieurs résultats d'existence et non-existence d'idéaux de Carmichael. De nombreuses questions sont soulevées, notamment la suivante.

**Question I.4.** Soient  $n$  un entier de Carmichael et  $K$  un corps de nombres. Dans quelle mesure  $n$  est-il de Carmichael dans  $K$  ?

Nous nous proposons de répondre à une partie de cette question au cours de ce mémoire, que nous abordons avec une vision aussi bien théorique que pratique. Au delà des résultats de l'article, l'auteur du présent mémoire a implémenté plusieurs algorithmes y étant suggéré et réalise des nombreuses expérimentations numériques avec l'outil SageMath<sup>1</sup>. Algorithmes et résultats des expérimentations se trouvent sur la page GitHub de l'auteur de ce texte : <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael>, au dossier **Simulations et résultats**. Le fichier `Utilities.sage` contient des fonctions et définitions de base ; le fichier `Algorithms.sage` contient toutes les fonctions des expérimentations. Par ailleurs, donnons dès à présent la liste<sup>2</sup> des vingt-neuf premiers entiers de Carmichael. Nous l'étudierons beaucoup dans la suite de ce mémoire.

$$\left\{ \begin{array}{l} 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10585, \\ 15841, 29341, 41041, 46657, 52633, 62745, 63973, \\ 75361, 101101, 115921, 126217, 162401, 172081, \\ 188461, 252601, 278545, 294409, 314821, 334153, \\ 340561, 399001, 410041, 449065, 488881, 512461 \end{array} \right\} \quad (\mathfrak{C})$$

1. Voir <https://www.sagemath.org> et plus particulièrement la documentation des corps de nombres : [https://doc.sagemath.org/html/en/reference/number\\_fields/index.html](https://doc.sagemath.org/html/en/reference/number_fields/index.html).

2. C'est l'entrée A002997 de l'encyclopédie en ligne des séquences d'entiers : <https://oeis.org/A002997>.

Enfin, les preuves des énoncés fondamentaux sont redonnées et éventuellement modifiées. Nous donnons en plus quelques corollaires et étendons la notion de *témoin de Fermat* dans l'anneau d'entiers d'un corps de nombres. Enfin certaines preuves non redonnées sont quant à elle commentées dans des environnements dédiés intitulés *Un mot sur la preuve*.

## 1 Délices de la théorie

Certaines propriétés fondamentales des *entiers* de Carmichael restent vraies dans le cadre plus général des *idéaux* de Carmichael. Commençons par un lemme.

**Lemme 1.1.** *Soient  $K$  un corps de nombres,  $\mathfrak{p}$  un idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  et  $\alpha \in \mathcal{O}_K$  un entier. Alors la congruence*

$$\alpha^{N(\mathfrak{p})} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}$$

*est vérifiée.*

*Démonstration.* Si  $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , le résultat est évident. Si ce n'est pas le cas, l'idéal  $\mathfrak{p}$  étant un idéal premier d'un anneau de Dedekind, il est maximal. Le quotient  $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$  est donc un corps et  $N(\mathfrak{p}) - 1$  est le cardinal du groupe des inversibles de  $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ . Le théorème de Lagrange implique donc  $\alpha^{N(\mathfrak{p})-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$  puis

$$\alpha^{N(\mathfrak{p})} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}$$

en multipliant par  $\alpha$  des deux côtés. □

Nous pouvons dès à présent généraliser le critère de Korselt I.1.

**Théorème 1.2** (critère de Korselt généralisé, [Ste06, th. 2.2]). *Soient  $K$  un corps de nombres et  $I$  un idéal (premier ou composé) de  $\mathcal{O}_K$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *pour tout entier  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ , la congruence*

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I}$$

*est vérifiée ;*

(ii) *l'idéal  $I$  est sans facteurs carrés et chacun de ses facteurs premiers  $\mathfrak{p}$  vérifie la relation*

$$N(\mathfrak{p}) - 1 \mid N(I) - 1.$$

*Démonstration.* Commençons par le sens réciproque. Soit  $\alpha \in \mathcal{O}_K$  un entier et  $\mathfrak{p}$  un idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  divisant  $I$ .

- Si  $\alpha \notin \mathfrak{p}$ , vient  $\alpha^{N(\mathfrak{p})-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$  d'après le lemme 1.1. L'entier  $N(\mathfrak{p}) - 1$  divisant  $N(I) - 1$  par hypothèse, cela entraîne  $\alpha^{N(I)-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}}$  et donc

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}.$$

- Si  $\alpha \in \mathfrak{p}$ , la dernière congruence est toujours vérifiée.

L'idéal  $I$  étant de plus sans facteurs carrés (hypothèse), il est de la forme  $I = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r$ , où les  $\mathfrak{p}_i$  sont des idéaux premiers distincts de  $\mathcal{O}_K$ . Ces idéaux sont même maximaux (anneau de Dedekind) et donc comaximaux. Le théorème chinois affirme alors que l'application canonique

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_K/I &\longrightarrow \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_1 \times \cdots \times \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_r \\ a \pmod{I} &\longmapsto (a \pmod{\mathfrak{p}_1}, \dots, a \pmod{\mathfrak{p}_r}), \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneaux. Comme nous avons montré  $\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}_i}$  pour tout  $1 \leq i \leq r$ , l'isomorphisme évoqué entraîne la congruence

$$\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I}.$$

Démontrons cette fois le sens direct. La preuve se fait en deux temps. Écrivons  $I = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$ , les  $\mathfrak{p}_i$  étant des idéaux premiers de  $\mathcal{O}_K$  distincts. Pour tout indice  $1 \leq i \leq r$  donnons nous  $\alpha_i \in \mathcal{O}_K$  un élément dont la classe modulo  $\mathfrak{p}_i$  engendre le groupe quotient  $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i)^\times$ . Un tel élément existe car  $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i$  est un corps fini et que le groupe des inversibles d'un corps fini est cyclique. En particulier,  $\alpha_i$  n'est *pas* dans  $\mathfrak{p}_i$ . On a alors

$$\alpha_i^{N(I)-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_i}$$

en reprenant le raisonnement précédent. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de  $\alpha_i$  modulo  $\mathfrak{p}_i$  divise  $N(I) - 1$ . Cet ordre étant  $N(\mathfrak{p}_i) - 1$ , on en déduit la relation de divisibilité désirée.

Démontrons désormais que  $I$  est sans facteurs carrés. Supposons qu'il existe un idéal premier  $\mathfrak{p}$  de  $\mathcal{O}_K$  tel que  $\mathfrak{p}^2 \mid I$  et posons

$$H = (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}^2)^\times.$$

On a

$$|H| = N(\mathfrak{p})(N(\mathfrak{p}) - 1).$$

Soit  $p \in \mathbb{Z}$  l'unique nombre premier tel que  $p\mathbb{Z} = \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ . L'entier  $N(\mathfrak{p})$  est une puissance de  $p$ , d'où  $p \mid N(\mathfrak{p})$  et

$$p \mid |H|.$$

Le théorème de Cauchy abélien assure alors qu'il existe un élément  $\alpha \in H$  d'ordre  $p$ . Comme  $I$  est de Carmichael par hypothèse, on a  $\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{I}$  puis  $\alpha^{N(I)} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}^2}$ , car  $\mathfrak{p}^2 \mid I$ . Comme en outre  $\alpha \notin \mathfrak{p}^2$ , on en déduit  $\alpha^{N(I)-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^2}$  puis

$$p \mid N(I) - 1$$

d'après le théorème de Lagrange. Comme  $p \mid N(I)$ , cela constitue une contradiction. L'idéal  $I$  est donc sans facteurs carrés.  $\square$

**Remarque 1.3.** Le critère de Korselt que nous connaissons dans le cadre de l'arithmétique se déduit immédiatement du critère de Korselt généralisé en prenant  $K = \mathbb{Q}$ .

On a alors la (fondamentale) caractérisation suivante.

**Corollaire 1.4.** *Soient  $K$  un corps de nombres et  $I$  un idéal de  $\mathcal{O}_K$ . Alors l'idéal  $I$  est de Carmichael si, et seulement si, il est composé et vérifie les hypothèses du critère de Korselt généralisé 1.2.*

**Remarque 1.5.** Il faut être vigilant avec la nomenclature. Pour établir qu'un idéal est de Carmichael, il faut montrer qu'il est composé, indépendamment du critère de Korselt.

Ce critère permet de généraliser le petit théorème de Fermat. Dans une extension galoisienne  $K$  de  $\mathbb{Q}$  de degré fini, un nombre premier est soit inerte, soit de Carmichael dans  $K$ . Plus précisément.

**Théorème 1.6** (petit théorème de Fermat généralisé, [Ste06, th. 2.3]). *Soient  $p$  un nombre premier et  $K/\mathbb{Q}$  une extension galoisienne de degré fini tels que  $p \nmid \text{Disc}(K)$ . Alors, pour tout entier  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ , on a*

$$\alpha^{N_{K/\mathbb{Q}}(p)} \equiv \alpha \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

*Démonstration.* Comme  $p \nmid \text{Disc}(K)$ , le nombre premier  $p$  n'est pas ramifié dans  $\mathcal{O}_K$ . Comme l'extension  $K/\mathbb{Q}$  est galoisienne de degré fini, les indices de ramifications et degrés résiduels des idéaux de  $\mathcal{O}_K$  au dessus de  $\mathfrak{p}$  sont égaux. L'idéal  $p\mathcal{O}_K$  est donc de la forme

$$p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1 \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_r.$$

Soit donc  $f$  ce degré résiduel. On a  $rf = [K : \mathbb{Q}]$  et surtout que  $f$  divise  $[K : \mathbb{Q}]$ . Ainsi, pour tout indice  $1 \leq i \leq r$ , il vient

$$N(\mathfrak{p}_i) - 1 = p^f - 1 \mid p^{[K:\mathbb{Q}]} - 1 = N(p\mathcal{O}_K) - 1.$$

L'idéal  $\mathcal{O}_K$  vérifie donc le critère de Korselt généralisé 1.2, d'où le résultat.  $\square$

Nous étendons alors la notion de témoin de Fermat.

**Définition 1.7.** Soient  $n$  un entier rationnel,  $K/\mathbb{Q}$  une extension galoisienne de degré fini et  $\alpha \in \mathcal{O}_K$  un entier. On dit que  $\alpha$  est un  $K$ -témoin de Fermat pour  $n$  si l'on a

$$\alpha^{N(n\mathcal{O}_K)} \not\equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}.$$

Un nombre premier n'a donc de témoins de  $K$ -Fermat dans aucun corps de nombres galoisien  $K$  dont le discriminant lui est premier. Cette généralisation de la notion de témoin de Fermat apparaît naturellement dans la contraposée du théorème 1.6. Fait tout à fait remarquable, l'auteur de l'article donne une réciproque au petit théorème de Fermat généralisé 1.6.

**Théorème 1.8** (réciproque du petit théorème de Fermat généralisé, [Ste06, th. 2.4]). *Soit  $n > 2$  un entier rationnel composé. Alors  $n$  admet un témoin de Fermat dans les corps quadratiques de la forme*

$$K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}p}\right)$$

où  $p$  est un facteur premier impair de  $n$ .

*Démonstration.* Soit  $K$  un corps quadratique comme dans l'énoncé. Le nombre premier  $p$  se ramifie dans  $K$  et  $n\mathcal{O}_K$  a un facteur carré. Il n'est donc pas de Carmichael d'après le critère de Korselt généralisé 1.2 et la caractérisation 1.4.  $\square$

Vient alors l'équivalence suivante.

**Théorème 1.9** (petit théorème de Fermat généralisé et sa réciproque). *Soit  $n > 2$  un entier rationnel. Alors  $n$  est premier si, et seulement si, il n'a de  $K$ -témoin de Fermat dans aucun corps quadratique  $K$  vérifiant  $n \nmid \text{Disc}(K)$ .*

*Démonstration.* Le sens direct correspond à 1.6 et le sens réciproque s'obtient avec l'énoncé précédent en constatant que  $\text{Disc}(K) = p$  et que  $n$  ne divise pas  $p$  si  $n$  est composé.  $\square$

**Remarque 1.10.** Au delà de sa force théorique, cette énoncé semble porter une valeur historique notable. Le test de primalité de Fermat était le seul test de primalité classique à ne pas disposer d'une réciproque (pour le test d'Euler par exemple, c'est une équivalence). Cette absence de réciproque semblait bien être le prix à payer pour sa simplicité et son efficacité. Il aura certes fallu aller chercher la réciproque dans les corps de nombres, mais l'énoncé prouve que les corps quadratiques suffisent. Ces objets ne sont d'ailleurs pas si loin de l'arithmétique classique : Gauss les étudiait déjà.

Nous avons déjà des outils suffisamment robustes pour fournir un test de primalité naïf. Comme certains outils de calcul formel sont capables de décomposer un idéal de l'anneau d'entiers d'un corps de nombres en produit d'idéaux premiers dudit anneau :



c'est notamment le cas de SageMath. Il est alors facile d'implémenter le critère de Korselt 1.2. La contraposée du petit théorème de Fermat généralisé 1.9 nous permet en suite d'écrire le critère de composition suivant.

**Algorithme 1 :** Critère de composition de Korselt dans les extensions galoisiennes de degré fini de  $\mathbb{Q}$

**Entrées :**  $n$  (entier rationnel à tester),  $\mathcal{K}$  (liste d'extensions galoisiennes de degré fini de  $\mathbb{Q}$ )

```

1 pour chaque  $K$  dans  $\mathcal{K}$  faire
2   si  $n \nmid \text{Disc}(K)$  alors
3     si  $n\mathcal{O}_K$  ne vérifie pas le critère de Korselt alors
4       retourner  $n\mathcal{O}_K$  n'est pas de Carmichael et  $n$  est composé

```

Avant de poursuivre, donnons un lemme qui permettra d'alléger les énoncés de l'article.

**Lemme 1.11.** *Soient  $n$  un entier rationnel et  $K$  un corps de nombres. Si  $n$  est de Carmichael dans  $K$ , alors  $n$  et  $\text{Disc}(K)$  sont premiers entre eux.*

*Démonstration.* Si les entiers  $n$  et  $\text{Disc}(K)$  ne sont pas premiers entre eux,  $n$  a un facteur premier qui divise  $\text{Disc}(K)$  et qui se ramifie dans  $\mathcal{O}_K$ . L'idéal  $n\mathcal{O}_K$  a donc un facteur carré, ce qui l'empêche d'être un idéal de Carmichael d'après le critère de Korselt généralisé 1.2 et la caractérisation 1.4.  $\square$

Ces résultats fournissent un début de théorie confortable. Nous pouvons dès à présent nous confronter à une étude plus spécifique, celle des corps quadratiques.

## 2 Corps quadratiques

### 2.1 Théorie

Entrons dès à présent dans le vif du sujet.

**Théorème 2.1** ([Ste06, th. 2.5]). *Soit  $n$  un entier rationnel impair sans facteurs carrés. S'il existe un diviseur premier  $p$  de  $n$  vérifiant*

$$p^2 - 1 \nmid n^2 - 1,$$

*alors il existe une infinité de corps quadratiques  $K$ , de discriminants premiers avec  $n$ , dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael.*

*Un mot sur la preuve.* On présage dès l'énoncé la nature de la preuve : c'est le critère de Korselt généralisé 1.2 et la caractérisation 1.4. On commence par s'assurer que  $n$  est sans facteurs carrés de sorte de contrôler la décomposition de  $n\mathcal{O}_K$  dans un corps quadratique  $K$  donné. La partie la plus difficile de la preuve consiste à trouver les bons corps quadratiques. Elle est basée sur la connaissance d'un nombre premier  $p$  comme dans les hypothèses du théorème et sur une savante utilisation du théorème chinois. Les techniques de base de la ramification permettent encore une fois de s'assurer que les corps construits vérifient bien ce qu'on leur demande de vérifier.

Bien que cet énoncé ne semble pas optimal en pratique<sup>3</sup>, certains nombres de Carmichael vérifient ces hypothèses : c'est même le cas de tous les nombres de Carmichael de la liste  $\mathfrak{C}$ . Il existe donc pour chacun d'eux une infinité de corps quadratiques dans lesquels ils ne sont pas de Carmichael, prouvant qu'ils sont composés (énoncé 1.9). Dans l'exemple 2.6, l'auteur trouve le  $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ -témoin de Fermat  $2 + 1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$  pour  $n = 561$ , prouvant sa composition. C'est le *test de Fermat dans les corps quadratiques*. Étant donné un entier rationnel  $n$  on se donne une liste de corps quadratiques  $K$  de discriminant premier avec  $n$  et l'on cherche dans chacun d'eux un  $K$ -témoin de Fermat.

Il par ailleurs tentant d'utiliser ce test pour déterminer la primalité de  $n$  avec une certitude morale, dans l'esprit du test de primalité de Rabin-Miller (voir [Dem08, § 3.3.7 p. 68]). L'idée serait que si  $n$  vérifie la congruence  $\alpha^{N(n\mathcal{O}_K)} \equiv \alpha \pmod{n\mathcal{O}_K}$  pour un nombre « suffisamment grand » de corps quadratiques  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$  de discriminant premier avec  $n$  et d'entiers  $\alpha \in \mathcal{O}_K$ , nous aurions une certitude morale de la primalité de  $n$ . Nous allons cependant voir qu'un tel test ne saurait exister. Nous avons évoqué la réciproque du petit théorème de Fermat (1.9). Il faut bien faire attention au fait que l'on ne peut pas remplacer l'hypothèse «  $n \nmid \text{Disc}(K)$  » par l'hypothèse «  $n$  et  $\text{Disc}(K)$  sont premiers entre eux »<sup>4</sup> ! Le mathématicien E.W. Howe montre en effet le résultat suivant.

**Théorème 2.2** (Howe, 2000). *Il existe un entier rationnel  $h$  qui soit à la fois composé et de Carmichael dans tout corps quadratique de discriminant premier avec  $h$ .*

En guise de preuve, Howe exhibe un tel nombre, défini par

$$h = 17 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 43 \cdot 89 \cdot 97 \cdot 167 \cdot 331 = 443372888629441. \quad (1)$$

Nous l'appellerons dans la suite *entier de Howe*. Il est même de Carmichael dans  $\mathbb{Q}$ . L'existence de cet entier rationnel signifie que — comme dans  $\mathbb{Q}$  — le test de Fermat

---

3. Il n'y a à ce jour (3 juin 2020) pas d'algorithme efficace pour déterminer si un entier rationnel est sans facteurs carrés. Les algorithmes passent souvent par la décomposition en produit de facteurs premiers (voir [AM]), ce qui ne nous arrange pas.

4. Cela peut être contre intuitif : si  $n$  est un entier rationnel et  $K$  un corps de nombres, le fait que  $n$  soit de Carmichael dans  $K$  implique que  $n$  et  $\text{Disc}(K)$  sont premiers entre eux.

quadratique ne peut pas prouver qu'un entier rationnel est composé simplement parce qu'il n'a de  $K$ -témoins de Fermat dans aucun corps quadratique  $K$  dont le discriminant lui est premier. Plus généralement, l'auteur de l'article montre le théorème suivant.

**Théorème 2.3** ([Ste06, th. 2.7]). *Soient  $n$  un entier rationnel composé sans facteurs carrés et  $d \geq 1$  un entier rationnel. Si pour tout diviseur  $p$  de  $n$  et tout entier  $1 \leq i \leq d$  la division*

$$p^i - 1 \mid n^d - 1$$

*est vérifiée, alors  $n$  est de Carmichael dans tout corps de nombres de degré  $d$  de discriminant premier avec  $n$ .*

**Définition 2.4.** Un entier rationnel  $n$  vérifiant les hypothèses du théorème 2.3 pour un certain entier rationnel  $d \geq 1$  est appelé *nombre de Carmichael rigide d'ordre  $d$* .

L'entier de Howe est donc un nombre de Carmichael rigide d'ordre 2. Ces résultats nous enseignent que les corps quadratiques — à l'instar de  $\mathbb{Q}$  — ne peuvent pas détecter tous les entiers de Carmichael à l'aide avec le test de Fermat. Terminons avec un énoncé proche de l'arithmétique classique.

**Corollaire 2.5.** *Soit  $n$  un entier rationnel. Si  $n$  est sans facteurs carrés et composé, alors les propositions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *l'entier  $n$  est de Carmichael dans tout corps quadratique de discriminant premier avec  $n$  ;*
- (ii) *la relation*

$$p^2 - 1 \mid n^2 - 1$$

*est vérifiée pour tout diviseur premier  $p$  de  $n$ .*

*Démonstration.* Si  $n$  est de Carmichael dans tout corps quadratique de discriminant premier avec  $n$ , le théorème 2.1 assure que la relation

$$p^2 - 1 \mid n^2 - 1$$

est vérifiée pour tout diviseur premier  $p$  de  $n$ . Pour le sens réciproque, soit  $p$  un facteur premier de  $n$ . On a  $p - 1 \mid (p - 1)(p + 1) = p^2 - 1$  et  $p^2 - 1 \mid n^2 - 1$  par hypothèse. La division

$$p^i - 1 \mid n^2 - 1$$

est donc vérifiée pour toute puissance  $1 \leq i \leq 2$ . Le théorème 2.3 permet alors de conclure.  $\square$

**Remarque 2.6.** L'énoncé est faux si  $n$  n'est pas composé. Sous cette hypothèse, notons  $p = n$ . Soit  $K$  un corps quadratique dans lequel  $p$  est inerte. Un idéal de Carmichael étant composé,  $p$  n'est pas de Carmichael dans  $K$ . L'identité  $p^2 - 1 \mid n^2 - 1 = p^2 - 1$  est cependant vérifiée.

Passons désormais aux expérimentations numériques.

## 2.2 Expérimentations numériques

Nous étudions ici le critère de Korselt dans des corps quadratiques<sup>5</sup>. Pour tout entier rationnel  $n$ , nous cherchons une liste de corps quadratiques dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael. Pour cela, nous lançons l'algorithme avec les paramètres suivants.

paramètre	valeur
corps testés	corps quadratiques de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ où $d$ est un entier rationnel sans facteurs carrés dans $\llbracket -5000, +5000 \rrbracket$ <sup>6</sup>
entiers de Carmichael testés	tous ceux de la liste $\mathfrak{C}$

TABLE 1 – Paramètres des expérimentations du critère de Korselt pour les corps quadratiques.

Avec ces paramètres, le critère de Korselt a donné pour chaque élément  $n$  de la liste, plusieurs corps quadratiques de discriminant premier avec  $n$  dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael. En fait, il en exhibe des centaines. Il est donc impossible d'énoncer ici tous les résultats<sup>7</sup>, mais citons à titre d'exemple que 561 n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{-4874})$  mais qu'il l'est dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{4877})$  ou que 172081 n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{766})$  mais qu'il l'est dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{-1459})$ . Pour la plupart des couples  $(n, K)$  testés,  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $K$ . Nous avons tiré les statistiques suivantes de nos expérimentations.

donnée évaluée	statistique
nombre de corps testés	143524
nombre d'idéaux de Carmichael trouvés dans ces corps	34138
proportion d'idéaux de Carmichael trouvés dans ces corps	23,8 %

TABLE 2 – Statistiques des expérimentations du critère de Korselt sur les corps quadratiques.

S'il s'avère que l'entier rationnel  $n$  que nous testons n'est pas comme l'entier de Howe et admet bien un  $K$ -témoin de Fermat dans un certains corps quadratique  $K$  dont le

5. Pour l'implémentation, voir la fonction `Carmichael_quadratic` du fichier <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Algorithms.sage>.

7. Les résultats se trouvent tous dans <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/tree/master/Simulations%20et%20resultats>, sous la forme d'un fichier par entier testé. Par exemple, les résultats pour l'entier 561 se trouvent dans le fichier `561_quadratic.txt`.

discriminant lui est premier, ces résultats laissent penser qu'on a de bonnes chances de le trouver. Bien sûr, ces sommaires statistiques ne prouvent rien et on ne sait pas déterminer a priori s'il existe ou non un tel témoin. Pour les performances, les calculs sont extrêmement rapides dans tous les corps. Nous donnons ici le temps nécessaire au critère de Korselt pour déterminer si l'entier  $n = 512461$  est de Carmichael dans les corps donnés. D'après nos tests, ils sont sensiblement proches pour tout entier rationnel et tout corps quadratique testé.

corps quadratiques	512461 reste de Carmichael dans ce corps	temps de calcul
$\mathbb{Q}(\sqrt{-4957})$	non	0.00303 s
$\mathbb{Q}(\sqrt{-2426})$	oui	0.00211 s
$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$	non	0.0024 s
$\mathbb{Q}(\sqrt{+2})$	non	0.0024 s
$\mathbb{Q}(\sqrt{+2426})$	oui	0.0031 s
$\mathbb{Q}(\sqrt{+4957})$	oui	0.0031 s

TABLE 3 – Temps de calcul du critère Korselt dans les corps quadratiques donnés pour l'entier  $n = 512461$ .

## 3 Idéaux de Carmichael et extensions de corps

### 3.1 Deux résultats

Donnons nous

$$\mathbb{Q} \subset K \subset L$$

une tour de corps de nombres,  $I \subset \mathcal{O}_K$  un idéal de Carmichael de  $K$  et  $J \subset \mathcal{O}_L$  un idéal de Carmichael de  $L$ .

**Question 3.1.** L'idéal étendu  $I\mathcal{O}_L$  est-il de Carmichael dans  $\mathcal{O}_L$  et l'idéal restreint  $J \cap \mathcal{O}_K$  est-il de Carmichael dans  $\mathcal{O}_K$  ?

L'auteur de l'article a déjà répondu à la première partie de la question dans l'exemple 2.6 de l'article, en utilisant le test de Fermat dans les corps quadratiques.

**Proposition 3.2.** *Il existe des tours de corps de nombres  $\mathbb{Q} \subset K \subset L$  et des idéaux de Carmichael  $I$  de  $K$  pour lesquels l'idéal étendu  $I\mathcal{O}_L$  qui n'est pas de Carmichael dans  $\mathcal{O}_L$ .*

*Démonstration.* L'exemple 2.6 de l'article montre que l'entier de Carmichael 561 n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ . On a alors l'énoncé en prenant  $K = \mathbb{Q}$ ,  $I = 561\mathcal{O}_K$  et  $L = \mathbb{Q}(\sqrt{13})$ .  $\square$

L'algorithme de Korselt 2.2 dans les corps quadratiques permet de répondre à la deuxième partie de la question.

**Proposition 3.3.** *Il existe des tours de corps de nombres  $\mathbb{Q} \subset K \subset L$  et des idéaux de Carmichael  $J$  de  $L$  pour lesquels l'idéal restreint  $J \cap \mathcal{O}_K$  n'est pas de Carmichael dans  $\mathcal{O}_K$ .*

Pour y répondre, l'auteur du présent mémoire a implémenté l'algorithme suivant<sup>8</sup>. On se donne une liste d'entiers  $d$  sans facteurs carrés et pour tout entier rationnel  $n$  qui n'est pas de Carmichael dans un intervalle donné, on teste si  $n$  est de Carmichael dans  $K$  avec le critère de Korselt. Plus précisément, on a l'algorithme suivant.

<b>Algorithme 2 :</b> trouver un entier rationnel $n$ et un corps quadratique $K$ tels que $n$ ne soit pas de Carmichael dans $K$ , avec le critère de Korselt	
<b>Entrées :</b> $\mathcal{N}$ (liste d'entiers qui ne sont pas de Carmichael), $\mathcal{K}$ (liste de corps quadratiques)	
<b>Sorties :</b> couples $(n, K)$ où $K$ est un corps quadratique de $\mathcal{K}$ et $n$ est un entier rationnel de $\mathcal{N}$ de Carmichael dans $K$ mais pas dans $\mathbb{Q}$	
1	<b>pour chaque</b> $n$ dans $\mathcal{N}$ <b>faire</b>
2	<b>pour chaque</b> $K$ dans $\mathcal{K}$ <b>faire</b>
3	<b>si</b> $n$ est de Carmichael dans $K$ (critère de Korselt) <b>alors</b>
4	<b>retourner</b> $n$ de Carmichael dans $K$ mais ne l'est pas dans $\mathbb{Q}$

Cette algorithme retourne de nombreux résultats<sup>9</sup>. Par exemple 35 est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{11})$  et 8029 est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{-73})$  ; aucun de ces deux nombres n'est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}$ . Nous avons tiré les statistiques suivantes.

donnée évaluée	statistique
nombre de couples testés	5723
nombre d'entiers qui sont de Carmichael dans un corps testé	2930
proportion d'entiers qui sont de Carmichael dans un corps testé	51,2 %

TABLE 4 – Statistiques des expérimentations du critère de Korselt sur les corps quadratiques pour les paramètres 2.2.

8. Pour l'implémentation, voir la fonction `Carmichael_ideal_restricted` du fichier <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Algorithms.sage>.

9. Les résultats se trouvent tous dans l'unique fichier [https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Carmichael\\_ideal\\_restricted\\_1.txt](https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Carmichael_ideal_restricted_1.txt). Chaque couple  $(d, n)$  vérifie que l'entier rationnel  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}$  mais l'est dans le corps quadratique  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ .

Face à la généralité de l'énoncé de la question posée, il était tentant d'aller chercher une réponse ou bien théorique, ou bien dans des corps de nombres beaucoup plus compliqués. En fin de compte, les corps quadratiques auront suffi. Nous avons vu à la section précédente que sur les entiers de Carmichael et les corps quadratiques testés, ceux-ci restaient de Carmichael dans environ 24 % des cas. Ici, nous avons montré que sur les entiers n'étant pas de Carmichael et les corps quadratiques testés, ceux-ci engendraient un entier de Carmichael dans plus de 50 % des cas. Ces statistiques sont symptomatiques du fait que nous sommes a priori largement ignorants sur le comportement d'un idéal de Carmichael lorsqu'on l'étend ou le restreint, et ce même en restant dans le cadre des corps quadratiques, corps de nombres a priori parmi les moins compliqués.

### 3.2 Un peu d'arithmétique

Voyons maintenant un autre procédé permettant d'expliciter des entiers qui sont de Carmichael dans certains corps quadratiques et non dans  $\mathbb{Q}$ . L'entier  $n = 8029$  exposé précédemment a la particularité d'être le produit de trois nombres premiers distincts<sup>10</sup> :

$$n = 8029 = 7 \cdot 31 \cdot 37,$$

d'être de Carmichael dans le corps quadratique  $\mathbb{Q}(\sqrt{-73})$  et de ne pas l'être dans  $\mathbb{Q}$ , et ses facteurs premiers vérifient les hypothèses faites dans l'énoncé suivant.

**Proposition 3.4.** *Soient  $(p_i)_{1 \leq i \leq r}$  une famille de nombres premiers tous impairs et  $d$  un entier rationnel sans facteurs carrés. Notons  $n$  le produit  $n = p_1 \cdots p_r$  et supposons que les assertions suivantes sont vérifiées.*

- (i) *l'entier  $d$  est un carré modulo  $p_i$  pour tout indice  $1 \leq i \leq r$  ;*
- (ii) *l'entier  $n^2 - 1$  est divisible par  $p_i - 1$  pour tout indice  $1 \leq i \leq r$  ;*
- (iii) *au moins l'un des entiers  $p_i - 1$ ,  $1 \leq i \leq r$ , ne divise pas  $n - 1$ .*

*Alors, l'entier  $n$  est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$  mais ne l'est pas dans  $\mathbb{Q}$ .*

*Démonstration.* Posons  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ . L'hypothèse (i) implique que  $n\mathcal{O}_K$  est sans facteurs carrés et que les  $p_i$  sont décomposés dans  $K$  pour tout indice  $1 \leq i \leq r$ . Fixons  $1 \leq l \leq r$  un tel indice. Il existe alors deux idéaux premiers distincts  $\mathfrak{p}_l$  et  $\mathfrak{p}'_l$  de  $\mathcal{O}_K$  tels que

$$p_l \mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_l \mathfrak{p}'_l.$$

---

10. Nous avons exhibé de nombreux autres entiers  $n$  produits de trois nombres premiers distincts qui sont de Carmichael dans certain corps quadratique de la forme  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ , où  $d$  est sans facteurs carrés, mais ne le sont pas dans  $\mathbb{Q}$ . La liste de tous les tels couples  $(d, n)$  exhibés est disponible ici : [https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Carmichael\\_ideal\\_restricted\\_2.txt](https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Carmichael_ideal_restricted_2.txt).

Soit  $\mathfrak{P}$  un idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  divisant  $n$ . Supposons sans perdre de généralité que  $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}_l$ . On a alors

$$N(\mathfrak{P}) - 1 = N(\mathfrak{p}_l) - 1 = p_l - 1 \mid n^2 - 1 = N(n\mathcal{O}_K) - 1,$$

d'après l'hypothèse (ii). Le critère de Korselt généralisé 1.2 et la caractérisation 1.4 impliquent alors que  $n$  est de Carmichael dans  $K$ . Le critère de Korselt I.1 et l'hypothèse (iii) impliquent que  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}$ , d'où le résultat.  $\square$

**Remarque 3.5.** Cet énoncé n'est pas une équivalence. Dans le cas  $r = 3$ , l'entier rationnel  $n = 665 = 5 \cdot 7 \cdot 19$  est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{-97})$  mais ne l'est pas dans  $\mathbb{Q}$ . Cependant, l'entier  $d = -97$  n'est jamais un carré modulo un diviseur premier de  $n$  et l'entier  $n$  ne vérifie pas le point (ii). Il vérifie toutefois les points (i) et (iii).

Pour trouver des entiers  $(d, n)$  où  $d$  est un entier sans facteurs carrés et  $n$  est un entier qui est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$  mais pas dans  $\mathbb{Q}$ , nous aurions donc pu utiliser l'algorithme suivant.

**Algorithme 3 :** trouver un entier rationnel  $n$  et un corps quadratique  $K$  tels que  $n$  ne soit pas de Carmichael dans  $K$ , avec la proposition 3.4

**Entrées :**  $\mathcal{P}$  (liste de nombres premiers impairs),  $\mathcal{D}$  (liste d'entiers sans facteurs carrés)

**Sorties :** des couples  $((p, q, r), d)$  vérifiant les hypothèses de la proposition 3.4

1 **pour chaque**  $d$  dans  $\mathcal{D}$  **faire**

2     **pour chaque**  $(p, q, r)$  dans  $\mathcal{P}^3$ , où  $p, q$  et  $r$  sont distincts **faire**

3          $n \leftarrow pqr$

4         **si**  $d$  est un carré modulo  $p, q$  et  $r$  **et**  $n^2 - 1$  est divisible par  $p - 1, q - 1$  et  $r - 1$  **et**  $p - 1, q - 1$  ou  $r - 1$  ne divise pas  $n - 1$  **alors**

5             **retourner**  $n$  n'est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ , ne l'est pas dans  $\mathbb{Q}$  et est le produit de trois nombres premiers distincts

La remarque 3.5 prouve toutefois que les couples  $(d, n)$  exhibés avec cet algorithme jouissent de propriétés arithmétiques beaucoup plus fortes que les couples  $(d, n)$  exhibés en toute généralité dans la sous-section précédente.

## 4 Corps cyclotomiques

### 4.1 Théorie

Dans cette section, nous nous intéressons aux corps cyclotomiques de la forme  $\mathbb{Q}(\zeta_q)$  où  $q$  est un nombre premier. Commençons par un résultat théorique.



**Théorème 4.1** ([Ste06, th. 3.1]). *Pour tout entier naturel  $n$  composé, il existe une infinité de corps de nombres abéliens de discriminant premier avec  $n$  dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael.*

*Un mot sur la preuve.* Les preuves des énoncés sur les corps cyclotomiques sont autrement plus sophistiquées que celles sur les corps quadratiques et l'auteur y utilise des résultats de théorie analytique des nombres. Ces derniers assurent de l'existence d'objets mais ne les construisent pas, à l'image des lemmes 3.3 et 3.4 de l'article. Pour ce théorème, la construction des corps se fait avec la correspondance de Galois et la vérification qu'ils vérifient les bonnes propriétés nécessite des arguments sophistiqués de ramification (groupes de décomposition et d'inertie, Frobenius d'un élément). Nous verrons ces arguments plus en détails dans la preuve du théorème 3.6 de l'article (n°4.3 chez nous).

Un nombre de Carmichael  $n$  étant composé, le théorème 4.1 assure qu'il existe une infinité de corps de nombres abéliens de discriminant premier avec  $n$  dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael. Cela fournit une nouvelle réciproque au petit théorème de Fermat, plus contraignante que la précédente.

**Théorème 4.2** (deuxième réciproque). *Soit  $n$  un entier rationnel. Alors  $n$  est premier si, et seulement si, pour tout corps de nombres abéliens  $K$  de discriminant premier avec  $n$ ,  $n$  n'admet aucun  $K$ -témoin de Fermat.*

*Démonstration.* Supposons que  $n$  est premier. Dans ce cas, d'après le théorème 1.6 et la définition 1.7, de  $K$ -témoin de Fermat dans aucun corps de nombres abélien  $K$  de discriminant premier avec  $n$ . L'application réciproque résulte directement du théorème 4.1.  $\square$

Le résultat le plus à même d'aboutir à un test de primalité est le crucial théorème suivant. Il nous enseigne qu'il faut aller chercher du côté des corps cyclotomiques. Nous en donnons la démonstration.

**Théorème 4.3** ([Ste06, th. 3.6]). *Soit  $n$  un entier rationnel composé ayant au moins trois facteurs premiers distincts. Alors il existe une infinité de corps cyclotomiques  $K$  de la forme  $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$ ,  $q$  étant premier, tels que  $\text{Disc}(K)$  soit premier avec  $n$ , et que  $n$  ne soit pas de Carmichael dans  $K$ .*

Remarquons d'abord que  $\text{Disc}(K) = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q^{q-2}$ . Nous avons ensuite besoin de quelques résultats préliminaires.

**Lemme 4.4** ([Ste06, lemme 3.3]). *Soit  $n$  un entier rationnel. Si  $n$  n'est pas la puissance d'un nombre premier, alors pour tout diviseur premier  $p$  de  $n$ , il existe un rang  $d_0$  tel que la relation*

$$p^d - 1 \nmid n^d - 1$$

soit vérifiée pour tout entier rationnel  $d > d_0$ .

*Démonstration.* Voir [BCZ03]. □

**Lemme 4.5** (théorème de Heath-Brown, [Ste06, th. 3.5]). *Tous les nombres premiers, à l'exception d'au plus deux d'entre eux, sont des racines primitives modulo  $q$  pour une infinité de nombres premiers  $q$ .*

*Démonstration.* Voir [HB86]. □

**Lemme 4.6.** *Soient  $K/\mathbb{Q}$  une extension abélienne de degré fini et  $p$  un nombre premier non ramifié. S'il existe un groupe cyclique  $H$  et un isomorphisme de groupes*

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \rightarrow H$$

*qui envoie la substitution de Frobenius de  $p$  en  $K/\mathbb{Q}$ <sup>11</sup> sur un générateur de  $H$ , alors  $p$  est inerte dans  $K$ .*

*Démonstration.* Dans cette preuve, nous utilisons les résultats de [Kra00, ch. 3 § 4 et 5]. Soient  $f : \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) \rightarrow H$  un isomorphisme de groupes,  $s_p$  la substitution de Frobenius de  $p$  en  $K/\mathbb{Q}$  et  $h$  un générateur de  $H$  vérifiant  $f(s_p) = h$ . L'extension étant non ramifiée en  $p$ , tout ceci a bien un sens. Comme  $h$  engendre  $H$ , que  $s_p$  engendre le sous-groupe de décomposition de  $p$ <sup>12</sup> et que  $f$  est un isomorphisme entre  $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$  et  $H$ , le Frobenius  $s_p$  est générateur de  $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ . On a donc l'égalité

$$D_p = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}).$$

La sous-extension de  $K/\mathbb{Q}$  correspondant  $D_p$  dans la correspondance de Galois est donc  $\mathbb{Q}$ . D'après [Kra00, lemme 3.9], cela induit que  $p$  n'a qu'un seul idéal premier au-dessus de lui. L'idéal  $p$  est donc l'unique idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  au-dessus de  $p$ , et comme  $p$  ne se ramifie pas dans  $K$ , cela prouve l'inertie que  $p$  est inerte dans  $K$ . □

**Lemme 4.7.** *Soient  $n \geq 1$  un entier rationnel et  $\zeta_n$  une racine primitive  $n$ -ième de l'unité. L'application*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \\ \sigma & \longmapsto & \bar{a}, \end{array}$$

*où  $a$  est un entier rationnel tel que  $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^a$ , est un isomorphisme de groupes bien défini.*

---

11. Bien définie dans le cas abélien.

12. Bien défini dans le cas abélien.

*Démonstration.* Commençons par montrer que cette application est bien définie et que c'est un morphisme de groupes. Notons la  $\varphi$ . Soit  $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ . Cet automorphisme envoie  $\zeta_n$  sur une autre racine primitive de l'unité. La racine  $\zeta_n$  étant primitive, on a

$$\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^a$$

avec  $a$  premier avec  $n$ . Si désormais  $a$  et  $b$  sont deux entiers rationnels tels que  $\zeta_n^a = \zeta_n^b$ , on a alors  $\zeta_n^{a-b} = 1$ . Comme  $\zeta_n$  est primitive, cela implique

$$\bar{a} = \bar{b}.$$

Enfin, cette application est un morphisme de groupes, soient  $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$  dont les images respectives par  $\varphi$  sont  $a_1$  et  $a_2$ . On a

$$\sigma_1 \circ \sigma_2(\zeta_n) = \sigma_1(\zeta_n^{a_2}) = (\sigma_1(\zeta_n))^{a_2} = \zeta_n^{a_1 a_2}$$

et donc

$$\varphi(\sigma_1 \circ \sigma_2) = a_1 a_2 = \varphi(\sigma_1) \varphi(\sigma_2).$$

L'application  $\varphi$  est donc un morphisme de groupes bien défini.

Montrons que c'est un isomorphisme. Comme les ensembles de départ et d'arrivée sont finis, il suffit de montrer l'injectivité. Soit  $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$  un automorphisme d'image  $\bar{1}$ . On a alors

$$\sigma(\zeta_n) = \zeta_n$$

et comme  $\sigma$  fixe  $\mathbb{Q}$ , l'égalité

$$\sigma = \text{Id}.$$

Cela termine la démonstration. □

Démontrons le théorème 4.3.

*Démonstration (du théorème 4.3).* L'entier  $n$  a par hypothèse au moins trois facteurs premiers distincts. D'après le théorème Heath-Brown 4.5, l'un d'entre eux, que nous notons  $p$ , est donc racine primitive modulo  $q$  pour une infinité de nombres premiers  $q$ . Soit  $d_0$  le rang à partir duquel on a

$$p^d - 1 \nmid n^d - 1$$

pour tout entier  $d > d_0$ , donné par le lemme 4.4. On en déduit l'existence d'une infinité de nombres premiers  $q$  (premiers avec  $n$ ) pour lesquels  $p$  est une racine primitive et vérifiant  $q > d_0$ . Fixons un tel nombre  $q$  et

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_q).$$

Soit  $\varphi$  l'isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_q)/\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \mathbb{F}_q^* \\ \sigma & \longmapsto & \bar{a}, \end{array}$$

où  $a$  est un entier rationnel tel que  $\sigma(\zeta_q) = \zeta_q^a$ , donné par le lemme 4.7 pour  $n = q$ . D'après [Kra00, p. 45 relation (23)],  $\varphi$  envoie le Frobenius de  $p$  sur la classe de  $p$  modulo  $q$ . Comme  $p$  est une racine primitive modulo  $q$ , le lemme 4.6 appliqué à  $K/\mathbb{Q}$  et  $\varphi$  prouve que  $p$  est inerte dans  $K$ . En particulier, l'idéal  $p\mathcal{O}_K$  est un idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  divisant  $n\mathcal{O}_K$ . On peut supposer  $d_0 > q - 1$ . On a alors

$$N(p\mathcal{O}_K) - 1 = N_{K/\mathbb{Q}}(p) - 1 = p^{q-1} - 1 \nmid n^{q-1} - 1 = N_{K/\mathbb{Q}}(n) - 1 = N(n\mathcal{O}_K) - 1.$$

Le critère de Korselt généralisé 1.2 et la caractérisation 1.4 permettent d'affirmer que  $n$  n'est pas de Carmichael dans  $K$ , terminant la démonstration.  $\square$

Un nombre de Carmichael ayant toujours au moins trois diviseurs premiers distincts (voir [Dem08, p. 90 prop. 3.35]), il vérifiera toujours les hypothèses du théorème. Ce résultat est donc en théorie bien plus puissant que le théorème 2.1 ([Ste06, th. 2.5]), puisque nous avons vu que le test de primalité naïf qui en découlait ne détectait pas tous les entiers de Carmichael, comme par exemple l'entier de Howe 1.

**Corollaire 4.8** ([Ste06, cor. 3.7]). *Soit  $n$  un entier rationnel composé. Il existe au moins un corps cyclotomique de la forme  $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ ,  $q$  étant premier, de discriminant premier avec  $n$  dans lequel  $n$  n'est pas de Carmichael.*

*Démonstration.* Distinguons trois cas.

- Si  $n$  a un unique facteur premier, étant composé, il a un facteur carré et ne sera jamais de Carmichael, d'après le critère de Korselt généralisé 1.2.
- Si  $n$  a deux uniques facteurs premiers distincts, il n'est pas de Carmichael dans  $\mathbb{Q}$ , le corps cyclotomique  $\mathbb{Q}(\zeta_2)$  (voir [Dem08], Proposition 3.35, p. 90).
- Si  $n$  a au moins trois facteurs premiers distincts, nous appliquons le théorème précédent.

$\square$

Ce corollaire a bien entendu droit à sa réciproque du théorème de Fermat.

**Théorème 4.9** (troisième réciproque). *Soit  $n$  un entier rationnel. Alors  $n$  est premier si, et seulement si, pour tout corps cyclotomique  $K$  de la forme  $K = \mathbb{Q}(\zeta_q)$ , où  $q$  est un nombre premier ne divisant pas  $n$ ,  $n$  n'admet aucun  $K$ -témoin de Fermat.*

**Remarque 4.10.** L'énoncé est faux si  $q$  divise  $n$ . Sous cette hypothèse, l'entier  $q$  se ramifie dans  $\mathbb{Q}(\zeta_q)$  et l'idéal  $n\mathcal{O}_K$  a un facteur carré, ce qui contredit le critère de Korselt 1.2 et la caractérisation 1.4.

*Démonstration.* C'est la conjonction du théorème 1.6 et du corollaire 4.8. □

**Remarque 4.11.** Dans les deux réciproques (théorèmes 4.2 et 4.9) que nous venons de donner, l'hypothèse sur le discriminants est que  $n$  et  $K$  doivent être premiers entre eux. C'est une hypothèse bien plus forte que de demander à ce que  $n$  ne divise pas le discriminant de  $K$  comme dans les corps quadratiques (1.8) et cela permet de tester beaucoup moins de corps.

Passons désormais aux expérimentations numériques.

## 4.2 Expérimentations numériques

Comme dans la section sur les corps quadratiques, nous cherchons ici — pour tout entier  $n$  de la liste  $\mathfrak{C}$  — un corps cyclotomique de la forme  $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ ,  $q$  étant premier, dans lequel il n'est pas de Carmichael et dont le discriminant est premier avec  $n$ . Nous reprenons donc l'algorithme 2.2 et l'utilisons avec les paramètres suivants<sup>13</sup>.

paramètre	valeur
corps testés	corps cyclotomiques de la forme $\mathbb{Q}(\zeta_q)$ où $q$ est un nombre premier dans $\llbracket 3, 300 \rrbracket$ <sup>14</sup>
entiers de Carmichael testés	tous ceux de la liste $\mathfrak{C}$

TABLE 5 – Paramètres des expérimentations du critère de Korselt pour les corps cyclotomiques.

Avec ces paramètres, le critère de Korselt a donné pour chaque élément  $n$  de la liste, plusieurs corps cyclotomiques de discriminant premier avec  $n$  dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael<sup>15</sup>. Pour l'entier  $n = 561$ , nous trouvons par exemple qu'il est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_3)$  mais dans aucun autre corps testé. Cet algorithme permet aussi de prouver que l'entier de Howe 1 est composé! Nous trouvons qu'il est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_3)$  mais dans aucun autre corps testé<sup>16</sup>. En fait, nous avons trouvé très peu de couples  $(n, K)$  où  $n$  est un entier de Carmichael de la liste et  $K$  un corps cyclotomique dans lequel  $n$  est de Carmichael. La liste exhaustive de tels couples est la suivante.

13. Pour l'implémentation, voir la fonction `Carmichael_cyclotomic` du fichier <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/Algorithms.sage>.

15. Les résultats se trouvent tous dans <https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/tree/master/Simulations%20et%20resultats>, sous la forme d'un fichier par entier testé. Par exemple, les résultats pour l'entier 561 se trouvent dans le fichier `561_cyclotomic.txt`.

16. Nous sommes en réalité allés plus loin pour l'entier de Howe et avons testé tous les corps cyclotomiques de la forme  $\mathbb{Q}(\zeta_q)$  où  $q$  est un nombre premier compris entre 3 et 600.

entier de Carmichael	corps cyclotomique dans lequel il est de Carmichael
561	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
2821	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
1729	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
8911	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
15841	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
29341	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
46657	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
52633	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
63973	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
115921	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
126217	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
172081	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
115921	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
188461	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
252601	$\mathbb{Q}(\zeta_5)$
294409	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
488881	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$
512461	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$ et $\mathbb{Q}(\zeta_5)$
entier de Howe	$\mathbb{Q}(\zeta_3)$

TABLE 6 – Liste exhaustive des couples trouvés  $(n, K)$  où  $n$  est un entier de Carmichael et  $K$  un corps cyclotomique dans lequel  $n$  reste de Carmichael.

Voici les faits remarquables à retenir de ces expérimentations.

- Nous n'avons trouvé aucun corps cyclotomique parmi ceux testés dans lequel les entiers suivants sont de Carmichael : 561, 1105, 2465, 6601, 1085, 41041, 62745, 101101, 449065.
- Les autres entiers sont de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_3)$  ou  $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ , mais dans aucun autre corps testé.
- Les deux seuls entiers de Carmichael de la liste de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_5)$  sont 252601 et 512461. Leurs facteurs premiers sont congrus à 1 modulo 5. À noter que nous avons exhibé des entiers rationnels qui ne sont pas de Carmichael, dont tous les facteurs premiers ne sont pas congrus à 1 modulo 5 et qui sont de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ . C'est par exemple<sup>17</sup> le cas de 2047 (qui n'est même pas congru à 1 modulo 5).

---

17. Nous avons exhibé de nombreux tels autres entiers, tous donnés dans le fichier [https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/CarmichaelInQzeta5\\_NotCarmichaelInt\\_PrimeFactorsNot1mod5.txt](https://github.com/kryzar/TER-Carmichael/blob/master/Simulations%20et%20resultats/CarmichaelInQzeta5_NotCarmichaelInt_PrimeFactorsNot1mod5.txt).

- L'entier 512461 est l'unique testé qui soit de Carmichael dans deux corps cyclotomiques à la fois.
- L'entier de Howe est de Carmichael dans  $\mathbb{Q}(\zeta_3)$  (qui est égal au corps quadratique  $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ ) mais dans aucun autre corps testé.

Donnons aussi quelques statistiques.

nombre de corps testés	1857
nombre d'idéaux de Carmichael trouvés dans ces corps	18
proportion d'idéaux de Carmichael trouvés dans ces corps	0,9 %

TABLE 7 – Statistiques des expérimentations du critère de Korselt sur les corps cyclotomiques pour les paramètres 4.2.

Quant aux performances, les calculs sont cependant significativement plus longs dans le cas des corps cyclotomiques que dans le cas des corps quadratiques. Nous donnons ici le temps nécessaire au critère de Korselt pour déterminer si l'entier  $n = 512461$  est de Carmichael dans les corps donnés. On retrouve néanmoins le fait que lesdits temps restent sensiblement proches pour tout entier rationnel (y compris l'entier de Howe) et tout corps cyclotomique testé.

corps cyclotomique	512461 reste de Carmichael dans ce corps	temps de calcul
$\mathbb{Q}(\zeta_7)$	non	0.005 s
$\mathbb{Q}(\zeta_{101})$	non	1.626 s
$\mathbb{Q}(\zeta_{199})$	non	18.9 s
$\mathbb{Q}(\zeta_{293})$	non	38.4 s

TABLE 8 – Temps de calcul du critère Korselt dans les corps cyclotomiques donnés pour l'entier  $n = 512461$ .

## Conclusion

L'article de G.A. Steele propose une extension de la notion d'entier de Carmichael. Nous y retrouvons le petit théorème de Fermat, le critère de Korselt et exposons de précieuses clés pour la détection des entiers de Carmichael. Le théorème, 2.1 tout d'abord, force à faire la distinction entre les nombres de Carmichael et les nombres de Carmichael *rigides* comme l'entier de Howe. Ce dernier indique toutefois que, comme  $\mathbb{Q}$ , les corps quadratiques ne peuvent pas détecter tous les entiers de Carmichael à l'aide du théorème de Fermat. C'est en revanche le cas des corps cyclotomiques : pour tout nombre de Carmichael  $n$ , il existe une infinité de corps cyclotomiques, de discriminant premier avec  $n$ ,

dans lesquels  $n$  n'est pas de Carmichael ; c'est le théorème 4.3. Ces énoncés d'existence n'indiquent cependant pas comment trouver de tels corps ou des témoins de Fermat.

Nos expérimentations numériques ont mis en valeur des tendances allant dans le sens de ces résultats. Les entiers de Carmichael (dans  $\mathbb{Q}$ ) testés restèrent de Carmichael dans environ 24 % des corps quadratiques (2.2) contre moins de 1 % des corps cyclotomiques (4.2). Les versions cyclotomiques du test de Fermat et du critère de Korselt sont deux alternatives vraisemblables pour aboutir à un critère de composition. Le test de Fermat évite d'avoir à décomposer un idéal et le critère de Korselt évite de calculer des témoins de Fermat. Une étude sur la répartition de ces derniers pourrait aider à trancher.

Enfin, les résultats de la section 3 témoignent de notre ignorance actuelle quant au comportement des idéaux de Carmichael et des extensions de corps dans lesquelles ces derniers conservent cette propriété. G.A. Steele a par ailleurs concentré son étude sur des corps bien connus : les corps quadratiques et cyclotomiques. Il y utilise à volonté des outils de théorie algébrique des nombres : ramification, discriminant, et de théorie analytique des nombres : lemmes 3.3 et 3.4 de l'article, théorème de Heath-Brown. Le critère de Korselt est le seul outil propre à la théorie. L'expansion de celle-ci dans une plus grande généralité, pour lui fournir des outils souples et adaptés, semble cruciale son développement.

## Remerciements

Je remercie chaleureusement et sincèrement Alain Kraus, mon encadrant, pour m'avoir proposé un sujet beau et motivant et avoir été très présent. Cette étude m'aura grandement apporté, je ne l'oublierai pas.

## Références

- [AGP94] W. R. ALFORD, A. GRANVILLE et C. POMERANCE : There are infinitely many Carmichael numbers. *Annals of Mathematics*, 139:703–722, 1994.
- [AM] L. M. ADLEMAN et K. S. MCCURLEY : Open problems in number theoretic complexity, ii.
- [BCZ03] Y. BUGEAUD, P. CORVAJA et U. ZANNIER : An upper bound for the g.c.d. of  $a^n - 1$  and  $b^n - 1$ . *Mathematische Zeitschrift*, 243:79–84, 2003.
- [Ber18] G. BERTHUY : *Algèbre : le grand combat*. Calvage & Mounet, 1 édition, 2018.
- [Dem08] M. DEMAZURE : *Cours d'algèbre*. Cassini, 2 édition, 2008.
- [HB86] D. R. HEATH-BROWN : Artin's conjecture for primitive roots. *The Quarterly Journal of Mathematics*, 307:27–38, 1986.



- [Kra00] A. KRAUS : Corps locaux et applications. Cours accéléré de DEA, Université Pierre et Marie Curie, septembre 2000.
- [Sam71] P. SAMUEL : *Théorie algébrique des nombres*. Hermann Paris, 2 édition, 10 1971.
- [Ste06] G. A. STEELE : Carmichael numbers in number rings. *Journal of Number Theory*, 128:910–917, 2006.