

Objet : Compte-rendu fonctionnel de kinésithérapie – Test de marche de 6 minutes

Compte-rendu relatif au test de marche de 6 minutes réalisé chez **Monsieur Sajed Khalid**, né le **13/11/1971**, âgé de **53 ans**, dans le cadre de son suivi en kinésithérapie.

COMPTE-RENDU FONCTIONNEL DE KINÉSITHÉRAPIE

Test de marche de 6 minutes (TM6)

Date et heure du test : 03/02/2026 à 14h30

Lieu : Roubaix

Test réalisé par : Valentin Bauge, masseur-kinésithérapeute, remplaçant de M. Seid Lakrouf

Pathologie connue

Paraparésie spastique secondaire à des séquelles de méningoradiculite tuberculeuse.

Objectifs du test

Évaluer la capacité fonctionnelle à la marche, la tolérance à l'effort prolongé ainsi que la fatigabilité à l'effort.

Conditions de réalisation

Le test a été réalisé sur terrain plat, selon un parcours matérialisé par deux plots espacés de 15 mètres, avec des repères intermédiaires tous les 2 mètres.

Le patient utilisait une canne anglaise comme aide technique.

Les arrêts et ralentissements étaient autorisés.

En l'absence du matériel nécessaire à la réalisation complète du protocole standardisé, seuls les paramètres suivants ont été relevés avant l'effort :

- **Dyspnée (échelle de Borg) :** 0/10
 - **Fatigue (échelle de Borg) :** 2/10
-

Résultats

- **Distance totale parcourue en 6 minutes :** 51 mètres
- **Pause :** une pause assise sur chaise d'une durée de **1 minute et 5 secondes**, en raison d'une fatigabilité importante des membres inférieurs.
- **FC :** 105
- **Dyspnée et fatigue :** 5/10

Observations cliniques

Le test met en évidence une fatigabilité neuromusculaire précoce, associée à une sensation de lourdeur des membres inférieurs, prédominant à droite.

Une diminution progressive de la stabilité dynamique est observée, accompagnée d'une altération de la qualité de la marche, caractérisée par un accrochage du pied droit avec discret fauchage droit.

Le rythme de marche diminue dès la première minute de l'épreuve.

Conclusion

L'effort prolongé met en évidence une diminution marquée de l'endurance à la marche, associée à une fatigabilité précoce et à une altération progressive du schéma de marche, limitant la capacité du patient à maintenir des déplacements continus sans pause.

Le test révèle ainsi une altération significative de la capacité fonctionnelle à la marche et à l'effort.

Complément

D'autre part, monsieur Sajed m'a exprimé son souhait de poursuivre sa prise en charge en kinésithérapie à domicile, à raison de trois séances par semaine, afin de lui simplifier l'organisation des soins. Il décrit en effet un certain découragement lié à l'absence de progrès fonctionnels significatifs malgré son investissement, ainsi qu'aux contraintes importantes engendrées par les déplacements jusqu'au cabinet. Ces déplacements mobilisent une quantité d'énergie conséquente, au détriment de celle pouvant être consacrée aux séances de rééducation elles-mêmes. Une prise en charge à domicile lui semblerait plus adaptée à sa situation actuelle et constituerait, selon lui, un facteur de remobilisation et de motivation dans la poursuite de son traitement.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Valentin Bauge remplaçant de Seid Lakrouf.