

## ANALIZA PRZEŻYCIA

### Lista 3

1. Na podstawie danych opisanych w zadaniu 3 z listy 2, przyjmując, że są one realizacjami zmiennych z rozkładu wykładniczego,
  - (a) wyznaczyć oszacowania największej wiarygodności średniego czasu do remisji choroby dla pacjentów leczonych lekiem A oraz pacjentów leczonych lekiem B,
  - (b) wyznaczyć realizację przedziału ufności, na poziomie ufności  $1-\alpha$ , dla średniego czasu do remisji choroby dla pacjentów leczonych lekiem A oraz pacjentów leczonych lekiem B, przyjmując  $\alpha = 0.05$  i  $\alpha = 0.01$ .
2. Przyjmując w zadaniu 1, że obserwacje czasu do remisji choroby były prowadzone do momentu, w którym u dziesięciu pacjentów zostanie ona zaobserwowana, wyznaczyć oszacowania z punktu (a) i (b) zadania 1.
3. Niech  $X_1, \dots, X_n$  będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie wykładniczym  $\mathcal{E}(\vartheta)$ , tzn. o funkcji gęstości

$$f_{\vartheta}(x) = \vartheta \exp\{-\vartheta x\} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x). \quad (1)$$

Niech  $t_0$  będzie ustalonym czasem obserwacji. Wówczas, na podstawie danych cenzurowanych I-go typu, możemy szacować nieznaną wartość parametru  $\vartheta$  przy użyciu następujących estymatorów

$$\hat{\vartheta} = \frac{R}{T_1}, \quad (2)$$

gdzie

$$R = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i \leq t_0),$$

$$T_1 = \sum_{i=1}^R X_{(i)} + t_0(n - R),$$

oraz

$$\tilde{\vartheta} = -\frac{\log(1 - \frac{R}{n})}{t_0}. \quad (3)$$

W celu porównania dokładności estymatorów określonych wzorami (2) i (3), przeprowadzić symulacje, których wynikiem będzie tabela z oszacowaniami obciążeń  $Bias(\hat{\vartheta}, \vartheta) = E_{\vartheta}(\hat{\vartheta} - \vartheta)$ ,  $Bias(\tilde{\vartheta}, \vartheta) = E_{\vartheta}(\tilde{\vartheta} - \vartheta)$  i błędów średniokwadratowych  $MSE(\hat{\vartheta}, \vartheta) = E_{\vartheta}(\hat{\vartheta} - \vartheta)^2$ ,  $MSE(\tilde{\vartheta}, \vartheta) = E_{\vartheta}(\tilde{\vartheta} - \vartheta)^2$  obu estymatorów, dla wartości  $\vartheta = 1$ ,  $n = 10, 30$  i  $t_0 = 0.5, 1, 2$ .

## Zadania dodatkowe

1. Udowodnić, że statystykę

$$T_2 = \sum_{i=1}^m X_{(i)} + (n-m)X_{(m)} \quad (4)$$

można przedstawić w postaci

$$T_2 = \sum_{i=1}^m D_i, \quad (5)$$

gdzie

$$D_i = (n-i+1)(X_{(i)} - X_{(i-1)}) \quad (6)$$

są tzw. unormowanymi spacjami i przyjmujemy  $X_{(0)} = 0$ . W przypadku obserwacji z rozkładu wykładniczego można pokazać, że  $D_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , określone wzorem (6), są niezależne i mają jednakowy rozkład wykładniczy z parametrem  $\vartheta$ .

2. Załóżmy, że  $X_1, \dots, X_n$  są niezależnymi zmiennymi z rozkładu Rayleigha  $Ra(\sigma)$  o gęstości

$$f_{\sigma}(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x),$$

gdzie  $\sigma > 0$  jest nieznanym parametrem. Podać postać estymatora NW, przedziału ufności dla  $\sigma$  w oparciu o dane cenzurowane I-go typu.

3. Wyznaczyć dokładny rozkład  $\hat{\mu} = 1/\hat{\vartheta}$ , pod warunkiem, że  $R > 0$  (zobacz Bartholomew, 1963).

## Literatura

- [1] Bartholomew, D. J. (1963). *The sampling distribution of an estimate arising on life-testing*. Technometrics, 5:361–374.

Alicja Jokiel-Rokita  
23 września 2025