

## Aussagenlogik

Eine **Aussage** ist ein Satz oder eine Formel, der man genau einen Wahrheitswert zuordnen kann (w: wahr, f: falsch). Befehle oder Fragen sind keine Aussagen.

Statt w und f nutzen wir auch 1 und 0.

Mit **Junktoren** können wir zusammengesetzte Aussagen bilden.

- Negation -  $\neg$  - nicht
- Konjunktion -  $\wedge$  - und
- Disjunktion -  $\vee$  - oder (nicht ausschließend)
- Kontravalenz -  $\oplus$  - xor - entweder...oder - ausschließendes oder -  $\dot{\vee}$ ,  $\dot{\vee}$
- Implikation -  $\Rightarrow$  - wenn...dann
- Äquivalenz -  $\Leftrightarrow$  - genau dann, wenn

## Wahrheitstabellen

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \oplus q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ | $\neg p$ |
|-----|-----|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 0   | 0   | 0            | 0          | 0            | 1                 | 1                     | 1        |
| 0   | 1   | 0            | 1          | 1            | 1                 | 0                     | 1        |
| 1   | 0   | 0            | 1          | 1            | 0                 | 0                     | 0        |
| 1   | 1   | 1            | 1          | 0            | 1                 | 1                     | 0        |

## Gesetze der Aussagenlogik

$$p \Leftrightarrow \neg(\neg p)$$

doppelte Negation

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

Kommutativgesetze

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

Assoziativgesetze

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r)$$

Distributivgesetze

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

DeMorgansche Regeln

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p$$

Kontrapositionsregel

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

Sonstige

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$$

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$$

$\neg$  bindet stärker als  $\vee$  und  $\wedge$  und diese binden stärker als  $\Rightarrow$ ,  $\Leftrightarrow$ .

## Prädikatenlogik

$\forall x \in X : p(x)$  Für alle  $x$  aus  $X$  ist die Aussage  $p(x)$  wahr.

$\exists x \in X : p(x)$  Es gibt mindestens ein  $x$  aus  $X$  für das die Aussage  $p(x)$  wahr ist.

## Prädikatenlogische Verneinungsregeln

$$\neg(\forall x \in X : p(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X : \neg p(x)$$

$$\neg(\exists x \in X : p(x)) \Leftrightarrow \forall x \in X : \neg p(x)$$

Quantoren können auch hintereinander stehen:

$$\neg(\forall x \in X \exists y \in Y : p(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \in X \forall y \in Y : \neg p(x, y)$$