



การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม

พว.ศิริชล เนตรสว่าง
(งานการพยาบาล
ผ่าตัด)


TKA. (TOTAL KNEE ARTHROPLASTY)

ગોડૈ 125 – 130
ઑવર્



TKA. (TOTAL KNEE ARTHROPLASTY)

MOBILE BEARING



TKA. (TOTAL KNEE ARTHROPLASTY)

MIS-TKA.

Minimal invasive surgery total knee arthroplasty

Which approach in total knee arthroplasty?




Medial parapatellar
approach

versus

Minimally invasive

ARTHRITIS

- Age
- Sex
- Obesity
- genetic
- Repetitive knee injury



ARTHRITIS IS

**Rheumatoid
arthritis**

**Pannus
formation**



©MMG 2000

ARTHRITIS

IS



A side-by-side comparison of a person's knee. The left knee is significantly swollen, red, and shiny, indicating an acute gout attack. The right knee is normal in size and color. The text 'Gout Knee' is overlaid on the left knee.

Gout Knee



TREATMEN

T

1. Conservative treatment

- Non-medication treatments
- Medication treatments

บริหารข้อเข่า พิชิตเข่าเสื่อม

4 ท่าบริหารไกลข้อเสื่อม

นั่งชิดเก้าอี้ เหยียดเข่าตรง กระดกปลายเท้าขึ้น
เกร็งค้างนับ 1-10 แล้ววางลง
ทำสลับกันทั้ง 2 ข้าง ซ้ำละ 20 ครั้ง



ท่าที่ 1




ท่าที่ 2

นั่งชิดเก้าอี้ แล้วไขว้ขา โดยขาบนกดขาล่าง
และขาล่าง เหยียดขึ้นด้านขาบน เกร็งค้าง
นับ 1-10 ทำสลับกัน ทั้ง 2 ข้าง ซ้ำละ 20 ครั้ง

นอนหงาย กระดกปลายเท้าขึ้นลง
เกร็งค้าง นับ 1-10 ทำสลับกัน
ทั้ง 2 ข้าง ซ้ำละ 20 ครั้ง



ท่าที่ 3



ท่าที่ 4

นอนหงาย ใช้หมอนรองใต้เข่าด้านขวา
เหยียดเข่าซ้ายยกสูงประมาณ 1 ฟุต
เกร็งค้างไว้ นับ 1-10 แล้วทำสลับกัน

ศูนย์จอร์โรปิดส์
1474
www.siphospital.com
piyamaharajkarun



การปฏิบัติตัว ในโรคข้อเข่าเสื่อม

ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักมาก

ประคบอุ่น ลดการปวดเกร็ง

ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเข่า

ลดการนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่า

ใช้ไม้เท้าพยุง ช่วยลดการกดน้ำหนัก

อาจมีการใช้ส้นเข่าได้เพื่อลดอาการปวด

หากปวดมากกว่า 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์

บทความสุขภาพ โรคข้อเข่าเสื่อม



Wellness

ระวัง! ทำนั่ง
เร่งเข่าเสื่อม

นั่งขัดสมาธิ ❌


นั่งพับเพียบ ❌

นั่งยอง ๆ ❌

นั่งคุกเข่า ❌

นั่งบนเก้าอี้ ✅

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ Wellness 086-2565599 @wellnessth https://wellnessth.com



ฉีดยาข้อเข่า

ทางเลือกเพื่อลดอาการ
ข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด



การฉีดน้ำเลี้ยง ข้อเข่าเทียม

สารไฮยาลูรอนิก
เป็นคอลลาเจนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน
ข้อเข่าตามธรรมชาติ เป็นตัวหล่อลื่น
และดูดซับแรงกระแทกให้กับ
กระดูกอ่อนข้อเข่าช่วยลดอาการอักเสบ
ทำให้ข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีขึ้น
เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ระยะแรกไปจนถึงปานกลาง

การฉีดพลาสมา เกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP)


รักษาโดยใช้เลือดของผู้ป่วยของ
มาบิให้ได้พลาสมาเกล็ดเลือด
และฉีดกลับเข้าไปในจุดที่บาดเจ็บช่วย
ลดอาการบาดเจ็บและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของข้อเข่า เหมาะกับผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มแรกของ
โรคข้อเข่าเสื่อมจนถึงระดับปานกลาง

การฉีดยาในข้อเข่าแต่ละแบบ ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน


TREATMENT

2. Surgical treatment

- Unicompartmental knee arthroplasty




- Total knee arthroplasty



ถึงเวลาเปลี่ยนข้อเข่าเทียม??





PRE - ADMISSION NURSE





PREOPERATIVE ASSESSMENT



PREOPERATIVE ASSESSMENT



OR DEDICATION



OR PREPARATION



OR PREPARATION



INTRA-OPERATIVE PHASE






INTRA-OPERATIVE PHASE



INTRA-OPERATIVE PHASE





INTRA-OPERATIVE PHASE



INTRA-OPERATIVE PHASE



INTRA-OPERATIVE PHASE




INTRA-OPERATIVE PHASE






**INTRA-OPERATIVE
PHASE**



INTRA-OPERATIVE PHASE



การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด

- $SpO_2 > 98\%$
- O_2 5 lit/min



1481135981

POST-OPERATIVE CARE

Verbal report

- Patient's identification
- Operation
- Side
- Allergy
- Vital signs
- Anaesthetic
- IV fluid
- Bleeding
- Urine



POST-OPERATIVE CARE



THANK YOU







ออกกำลังกายหลัง
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า