Stage Laboratoire E3S

Kossi ABOTSI

June 13, 2024

Introduction

La question de recherche est d'examiner les conditions qui augmentent ou diminuent les différences entre les sexes dans l'engagement dans l'activité physique pendant les cours d'éducation physique, dans le cadre écologique.

Kossi ABOTSI Stage Laboratoire E3S June 13, 2024 2 / 15

Objectif

Notre objectif dans ce stage est d'examiner les écarts de MVPA (moderate to vigorous physical activity) des filles et garçons mesurés au cours d'une leçon d'EPS de 2h au regard de quatres variables : le sexe, la nature de l'activité (CA = champ d'apprentissage), la catégorie socioculturelle de l'établissement (catégorie d'IPS = indice de position sociale) et la catégorie socioprofessionnelle des parents (CSP).

Kossi ABOTSI Stage Laboratoire E3S June 13, 2024 3 / 15

Données

Pour atteindre nos objectifs, nous disposons de mesures de MVPA des élèves de différentes classes dont nous connaissons aussi le sexe, la nature de l'activité effectuée, la catégorie socioculturelle de l'établissement et la catégorie socioprofessionnelle du père et de la mère. Au total on a notre disposition 462 observations.

Kossi ABOTSI Stage Laboratoire E3S June 13, 2024 4 / 15

Questions à répondre et Modèle à utiliser

- Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon les CA (CA1, CA2, CA3, CA4).
- Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon la catégorie d'IPS du collège (élevé, moyen, faible).
- Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon le milieu géographique (urbain, rural).
- Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon le CSP des parents.

Dans ces 4 questions, nous voulons expliquer une variable quantitative continue en fonction de deux variables qualitatives. Donc le modèle statistique adapté est une ANOVA à deux facteurs avec interaction.

Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon les CA (CA1, CA2, CA3, CA4) Partie 1

ANOVA à deux facteurs :

- Variables dépendantes : écart de MVPA de chaque élève à la moyenne de sa classe
- Variables indépendantes qualitatives : genre, CA et interaction entre genre et CA

Les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité des résidus du modèle étant vérifiées, on peut regarder les résultats.

6/15


Résultats de l'ANOVA

Significativité de l'effet de l'interaction

	CA1	CA2	CA3	CA4
Écart entre fille et garçon				
des écarts à la moyenne de	-4.4548	-1.4898	-1.7470	-9.7647
MVPA dans chaque classe				
Intervalle de confiance	-12.010 à	-6.4730 à	-6.759 à	-13.286 à
	3.100	3.493	3.265	-6.244
P-valeur	0.6235	0.9850	0.96	0.000

Table: Tableau des écarts, intervalles de confiance et p-valeurs pour chaque classe (CA1 à CA4)

Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon les CA (CA1, CA2, CA3, CA4) Partie 2



Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon les CA (CA1, CA2, CA3, CA4) Partie 3 : Taille d'effets

Parameter	Omega2 (partial)	95% CI
gender	0.05	[0.02, 1.00]
CA	0.00	[0.00, 1.00]
gender:CA	0.05	[0.02, 1.00]

Table: Omega2 (partial) avec intervalle de confiance

- La taille d'effet pour le facteur genre est 0.05, ce qui signifie que 5% de la variance totale de la variable dépendante (écart_MVPA) peut être attribuée à l'effet du genre.
- La taille d'effet pour l'interaction entre genre et CA est 0.05, ce qui signifie que 5% de la variance totale de la variable dépendante (écart_MVPA) peut être attribuée à l'effet de l'interaction.

9/15

Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon la catégorie d'IPS du collège (élevé, moyen, faible)

ANOVA à deux facteurs :

- Variables dépendantes : écart de MVPA de chaque élève à la moyenne de sa classe.
- Variables indépendantes qualitatives : genre, catégorie d'IPS du collège et interaction entre genre et catégorie d'IPS.

Les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité des résidus du modèle étant vérifiées, on peut regarder les résultats.

Kossi ABOTSI Stage Laboratoire E3S June 13, 2024 10 / 15

Résultat de l'ANOVA

- Interaction non significative.
- La catégorie d'IPS du collège n'est pas également significative.

	Faible	Moyen	Élevé
Écart entre fille et garçon			
des écarts à la moyenne de	-5.57	-5.57	-5.57
MVPA de chaque classe			
Intervalle de confiance	-7.13 à -4.01	-7.13 à -4.01	-7.13 à -4.01
P-valeur	0.000	0.000	0.000

Table: Tableau des écarts, intervalles de confiance et p-valeurs selon la catégorie d'IPS

Donc l'IPS_categorie n'a aucune influence sur les écarts de MVPA à la moyenne de chaque classe des filles et garçons et aussi dans toutes ces catégories les garçons ont les écarts à la moyenne de mvpa significativement supérieur à celui des filles.

Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon le milieu géographique (urbain, rural) Partie 1

ANOVA à deux facteurs :

- Variables dépendantes : écart de MVPA de chaque élève à la moyenne de sa classe.
- Variables indépendantes qualitatives : genre, milieu géographique et interaction entre genre et milieu géographique.

Les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité des résidus du modèle étant vérifiées, on peut regarder les résultats.

Kossi ABOTSI Stage Laboratoire E3S June 13, 2024 12 / 15


Résultats de l'ANOVA

Significativité de l'effet de l'interaction

	Rural	Urbain
Écart entre fille et garçon des écarts à la moyenne de MVPA de chaque classe	-2.44	-8.06
Intervalle de confiance	-5.49 à 0.602	-10.761 à -5.350
P-valeur	0.1650	0.000

Table: Tableau des écarts, intervalles de confiance et p-valeurs selon le milieu géographique

Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon le milieu géographique (urbain, rural) Partie 2



Les écarts de MVPA entre filles et garçons selon le milieu géographique (urbain, rural) Partie 3

	Omega2 (partial)	95% CI
gender	0.09	[0.05, 1.00]
Geographie	0.00	[0.00, 1.00]
gender:Geographie	0.02	[0.01, 1.00]

Table: Tableau des Omega2 (partial) et intervalles de confiance pour chaque paramètre

- La taille d'effet pour le facteur gender est 0.09 ce qui signifie que 9% de la variance totale de la variable dépendante (écart_MVPA) peut être attribuée à l'effet du genre.
- La taille d'effet pour l'interaction entre genre et Geographie est 0.02 ce qui signifie que 2% de la variance totale de la variable dépendante (écart_MVPA) peut être attribuée à l'effet de l'interaction.