

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 클리닉

[단원: 교과서 p.110~135 좌표평면과 그래프 핵심 확인 5제]

과 목	수학	일 시	2026년 2학기 중간	학 년	중학교 1학년	이 름	
-----	----	-----	--------------	-----	---------	-----	--

[제 1 교시] 수학 영역 (4. 좌표평면과 그래프 집중 클리닉)

문제지 (1 / 2)

01. 정비례 관계 $y = -2/5x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원점 $(0, 0)$ 을 지나고 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ④ 점 $(-5, -2)$ 를 지난다.
- ⑤ 정비례 관계 $y = -3x$ 의 그래프보다 y 축에 더 가깝다.


02. 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 두 점 $A(m, 15)$, $B(-3, n)$ 을 지난다. $a = -5$ 일 때, $m + n$ 의 값은?

- ① -18 ② -12 ③ 6 ④ 12 ⑤ 18

03. 반비례 관계 $y = a/x$ 의 그래프가 두 점 $P(3, -8)$, $Q(b, 6)$ 을 지난다. 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① -28 ② -20 ③ -12 ④ 20 ⑤ 28

04. 그림과 같이 정비례 관계 $y = 2x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = a/x$ ($a > 0$)의 그래프가 제1사분면의 점 P 에서 만난다. 점 P 의 x 좌표가 3일 때, 점 P 의 y 좌표를 b , 상수 a 에 대하여 $a + b$ 의 값은?



① 24


② 26

③ 28

④ 30

⑤ 32

05. 그림과 같이 네 점 $A(2, 1)$, $B(6, 1)$, $C(6, 5)$, $D(2, 5)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 $ABCD$ 의 넓이를 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 이등분할 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)



① $1/4$

② $1/3$

③ $1/2$

④ $2/3$

⑤ $3/4$

2026학년도 중1 수학 [1:1 맞춤형 오답 클리닉 정답 및 정밀 해설집]

학생 오답 원인 1:1 진단 • 실수 방지 공식 • 시험장 1초 해법 수록

[해설편] 빠른 정답표 및 문항별 1:1 오답 클리닉 (01~03번)

해설지 (1 / 2)

클리닉 문항	01번	02번	03번	04번	05번
원본 문항	08번 (④선택)	09번 (④선택)	12번 (미체크)	14번 (④정답!)	15번 (미체크)
클리닉 정답	③	④ (12)	② (-20)	① (24)	⑤ (3/4)

클리닉 01번 해설 [원본 08번 1:1 쌍둥이]

정답: ③

[오답 진단 — 왜 원본 08번에서 ④번을 골라 틀렸을까?]

- 원본 08번에서 학생이 고른 ④번은 "정비례 관계 $y = -3/4x$ 는 $y = -2x$ 보다 y 축에 더 가깝다"였습니다.
- 음수 부호 때문에 $-3/4 > -2$ 라고 단순 비교하여 생긴 오답입니다. 축과의 거리는 부호를 뺀 절댓값 $|a|$ 로만 판정하며, $|a|$ 가 클수록 경사가 가팔라져 y 축(세로축)에 가깝고, $|a|$ 가 작을수록 완만해져 x 축(가로축)에 가깝습니다!

단계별 정답 도출 과정

1. $y = -2/5x$ 에서 비례상수 $a = -2/5 < 0$ 이므로 원점을 지나고 오른쪽 아래로 향하며(① 거짓), 제2사분면과 제4사분면을 지납니다(② 거짓).
2. $a < 0$ 이므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소합니다 (③번 참 — 정답).
3. $x = -5$ 를 대입하면 $y = (-2/5) \times (-5) = +2$ 이므로 점 $(-5, 2)$ 를 지납니다(④ 거짓).
4. 절댓값 비교: $|-2/5| = 2/5 < |-3| = 3$ 이므로 절댓값이 큰 $y = -3x$ 가 y 축에 더 가깝습니다(⑤ 거짓).

클리닉 02번 해설 [원본 09번 1:1 쌍둥이]

정답: ④ (12)

[오답 진단 — 왜 원본 09번에서 ④번(-10)을 골라 틀렸을까?]

- 원본 09번($y = -3x$)에서 점 $A(m, 12)$ 를 대입해 $m = -4$ 까지는 정확히 구했으나, 점 $B(-2, n)$ 을 대입할 때 $n = (-3) \times (-2) = +6$ 을 부호 실수로 -6 으로 계산하여 $(-4) + (-6) = -10$ (④번)을 골랐습니다.
- [실수 방지 규칙] 음수 계수에 음수 좌표를 대입할 때는 반드시 괄호를 쳐서 (음수) $\times$ (음수) = +(양수)로 바꾸세요!

단계별 정답 도출 과정

1. $a = -5$ 이므로 정비례 관계식은 $y = -5x$ 입니다.
2. 점 $A(m, 15)$ 대입: $15 = -5m \Rightarrow m = 15 \div (-5) = -3$.
3. 점 $B(-3, n)$ 대입: $n = (-5) \times (-3) = +15$.
4. 따라서 구하는 값은 $m + n = (-3) + 15 = 12$ (④번)입니다.

클리닉 03번 해설 [원본 12번 1:1 쌍둥이]

정답: ② (-20)

[미해결 진단 — 왜 원본 12번을 체크하지 못했을까?]

- 반비례 분수식 $y = a/x$ 에 숫자를 그대로 넣으면 분수 방정식이 되어 헷갈립니다.
- [절대 안 틀리는 1초 공식] 반비례 $y = a/x$ 가 나오면 분수로 풀지 말고 무조건 양변에 x 를 곱한 $x \times y = a$ (두 좌표의 곱 = 일정) 공식으로 바꾸어 푸세요!

단계별 정답 도출 과정

1. 반비례 그래프 위의 모든 점은 (x좌표) $\times$ (y좌표) = a 가 일정합니다.
2. 점 $P(3, -8)$ 에서 두 좌표를 곱하면 곧바로 a 가 나옵니다: $a = 3 \times (-8) = -24$.
3. 점 $Q(b, 6)$ 도 같은 그래프 위의 점이므로 두 좌표의 곱이 -24 입니다: $b \times 6 = -24 \Rightarrow b = -4$.
4. 따라서 $a - b = -24 - (-4) = -24 + 4 = -20$ (②번)입니다.

클리닉 04번 해설 [원본 14번 1:1 쌍둥이]

정답: ① (24)

[원본 14번 채점 정정 안내 및 교점 2단계 해법]

- [채점 확인] 원본 모의고사(110-135) 14번의 실제 정답은 학생이 체크한 ④번(18)이 정답 맞습니다! ($P(2, b)$ 를 $y=3x$ 에 대입하면 $b=6$, $P(2, 6)$ 을 $y=a/x$ 에 대입하면 $a=12 \Rightarrow a+b=18$).
- [교점 문제 불변의 법칙] 두 그래프가 만나는 점(교점) P 는 식이 완성된 그래프($y=2x$)에 먼저 대입해 좌표를 구한 뒤, 그 좌표를 미지수가 있는 그래프($y=a/x$)에 대입하면 100% 풀립니다.

단계별 정답 도출 과정

1. [1단계: 정비례 식에 대입하여 b 구하기]

점 $P(3, b)$ 는 직선 $y = 2x$ 위의 점이므로 $x = 3, y = b$ 를 대입하면:

$$b = 2 \times 3 = 6 \Rightarrow \text{교점 } P \text{의 완성된 좌표는 } P(3, 6) \text{입니다.}$$

2. [2단계: 반비례 식에 대입하여 a 구하기]

교점 $P(3, 6)$ 은 반비례 곡선 $y = a/x$ 위의 점이기도 하므로 곱 일정 법칙($x \times y = a$)을 쓰면:

$$a = 3 \times 6 = 18.$$

3. [3단계: 합 구하기] $a + b = 18 + 6 = 24$ (①번).

클리닉 05번 해설 [원본 15번 1:1 쌍둥이]

정답: ⑤ (3/4)

[미해결 진단 — 왜 원본 15번을 체크하지 못했을까?]

- 직사각형 넓이를 직선 $y = ax$ 가 이등분한다는 조건을 수식으로 바꾸는 법을 몰랐기 때문입니다.
- 아래 [시험장 1초 중심점 공식]과 [정석 사다리꼴 넓이 풀이] 두 가지를 모두 익혀 두면 어떤 변형 문제도 즉시 풀 수 있습니다!

풀이법 1 : 시험장 1초 암산 공식 (직사각형 대각선 교점 통과 법칙)

1. 직사각형 $ABCD$ 의 넓이를 이등분하는 모든 직선은 무조건 직사각형의 정중앙 점(두 대각선의 교점 = 가로와 세로의 중점)을 지나야 합니다!
2. 가로($x = 2 \sim 6$)의 중점은 $(2 + 6)/2 = 4$, 세로($y = 1 \sim 5$)의 중점은 $(1 + 5)/2 = 3$ 이므로 중심점의 좌표는 $M(4, 3)$ 입니다.
3. $y = ax$ 에 $(4, 3)$ 을 대입하면 $3 = 4a \Rightarrow a = 3/4$ (⑤번)이 1초 만에 나옵니다! (원본 15번도 가로 2~4의 중점 3, 세로 1~3의 중점 2인 중심점 $(3, 2)$ 를 대입하면 $2 = 3a \Rightarrow a = 2/3$ 완성!)

풀이법 2 : 정석 사다리꼴 넓이 공식 (서술형 대비)

1. 직사각형 $ABCD$ 의 가로 길이는 $6 - 2 = 4$, 세로 길이는 $5 - 1 = 4$ 이므로 전체 넓이 = $4 \times 4 = 16$ 이며, 이등분된 아래쪽 사다리꼴의 넓이는 절반인 8입니다.
2. 직선 $y = ax$ 가 왼쪽 변 $AD(x = 2)$ 와 만나는 점은 $(2, 2a)$, 오른쪽 변 $BC(x = 6)$ 와 만나는 점은 $(6, 6a)$ 입니다.
3. 아래쪽 사다리꼴의 왼쪽 세로변 길이는 $2a - 1$, 오른쪽 세로변 길이는 $6a - 1$, 높이는 4이므로:
 $1/2 \times \{(2a - 1) + (6a - 1)\} \times 4 = 8 \Rightarrow 2(8a - 2) = 8 \Rightarrow 8a = 6 \Rightarrow a = 3/4$ (⑤번).

[시험 직전 최종 점검] 오답 0%를 만드는 4단원 3대 불변 공식

1. [정비례 경사도 공식] $y = ax$ 에서 음수 부호는 무시하고 절댓값 $|a|$ 가 클수록 y 축에 가깝다! ($|-3| = 3 > |-2/5| = 2/5$)
2. [반비례 곱 일정 공식] $y = a/x$ 가 보이면 분수로 풀지 말고 무조건 $(x \text{ 좌표}) \times (y \text{ 좌표}) = a$ 로 바꾸어 곱한다!
3. [직사각형 넓이 이등분 공식] 직선 $y = ax$ 가 직사각형 넓이를 이등분하면 무조건 직사각형의 중심점 $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ 을 대입한다! (원본 15번: 중심 $(3, 2) \Rightarrow a = 2/3$, 클리닉 05번: 중심 $(4, 3) \Rightarrow a = 3/4$)