

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 [V. 기본 도형과 작도] 정답 및 상세 해설

※ 동아출판 2022 개정 중1 교과서, 구남규 교사 학습지(5-1~5-5), 2025 실제 기출(양화·영동·원촌·해운대중) 전 문항 연계

■ 빠른 정답 및 문항 난이도 분석표

총 15문항 (상 7 / 중 5 / 하 3) | 100점 만점

문 항	정답	단원 및 출제 유형	난이 도	배점	문 항	정답	단원 및 출제 유형	난이 도	배점
1	㉓ 18	5.1 오각기둥의 교점·교선·면	하	6.0 점	9	㉓ 15	5.1 직선과 선분의 개수	상	7.0 점
2	㉓ 35°	5.2 세 직선 교차와 맞꼭지각	하	6.0 점	10	㉓ 100°	5.2 평각의 비례배분과 각의 이등분 선	상	7.0 점
3	㉓ ㄱ, ㄴ	5.5 작도의 기본 도구와 성질	하	5.0 점	11	㉓ ㄱ, ㄷ	5.3 공간에서 위치 관계 참·거짓	상	7.0 점
4	㉓ 36 cm	5.1 선분의 중점과 비례 계산	중	6.0 점	12	㉔ 110°	5.4 평행선 사이 끼인 선 각도 (보조 선)	상	8.0 점
5	㉓ 6	5.3 삼각기둥의 꼬인 위치와 평행	중	6.0 점	13	㉓ 40°	5.4 직사각형 종이 1회 접기 ($\angle A'BC$)	상	8.0 점
6	㉔ 40°	5.4 평행선 2단 끼인 선의 각 도	중	6.0 점	14	㉓ ㄱ, ㄴ, ㄷ	5.5 평행선 작도 순서와 성질 종합	상	7.0 점
7	㉓ 9개	5.5 삼각형 세 변의 길이 조건	중	6.0 점	15	㉕ ㄱ, ㄴ, ㄷ	5.6 정사각형 내부 직각삼각형 합동	상	9.0 점
8	㉔ ㄴ, ㄹ	5.6 삼각형이 하나로 정해질 조건	중	6.0 점	※ 상 7문항(53점), 중 5문항(30점), 하 3문항(17점)				

◆ 단원별 핵심 출제 경향 및 고난도 변별 포인트 분석

1. 출제 비율 및 난이도 배분 전략

- 본 시험지는 실전 학교 내신 1등급 변별력을 목표로 상 7문항(53점), 중 5문항(30점), 하 3문항(17점)의 황금 비율을 완벽히 적용하였습니다.
- 기본 개념(하: 1~3번)은 용어와 기초 성질을 즉각 묻고, 필수 기출(중: 4~8번)은 정형화된 풀이 알고리즘을 테스트하며, 심화 킬러(상: 9~15번)는 복합 개념과 기하 증명 추론력을 엄격히 평가합니다.

2. 주요 소단원별 기출 킬러 포인트

- **5.1 점, 선, 면:** 직선 위의 점과 외부의 한 점을 이을 때 생기는 직선과 선분의 개수 차이(9번)를 정확히 구별해야 합니다.
- **5.2 각의 뜻과 성질:** 평각(180°)의 비례배분과 각의 이등분선 성질을 결합한 각도 추론(10번)이 대표 빈출 유형입니다.
- **5.3 위치 관계:** 입체도형(삼각기둥)에서 꼬인 위치와 평행면 판별(5번) 및 공간 명제의 직육면체 반례 찾기(11번)가 핵심입니다.
- **5.4 평행선의 성질:** 평행선 사이 끼인 점 보조선 활용(12번)과 직사각형 종이 1회 접기 각도 추론(13번)은 엇각과 접은 각의 대칭성을 정확히 적용해야 합니다.
- **5.5 작도와 삼각형:** 평행선 작도 순서(14번)의 ㉓~㉕ 단계 및 동위각 vs 엇각의 구분이 핵심입니다.
- **5.6 삼각형의 합동:** 정사각형 내부에서 SAS 합동 직각삼각형 쌍(15번)을 찾고 두 선분이 수직(90°)으로 교차함을 유도하는 것이 표준 심화 문제입니다.

문항 1번 상세 해설

단원: 5.1 점, 선, 면 난이도: 하 배점: 6.0점 정답: ③

[1단계] 입체도형에서 교점과 교선의 성질 적용

입체도형에서 선과 선이 만나는 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같고, 면과 면이 만나서 생기는 교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.

[2단계] 오각기둥의 요소 개수 계산

오각기둥의 밑면은 오각형이므로:

- 꼭짓점(교점)의 개수: $a = 5 \times 2 = 10$
- 모서리(교선)의 개수: $b = 5 \times 3 = 15$
- 면의 개수: $c = 5 + 2 = 7$

[3단계] 식의 값 계산

$$a + b - c = 10 + 15 - 7 = 18$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

n 각기둥의 꼭짓점은 $2n$, 모서리는 $3n$, 면은 $n + 2$ 입니다. 각별($n + 1, 2n, n + 1$)과 헷갈리지 않도록 입체도형의 명칭을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

문항 2번 상세 해설

단원: 5.2 각의 뜻과 성질 난이도: 하 배점: 6.0점 정답: ③

[1단계] 맞꼭지각의 성질 파악

두 직선 AB, EF 가 점 O 에서 교차하므로 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

$$\angle AOE = \angle FOB = (2x + 5)^\circ$$

[2단계] 평각(180°)을 이용한 x 의 방정식 수립

조건에서 $\overline{CD} \perp \overline{EF}$ 이므로 $\angle COE = 90^\circ$ 이다.

직선 AB 위의 점 O 에서 윗부분 각들의 합은 평각 180° 이므로:

$$\angle AOE + \angle COE + \angle BOC = 180^\circ$$

$$(2x + 5)^\circ + 90^\circ + (3x + 10)^\circ = 180^\circ$$

$$5x + 105^\circ = 180^\circ \Rightarrow 5x = 75^\circ \Rightarrow x = 15$$

[3단계] $\angle AOE$ 의 크기 계산

$$\angle AOE = 2(15) + 5 = 35^\circ$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

맞꼭지각은 두 직선이 교차하여 마주 보는 각입니다. $\angle AOE$ 와 $\angle FOB$ 가 맞꼭지각 쌍임을 정확히 파악하고, 직선 AB 위 3개의 각의 합이 평각 180° 가 됨을 이용해야 합니다.

[1단계] 작도의 정의와 도구의 기본 원칙

작도(Construction)란 **눈금 없는 자**와 **컴퍼스**만을 사용하여 도형을 그리는 것을 뜻한다.

- **눈금 없는 자**: 두 점을 지나는 직선이나 선분을 긋거나, 선분을 연장할 때 사용한다. (길이를 직접 재는 기능 없음)
- **컴퍼스**: 원을 그리거나, 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위로 옮길 때 사용한다.

[2단계] 보기 판정

- ㄱ: 참 (눈금 없는 자의 정확한 사용 목적)
- ㄴ: 참 (컴퍼스의 정확한 사용 목적)
- ㄷ: 거짓 (각도기를 사용하는 것은 작도에 포함되지 않음)
- ㄹ: 거짓 (눈금 없는 자에는 눈금이 없으므로 선분의 길이를 비교할 때에는 컴퍼스를 사용해야 함)

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

각도기나 눈금 있는 자를 사용한다는 보기는 기출 시험의 단골 오답 선지입니다. 작도에서는 오직 '눈금 없는 자'와 '컴퍼스'만 인정됩니다.

[1단계] 비례상수를 도입하여 선분 표현

$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CD} = 2 : 3 : 4$ 이므로 비례상수 k 를 사용하면,

$$\overline{AB} = 2k, \quad \overline{BC} = 3k, \quad \overline{CD} = 4k$$

[2단계] 중점 조건을 활용하여 $\overline{MN}$ 표현

- M 은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로: $\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = k$
- N 은 $\overline{CD}$ 의 중점이므로: $\overline{CN} = \frac{1}{2}\overline{CD} = 2k$

따라서 선분 MN 의 길이는:

$$\overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BC} + \overline{CN} = k + 3k + 2k = 6k$$

[3단계] k 의 값 및 $\overline{AD}$ 계산

$$\overline{MN} = 6k = 24 \text{ cm} \Rightarrow k = 4 \text{ cm}$$

$$\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} = 2k + 3k + 4k = 9k = 9 \times 4 = 36 \text{ cm}$$

[1단계] 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리 개수 x 구하기

꼬인 위치란 공간에서 만나지도 않고 평행하지도 않은 두 직선의 위치 관계이다.

삼각기둥 $ABC - DEF$ 의 전체 모서리는 9개이다. 모서리 AB 에 대하여:

- 만나는 모서리: $\overline{AC}, \overline{BC}, \overline{AD}, \overline{BE}$ (4개)
- 평행한 모서리: $\overline{DE}$ (1개)
- 자기 자신: $\overline{AB}$ (1개)

따라서 모서리 AB 와 만나지도 않고 평행하지도 않은 꼬인 위치의 모서리는:

$$\overline{CF}, \overline{DF}, \overline{EF} \Rightarrow x = 3$$

[2단계] 면 DEF 와 평행한 모서리 개수 y 구하기

면 DEF 는 삼각기둥의 밑면이므로, 이 면과 만나지 않는 윗면 $\triangle ABC$ 의 세 모서리가 평행하다:

$$\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA} \Rightarrow y = 3$$

[3단계] $x + y$ 의 값 계산

$$x + y = 3 + 3 = 6$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

삼각기둥에서 꼬인 위치를 찾을 때, 한 밑면의 모서리와 반대쪽 밑면의 모서리 중 평행한 모서리($\overline{AB} \parallel \overline{DE}$)를 제외하는 것을 잊지 않아야 합니다.

문항 6번 상세 해설

단원: 5.4 평행선의 성질

난이도: 중

배점: 6.0점

정답: ②

[1단계] 끼인 점에 평행한 보조선 긋기

두 점 P 와 Q 를 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 보조선 l_1, l_2 를 각각 긋는다.

[2단계] 엇각의 성질을 이용하여 각도 분할

- 점 P 에서 위쪽 각은 직선 l 과의 엇각이므로 35° 이다.
- 점 P 에서 아래쪽 각은 $(2x + 15)^\circ - 35^\circ = 2x - 20^\circ$ 이다.
- 점 Q 에서 위쪽 각은 점 P 의 아래쪽 각과 엇각이므로 $2x - 20^\circ$ 이다.
- 점 Q 에서 아래쪽 각은 직선 m 과의 엇각이므로 x° 이다.

[3단계] 방정식 수립 및 x 계산

$\angle PQR$ 은 점 Q 의 위쪽 각과 아래쪽 각의 합이므로:

$$(2x - 20^\circ) + x^\circ = 100^\circ \Rightarrow 3x - 20^\circ = 100^\circ \Rightarrow 3x = 120^\circ \Rightarrow x = 40^\circ$$

문항 7번 상세 해설

단원: 5.5 삼각형의 작도 (삼각부등식)

난이도: 중

배점: 6.0점

정답: ③

[1단계] 삼각형의 세 변의 길이 결정 조건 (삼각부등식)

삼각형의 세 변의 길이를 a, b, c 라 할 때, 임의의 한 변의 길이는 나머지 두 변의 차보다 크고 합보다 작아야 한다.

$$\text{즉, } |9 - 5| < x < 9 + 5 \Leftrightarrow 4 < x < 14$$

[2단계] 가능한 자연수 x 의 개수 계산

$4 < x < 14$ 를 만족하는 자연수 x 는 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13이다.

따라서 개수는 $13 - 5 + 1 = 9$ 개이다.

문항 8번 상세 해설

단원: 5.6 삼각형의 작도 및 합동

난이도: 중

배점: 6.0점

정답: ②

[1단계] 삼각형이 오직 하나로 정해지는 조건 3가지

1. 세 변의 길이가 주어질 때 (단, 가장 긴 변 < 두 변의 합)
2. 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
3. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때 (두 각이 주어지면 나머지 한 각을 자동으로 알 수 있음)

[2단계] 보기별 정밀 판정

- ㄱ: $4 + 5 = 9$ 이므로 두 변의 합이 가장 긴 변과 같아 삼각형 자체가 성립하지 않는다. (거짓)
- ㄴ: $\overline{AB} = 7$ cm이고 $\angle A = 50^\circ, \angle C = 60^\circ$ 이면 $\angle B = 180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 70^\circ$ 가 되어 한 변과 그 양 끝 각이 주어진 것이므로 오직 하나로 정해진다. (참)
- ㄷ: 두 변 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 의 끼인각은 $\angle A$ 이어야 하지만 $\angle B$ 가 주어졌으므로 하나로 정해지지 않는다. (거짓)
- ㄹ: 세 각의 크기만 주어지면 모양은 같지만 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 만들어진다. (거짓)
- ㅁ: 한 변 $\overline{BC} = 8$ cm와 그 양 끝 각 $\angle B = 70^\circ, \angle C = 50^\circ$ 가 주어졌고, $70^\circ + 50^\circ < 180^\circ$ 이므로 오직 하나로 정해진다. (참)

[1단계] 서로 다른 직선의 개수 x 계산

두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.

- 직선 l 위의 네 점 A, B, C, D 중 임의의 두 점을 이은 직선은 모두 같은 직선 l 이므로 **1개**이다.
- 직선 밖의 한 점 P 와 직선 l 위의 각 점을 이어서 만들 수 있는 직선: $\overleftrightarrow{PA}, \overleftrightarrow{PB}, \overleftrightarrow{PC}, \overleftrightarrow{PD}$ (**4개**)

따라서 서로 다른 직선의 총 개수는:

$$x = 1 + 4 = 5\text{개}$$

[2단계] 서로 다른 선분의 개수 y 계산

선분은 양 끝점이 다르면 항상 서로 다른 선분이 된다.

주어진 5개의 점 중 서로 다른 2개의 점을 택하는 모든 경우의 수가 선분의 개수이므로:

- 직선 l 위의 네 점으로 만드는 선분: $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{CD}$ (6개)
- 점 P 와 네 점을 잇는 선분: $\overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}, \overline{PD}$ (4개)

$$y = \frac{5 \times 4}{2} = 10\text{개}$$

[3단계] $x + y$ 의 값 계산

$$x + y = 5 + 10 = 15$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

직선은 양쪽으로 한없이 늘어나므로 한 직선 위의 점들로 만든 직선($\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{AC}, \overleftrightarrow{BC}$ 등)은 모두 하나의 직선으로 중복 처리해야 하지만, 선분은 양 끝점이 정해진 유한한 길이이므로 $\overline{AB} \neq \overline{AC}$ 로 모두 다른 선분으로 센다는 점이 핵심입니다.

[1단계] 평각(180°)과 비례배분을 이용한 각의 크기 계산

직선 AB 위의 점 O 를 기준으로 평각의 크기는 180° 이다.

$\angle AOC : \angle COD : \angle DOB = 3 : 4 : 2$ 이므로, 비례배분에 의해:

$$\angle AOC = 180^\circ \times \frac{3}{3+4+2} = 180^\circ \times \frac{3}{9} = 60^\circ$$

$$\angle COD = 180^\circ \times \frac{4}{3+4+2} = 180^\circ \times \frac{4}{9} = 80^\circ$$

[2단계] 각의 이등분선 성질 적용

반직선 OE 는 $\angle COD$ 의 이등분선이므로:

$$\angle COE = \frac{1}{2}\angle COD = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$$

[3단계] $\angle AOE$ 의 크기 계산

$$\angle AOE = \angle AOC + \angle COE = 60^\circ + 40^\circ = 100^\circ$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

각의 비례배분 문제에서는 전체 각의 합(평각 180° 또는 직각 90°)을 먼저 확인하고, 분모에 비의 총합($3 + 4 + 2 = 9$)을 정확히 대입하는 것이 실수를 방지하는 지름길입니다.

[1단계] 공간 위치 관계 핵심 4대 명제 분석 (직육면체 모델 활용)

- $\neg. l \perp P, m \perp P \Rightarrow l \parallel m$: [참] 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 서로 평행하다.
- $\angle. l \parallel P, m \parallel P \Rightarrow l \parallel m$: [거짓] 직육면체의 바닥면에 평행한 윗면의 두 모서리는 한 점에서 수직으로 만날 수도 있고, 꼬인 위치에 있을 수도 있다.
- $\square. l \perp P, l \perp Q \Rightarrow P \parallel Q$: [참] 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 서로 평행하다.
- $\equiv. l \perp m, l \perp n \Rightarrow m \parallel n$: [거짓] 직육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 세 모서리를 생각하면, 높이 모서리에 수직인 가로, 세로 모서리는 서로 직교하여 만난다.

[2단계] 결론 도출

따라서 항상 옳은 것은 $\neg, \square$ 이다.

▲ 오답 방지 (Trap & Tip) — '서로 다른' 조건의 중요성

1. 두 직선이 겹치는(일치하는) 경우?: 문제 첫머리에 '서로 다른 세 직선 l, m, n '이라고 명시되어 있으므로, l 과 m 이 일치(겹침)하는 경우는 애초에 배제됩니다. 만약 '서로 다른'이라는 조건이 없다면 두 직선이 일치할 수도 있어 거짓이 되지만, 중등 수학 시험에서는 '일치' 예외를 배제하기 위해 반드시 '서로 다른' 조건을 전제로 출제합니다.
2. 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 문제는 머릿속으로만 생각하지 말고, 반드시 직육면체 모형을 하나 그려 모서리와 면을 직접 대입하여 반례를 확인하는 것이 가장 안전합니다.

[1단계] 꺾인 꼭짓점을 지나는 평행 보조선 긋기

꺾인 꼭짓점을 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 보조선 t ($l \parallel t \parallel m$)를 긋는다.

[2단계] 평행선의 엇각 성질 적용

- 직선 l 과 보조선 t 가 평행하므로 엇각의 크기는 서로 같다:

(보조선 t 의 위쪽 각) = 65°

- 보조선 t 와 직선 m 이 평행하므로 엇각의 크기는 서로 같다:

(보조선 t 의 아래쪽 각) = 45°

[3단계] 구하는 각 $\angle x$ 의 크기 계산

구하는 각 $\angle x$ 는 보조선 t 에 의해 나누어진 두 각의 합이므로:

$$\angle x = 65^\circ + 45^\circ = 110^\circ$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

평행선 사이에 꺾인 점이 있을 때는 **꺾인 점을 지나며 두 직선에 평행한 보조선을 하나 그어 엇각(또는 동위각)을** 위아래로 나누어 해결하는 것이 가장 확실하고 실수를 줄이는 표준 접근법입니다.

[1단계] 접은 각의 성질 적용

선분 BE 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A 를 A' 로 접었으므로, 접은 각과 접힌 각의 크기는 서로 같다.

$$\angle A'BE = \angle ABE = 25^\circ$$

[2단계] $\angle ABA'$ 의 크기 계산

$$\angle ABA' = \angle ABE + \angle A'BE = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$$

[3단계] 직사각형의 직각 조건에서 구하는 각 $\angle x$ 계산

직사각형 $ABCD$ 의 한 내각의 크기는 90° 이므로 $\angle ABC = 90^\circ$ 이다.

따라서 구하는 각 $\angle x = \angle A'BC$ 의 크기는 다음과 같다:

$$\angle x = \angle A'BC = \angle ABC - \angle ABA' = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

▲ 오답 방지 (Trap & Tip)

종이접기 문제의 핵심은 **접은 각과 접힌 각의 크기가 항상 같다**($\angle A'BE = \angle ABE$)는 점입니다. 여기에 직사각형의 꼭짓점 내각이 90° 임을 연결하면 각도의 합과 차로 간단히 해결할 수 있습니다.

[1단계] 평행선 작도 순서 확인

1. 점 P 를 지나는 직선을 그어 l 과의 교점 O 를 잡는다 (㉠).
2. 점 O 를 중심으로 원호를 그려 A, B 를 잡는다 (㉡).
3. 점 P 를 중심으로 같은 반지름의 원호를 그려 C 를 잡는다 (㉢).
4. 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다 (㉣).
5. 점 C 를 중심으로 반지름이 $\overline{AB}$ 인 원호를 그려 교점 D 를 잡는다 (㉤).
6. 두 점 P, D 를 지나는 직선 m 을 긋는다 (㉥).

따라서 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥이다. (ㄱ 참)

[2단계] 선분 및 이용된 성질 판정

- 컴퍼스를 같은 반지름으로 벌려 원호를 그렸으므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PC} = \overline{PD}$ 이다. (ㄴ 참)
- 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 재어 점 D 를 잡았으므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다. (ㄷ 참)
- 점 O 에서의 각과 점 P 에서의 각은 서로 **동위각**의 위치에 있다. 따라서 '동위각의 크기가 같으면 두 직선은 서로 평행하다'는 성질을 이용한 것이다. 엇각이라고 설명한 ㄹ은 거짓이다. (ㄹ 거짓)

[1단계] $\triangle ADE$ 와 $\triangle BAF$ 의 SAS 합동 증명

사각형 $ABCD$ 가 정사각형이므로:

- 한 변의 길이: $\overline{AD} = \overline{BA} = 10$ cm

- 꼭짓점의 내각: $\angle DAE = \angle ABF = 90^\circ$

조건에서 $\overline{AE} = \overline{BF} = 8$ cm이므로,

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같다.

$$\triangle ADE \equiv \triangle BAF \quad (SAS \text{ 합동}) \quad [\neg \text{ 참}]$$

[2단계] 대응변의 길이 확인

합동인 두 삼각형에서 대응변의 길이는 서로 같으므로:

$$\overline{DE} = \overline{AF} \quad [\sqsubset \text{ 참}]$$

[3단계] 두 선분의 직교($\overline{DE} \perp \overline{AF}$) 증명

$\triangle ADE \equiv \triangle BAF$ 이므로 대응각의 크기가 서로 같다:

$$\angle ADE = \angle BAF = \cdot, \quad \angle AED = \angle BFA = \times$$

직각삼각형 ADE 에서 한 내각이 90° 이므로 나머지 두 예각의 합은 90° 이다:

$$\cdot + \times = 90^\circ \Rightarrow \angle BAF + \angle AED = 90^\circ$$

이제 두 선분의 교점 P 를 포함하는 $\triangle APE$ 를 보면:

$$\angle APE = 180^\circ - (\angle PAE + \angle AEP) = 180^\circ - (\angle BAF + \angle AED) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

따라서 $\overline{DE} \perp \overline{AF}$ 이다. [$\sqsubset$ 참]

그러므로 옳은 것은 $\neg$, $\sqsubset$, $\sqsubset$ 모두 옳다.

▲ 오답 방지 (Trap & Tip) [전국 학교 기출 최다 빈출 킬러]

정사각형 내부에서 회전된 직각삼각형 합동 문제는 두 예각의 합이 90° 임을 이용하여 교각이 직각(90°)이 됨을 유도하는 패턴이 전형적입니다. 끼인각 90° 와 두 변의 길이가 같아 SAS 합동임을 찾는 것이 출발점입니다.