

# Spis treści

1.	<i>Wprowadzenie</i> . . . . .	1
1.1	Streszczenie . . . . .	1
1.2	Abstract . . . . .	1
1.3	Cel pracy . . . . .	1
1.4	Układ pracy . . . . .	1
2.	<i>Wstęp</i> . . . . .	3
2.1	Procesy nowotworowe . . . . .	3
2.2	Budowa układu immunologicznego i jego znaczenie w procesie leczenia nowotworów . . . . .	3
2.2.1	Limfocyty $T_{CD8+}$ . . . . .	5
2.2.2	Komórki NK . . . . .	6
2.2.3	Interferony . . . . .	6
2.2.4	Interleukiny . . . . .	6
2.3	Sposoby leczenia nowotworów . . . . .	7
2.3.1	Immunoterapia . . . . .	7
2.3.2	Chemioterapia . . . . .	8
2.3.3	Leczenie skojarzone . . . . .	8
3.	<i>Model</i> . . . . .	10
3.1	Opis modelu . . . . .	10
3.2	Założenia modelu . . . . .	11
3.3	Równania modelu . . . . .	12
3.4	Interpretacja równań modelu . . . . .	12
3.4.1	Równanie $\frac{dT}{dt}$ . . . . .	12
3.4.2	Równanie $\frac{dN}{dt}$ . . . . .	13
3.4.3	Równanie $\frac{dL}{dt}$ . . . . .	13
3.4.4	Równanie $\frac{dC}{dt}$ . . . . .	14
3.4.5	Równanie $\frac{dM}{dt}$ . . . . .	14
3.4.6	Równanie $\frac{dI}{dt}$ . . . . .	14

---

3.4.7	Równanie $\frac{dI_\alpha}{dt}$ . . . . .	14
3.5	Parametry modelu . . . . .	14
4.	<i>Symulacje</i> . . . . .	17
4.1	Brak leczenia . . . . .	17
4.1.1	Warunki początkowe . . . . .	17
4.2	Leczenie metodą immunoterapii . . . . .	18
4.3	Leczenie metodą chemioterapii . . . . .	18
4.4	Połączenie metod immunoterapii i chemioterapii . . . . .	18
5.	<i>Rezultaty</i> . . . . .	19
6.	<i>Analiza wyników</i> . . . . .	20
7.	<i>Podsumowanie</i> . . . . .	21

# Spis rysunków

2.1	Podział limfocytów T [7]. . . . .	5
4.1	Symulacja odpowiedzi układu immunologicznego na nowotwór, dla warunków początkowych: początkowa liczba komórek nowotworowych $T(0) = 1 \cdot 10^6$ , początkowa liczba komórek NK $N(0) = 1 \cdot 10^5$ , początkowa liczba limfocytów $T_{CD8+}$ $L(0) = 1 \cdot 10^2$ , początkowa liczba krążących limfocytów $C(0) = 6 \cdot 10^{10}$ . . . . .	17
4.2	Symulacja odpowiedzi układu immunologicznego na nowotwór, dla warunków początkowych: początkowa liczba komórek nowotworowych $T(0) = 1 \cdot 10^6$ , początkowa liczba komórek NK $N(0) = 1 \cdot 10^3$ , początkowa liczba limfocytów $T_{CD8+}$ $L(0) = 1 \cdot 10^1$ , początkowa liczba krążących limfocytów $C(0) = 6 \cdot 10^8$ . . . . .	18

# Spis tabel

2.1	Podział mechanizmów obronnych odporności nieswoistej i swoistej [7]. .	4
3.1	Parametry modelu. . . . .	15

# 1. Wprowadzenie

## 1.1 Streszczenie

W pracy przedstawiono model opisujący odpowiedź układu immunologicznego na rozwijający się w organizmie nowotwór. Model ten oparty jest na modelu de Pillis'a oraz modelu Isaeva i Osiopov'a [1]. Obejmuje on rozwój komórek nowotworowych w organizmie oraz odpowiedź układu immunologicznego – w tym limfocytów naciekających nowotwór (ang. Tumor Infiltrating Lymphocytes (TIL)), komórek NK (ang. Natural Killer cells - naturalni zabójcy), limfocytów  $T_{CD8+}$ . Następnie model zostaje poddany modyfikacji – uwzględnia dodatkowo proces leczenia nowotworu skojarzonymi metodami chemioterapii i immunoterapii z użyciem cytokin: interleukin-2 (IL-2) i interferonów alfa (INF- $\alpha$ ).

## 1.2 Abstract

## 1.3 Cel pracy

Celem pracy było:

- utworzenie modelu rozwoju nowotworu w organizmie z uwzględnieniem leczenia skojarzonymi metodami chemioterapii i immunoterapii,
- przeprowadzenie symulacji leczenia nowotworu metodą chemioterapii, immunoterapii oraz skojarzonych metod chemioterapii i immunoterapii,
- analiza rozwiązań modelu opisującego leczenie wyłącznie metodą chemioterapii,
- analiza rozwiązań modelu opisującego leczenie wyłącznie metodą immunoterapii,
- analiza rozwiązań modelu opisującego leczenie zarówno metodą chemioterapii, jak i immunoterapii.

## 1.4 Układ pracy

Praca składa się z następujących części:

- 
- wstępu teoretycznego zawierającego informacje na temat rodzajów nowotworów i sposobów ich rozwoju oraz niektórych metod ich leczenia, a także dotyczących budowy i sposobu działania układu immunologicznego,
  - przedstawienia zaimplementowanego modelu, na którym przeprowadzano symulacje,
  - opisu dokonanych symulacji i scenariuszy, według których zostały przeprowadzone,
  - analizy wyników symulacji i wynikających z nich wniosków,
  - podsumowania.

## 2. Wstęp

### 2.1 Procesy nowotworowe

Nowotworem określa się nieprawidłowe komórki w organizmie, których wzrost odbywa się w sposób niekontrolowany [1,2]. W zdrowym organizmie występuje równowaga pomiędzy tempem podziałów komórkowych a utratą komórek. W przypadku nowotworu ginie mniej komórek niż przybywa [3]. W efekcie ich spontanicznego mnożenia się struktura, która się z nich składa zaczyna niszczyć narząd, w którym wystąpił proces nowotworowy. Niektóre z tych komórek mogą oderwać się od pozostałych, przedostać do naczyń krwionośnych i limfatycznych, a w konsekwencji dawać przerzuty do innych narządów [2]. Powstawanie nowotworu wiąże się z wieloma zmianami materiału genetycznego. Rozpoczęcie tego procesu zależy zarówno od wagi, jak i miejsca, w którym dana zmiana wystąpiła. Warto zwrócić uwagę na zmiany systemów naprawy DNA oraz systemów regulujących podstawowe procesy komórek (na przykład wzrost, różnicowanie, apoptoza<sup>1</sup>). Na skutek zmian systemów naprawczych dochodzi do szybkiej i dużej niestabilności genomu, natomiast w przypadku zmian w systemach regulujących proces zaburzenia homeostazy komórki jest powolny, a niestabilność narasta stopniowo. Choroby nowotworowe w większości rozwijają się zgodnie z powolnym mechanizmem, dlatego od pojawienia się początkowej zmiany do klinicznego ujawnienia guza mija zazwyczaj wiele lat [3].

### 2.2 Budowa układu immunologicznego i jego znaczenie w procesie leczenia nowotworów

Na układ immunologiczny składają się mechanizmy odporności swoistej (nabytej) i nieswoistej (wrodzonej) [4,5]. Podział tych mechanizmów przedstawiono w Tab. 2.1.

Funkcjonowanie mechanizmów nieswoistych jest niezależne od wcześniejszej styczności organizmu z czynnikami patogennymi i pełni funkcję obronną przed infekcjami i chorobami będącymi skutkiem działania czynników środowiskowych. Mechanizmy te cechuje mniejsza precyzja, ale są one zdolne do szybkiego rozpoznawania i niszczenia wnikaających drobnoustrojów. Odporność wrodzoną warunkują między innymi: komórki NK, makrofagi, granulocyty, monocyty.

Do mechanizmów swoistej odporności należą [6]:

- aktywność cytokin i chemokin,

---

<sup>1</sup> Śmierć programowana, śmierć samobójcza komórki zachodząca w warunkach fizjologicznych [12].

- cytokinozależna wrodzona oporność leukocytów i innych komórek,
- zabijanie zakażonych lub nowotworowych komórek przez komórki NK, komplement aktywowany lektynami lub drogą alternatywną,
- opsonizacja i fagocytoza<sup>2</sup>.

Odporność swoista rozpoznaje antygeny bardzo precyzyjnie. Jej ważnymi elementami są limfocyty T, limfocyty B, cytokiny, przeciwciała. Komórki tego typu są zdolne do wytwarzania nieograniczonej liczby receptorów. Dodatkowo, jeśli dojdzie do ich kontaktu z antygenem wytwarza się pamięć immunologiczną, dzięki której przy ponownym zetknięciu komórki danego typu z odpowiednim antygenem wytwarzana jest odpowiedź immunologiczna. W przypadku limfocytów T, typ odpowiedzi swoistej określany jest jako komórkowy, natomiast dla limfocytów B – humoralny. Pomimo bardzo dużego znaczenia układu immunologicznego dla organizmu, wiele mechanizmów jego działania pozostaje jeszcze niewyjaśnionych [4].

**Tab. 2.1:** Podział mechanizmów obronnych odporności nieswoistej i swoistej [7].

Odporność		
	Nieswoista (wrodzona)	Swoista (nabyta)
Humoralna	Lizozym Laktoferyna Transferyna Białka ostrej fazy Układ dopełniacza Interferony	Immunoglobuliny Limfocyty B
Komórkowa	Fagocyty Eozynofile Komórki K Komórki NK	Limfocyty T

Znaczącą rolę w oddziaływaniu układu immunologicznego na rozwijający się nowotwór mają takie jego elementy, jak:

- limfocyty  $T_{CD8+}$ ,
- komórki NK,
- interferony,
- interleukiny.

W związku z tym, ich funkcję w organizmie ujęto w opisywanym modelu, a ich znaczenie opisano w dalszej części pracy.

<sup>2</sup> Usuwanie kompleksów immunologicznych i uszkodzonych komórek (ułatwienie fagocytozy immunologicznej). Efektywne niszczenie drobnoustrojów przez fagocyty [13, 14].




### 2.2.1 Limfocyty $T_{CD8+}$

Limfocyty T wytwarzane są w szpiku kostnym, natomiast dojrzewają w grasicy. Te oznaczane jako CD8+ dzielą się na limfocyty:

- $T_c$  – cytotoksyczne – odpowiadające za niszczenie komórek i odrzucanie przeszczepów,
- $T_s$  – supresyjne – odpowiadające za hamowanie działania innych limfocytów, reakcji alergicznych i utrzymanie tolerancji immunologicznej na własne antygeny [7].

Odpowiedź immunologiczna swoista typu komórkowego, w którą zaangażowane są subpopulacje limfocytów T polega na wywołaniu reakcji zwalczania antygeny. Możliwe są dwa typy tej reakcji. W pierwszym z nich funkcję efektorów pełnią limfocyty CD4+, a makrofagi są komórkami pomocniczymi. Drugi typ reakcji zakłada, że limfocyt cytotoksyczny CD8+ jest komórką efektorową, a limfocyt CD4+ pomocniczą. Podział limfocytów T przedstawiono na Rys. 2.1. Odporność komórkowa ma za zadanie, przede wszystkim walczyć z zakażeniami będącymi efektem namnażających się drobnoustrojów, ale również spełnia ważną rolę w reakcji kontaktowej ze związkami chemicznymi, odrzuceniu przeszczepu czy tkanek zmienionych nowotworowo i w niektórych reakcjach autoimmunologicznych [4]. Między 5 a 6 dekadą życia ustaje czynność grasicy, czego skutkiem są zmiany w subpopulacjach limfocytów T. Z wiekiem głównie wzrasta liczba limfocytów CD4+, natomiast zmniejsza się liczba limfocytów supresorowych i cytotoksycznych CD8+ [4].



Rys. 2.1: Podział limfocytów T [7].

### 2.2.2 Komórki NK

Swoją rolę w odpowiedzi immunologicznej mają także komórki NK, które pochodzą z prekursorów dojrzewających w szpiku kostnym [7]. Stanowią one 10-15% limfocytów obecnych w krwi. Ich zadaniem jest niszczenie komórek nowotworowych i zainfekowanych wirusami [5]. Charakterystyczny jest dla nich brak posiadania markerów czy receptorów antygenowych na powierzchni. Ich działanie wpływa na cytotoksyczne uszkodzenie, między innymi komórek nowotworowych. Jest to możliwe dzięki rozpoznawaniu przez receptor pektynowy reszt cukrowych, co wpływa na gotowość komórek NK do zabicia komórki docelowej. Z kolei receptor KIR (Killer Cell Inhibitory Receptor) zmniejsza aktywność komórek NK, jeśli rozpoznają one prawidłowe komórki organizmu [4]. Z wiekiem aktywność komórek NK spada (ze względu na zwiększoną liczbę receptorów KIR [5]), co zwiększa ryzyko umieralności z powodu ciężkich infekcji. Niekorzystnymi czynnikami mającymi wpływ na komórki NK są: stres, niska aktywność fizyczna oraz dieta wysokotłuszczowa [4]. Silna aktywność cytotoksyczna komórek NK może być uznana za oznakę dobrego zdrowia [5].

### 2.2.3 Interferony

Interferony należą do humoralnych mechanizmów obronnych odporności nieswoistej. Ich funkcją jest, między innymi hamowanie replikacji wirusów w komórce i proliferacji komórek (w szczególności nowotworowych), aktywowanie syntezy enzymów (rybonukleazy, syntetazy, kinazy białkowej) i cytotoksyczności makrofagów oraz limfocytów T, a także wzmoczenie aktywności komórek cytotoksycznych [7].

### 2.2.4 Interleukiny

Interleukiny są jedną z grup cytokin, która służy, między innymi do komunikacji pomiędzy komórkami układu odpornościowego, stanowiącymi elementy odporności wrodzonej i nabytej. Mają one charakter białkowy i są produkowane głównie przez leukocyty. Ze względu na cechy biologiczne, w tym różnice w budowie molekularnej i strukturze, interleukiny zostały zgrupowane w trzy rodziny:

- pierwszą – podzieloną na podrodzinę interleukiny-2 i podrodzinę interferonów (reprezentowaną przez interferon- $\alpha$  i interferon- $\beta$ ),
- drugą – rodzinę interleukiny-1,
- trzecią – zawierającą interleukinę 17A, B, C, D, F oraz IL-8, 25 i 27, a także IL-31, 32 i 33 [8].

## 2.3 Sposoby leczenia nowotworów

### 2.3.1 Immunoterapia

Podczas immunoterapii dochodzi do ingerencji w układ odpornościowy, co ma na celu wzmocnienie lub modyfikację mechanizmów obronnych walczących z nowotworem. Immunoterapię można podzielić na bierną i czynną o charakterze swoistym albo nieswoistym [10].

#### *Nieswoista bierna immunoterapia*

Immunoterapia tego typu ma za zadanie wywołać nieswoistą aktywację układu immunologicznego, a w konsekwencji działanie przeciwnowotworowe na skutek podawania czynników lub aktywowanych komórek efektorowych. Wykorzystuje się tu, na przykład cytokiny czy komórki LAK (ang. Lymphokine Activated Killers). Aby wywołać efekt biologiczny konieczne jest połączenie cytokiny ze swoistym receptorem na komórkach docelowych (limfocyty T i B, komórki NK, monocyty, makrofagi i granulocyty). Efektami przeciwnowotworowymi cytokin są:

- bezpośredni efekt cytotoksyczny,
- modyfikacja migracji limfocytów,
- wzrost wrażliwości komórek nowotworowych na efekty cytotoksyczne różnych czynników biologicznych lub chemicznych,
- hamowanie proliferacji komórek nowotworowych (m. in.  $\text{INF-}\alpha$ ),
- aktywacja komórek NK (m. in. IL-2).

$\text{INF-}\alpha$  to pierwsza rekombinowana cytokina zarejestrowana do stosowania klinicznego [10].

#### *Swoista bierna immunoterapia*

Swoista bierna immunoterapia to metoda, która polega na podawaniu czynników lub komórek efektorowych swoście skierowanych przeciwko danej komórce nowotworowej. Są to, na przykład:

- przeciwciała podawane przeciwko antygenom, które występują na komórkach nowotworowych,
- terapie komórkowe, które wykorzystują limfocyty naciekające guz (TIL); są one izolowane, następnie namnożone i aktywowane, po czym ponownie przetaczane,
- limfocyty krwi obwodowej stymulowane in vitro komórkami prezentującymi antygen [10].

### *Nieswoista czynna immunoterapia*

W metodzie tej pobudzany jest układ odpornościowy, a zwłaszcza odpowiedź komórkowa. Wykorzystywane są do tego antygeny, niewystępujące w komórkach nowotworu. Substancjami stymulującymi procesy odpornościowe są nieswoiste immunostymulatory (np. całe mikroorganizmy, elementy ściany komórkowej) i immunomodulatory (m. in. wyciągi z grasicy, syntetyczne hormony grasicy, tuftsynę, enkefaliny, endorfiny, wyciągi z limfocytów) [10].

### *Swoista czynna immunoterapia*

Ostatni rodzaj leczenia metodą immunoterapii polega na pobudzaniu odporności na antygeny swoiste dla danego typu nowotworu. Wykorzystuje się w niej immunizację przy użyciu tzw. terapeutycznych szczepionek nowotworowych. Są to szczepionki:

- niekomórkowe – peptydowe, HSP (ang. Heat Shock Protein – szczepionki na bazie białek szoku cieplnego), szczepionki DNA oraz wirusowe,
- komórkowe – niemodyfikowane i modyfikowane genetycznie oraz komórki DC (ang. Dendritic Cells – komórki dendrytyczne) „karmione” antygenami nowotworowymi [10].

## **2.3.2 Chemioterapia**

Chemioterapia to metoda leczenia, która polega na niszczeniu komórek nowotworowych, drobnoustrojów, bakterii za pomocą środków chemicznych. W przypadku nowotworów, stosuje się różne grupy leków, tzw. cytostatyków. Zależnie od indywidualnych cech pacjenta ma ona ściśle określony przebieg. Leki mogą być stosowane w monoterapii – stosowanie jednego leku cytostatycznego lub polichemioterapii – stosowanie kilku leków zgodnie z określonym schematem. Leki podawane są w sekwencjach – co kilka dni, tygodni lub stale, bez przerwy w leczeniu. Leki cytostatyczne działają w określonych fazach podziału komórek nowotworowych – zmniejszają lub spowalniają ich proliferację. Najczęściej podawane są w postaci dożylnych wlewów, lecz niektóre z nich mają formę tabletek. Skutki uboczne chemioterapii mogą być liczne i zauważalne już po kilku dniach terapii, a czasem nawet po kilku godzinach [9].

## **2.3.3 Leczenie skojarzone**

Leczenie skojarzone polega na połączeniu kilku metod leczniczych u pacjenta. Ten sposób terapii posiada wiele zalet, między innymi umożliwia wykonanie zabiegu operacyjnego w wielu przypadkach pierwotnie nieoperacyjnych i pozwala zastąpić okaleczające zabiegi chirurgiczne równie skutecznym leczeniem zachowawczym. Ponadto, zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej choroby i rozwoju odległych przerzutów, co wpływa na wydłużenie czasu przeżycia chorych. Z drugiej strony, leczenie skojarzone ma

również pewne wady takie, jak znaczne zwiększenie toksyczności w porównaniu z monoterapią czy brak współpracy między specjalistami, co z kolei sprawia trudności w przeprowadzeniu optymalnego w danym przypadku leczenia.

Wśród metod leczenia skojarzonego można wyróżnić:

- leczenie sekwencyjne – poszczególne metody lecznicze stosowane są po kolei, np.:
  - leczenie wstępne (neoadiuwantowe, indukcyjne) — poprzedza leczenie radykalne. Jego celem jest wczesne oddziaływanie na mikroprzerzuty lub zmniejszenie masy guza u chorych z miejscowo zaawansowanym nowotworem i umożliwienie tym samym przeprowadzenia leczenia radykalnego;
  - uzupełniające (adiuwantowe) — stosowane jest po leczeniu radykalnym, czyli u osób bez cech choroby nowotworowej, u których ryzyko uogólnienia jest duże. Jego celem jest zniszczenie potencjalnie istniejących mikroprzerzutów i zmniejszenie tym samym prawdopodobieństwa nawrotu nowotworu;
- leczenie równoczesne — kojarzenie różnych metod leczenia w tym samym czasie, na przykład równoczesna chemioradioterapia, napromienianie śródoperacyjne;
- leczenie naprzemienne — dotyczy kojarzenia radioterapii i chemioterapii [11].

W tej pracy omawiany jest przypadek leczenia skojarzoną metodą chemioterapii i immunoterapii, zwanej także biochemioterapią [1].

## 3. Model

### 3.1 Opis modelu

Model matematyczny wykorzystany w pracy oparto na modelu de Pillis'a oraz modelu Isaeva i Osiopov'a [1]. W pierwszym etapie obejmuje on tempo rozwoju czterech populacji komórek:

- $T(t)$  – liczba komórek nowotworowych w chwili czasowej  $t$ ,
- $N(t)$  – liczba komórek NK w chwili czasowej  $t$ ,
- $L(t)$  – liczba limfocytów  $T_{CD8+}$  w chwili czasowej  $t$ ,
- $C(t)$  – liczba limfocytów krążących w chwili czasowej  $t$ ,

gdzie jednostką czasu  $t$  jest dzień.

W drugim etapie model zostaje poddany modyfikacji i dodatkowo badane są zmiany stężenia trzech podawanych leków:

- $I(t)$  – interleukin-2,
- $I_\alpha(t)$  – interferonów- $\alpha$ ,
- $M(t)$  – cytostatyku użytego w chemioterapii.

W równaniach modelu uwzględniono takie czynniki, jak:

- naturalny rozwój i śmierć komórek,
- śmierć komórek nowotworowych pod wpływem komórek NK, limfocytów  $T_{CD8+}$  i leków chemioterapeutycznych,
- wytwarzanie komórek NK i limfocytów  $T_{CD8+}$ ,
- dezaktywację komórek NK i limfocytów  $T_{CD8+}$ ,
- ilość podawanych leków i czas, w którym zostały podane.

## 3.2 Założenia modelu

Przyjęto założenia jak w połączonym modelu de Pillis'a oraz modelu Isaeva i Osio-pov'a [1]:

1. W przypadku braku odpowiedzi układu immunologicznego liczba komórek nowotworowych wzrasta logistycznie.
2. Limfocyty NK i  $T_{CD8+}$  są zdolne zniszczyć komórki nowotworu.
3. Pod wpływem komórek nowotworowych limfocyty NK i  $T_{CD8+}$  ulegają rozszerzeniu się oraz wzrasta ich aktywność cytolityczna.
4. Limfocyty NK są zawsze obecne w organizmie, także w przypadku braku występowania komórek nowotworowych.
5. Jako część specyficznej odpowiedzi immunologicznej aktywne limfocyty  $T_{CD8+}$  są obecne w dużej liczbie tylko w przypadku obecności komórek nowotworowych.
6. Limfocyty NK i  $T_{CD8+}$  ulegają całkowitej dezaktywacji po pewnej ilości interakcji z komórkami nowotworowymi.
7. Komórki nowotworowe dezaktywują się pod wpływem interferonów  $\alpha$ .
8. Poziom krążących limfocytów może służyć do oceny zdrowia pacjenta.
9. Odsetek komórek nowotworowych zabitych w wyniku chemioterapii zależy od ilości leku obecnego w organizmie. Maksymalny odsetek zabitych komórek wynosi mniej niż 1 – pokonanie komórek nowotworowych wskutek chemioterapii jest możliwe tylko na niektórych etapach ich rozwoju.
10. Część limfocytów NK,  $T_{CD8+}$  i krążących jest również zabijana podczas chemioterapii, zgodnie z krzywą zabijania.
11. Limfocyty NK i  $T_{CD8+}$  uczestniczą w procesie stymulacji i eliminacji aktywowanych komórek (efektorów); uproszczony model ma odzwierciedlać samoregulujący charakter układu immunologicznego.

### 3.3 Równania modelu

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dT}{dt} = aT(1 - bT) - cNT - DT - K_T(1 - e^{-M})T - c'TL, \\ \frac{dN}{dt} = eC - fN + g\frac{T^2}{h + T^2}N - pNT - K_N(1 - e^{-M})N, \\ \frac{dL}{dt} = -mL + j\frac{D^2T^2}{k + D^2T^2}L - qLT + (r_1N + r_2C)T - uNL^2 - K_L(1 - e^{-M})L + \frac{p_iLI}{g_i} + \nu_L(t), \\ \frac{dC}{dt} = \alpha - \beta C - K_C(1 - e^{-M})C, \\ \frac{dM}{dt} = -\gamma M + \nu_M(t), \\ \frac{dI}{dt} = -\mu_i L - j'LI - k'TI + \nu_I(t), \\ \frac{dI_\alpha}{dt} = V_\alpha(t) - gI_\alpha, \end{array} \right. \quad (3.1)$$

$$\text{gdzie: } D = d\frac{(\frac{L}{T})^l}{s + (\frac{L}{T})^l} \text{ i } c' = c_{CTL}(2 - e^{\frac{I_\alpha}{I_{\alpha 0}}}).$$

### 3.4 Interpretacja równań modelu

#### 3.4.1 Równanie $\frac{dT}{dt}$

- $aT(1 - bT)$  – liczba komórek nowotworowych powstałych w chwili czasowej  $t$  (wzrost logistyczny),
- $-cNT$  – liczba komórek nowotworowych zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek ich interakcji z komórkami NK,
- $-DT$  – liczba komórek nowotworowych zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek ich interakcji z limfocytami  $T_{CD8+}$ ,
- $-K_T(1 - e^{-M})T$  – liczba komórek nowotworowych zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek działania cytostatyku podanego podczas chemioterapii,
- $-c'TL$  – liczba komórek nowotworowych zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek interakcji INF- $\alpha$ , limfocytów  $T_{CD8+}$  i komórek nowotworu;



### 3.4.2 Równanie $\frac{dN}{dt}$

- $eC$  – liczba komórek NK powstałych w chwili czasowej  $t$  z krążących limfocytów,
- $-fN$  – liczba zniszczonych komórek NK w chwili czasowej  $t$ ,
- $g \frac{T^2}{h + T^2} N$  – liczba komórek określonych jako komórki NK podczas rekrutacji w chwili czasowej  $t$ ,
- $-pNT$  – liczba dezaktywowanych komórek NK w chwili czasowej  $t$  na skutek interakcji z komórkami nowotworowymi,
- $-K_N(1 - e^{-M})N$  – liczba komórek NK zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek działania cytostatyku podanego podczas chemioterapii;

### 3.4.3 Równanie $\frac{dL}{dt}$

- $-mL$  – liczba limfocytów  $T_{CD8+}$  zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek obecności komórek nowotworowych,
- $j \frac{D^2 T^2}{k + D^2 T^2} L$  – liczba stymulowanych limfocytów  $T_{CD8+}$  przez resztę komórek nowotworowych lizowanych przez limfocyty  $T_{CD8+}$  w chwili czasowej  $t$ ,
- $-qLT$  – liczba dezaktywowanych limfocytów  $T_{CD8+}$  w chwili czasowej  $t$  na skutek interakcji z komórkami nowotworowymi,
- $(r_1 N + r_2 C)T$  – liczba stymulowanych limfocytów  $T_{CD8+}$  przez resztę komórek nowotworowych lizowanych przez komórki NK oraz limfocytów  $T_{CD8+}$  powstałych na skutek obecności komórek nowotworowych w chwili czasowej  $t$ ,
- $-uNL^2$  – liczba dezaktywowanych limfocytów  $T_{CD8+}$  w chwili czasowej  $t$  na skutek działania komórek NK,
- $-K_L(1 - e^{-M})L$  – liczba limfocytów  $T_{CD8+}$  zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek działania cytostatyku podanego podczas chemioterapii,
- $\frac{p_i L I}{g_i}$  – liczba limfocytów  $T_{CD8+}$  stymulowanych przez IL-2,
- $\nu_L(t)$  – funkcja opisująca ilość i czas podania TIL;

#### 3.4.4 Równanie $\frac{dC}{dt}$

- $\alpha - \beta C$  – liczba powstałych i zniszczonych limfocytów krążących w chwili czasowej  $t$ ,
- $-K_C(1 - e^{-M})C$  – liczba limfocytów krążących zniszczonych w chwili czasowej  $t$  na skutek działania cytostatyku podanego podczas chemioterapii;

#### 3.4.5 Równanie $\frac{dM}{dt}$

- $-\gamma M$  – spadek stężenia cytostatyku na skutek jego rozpadu,
- $+\nu_M(t)$  – funkcja opisująca ilość i czas podania cytostatyku;

#### 3.4.6 Równanie $\frac{dI}{dt}$

- $-\mu_i L$  – spadek stężenia IL-2 na skutek jej rozpadu,
- $-j'LI$  – liczba komórek IL-2 wchłoniętych przez limfocyty  $T_{CD8+}$  w chwili czasowej  $t$ ,
- $-k'TI$  – liczba dezaktywowanych komórek IL-2 przez prostaglandyny w chwili czasowej  $t$ ,
- $\nu_I(t)$  – funkcja opisująca ilość i czas podania IL-2;

#### 3.4.7 Równanie $\frac{dI_\alpha}{dt}$

- $V_\alpha(t)$  – funkcja opisująca ilość i czas podania INF- $\alpha$ ,
- $-gI_\alpha$  – spadek stężenia INF- $\alpha$  na skutek jego rozpadu;

### 3.5 Parametry modelu

W celu przeprowadzenia symulacji dobrano parametry modelu, jak w tabeli 3.1.

**Tab. 3.1:** Parametry modelu.

Nazwa	Wartość	Jednostka	Opis
a	$4,31 \cdot 10^{-1}$	$\text{dzień}^{-1}$	Tempo wzrostu nowotworu
b	$1,02 \cdot 10^{-9}$	$\text{komórka}^{-1}$	$1/b$ – nośność nowotworu
c	$6,41 \cdot 10^{-11}$	$\text{dzień}^{-1} \cdot \text{komórka}^{-1}$	Liczba komórek nowotworu zabita przez komórki NK
d	2,34	$\text{dzień}^{-1}$	Stopień zabijania komórek nowotworu przez limfocyty $T_{CD8+}$
e	$2,08 \cdot 10^{-7}$	$\text{dzień}^{-1}$	Liczba krążących limfocytów, które stały się komórkami NK
l	2,9	bezwymiarowe	Komórki nowotworowe częściowo zabijane przez limfocyty $T_{CD8+}$ i przez chemioterapię
f	$4,12 \cdot 10^{-2}$	$\text{dzień}^{-1}$	Tempo wymierania komórek NK
g	$1,25 \cdot 10^{-2}$	$\text{dzień}^{-1}$	Maksymalna liczba komórek NK wytwarzanych na skutek obecności komórek nowotworowych
h	$2,02 \cdot 10^7$	$\text{komórka}^2$	Współczynnik stromości krzywej rekrutacji komórek NK
j	$2,49 \cdot 10^{-2}$	$\text{dzień}^{-1}$	Maksymalne tempo rekrutacji limfocytów $T_{CD8+}$
k	$3,66 \cdot 10^7$	$\text{komórka}^2$	Współczynnik stromości krzywej rekrutacji limfocytów $T_{CD8+}$

m	$2,04 \cdot 10^{-1}$	dzień <sup>-1</sup>	Tempo wymierania limfocytów $T_{CD8+}$
q	$1,42 \cdot 10^{-6}$	dzień <sup>-1</sup> · komórka <sup>-1</sup>	Tempo dezaktywacji limfocytów $T_{CD8+}$ przez komórki nowotworu
p	$3,42 \cdot 10^{-6}$	dzień <sup>-1</sup> · komórka <sup>-1</sup>	Tempo dezaktywacji komórek NK przez komórki nowotworu
s	$8,39 \cdot 10^{-2}$	bezwymiarowe	Współczynnik stromości krzywej dezaktywacji nowotworu
$r_1$	$1,1 \cdot 10^{-7}$	dzień <sup>-1</sup> · komórka <sup>-1</sup>	Tempo stymulacji wytwarzania limfocytów $T_{CD8+}$ jako rezultat niszczenia komórek nowotworowych przez komórki NK
$r_2$	$6,5 \cdot 10^{-11}$	komórka <sup>-1</sup> · dzień <sup>-1</sup>	Tempo stymulacji wytwarzania limfocytów $T_{CD8+}$ jako rezultat interakcji komórek nowotworowych z krążącymi limfocytami
u	$3 \cdot 10^{-10}$	komórka <sup>-2</sup> · dzień <sup>-1</sup>	Współczynnik Funkcji regulacyjnej limfocytów $T_{CD8+}$ nadzorowanej przez komórki NK
$\alpha$	$7,5 \cdot 10^8$	komórka · dzień <sup>-1</sup>	Stała liczba krążących limfocytów
$\beta$	$1,2 \cdot 10^{-2}$	dzień <sup>-1</sup>	Naturalna śmierć i różnicowanie krążących limfocytów
$\gamma$	$9 \cdot 10^{-1}$	dzień <sup>-1</sup>	Tempo rozpadu leku chemioterapeutycznego
$p_i$	$1,25 \cdot 10^{-1}$	dzień <sup>-1</sup>	Maksymalna krzywa rekrutacji limfocytów $T_{CD8+}$ przez interleukiny-2
$g_i$	$2 \cdot 10^2$	komórka <sup>2</sup>	stała
$\mu_i$	$1 \cdot 10^1$	dzień <sup>-1</sup>	Tempo rozpadu interleukiny-2 (leku)
$C_{CTL}$	$4,4 \cdot 10^{-9}$	komórka <sup>-1</sup> · dzień <sup>-1</sup>	Tempo dezaktywacji nowotworu przez limfocyty $T_{CD8+}$
$g'$	1,7	dzień <sup>-1</sup>	Tempo rozpadu terapeutycznego interferonu- $\alpha$
$j'$	$3,3 \cdot 10^{-9}$	komórka <sup>-1</sup> · dzień <sup>-1</sup>	Tempo wchłaniania interleukiny-2 przez limfocyty $T_{CD8+}$
$k'$	$1,8 \cdot 10^{-8}$	komórka <sup>-1</sup> · dzień <sup>-1</sup>	Dezaktywacja molekuł interleukiny-2 przez prostaglandyny
$I_{\alpha 0}$		jednostki	Początkowa ilość interferonu- $\alpha$

## 4. Symulacje

### 4.1 Brak leczenia

#### 4.1.1 Warunki początkowe

*Scenariusz I*

$$T(0) = 1 \cdot 10^6$$

$$N(0) = 1 \cdot 10^5$$

$$L(0) = 1 \cdot 10^2$$


$$C(0) = 6 \cdot 10^{10}$$

$$I(0) = 0$$

$$I_\alpha(0) = 0$$

$$M(0) = 0$$

Wynik symulacji przedstawiono na Rys. 4.1.



**Rys. 4.1:** Symulacja odpowiedzi układu immunologicznego na nowotwór, dla warunków początkowych: początkowa liczba komórek nowotworowych  $T(0) = 1 \cdot 10^6$ , początkowa liczba komórek NK  $N(0) = 1 \cdot 10^5$ , początkowa liczba limfocytów  $T_{CD8+}$   $L(0) = 1 \cdot 10^2$ , początkowa liczba krążących limfocytów  $C(0) = 6 \cdot 10^{10}$ .

*Scenariusz II*

$$T(0) = 1 \cdot 10^6$$

$$N(0) = 1 \cdot 10^3$$

$$L(0) = 1 \cdot 10^1$$


$$C(0) = 6 \cdot 10^8$$

$$I(0) = 0$$

$$I_\alpha(0) = 0$$

$$M(0) = 0$$

Wynik symulacji przedstawiono na Rys. 4.2.



**Rys. 4.2:** Symulacja odpowiedzi układu immunologicznego na nowotwór, dla warunków początkowych: początkowa liczba komórek nowotworowych  $T(0) = 1 \cdot 10^6$ , początkowa liczba komórek NK  $N(0) = 1 \cdot 10^3$ , początkowa liczba limfocytów  $T_{CD8+}$   $L(0) = 1 \cdot 10^1$ , początkowa liczba krążących limfocytów  $C(0) = 6 \cdot 10^8$ .

## 4.2 Leczenie metodą immunoterapii

## 4.3 Leczenie metodą chemioterapii

## 4.4 Połączenie metod immunoterapii i chemioterapii

## 5. Rezultaty

## 6. Analiza wyników



## 7. Podsumowanie

# Bibliografia

- [1] Mustafa Mamat, Subiyanto i Agus Kartono, „Mathematical Model of Cancer Treatments Using Immunotherapy, Chemotherapy and Biochemotherapy”,
- [2] R. Tadeusiewicz, „Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej.”, PWN, 2013
- [3] Redaktor naukowy dr n. med. Janusz Meder, „Podstawy onkologii klinicznej”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2011
- [4] Ewelina Dymarska, „Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 19(2)/2016
- [5] Nadzieja Drela, „Immunologiczna teoria starzenia”, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Zoologii, Zakład Immunologii, Warszawa, 23 kwietnia 2014
- [6] Marta Sochocka, Zofia Błach-Olszewska, „Mechanizmy wrodzonej odporności”, Laboratorium Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im L. Hirszfelda we Wrocławiu, Postępy Hig Med Dośw., 59: 250-258, 2005
- [7] Emilia Kolarzyk, „Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008, wyd.1
- [8] Beata Tokarz-Deptuła, Tymoteusz Miller, Wiesław Deptuła, „Cytokiny z rodziny interleukiny-1”, Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński
- [9] „Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana Informacje dla Pacjenta”, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin, 2011
- [10] Jacek Mackiewicz, Andrzej Mackiewicz, „Immunoterapia nowotworów i perspektywy jej rozwoju”, Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
- [11] Anna Świeboda-Sadlej, „Skojarzone leczenie nowotworów — współpraca chirurga i onkologa klinicznego w zakresie leczenia raka piersi, jelita grubego i płuca”, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

- 
- [12] Ewa Sikora, „Cykl komórkowy i apoptoza: śmierć starej komórki”, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, „Postępy biochemii”, tom 42, nr 2, 1996
- [13] Izabela Klaska, Jerzy Z. Nowak, „Rola układu dopełniacza w fizjologii i patologii”, Łódź, 2007
- [14] dr hab. Krzysztof Bryniarski, „Immunologia”, 2017