Differential accessibility benchmark
(no per-fold error bars — metrics computed jointly over all held-out peaks)

Baseline (0.167)
Base
Finetuned 50:50
Finetuned 80:20
Baseline (0.333)

Base

Finetuned 50:50

Finetuned 80:20

Pairwise log2FC Pearson
(|log2FC|≥1.5, n=9,296)

bundle sheath
epidermis
guard
mesophyll
phloem
xylem

	bundle sheath	epidermis	guard	mesophyll	phloem	xylem
bundle sheath		0.16	0.17	0.10	0.04	0.04
epidermis	0.16		0.21	0.10	0.28	0.08
guard	0.17	0.21		0.21	0.19	0.13
mesophyll	0.10	0.10	0.21		0.13	0.03
phloem	0.04	0.28	0.19	0.13		0.09
xylem	0.04	0.08	0.13	0.03	0.09	

	bundle sheath	epidermis	guard	mesophyll	phloem	xylem
bundle sheath		0.50	0.50	0.37	0.26	0.26
epidermis	0.50		0.44	0.35	0.55	0.28
guard	0.50	0.44		0.42	0.56	0.36
mesophyll	0.37	0.35	0.42		0.43	0.18
phloem	0.26	0.55	0.56	0.43		0.40
xylem	0.26	0.28	0.36	0.18	0.40	

	bundle sheath	epidermis	guard	mesophyll	phloem	xylem
bundle sheath		0.53	0.53	0.41	0.30	0.31
epidermis	0.53		0.46	0.40	0.58	0.35
guard	0.53	0.46		0.46	0.58	0.40
mesophyll	0.41	0.40	0.46		0.48	0.24
phloem	0.30	0.58	0.58	0.48		0.42
xylem	0.31	0.35	0.40	0.24	0.42	

Pearson r
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Top-1 specificity accuracy
(predicted vs observed cell type)

Accuracy
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

All peaks
Tau≥0.75
|log2FC|≥1.5

Top-2 specificity accuracy
(obs cell type in top-2 predicted)

Accuracy
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

All peaks
Tau≥0.75
|log2FC|≥1.5