

Os primeiros *30 dias* com seu bebê

O que observar, como cuidar e quando procurar atendimento, explicado por uma enfermeira, passo a passo.



Oi, eu sou a *Regina*

Sou enfermeira e professora. Todos os dias vejo famílias chegarem em casa com o bebê no colo e a mesma pergunta no coração: "**e agora?**"

Este guia acompanha você do dia da alta até o fim do primeiro mês. Ele não substitui a consulta: ele ajuda você a observar, cuidar e saber a hora certa de procurar ajuda.

Como usar este guia

- 1 Leia uma parte por dia, sem pressa.
- 2 Use as tabelas e listas para marcar e acompanhar.
- 3 Deixe a página **Sinais de alerta** salva no celular.
- 4 Leve suas dúvidas anotadas para as consultas.

O que tem aqui

Parte	Dias	Página
Chegando em casa	1 a 4	3
Amamentação	5 a 14	5
Sono seguro e choro	15 a 21	10
Banho, umbigo, fralda e pele	22 a 25	13
Febre, sinais de alerta e agenda	26 a 28	15
E você, mãe?	29 e 30	16

Lembre: você não precisa saber tudo no primeiro dia. Ninguém sabe. Vamos aprender juntas, um passo por vez. 

As primeiras 24 horas: o que observar

Cinco coisas que a enfermeira olha em todo recém-nascido.



Respiração

Pausas curtas e respiração irregular durante o sono são comuns. **Alerta:** esforço para respirar, gemido, lábios arroxeados.



Cor da pele

Rosada é o esperado. Amarelado que aumenta ou desce para a barriga e as pernas precisa de avaliação.



Mamadas

De 8 a 12 vezes em 24 horas, quando o bebê pedir.



Xixi e cocô

Nos primeiros dias, poucas fraldas. Vai aumentando conforme o leite desce (página 7).



Temperatura e roupa

Vista o bebê com uma camada a mais do que você está usando. Pele da nuca suada indica calor; mãos e pés um pouco frios são comuns. Na dúvida, meça na axila: em bebê com menos de 3 meses, 37,5 °C já é alerta (página 15).

Anote para a primeira consulta: horário das mamadas, número de fraldas e qualquer dúvida. A tabela da página 8 ajuda.

O que é *realmente* necessário

Essencial agora

- ☐ Lugar seguro para dormir (berço ou moisés)
- ☐ Fraldas e algodão ou lenço
- ☐ Roupas confortáveis
- ☐ Banheira e toalha
- ☐ Termômetro digital
- ☐ Caderneta da criança

Pode esperar

- Muitos sapatinhos
- Travesseiro, protetor de berço e bichinhos (**não usar no berço**)
- Aparelhos e acessórios que prometem "acalmar"
- Roupas de tamanhos maiores

Monte dois cantinhos


Cantinho da troca

Fraldas, algodão, água morna, pomada de barreira e roupa extra, tudo ao alcance da mão.

Cantinho da mamada

Poltrona ou cama com apoio, almofada, água, lanche e carregador perto.

A rotina *possível*



Nas primeiras semanas o bebê ainda não tem rotina: existe o ciclo **mamar**, **trocar**, **dormir**, de dia e de noite. Se o seu dia virou isso, você está fazendo certo.

Peça ajuda para

Fazer a comida · cuidar da casa · fazer o bebê arrotar · trocar fraldas · organizar as visitas · dividir as madrugadas.

A primeira semana de *amamentação*

Colostro: o primeiro leite vem em pequena quantidade, e é o que o bebê precisa. O estômago do recém-nascido é bem pequeno.

ESTÔMAGO DO BEBÊ




tamanho cresce
aos poucos

Descida do leite: costuma acontecer entre o **3º e o 5º dia**. As mamas ficam mais cheias e pesadas.

O que ajuda: oferecer o peito sempre que o bebê pedir e cuidar da pega.

Pega correta em *4 sinais*



boca bem aberta, abocanhando a aréola

- 1 **Boca bem aberta**, como num bocejo.
- 2 **Boa parte da aréola** dentro da boca, não só o bico.
- 3 **Lábios virados para fora**, como boquinha de peixe.
- 4 **Queixo encostado** na mama e bochechas redondas.

Doeu a mamada inteira? Coloque o dedo mínimo no cantinho da boca do bebê para soltar e ofereça de novo. Dor que continua não é para "aguentar": é sinal de ajuste.

Posições que *facilitam*

Tradicional

Bebê deitado de lado, barriga com barriga, cabeça na dobra do braço.

Cavalinho

Bebê sentado na sua perna, de frente para a mama. Boa para quem golfa.

Invertida

Corpo do bebê sob o seu braço, pés para trás. Alivia a cicatriz da cesariana.

Evite amamentar deitada

Exausta, a mãe pode adormecer; se o bebê regurgitar, há risco de engasgo e broncoaspiração. Amamente sentada.



Quantas vezes mamar?

Em geral, de **8 a 12 vezes em 24 horas**, quando o bebê pedir. Mamadas seguidas no fim da tarde e à noite são comuns. Relógio rígido atrapalha.

Fome ou *satisfeito*?

Sinais de fome

- Leva a mão à boca
- Vira a cabeça procurando o peito
- Estala os lábios, põe a língua para fora
- **Chorar é o último sinal**

Sinais de satisfeito

- Solta o peito sozinho
- Mãos abertas e relaxadas
- Fica calmo ou sonolento
- Corpo "mole" e tranquilo

Ofereça o peito nos primeiros sinais: o bebê calmo pega melhor do que o bebê já chorando.

A fralda *conta* se o leite está chegando



Depois da descida do leite, o esperado são **6 ou mais fraldas bem molhadas por dia**, com xixi clarinho, e cocô várias vezes ao dia. O principal sinal de que tudo vai bem é o **ganho de peso** na consulta.

É comum o bebê perder um pouco de peso nos primeiros dias e recuperar até o fim da segunda semana.

As cores do *cocô*



1° e 2° dias · Mecônio

Escuro, quase preto, grudento. Normal.



3° e 4° dias · Transição

Esverdeado, mais mole. Normal.



A partir do 5° dia · Leite materno

Amarelo-mostarda, mole, com grumos. Normal.

Procure atendimento se



o cocô ficar **esbranquiçado, cinza ou muito claro**, se houver **sangue**, ou se o xixi ficar **escuro** e as fraldas diminuírem.

PARA MARCAR

Minha tabela da *primeira semana*

Marque um risquinho a cada mamada, fralda de xixi e fralda de cocô. Leve para a consulta.

Dia	Mamadas	Xixi	Cocô	Observações
Dia 1				
Dia 2				
Dia 3				
Dia 4				
Dia 5				
Dia 6				
Dia 7				

Referência: 8 a 12 mamadas por dia. Depois da descida do leite, 6 ou mais fraldas molhadas. Se os números ficarem bem abaixo disso, converse com a equipe de saúde.

Dor e fissuras

O que ajuda

- Corrigir a pega
- Variar a posição
- Passar o próprio leite no mamilo e deixar secar ao ar
- Começar pela mama que dói menos

O que evitar

- Sabonete, álcool ou bucha no mamilo
- Receitas caseiras sem orientação
- "Aguentar" a dor sem buscar ajuda

MITO OU VERDADE?

"Se o bebê chora muito, o leite é fraco."

MITO. O leite muda durante a mamada e é feito para o seu bebê. Quando parece "não sustentar", o que costuma estar por trás é a pega, a frequência das mamadas ou um bebê sonolento. Quem avalia é o crescimento do bebê, não a aparência do leite.

Procure ajuda na amamentação se


- A dor não melhora depois dos ajustes, ou as feridas não cicatrizam
- A mama fica **vermelha, quente e endurecida**, com febre ou mal-estar
- O bebê molha poucas fraldas, dorme demais para mamar ou não ganha peso

Onde: unidade de saúde, banco de leite humano, consultora de amamentação, pediatra.

Sempre de *barriga para cima*

Em todos os sonos, inclusive na soneca. O bebê saudável protege as vias aéreas nessa posição. De bruços, só acordado e com um adulto olhando.

berço vazio, colchão firme, bebê de barriga para cima



Berço seguro, item por item

- ☐ Colchão firme e plano, do tamanho exato do berço
- ☐ Lençol de elástico bem preso
- ☐ Nada solto: travesseiro, protetor lateral, pelúcia, edredom fofo
- ☐ Berço no quarto dos pais nos primeiros meses
- ☐ Ambiente sem fumaça e sem calor excessivo
- ☐ Se precisar cobrir: manta fina presa abaixo dos braços ou saco de dormir

"A vovó dizia..." e o que *sabemos hoje*

Costume	Hoje a orientação é
Rolinho para deixar o bebê de lado	Barriga para cima, sem rolinho
Travesseiro "para a cabeça ficar bonita"	Sem travesseiro no berço
Protetor de berço e bichinhos	Berço sem nada solto
Bebê bem agasalhado para não gripar	Uma camada a mais que o adulto, sem superaquecer
Dormir no sofá com o bebê no colo	Bebê no berço; sofá e poltrona são os lugares de maior risco
Cadeirinha ou rede para dormir	Para dormir, superfície plana e firme

Cansaço e *madrugada*

Seu sono também importa. Para a madrugada ser mais segura:

- Deixe o berço **ao lado** da sua cama: pegue para mamar e devolva ao berço
- Luz fraca, água e fralda por perto
- Terminou a mamada: bebê de volta ao berço, de barriga para cima
- **Não durma com o bebê na cama:** depois do parto, mãe e parceiro estão exaustos e podem adormecer sem perceber sobre o bebê
- Amamente sentada, nunca deitada, e se sentir sono, peça ajuda
- Divida as madrugadas com quem mora com você

Por que o bebê *chora*

Chorar é o jeito de o bebê se comunicar: fome, fralda, sono, calor, frio ou só vontade de colo. O choro costuma aumentar nas primeiras semanas.

Colo

Pele com pele acalma.

Embalar

Movimento suave e ritmado.

Ambiente

Luz baixa, voz calma.

Nunca sacuda o bebê

Se perder a paciência, coloque o bebê no berço seguro, saia por um minuto e respire. Peça ajuda. Isso é cuidado, não fraqueza.

Cólica e *golfada*

Cólica

Choro intenso, geralmente no fim do dia, em bebê que mama e cresce bem. Costuma melhorar com os meses.

Pode ajudar: colo, massagem suave na barriga, bebê de bruços no seu antebraço (com você acordada). Remédio ou chá, só com orientação.

Golfada

Um pouco de leite depois da mamada é comum. Ajude a arrotar com o bebê em pé no ombro.

Mantenha-o no colo um pouquinho após mamar.

Não é cólica, é consulta

Febre · vômitos em jato ou repetidos · vômito verde ou com sangue · recusa do peito · bebê mole ou muito sonolento · choro diferente do habitual.


Coto *umbilical*

- 1 Lave bem as mãos.
- 2 Limpe a base com **álcool 70%** a cada troca de fralda e depois do banho. Ele seca o coto e evita cheiro.
- 3 Mantenha sempre seco, com a fralda dobrada abaixo do coto.
- 4 Nada de faixa, moeda ou receita caseira.

Costuma cair entre 1 e 2 semanas. **Procure atendimento** se houver vermelhidão em volta, cheiro forte, pus ou sangramento que não para.



O primeiro *banho em casa*



- ☐ Tudo separado antes: toalha, roupa, fralda
- ☐ Ambiente aquecido, sem vento
- ☐ Água morna, **cerca de 36 a 37 °C**, conferida com termômetro ou antebraço
- ☐ Segure firme, apoiando nuca e costas
- ☐ Rosto e cabeça primeiro, depois o corpo
- ☐ Seque bem as dobras e passe álcool 70% no coto

Nunca deixe o bebê sozinho na água, nem por um segundo.

Troca de fralda e *higiene íntima*

Menina

Limpe sempre **da frente para trás**, para não levar cocô para a vulva.

Menino

Limpe as dobrinhas e o saco escrotal **sem forçar** a pele do pênis.

- Troque sempre que estiver suja ou bem molhada.
- Use algodão ou lenço com água morna.
- Deixe secar antes de fechar a fralda nova.
- Assadura: trocas frequentes e creme de barreira. Piorou ou tem bolhas? Consulta.

A pele do *recém-nascido*

Costuma ser normal

Pele descamando · pontinhos brancos no nariz · manchinhas vermelhas que aparecem e somem · pele marmorizada no frio.

Amarelinho (icterícia): procure avaliação se

- Aparecer nas **primeiras 24 horas** de vida
- Aumentar ou chegar à **barriga e às pernas**
- O bebê ficar muito sonolento ou mamar mal
- O cocô ficar claro

Dica: observe a pele com luz natural, apertando levemente com o dedo.

Febre no bebê *pequeno*



Meça na axila, com termômetro digital. Em bebê com **menos de 3 meses**:

- **37,5 °C ou mais** já é sinal de alerta (a temperatura interna já está perto de 38 °C).

- **38 °C ou mais, ou abaixo de 35,5 °C: pronto-socorro imediatamente.**

Não dê antitérmico por conta própria.

Sinais de alerta: *procure atendimento já*



Dificuldade para respirar ou cor arroxeada



37,5 °C ou mais, ou abaixo de 35,5 °C



Sonolência excessiva, bebê mole, não acorda para mamar



Recusa o peito



Vômitos repetidos ou em jato



Amarelo intenso ou cocô claro



Poucas fraldas molhadas



Umbigo com pus ou cheiro forte



Movimentos estranhos ou convulsão



Manchas pelo corpo

Na dúvida, procure atendimento.

Você não está exagerando.

O que não pode *faltar*

- ☐ **Teste do pezinho**, idealmente entre o 3º e o 5º dia
- ☐ Testes da **orelhinha**, do **olhinho**, do **coraçãozinho** e da **linguinha** (confira na caderneta)
- ☐ Vacinas **BCG** e **hepatite B**
- ☐ Consulta do bebê na **primeira semana**
- ☐ Consulta da **mãe** no pós-parto
- ☐ Levar a **caderneta da criança** em toda consulta

DIA 29 · E VOCÊ, MÃE?

Todo mundo pergunta do bebê. *E você?*

Baby blues

Choro fácil, sensibilidade e cansaço nas primeiras duas semanas são comuns e costumam passar com descanso e apoio.

Procure ajuda se

a tristeza for intensa, durar mais de duas semanas, tirar o prazer das coisas ou trazer pensamentos de se machucar ou machucar o bebê.

Onde buscar: unidade de saúde, seu médico ou enfermeira, e o **CVV**, pelo telefone **188**, 24 horas, gratuito. Pedir ajuda é cuidar do seu bebê também.

DIA 30

Você chegou ao *dia 30*

Você não precisava saber tudo no primeiro dia. E aprendeu, um passo por vez.

Chegando em casa

Pega correta

Mamadas

Fraldas e cocô

Dor e fissuras

Sono seguro

Choro e cólica

Umbigo

Banho

Pele

Febre

Sinais de alerta

Agenda

Saúde da mãe



Continue comigo no Instagram [@enfermeirareginarn](https://www.instagram.com/enfermeirareginarn): todos os dias tem um conteúdo novo para a próxima fase do seu bebê.

Materiais de amamentação, desfralde e inglês para crianças:

kurmannreginah.github.io/enfermeira-regina

Material educativo, preparado pela Enfermeira Regina. Não substitui consulta com profissionais de saúde. Em caso de dúvida ou sinal de alerta, procure atendimento.