

## Oefeningen (per bestand)

**Oefening 1** *Beargumenteer het gebruik van het model van een eenparig versnelde beweging (EVB) voor de vrije beweging van een wagentje op een helling. Denk daarbij aan een proefneming die we in de klas deden. De notie kracht moet je hier even buiten beschouwing laten.*

*Het model beschrijft de meetgegevens accuraat.*

*M.a.w. zijn de meetgegevens van de positie van het wagentje op de helling in functie van de tijd, gemeten met een (ultrasone) positieensor, accuraat te beschrijven met de plaatsfunctie van een eenparig versnelde beweging.*

*Toelichting. De vraag gaat over de relatie tussen de theorie en de realiteit. Het is maar door metingen te doen dat we kunnen nagaan of gevolgen van de theorie (in dit geval bijvoorbeeld dat de positie kwadratisch in de tijd verloopt voor een beweging met constante versnelling) overeenkomen met de realiteit. In het gegeven geval van een wagentje op een helling, is bijvoorbeeld een model van constante snelheid niet van toepassing. Het zou immers impliceren dat het wagentje niet van zin kan veranderen. Dat laatste wordt door metingen of waarnemingen weerlegd.*

**Oefening 2** *Toon aan dat de positie en de snelheid van een eendimensionale beweging met constante versnelling gegeven worden door de volgende functies:*

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\v(t) &= v_0 + a t\end{aligned}$$

**Oefening 3** *Een auto vertrekt vanuit rust en bereikt na 3,0 km een snelheid van 450 km/h. We onderstellen de versnelling constant en de baan recht. Bereken de versnelling en de tijd, nodig om die 3,0 km af te leggen. Omdat voor een EVRB de gemiddelde snelheid gegeven wordt door  $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$  en we de afgelegde afstand kennen, kunnen we de benodigde tijd gemakkelijk vinden. We kiezen  $t_0 = 0$ ,  $x_0 = 0$ . De beginsnelheid is nul zodat:*

$$\begin{aligned}\Delta x &= \bar{v} \Delta t \\ \Downarrow \\ t &= \frac{x}{\left(\frac{v}{2}\right)} = \frac{2x}{v}\end{aligned}$$

*Invullen van de gegevens levert een tijd van 48 s. Met de formule  $v = v_0 + at$  voor de snelheid vinden we de versnelling door de tijd erin te substitueren, en*

de beginsnelheid nul te nemen:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v}{t} = \frac{v}{\left(\frac{2x}{v}\right)} \\ &= \frac{v^2}{2x} \end{aligned}$$

Invullen van de gegeven grootheden levert een versnelling van  $2,6 \text{ m/s}^2$ .

**Oefening 4** Bewijs voor een eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (EVRB) de volgende formule voor de gemiddelde snelheid:

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

**Oefening 5** Een massa vertrekt vanuit rust om een EVB uit te voeren. Als haar beginpositie  $0 \text{ m}$  is, welke van de volgende betrekkingen is dan juist? Toon aan

/4

(a)  $t = \frac{x}{2v}$       (b)  $t = \frac{2x}{v}$       (c)  $t = \frac{v}{2x}$       (d)  $t = \frac{2v}{x}$

(b)

**Oefening 6** [80 % (b)] Een vliegtuig start vanuit rust en versnelt met een constante versnelling langs de grond alvorens op te stijgen. Het legt  $600 \text{ m}$  af in  $12 \text{ s}$ . Bepaal de versnelling, de snelheid na  $12 \text{ s}$  en de afstand afgelegd gedurende de twaalfde seconde.

$$a = \frac{2x}{t^2} = 8,33 \text{ m/s}^2, v = \frac{2x}{t} = 100 \text{ m/s}, x(t = 12) - x(t = 11) = \frac{1}{2}a(t_{12}^2 - t_{11}^2) = 95,8 \text{ m}$$

**Oefening 7** Kan de snelheid van een voorwerp gelijk zijn aan nul, terwijl de versnelling verschillend is van nul? Motiveer je antwoord.

/4

**Oefening 8** Kan de bewegingsrichting van een voorwerp omkeren terwijl de versnelling gelijk blijft? Zo ja, geef dan een voorbeeld. Zo nee, leg uit waarom dat niet kan.

/4

Ja, dat kan. Als je een bal opwerpt zal op het hoogste punt de bewegingszin omdraaien terwijl de versnelling gelijk blijft. We kunnen immers een verticale worp modelleren als een EVB. Kiezen we de referentieas om de beweging te beschrijven omhoog, dan is de snelheid van de bal positief bij het naar boven bewegen en negatief wanneer hij naar beneden komt, terwijl de verandering van de snelheid in de tijd (de versnelling) systematisch gelijk is aan de negatieve valversnelling.

ChatGPT:

Ja, de bewegingsrichting van een voorwerp kan omkeren terwijl de versnelling gelijk blijft. Dit gebeurt wanneer de versnelling tegengesteld is aan de bewegingsrichting van het voorwerp. In zo'n geval zal het voorwerp eerst vertragen totdat het stopt, en daarna versnellen in de tegenovergestelde richting.

**Voorbeeld:**

Stel je voor dat je een bal recht omhoog gooit. De zwaartekracht zorgt voor een constante versnelling naar beneden (ongeveer  $9,8 \text{ m/s}^2$ ). Terwijl de bal omhoog beweegt, is de snelheid van de bal naar boven gericht, maar de versnelling door de zwaartekracht blijft naar beneden gericht.

- Op het hoogste punt komt de bal kort tot stilstand (de snelheid is nul), maar de versnelling naar beneden verandert niet.
- Na dat punt keert de bal om en begint naar beneden te vallen, met een toenemende snelheid in de richting van de versnelling (naar beneden).

In dit scenario keert de bewegingsrichting van de bal om van omhoog naar omlaag, terwijl de versnelling constant naar beneden blijft gericht.

**Oefening 9** Kan een voorwerp dat een positieve versnelling heeft een negatieve snelheid hebben? Kan het omgekeerde ook? Licht je antwoord toe.

/4

Ja, dat kan. Neem bijvoorbeeld een voorwerp dat je verticaal omhoog gooit. Als je de referentieas waarmee je de beweging wil beschrijven verticaal naar beneden kiest, zal de versnelling van de beweging positief zijn en de snelheid negatief. De snelheid is negatief omdat je tegengesteld aan de as beweegt en de versnelling is positief omdat de snelheid minder negatief wordt.


Het omgekeerde kan ook, draai gewoon de referentieas om.

**Oefening 10** Vanop een grote hoogte laat men achtereenvolgens twee stenen vallen met een tussentijd van 2 seconden. Op welke wijze verandert de afstand tussen beide stenen in de tijdsduur dat beide vallen? (Begin met een grafische voorstelling.)

De afstand verandert lineair in functie van de tijd:  $\Delta x(t) = gt_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt_0^2$   
 ( $= \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$  met  $t \geq t_0 = 2 \text{ s}$ )

Oefeningen (per bestand)

- Oefening 11** Teken de overeenkomstige  $x(t)$ - en  $a(t)$ -grafiek  $v_x$  bij de gegeven  $v(t)$ -grafiek. Ga ervan uit dat  $x_0 = 0$  m. /4



- Oefening 12** Een trein met veel rijtuigen heeft een snelheid van 100 km/h en komt over een afstand van 520 m tot stilstand. Hoe groot is zijn versnelling?