3464. 正方形上的点之间的最大距离

难度: **Hard**

给你一个整数 `side` ，表示一个正方形的边长，正方形的四个角分别位于笛卡尔平面的 `(0, 0)` ，`(0, side)` ，`(side, 0)` 和 `(side, side)` 处。

同时给你一个 **正整数** `k` 和一个二维整数数组 `points` ，其中 `points[i] = [$x_i$, $y_i$]` 表示一个点在正方形**边界**上的坐标。

你需要从 `points` 中选择 `k` 个元素，使得任意两个点之间的 **最小** 曼哈顿距离 **最大化** 。

返回选定的 `k` 个点之间的 **最小** 曼哈顿距离的 **最大** 可能值。

两个点 `($x_i$, $y_i$)` 和 `($x_j$, $y_j$)` 之间的曼哈顿距离为 `|$x_i$ - $x_j$| + |$y_i$ - $y_j$|` 。

示例 1：

输入： side = 2, points = [[0,2],[2,0],[2,2],[0,0]], k = 4

输出： 2

解释：



选择所有四个点。

示例 2：

输入： side = 2, points = [[0,0],[1,2],[2,0],[2,2],[2,1]], k = 4

输出： 1

解释：



选择点 `(0, 0)` ， `(2, 0)` ， `(2, 2)` 和 `(2, 1)`。

示例 3：

输入： side = 2, points = [[0,0],[0,1],[0,2],[1,2],[2,0],[2,2],[2,1]], k = 5

输出： 1

解释：



选择点 `(0, 0)` ， `(0, 1)` ， `(0, 2)` ， `(1, 2)` 和 `(2, 2)`。

提示：

- `1 <= side <=` 10^9
- `4 <= points.length <= min(4 * side, 15 *` 10^3`)`
- `points[i] == [xi, yi]`
- 输入产生方式如下：
  - `points[i]` 位于正方形的边界上。
  - 所有 `points[i]` 都 **互不相同** 。
- `4 <= k <= min(25, points.length)`