

位相・解析大全

学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

★ 学部前半——定義・直観・基本定理

★★ 学部後半——証明の細部と別証明

★★★ 大学院——一般化・独立性・未解決問題

第1版

本書の使い方

本書は、位相空間論と解析学を一冊で通す。前半で作った道具が後半でそのまま働くので、順に読むことを想定している。ただし一冊のなかに三つの深さの記述を重ねてあり、読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 学部前半にあたる。なぜその定義でなければならないのかを述べてから 定義を置き、基本定理を証明する。まずここだけを通して読めば、位相から解析までの骨格が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 学部後半にあたる。本文で省いた証明の細部、別証明、仮定を外したときに何が壊れるか。手を動かして確かめる場所である。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院にあたる。定理の一般化、集合論の公理系からの独立性、そして未解決の問題。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、この分野の現在地である。

■ 各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。
2. **動機と直観** 定義を置く前に、何を捉えようとしているのかを述べる。
定義から始める書き方は厳密だが、なぜその形なのかを隠してしまう。
3. **定義・定理・証明（★）と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
4. **図版** 包含関係、反例の構造、証明の流れ、定理の依存関係。すべて本書のために描いた。

5. **例と反例** 定理の仮定がなぜ必要かは、それを外した反例によってしか分からない。本書は反例を独立した箱として、例と同じ重さで置く。
6. **演習** 基本・証明・発展の三段階。解答と方針は付録Eにある。

■ 囲みの種類

本文中に現れる箱は六種類である。いずれも章ごとの通し番号を持ち、番号は組版時に自動で振られる（手入力ではない）。

- ・ **定義** 輪郭だけの箱。読み飛ばすと後で必ず戻ることになる。
- ・ **定理・命題・補題・系** 左に太い罫のある箱。呼び分けは主張の重さによる。
- ・ **証明** 地色を持たず、末尾を□で閉じる。
- ・ **例** 定義や定理が何を言っているかを、具体物で確かめる。
- ・ **反例** 定理の仮定を外すと成り立たないことを示す。本書ではこれが特に重要である。
- ・ **注意** よくある誤解、仮定の必要性、記号の濫用について。

■ この本が守る方針

- ・ **証明を省略しない**。「容易に分かる」で済ませる箇所には、なぜ容易なのかを書く。読者が自分で埋めるべき部分は、演習として明示する。
- ・ **仮定を明示する**。選択公理を使う証明には、そのことを断る。使わずに済む場合は、その旨も述べる。
- ・ **一般性の水準を明示する**。距離空間でしか成り立たない主張を、一般の位相空間の主張として述べない。逆に、一般に成り立つことは一般の形で述べる。
- ・ **未解決は未解決と書く**。決着していない問題を、決着したかのように書かない。

凡例

- ・数式は組版時にベクタ画像として埋め込んでいる。拡大しても崩れないが、PDF内の文字列検索では数式そのものは検索できない。本文と定理名は検索できる。
- ・定理への参照は「定理20.3」のように示し、リンクになっている。数字は組版時に解決しており、手入力ではない。
- ・人名は初出時に原綴りを併記する。
- ・本書で「空間」と書いたときは、断りのないかぎり位相空間を指す。
- ・「可算」は、有限または可算無限を意味する。有限を除く場合は「可算無限」と書く。

目次

序論 数学の文章をどう読むか

11 準備

第1章 定義・定理・証明——数学の文章の読み方.....	12
第2章 集合・写像・同値関係	20
第3章 選択公理とその同値物	31
第4章 順序数と基数	40

第I部 位相空間の基礎

49 位相

第5章 なぜ開集合から始めるのか	50
第6章 位相空間・閉集合・閉包・内部	58
第7章 基底と準基底、近傍系	66
第8章 連続写像と同相	75
第9章 部分空間と相対位相	83
第10章 商空間と等化写像.....	91

第11章 積空間——なぜ箱位相ではないのか	100
第12章 ネットとフィルター——点列では足りない	108

第II部 分離公理 117 位相

第13章 $T_0 \cdot T_1 \cdot \text{Hausdorff}$	118
第14章 正則空間と完全正則空間	126
第15章 正規空間とUrysohnの補題	134
第16章 Tietzeの拡張定理	142
第17章 分離公理の階層と、逆が成り立たない反例	149
第18章 完全正規性と遺伝性	156
第19章 分離公理は何に保存されるか	164

第III部 コンパクト性と被覆性質 171 位相

第20章 コンパクト性——三つの定義の同値	172
第21章 Tychonoffの定理と選択公理	180
第22章 局所コンパクト性と一点コンパクト化	188
第23章 Stone–Čechコンパクト化	196
第24章 パラコンパクト性と1の分割	203
第25章 Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト	212
第26章 被覆性質の相互関係と反例	219
第27章 Baireのカテゴリー定理	226

第IV部 連結性・距離空間・距離化 235 位相

第28章 連結性・弧状連結・成分	236
第29章 距離空間の位相と完備性	244
第30章 一様空間——距離と位相のあいだ	252

第31章 Urysohnの距離化定理	261
第32章 Nagata-SmirnovとBingの距離化定理	268
第33章 完備距離化可能性とČech完備性	276
第34章 距離空間は何が特別なのか	283

第V部 基数不変量と次元論

291 位相

第35章 基数不変量——重み・稠密度・指標	292
第36章 セル数とスーリン問題	300
第37章 積空間の基数不変量	308
第38章 小さい帰納的次元 ind	316
第39章 大きい帰納的次元 Ind	325
第40章 被覆次元 dim	332
第41章 次元の一致定理	339
第42章 次元論の反例と、一致しない空間	346

第VI部 実数と極限

353 解析

第43章 実数の構成と完備性	354
第44章 上限・下限と単調列	355
第45章 極限—— ε - δ はなぜこの形か	356
第46章 連続関数——中間値と最大値	357
第47章 一様連続と一様収束	358
第48章 微分と平均値の定理	359
第49章 級数と収束判定	360
第50章 関数列——何が保存され、何が壊れるか	361

第VII部 測度と積分

363 解析

第51章 Riemann積分の限界	364
第52章 外測度とCarathéodoryの構成	365
第53章 Lebesgue測度と非可測集合.....	366
第54章 可測関数.....	367
第55章 Lebesgue積分と収束定理.....	368
第56章 積測度とFubini-Tonelli	369
第57章 符号付測度とHahn-Jordan分解.....	370
第58章 Radon-Nikodymの定理	371
第59章 Rieszの表現定理	372

第VIII部 関数空間

373 解析

第60章 L_p 空間とHölder・Minkowskiの不等式	374
第61章 完備性——Riesz-Fischerの定理	375
第62章 稠密性と近似.....	376
第63章 Banach空間	377
第64章 Hilbert空間と直交分解.....	378
第65章 正規直交基底とParsevalの等式	379
第66章 双対空間.....	380

第IX部 関数解析の基本定理

381 解析

第67章 Hahn-Banachの定理.....	382
第68章 一様有界性の原理.....	383
第69章 開写像定理と閉グラフ定理	384
第70章 弱位相と弱*位相	385
第71章 Banach-Alaogluの定理.....	386
第72章 凸性とKrein-Milmanの定理	387

第73章 コンパクト作用素	388
第X部 スペクトル理論	389 解析
第74章 有界作用素とスペクトル	390
第75章 自己共役作用素	391
第76章 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理	392
第77章 一般のスペクトル定理と作用素値測度	393
第78章 非有界作用素と自己共役拡大	394
第79章 Banach環とGelfand理論	395
第XI部 フーリエ解析	397 解析
第80章 Fourier級数——なぜ三角関数か	398
第81章 各点収束の問題——DirichletとFejér	399
第82章 L^2 理論とParsevalの等式	400
第83章 発散する例と、Carlesonの定理	401
第84章 Fourier変換—— L^1 の理論	402
第85章 L^2 への拡張とPlancherelの定理	403
第86章 畳み込みと近似単位元	404
第87章 Schwartz空間と超関数	405
第88章 超関数のFourier変換とSobolev空間	406
第XII部 複素解析	407 解析
第89章 複素微分とCauchy–Riemannの方程式	408
第90章 Cauchyの積分定理と積分公式	409
第91章 べき級数展開と解析接続	410
第92章 留数定理とその応用	411

第93章 等角写像とRiemannの写像定理	412
第94章 調和関数とDirichlet問題	413

第XIII部 位相と解析の交差 415 総合

第95章 関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理	416
第96章 Stone-Weierstrassの定理	417
第97章 何が何を支えているか——本書の地図	418

巻末資料 419

付録A 記号一覧	420
付録B 定義集	420
付録C 反例カタログ	420
付録D 図版索引	420
付録E 演習の解答と方針	420
付録F 読書案内	420
付録G 索引	420

序論

数学の文章をどう読むか

準備

定義・定理・証明という形式は何のためにあるのか。そして本書が全編で使う道具——集合と写像、濃度、選択公理、順序数と基数——を、後で困らないところまで固めておく。

定義・定理・証明——数学の文章の読み方

◆ この章の問い

- ・定義・定理・証明という形式は、何のためにあるのか。
- ・「明らか」と書いてよいのは、どんなときか。
- ・定理の仮定が本当に必要かどうかを、どうやって確かめるのか。

数学の文章は、三つの役割に分かれている

数学の本を読みにくくしているのは、記号の多さではない。文が三つの異なる役割を担っており、それぞれ読み方が違うのに、見た目が似ていることである。まずその区別をつけておきたい。

定義——言葉の意味を定める文。これは主張ではないので、正しいか誤っているかを問えない。問えるのは「便利か」「後の議論が通るか」だけである。定義を読んで「なぜそう決めるのか」と思ったら、その疑問は正しい。本書は定義の前に、必ずその問いに答える。

定理——主張する文。仮定と結論からなり、真偽を問える。仮定のどれを外しても成り立たなくなるように書かれているのが、よい定理である。

証明——定理が真であることを、既に認めた事柄から導く文。証明は「なぜ正しいか」を説明するのであって、「どうやって思いついたか」を説明するのではない。この二つが違うことが、数学の文章を難しくしている最大の原因である。

この本は、思いついた順序のほうも書く。定義の前に動機を置き、証明の前に方針を述べるのは、そのためである。

定理の形——仮定と結論

定理はほぼすべて「 P ならば Q 」の形に書ける。ここで P を仮定、 Q を結論という。

この形について、初学者がまずく点が三つある。

第一に、 P が偽のとき「 P ならば Q 」は真である。「空集合のすべての元は赤い」は真の主張である。これは言葉遊びではない。この約束があるおかげで、場合分けのたびに例外を書かずに済む。

第二に、逆・裏・対偶を混同しないこと。「 P ならば Q 」に対して、逆は「 Q ならば P 」、裏は「 P でないならば Q でない」、そして対偶は「 Q でないならば P でない」である。

もとの命題と対偶は同値であり、逆と裏は同値である。だがもとの命題と逆は同値でない。証明に行き詰まったら対偶を証明してみる——これは本書で何度も使う手である。

第三に、「必要」と「十分」の向き。「 P ならば Q 」が成り立つとき、 P は Q の十分条件であり、 Q は P の必要条件である。向きを取り違えると、定理の意味が逆になる。

定義1.1

二つの主張 P と Q について、「 P ならば Q 」と「 Q ならば P 」がともに成り立つとき、 P と Q は同値であるといい、 $P \iff Q$ と書く。

注意

同値であることを示すには、両方向を示さなければならない。片方だけ示して終わる誤りは、驚くほど頻繁に起きる。三つ以上の条件が同値であることを示すときは、 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ のように環状に回すと手間が減る。本書ではこの手を第20章で本格的に使う。

証明の型

証明の書き方には、繰り返し現れる型がある。型を知っていれば、証明を読むときに「いま何をしているのか」が見える。

直接証明——仮定から出発し、既知の事柄を使って結論に至る。

対偶による証明——結論の否定から出発し、仮定の否定に至る。結論が「～でない」という形のときに有効である。

背理法——仮定と結論の否定をともに認めて、矛盾を導く。強力だが、**得られるのは「そうでないことはありえない」という情報だけで、具体物は手に入らない。**この違いは第3章（選択公理）と第4章で重要になる。

数学的帰納法——自然数で添字づけられた主張の列に使う。後に第4章で、超限帰納法へ拡張する。

構成による証明——「存在する」という主張を、実際に作って示す。背理法による存在証明と対比される。

証明の型——どこから出発し、どこへ着くか

直接証明



対偶



背理法



構成



背理法と構成では、得られる情報の量が違う
「存在しないことはありえない」と「これが求めるものだ」は、同じではない

※ この違いは、選択公理を使う証明（第3章）で決定的になる。選択公理は「選べる」と主張するが、どう選ぶかは教えない。存在は保証されても、具体物は手に入らない。

図1-1 証明の四つの型。出発点と到達点の違いが、得られる情報の質を決める。

「明らか」と書いてよいとき

数学の文章には「明らかに」「容易に分かる」「同様にして」という語が頻繁に現れる。これらは読者を最も苛立たせる語でもある。

本書の方針を先に述べておく。「明らか」と書くのは、直前に示した議論をそのまま繰り返せば済む場合に限る。そしてその場合でも、何を繰り返すのかを述べる。

読者の側の作法も述べておきたい。「明らか」と書かれていて明らかでなかったら、それは読者の落ち度ではない。著者が省略の判断を誤ったか、読者がまだ必要な準備を終えていないかのどちらかである。後者であれば、どの準備が足りないのかを特定することが、次の一歩になる。

命題1.2

命題「 P ならば Q 」と、その対偶「 Q でないならば P でない」は同値である。

証明 「 P ならば Q 」が真であるとし、 Q でないと仮定する。もし P であれば、仮定より Q が従い、 Q でないことに反する。よって P でない。逆向きも同様に示される——「 Q でないならば P でない」が真であるとし、 P であると仮定すると、 Q でないとすれば P でないことになって矛盾する。よって Q である。□

注意

いま「逆向きも同様に示される」と書いたが、実際には書き下した。「同様」で済ませてよいのは、読者が自分で再現できることが確かな場合だけである。ここでは、対偶という概念を導入したばかりなので、省略しなかった。

★★ 学部後半 集合の言葉で書き直す——なぜ記号を使うのか

前節の議論は日本語だけで書けた。では、なぜ数学は記号を使うのか。答えは「短くするため」ではない。**日本語では区別しにくい二つの主張を、区別するためである。**

量子子の順序。次の二つの文を比べてほしい。

(甲) どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

(乙) ある N が存在して、どんな $\varepsilon > 0$ に対しても、 $n \geq N$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon$ 。

記号で書けば違いは一目で分かる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$$

(甲) は数列 (a_n) が a に収束することを言う。(乙) は、ある番号から先で a_n が a に完全に一致することを言う——なぜなら ε をいくらでも小さくできるからである。**語順を入れ替えただけで、意味がまったく違う主張になった。**

N は何に依存するか。(甲) では N は ε の後に来るので、 ε に依存してよい。これを明示したいときは $N(\varepsilon)$ と書く。この依存が許されるかどうか、一様収束と各点収束を分ける (第47章)。本書でもっとも重要な区別の一つである。

否定の作り方。量子子を含む文の否定は、機械的に作れる。 $\forall$ と $\exists$ を入れ替え、最後の主張を否定する。

$$\neg(\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon) \iff \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

つまり「収束しない」とは、ある ε が存在して、どんなに先へ行っても a から ε 以上離れる番号があるということである。**否定を機械的に作れることが、背理法と対偶を使える条件になっている。**

記号は、思考の節約のためではなく、あいまいさの排除のためにある。日本語で書いたときに二通りに読める文が、記号では一通りにしか読めない——それが記号を使う理由である。

★★★ 大学院 証明とは何か——形式化できるのか

本章では証明を「既に認めた事柄から導く文」と述べた。では「導く」とは何か。この問いは二〇世紀の数学基礎論の出発点であり、いまでも完全には決着していない。

形式的証明という理想。二〇世紀初頭、証明を完全に機械的な手続きに還元する計画が立てられた。公理を並べ、推論規則を定め、証明とは記号列の有限列であって、各行が公理か、前の行から規則によって得られるものと定義する。この定義のもとでは、ある記号列が証明であるかどうかは機械的に確かめられる。

そして限界が示された。ゲーデル Gödel の不完全性定理は、この計画に本質的な制約があることを示した。算術を含むだけの強さを持ち、かつ無矛盾な公理系は、**その体系内で証明も反証もできない主張を必ず含む。**しかも、その体系自身の無矛盾性は、その体系内では証明できない。

これは数学を否定するのか。しない。不完全性定理が述べているのは「真だが証明できない主張がある」ことであって、「証明できたことが怪しい」ことではない。証明できたものは依然として証明できている。ただし、公理系を選ぶという行為が、**数学の外にあることが明らかになった。**

本書に関わる具体例。この抽象的な話は、本書の内容に直接関わる。

第3章で扱う**選択公理**は、他の公理から証明も反証もできない。採用するかどうかは選択である。採用すればチコノフ Tychonoff の定理（第21章）が得られ、同時にバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説のような直観に反する帰結も生じる。第4章で扱う**連続体仮説**も同様に独立であり、

第36章のスーリン Souslin 問題は、その独立性が位相空間の性質として現れる例である。

「この定理は成り立つか」という問いに、「どの公理系の上で問うているか次第だ」という答えが返ってくる場面が、本書には実際に現れる。

実務としての証明。他方で、数学者が日々書いている証明は、形式的証明ではない。読者が形式的証明に翻訳できると納得するに足る説明である。どこまで書けば納得に足るかは、時代と読者によって変わる。一九世紀には認められた議論が、いまは不十分とされることがある（第43章で実数の構成を扱うときに、この例を見る）。

近年は、証明を計算機で検証する試みが進んでいる。四色定理のように、計算機の助けなしには検証しきれない証明も現れた。「証明とは何か」という問いは、技術の変化によって形を変えながら続いている。

演習

基本

1. 命題「 $x > 2$ ならば $x^2 > 4$ 」の逆・裏・対偶をそれぞれ述べ、真偽を判定せよ。
2. 「空集合のすべての元は赤い」が真である理由を説明せよ。
3. 三つの条件が同値であることを示すとき、環状に示すと手間が減るのはなぜか。
4. 背理法による存在証明と構成による存在証明で、得られる情報がどう違うか述べよ。

証明

1. 命題 命題1.2 の証明において、「逆向きも同様」で済ませずに書き下した理由を説明せよ。(10点)
2. 数列 (a_n) が a に収束しないことの定義を、量子子を用いて書き下せ。さらに、その否定を作ってもとの定義に戻ることを確かめよ。(10点)

発展

1. 「どんな $\varepsilon > 0$ に対してもある N が存在して」という語順と、「ある N が存在してどんな $\varepsilon > 0$ に対しても」という語順で、主張がまったく異なることを示した。この違いが、一様収束と各点収束の区別(第47章)にどう対応するかを予想して述べよ。(20点)

集合・写像・同値関係

◆ この章の問い

- ・「集合とは、ものの集まりである」という説明は、なぜ通用しないのか。
- ・写像の像と逆像は、なぜこれほど振る舞いが違うのか。
- ・同値関係で割るという操作は、何を捨てて何を残しているのか。
- ・無限には大小があるのか。

素朴な定義が壊れるところ

集合を「ものの集まり」と説明するのは分かりやすい。そして、その分かりやすさがそのまま矛盾を生む。どんな条件を書いても、それを満たすものを全部集めれば集合になる——この素朴な原則を認めると、次の集合を考えることができてしまう。

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

自分自身を元として含まないもの全体である。ここで $R \in R$ かどうかを問う。含むとすれば条件により含まない。含まないとすれば条件を満たすので含む。どちらに転んでも矛盾する。ラッセル Russell が一九〇一年に見つけたこの逆説は、集合論をいったん壊した。

修復の方針は、「集める」操作を制限することだった。現在の標準的な公理系では、条件を満たすものを無制限に集めることは許されない。許されるのはすでに存在する集合の中から、条件を満たす元を選び出すことだけである。これを分出の公理という。

注意

この制限のもとでは、上の R は作れない。作れるのは、あらかじめ与えられた集合 A に対する $\{x \in A \mid x \notin x\}$ だけである。そしてこの集合は A の元ではない——それを示すのが演習である。「すべての集合の集合」も同じ理由で存在しない。

本書はこれ以上集合論の公理には立ち入らない。必要なのは、無制限な内包が許されないという点だけである。位相空間論では「ある空間のすべての開集合の族」のように大きな族をしばしば扱うが、それらはいずれも冪集合の部分集合として作られており、危険はない。

演算——任意個の合併と交叉

二つの集合の合併と交叉は既知とする。位相空間論で本質的に効いてくるのは、添字集合が有限でなくてもよいという点である。

添字集合 I と、各 $i \in I$ に対する集合 A_i が与えられたとき、

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

と定める。合併には存在量子が、交叉には全称量子が対応している。この対応は覚える価値がある。後に開集合の公理が「任意個の合併で閉じ、有限個の交叉で閉じる」という非対称な形をとるとき、その非対称性の意味を考える手掛かりになるからである（第5章）。

ド・モルガン De Morgan の法則も任意個で成り立つ。全体集合 X の中で補集合をとるとき、

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

である。補集合をとる操作が、合併と交叉を入れ替える。この事実によって、開集合について証明したことは自動的に閉集合についての主張に翻訳される。第6章で繰り返し使う。

写像——像と逆像は対等ではない

写像 $f: X \rightarrow Y$ とは、 X の各元に Y の元をただ一つ対応させる規則である。厳密には $X \times Y$ の部分集合 f であって、各 $x \in X$ に対して $(x, y) \in f$ となる y がちょうど一つ存在するもの、と定める。規則という言葉を使わずに済ませたいときは、この定義に戻ればよい。

定義2.1

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $A \subseteq X$ 、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

$f(A)$ を A の像、 $f^{-1}(B)$ を B の逆像という。

注意

記号 f^{-1} は逆写像を意味しない。逆写像が存在しなくても逆像は定義される。逆像は集合に対する操作であり、点に対する操作ではない。この混同は非常によく起きるので、最初に断っておく。

さて、ここからがこの節の要点である。**逆像は集合演算のすべてと可換であるが、像はそうではない。**

定理2.2 逆像は集合演算を保つ

$f: X \rightarrow Y$ とし、 $\{B_i\}_{i \in I}$ を Y の部分集合の族、 $B \subseteq Y$ とする。

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$$

証明 交叉の場合を示す。他も同様であり、ここでは省略してよい——同じ書き換えを繰り返すだけだからである。

$x \in f^{-1}(\bigcap_i B_i)$ であることは、定義により $f(x) \in \bigcap_i B_i$ と同値であり、これは「すべての i について $f(x) \in B_i$ 」と同値であり、さらに「すべての i について $x \in f^{-1}(B_i)$ 」と同値である。最後の条件は $x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i)$ にほかならない。

証明の全体が、定義を書き下して量子子の位置を動かさずに読み替えるだけで終わっていることに注意してほしい。逆像がこれほど素直なのは、 $x \in f^{-1}(B)$ が $f(x) \in B$ という一点の条件に還元されるからである。□

像はそうはいかない。 $y \in f(A)$ は「ある $x \in A$ があって $f(x) = y$ 」という存在の主張であり、存在量子子は交叉と可換でない。

反例2.3 像は交叉を保たない

$X = \{a, b\}$ 、 $Y = \{c\}$ とし、 $f(a) = f(b) = c$ とする。 $A_1 = \{a\}$ 、 $A_2 = \{b\}$ とおくと、

$$f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{c\} \cap \{c\} = \{c\}$$

となって一致しない。一般に成り立つのは

$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ という片側の包含だけである。等号が常に成り立つのは f が単射のときに限る。

像と逆像の非対称——どちらが集合演算と可換か




図2-1 逆像は一点ごとの条件に還元されるので、合併・交叉・補集合のすべてと可換になる。像は存在の主張なので、交叉が潰れる。連続性を逆像で定義するのは、この非対称のためである。

注意

この非対称が、本書の構成を決めている。連続写像を「開集合の逆像が開集合」と定義するのは、逆像だけが集合演算を壊さないからである。

「開集合の像が開集合」という条件も考えられるが（開写像という）、それは連続性とは別の、もっと強くて扱いにくい条件になる。第8章で正面から扱う。

同値関係——何を捨てるか

数学で「同じとみなす」という操作は、同値関係によって形式化される。

定義2.4

集合 X 上の関係 $\sim$ が**同値関係**であるとは、次の三つを満たすことをいう。

反射律 すべての x について $x \sim x$ 。

対称律 $x \sim y$ ならば $y \sim x$ 。

推移律 $x \sim y$ かつ $y \sim z$ ならば $x \sim z$ 。

x を含む**同値類**を $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ と書き、同値類全体の集合を $X/\sim$ と書いて**商集合**という。

命題2.5

X 上の同値関係 $\sim$ に対し、同値類の全体は X の分割をなす。すなわち、どの同値類も空でなく、和集合が X に等しく、異なる二つの同値類は交わらない。逆に、 X の任意の分割は、ちょうど一つの同値関係から得られる。

証明 反射律より $x \in [x]$ なので、同値類は空でなく、和集合は X を覆う。交わらないことを示す。 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ とし、 z をその元とする。 $z \sim x$ かつ $z \sim y$ である。対称律と推移律より $x \sim y$ が従う。すると任意の $w \in [x]$ について $w \sim x \sim y$ なので $w \in [y]$ 、つまり $[x] \subseteq [y]$ 。役割を入れ替えて逆向きも得られ、 $[x] = [y]$ 。交われば一致する——これが分割の意味である。

逆を示す。分割 $\mathcal{P}$ が与えられたとき、 $x \sim y$ を「 x と y が同じ要素に属する」と定めれば、三つの条件はただちに確かめられる。一意性は、同値関係が同値類によって完全に決まることから従う。□

商集合を作るとは、区別する必要のない違いを捨てることである。何を捨てるかを決めるのが同値関係であり、**捨てた後に何が残るかを見極める**。

ことが、商を扱う際の実質的な作業になる。整数の合同、ベクトル空間の商、そして第10章の商空間は、いずれも同じ構造をしている。

濃度——無限の大小

二つの集合のあいだに全単射があるとき、濃度が等しいという。有限集合では元の個数が一致することと同じだが、無限集合ではこの定義が直観を裏切る。自然数全体と偶数全体は、真部分集合でありながら濃度が等しい。

自然数全体と濃度の等しい集合を可算無限といい、有限または可算無限であることを可算という。有理数全体は可算である。では、すべての無限集合が可算なのか。この問いに答えたのがカントール Cantor であった。

定理2.6 カントールの定理

任意の集合 X について、 X から冪集合 $\mathcal{P}(X)$ への全射は存在しない。

証明 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ を任意の写像とし、

$$D = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

とおく。 D は X の部分集合であるから $\mathcal{P}(X)$ の元である。もし f が全射なら、 $f(d) = D$ となる $d \in X$ がある。ここで $d \in D$ かどうかを問う。 $d \in D$ とすれば D の定義より $d \notin f(d) = D$ 。 $d \notin D$ とすれば $d \in f(d)$ なので定義より $d \in D$ 。いずれも矛盾する。よって全射は存在しない。

□

注意

この証明は、本章の冒頭で見たラッセルの逆説とまったく同じ仕掛けを使っている。違いは、無制限に集めていないことである。 D は既存の集合

X から分出しているので、正当に存在する。**逆説を生んだ対角線の議論が、制限のもとでは定理を生む。**

$x \mapsto \{x\}$ は単射なので、 X の濃度は $\mathcal{P}(X)$ の濃度より真に小さい。したがって無限には限りなく多くの段階がある。特に実数全体は自然数全体と濃度が等しくない——第43章で実数を構成したのち、この事実が解析学でどう効くかを見る。

★★ 学部後半 逆像の可換性は、どこまで自明か

「逆像は演算と可換、像は可換でない」という事実は、暗記すべき公式のように見える。しかし理由を押さえておくと、忘れても再構成できる。

述語の言葉で見ると。部分集合 $B \subseteq Y$ は、述語 $P_B(y) \equiv (y \in B)$ と同一視できる。このとき逆像は

$$x \in f^{-1}(B) \iff P_B(f(x))$$

であり、逆像をとる操作は述語に f を代入する操作にすぎない。代入は論理結合子と可換である—— $P \wedge Q$ に代入したものは、代入したものの同士の $\wedge$ に等しい。**逆像の可換性は、代入が論理結合子を透過するという、それだけの事実である。**

像はなぜ違うのか。像は代入ではなく、存在量化である。

$$y \in f(A) \iff \exists x (x \in A \wedge f(x) = y)$$

$\exists$ は $\vee$ とは可換だが $\wedge$ とは可換でない。 $\exists x(P \vee Q)$ と $\exists xP \vee \exists xQ$ は同値だが、 $\exists x(P \wedge Q)$ は $\exists xP \wedge \exists xQ$ より真に強い。左辺は同じ x が両方を満たすことを要求し、右辺は別々の x でよい。この一点が、反例反例2.3の正体である。

補集合はどうか。像と補集合の関係はさらに悪い。一般には $f(X \setminus A)$ と $Y \setminus f(A)$ のあいだにどちらの包含も成り立たない。 f が全射でなければ

ば左辺に入らない点が右辺にあり、 f が単射でなければ右辺に入らない点が左辺にある。**両方の包含が成り立つのは、 f が全単射のときに限る。**

まとめると次の表になる。成り立つ包含だけを書く。

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2), \quad f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

最後の二つも向きを間違えやすい。 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ の等号は f が単射のとき、 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ の等号は f が全射のときに成り立つ。どちらも、証明を書けば一行で終わる。書いてみることを勧める。

★★★ 大学院 選択公理なしで、どこまで進めるか

本章の結果は、どれも選択公理を使っていない。分出と冪集合と対の公理だけで足りる。しかし「可算」という概念のまわりには、選択公理の影が早くも差している。

可算和は可算か。「可算個の可算集合の合併は可算である」という主張は、教科書で当然のように使われる。証明は、各 A_n に自然数からの全単射 f_n を取り、 $(n, k) \mapsto f_n(k)$ で数え上げるといものである。ここに可算個の選択が隠れている——各 n について f_n を「取る」操作は、可算選択公理を使っている。

実際、選択公理を完全に否定するある種のモデルでは、**実数全体が可算個の可算集合の合併になる**ことが知られている。フェファーマン Feferman とレヴィ Lévy によるこのモデルでは、カントールの定理は依然として成り立つ（それは選択公理を使わない）が、可算性についての直観は崩れる。定理が成り立つことと、直観が通用することは別である。

濃度の比較可能性。「任意の二つの集合は、一方から他方への単射があるか、その逆があるかのいずれかである」——これを濃度の三分律とい

う。**三分律は選択公理と同値である。**選択公理を仮定しなければ、比較できない濃度の対が存在しうる。次章でこの事実を正面から扱う。

ベルンシュタインの定理は例外である。一方で、「 X から Y への単射と Y から X への単射があれば、全単射がある」というカントール–ベルンシュタイン Cantor–Bernstein の定理は、選択公理を使わずに証明できる。証明は構成的で、二つの単射の合成を繰り返して軌道を追い、軌道の型に応じて対応を定める。比較可能性は選択を要するが、比較した後の話は要しない——この境界は覚えておく価値がある。

本書での扱い。以降、選択公理を使う証明にはそのつど断りを入れる。特に第21章のチコノフ Tychonoff の定理は選択公理と同値であり、第27章のベール Baire のカテゴリー定理は従属選択公理と同値である。これらは単なる注釈ではない。**位相空間論の主要定理のいくつかは、集合論の公理の強さをそのまま反映している。**

演習

基本

1. 集合 A に対して $B = \{x \in A \mid x \notin x\}$ とおく。 $B \in A$ が成り立たないことを示せ。
2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ とするとき、 $f([-1, 2])$ と $f^{-1}([1, 4])$ を求めよ。
3. 整数上の関係「 $m - n$ が3で割り切れる」が同値関係であることを確かめ、同値類をすべて挙げよ。
4. 有理数全体が可算であることを、数え上げの方法を明示して述べよ。

証明

1. 定理2.2のうち、合併と補集合の場合を書き下せ。(10点)
2. 任意の f と $A \subseteq X$ について $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ を示し、等号が成り立つための必要十分条件が f の単射性であることを示せ。(15点)
3. 定理2.6 を用いて、すべての集合の集合が存在しないことを示せ。(15点)

発展

1. カントール-ベルンシュタインの定理を、選択公理を使わずに証明せよ。二つの単射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ に対し、各元の「来歴」を g^{-1}, f^{-1} と遡って分類する方針をとるとよい。(30点)
2. 像が交叉を保たない例を、 $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への連続写像のなかから作れ。また、 $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ がすべての A_1, A_2 について成り立つならば f が単射であることを示せ。(20点)

選択公理とその同値物

◆ この章の問い

- ・「各箱から一つずつ選ぶ」という当たり前に見える操作が、なぜ公理を要するのか。
- ・ツォルンの補題は、選択公理とどこが同じなのか。
- ・選択公理を認めると、なぜ直観に反する帰結が出てくるのか。
- ・認めない数学は、どこまで進めるのか。

無限個の選択は、有限個の選択と違う

空でない集合が有限個あるとき、それぞれから元を一つずつ取り出せる。これは公理ではなく、定理である。集合が空でないとは「元が存在する」という主張なのだから、一つ取り、二つ取り、と有限回繰り返せばよい。繰り返しの回数が有限であることが効いている。帰納法で書けば、証明は三行で終わる。

では、空でない集合が無限個あるときはどうか。「一つずつ取る」という操作を無限回続けることは、有限回の推論を並べても正当化できない。必要なのは、選び方を一挙に与える写像の存在である。それを要求するのが選択公理である。

定義3.1 選択公理

空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ が与えられたとき、写像

$$c: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{で} \quad c(i) \in A_i \quad (\forall i \in I)$$

を満たすものが存在する。この c を選択関数という。

注意

選択公理は「選べる」と主張するだけで、どう選ぶかは教えない。存在は保証されるが、具体物は手に入らない——第1章の図で見た、背理法と構成のあいだの溝が、ここでも開いている。選択公理を使った証明から、具体的な対象を取り出すことは一般にできない。この性質が、後に述べる直観に反する帰結の源になる。

ラッセル Russell が挙げた例が事情を明瞭にする。靴が無限足あるとき、各足から一つずつ選ぶのに公理はいらない——「左足を取る」という規則を書けばよい。だが靴下が無限足あるときは、左右の区別がないので規則が書けない。選択公理は、この「規則が書けない」場合を埋めるためにある。

族が有限のときは不要であり、また各 A_i が自然数の空でない部分集合であるようなときも不要である（最小元を取ればよい）。選択公理が本当に効くのは、選ぶべきものに自然な順序も自然な代表もないときだけである。

順序集合の言葉

同値物を述べるために、順序の言葉を用意する。

定義3.2

集合 P 上の関係 $\leq$ が半順序であるとは、反射律 ($x \leq x$)、反対称律 ($x \leq y$ かつ $y \leq x$ ならば $x = y$)、推移律を満たすことをいう。 P の任意の二元が比較可能るとき全順序という。

P の部分集合 C が、 $\leq$ の制限について全順序になるとき C を鎖という。 $u \in P$ が C の上界であるとは、すべての $x \in C$ について $x \leq u$ なることをいう。 $m \in P$ が極大元であるとは、 $m \leq x$ なる x が m 自身に限ることをいう。

注意

極大元と最大元を混同しないこと。最大元はすべての元より大きいのが、極大元は「それより大きいものがない」だけである。比較できない元があってもよい。半順序集合には極大元が複数あってよく、最大元は高々一つしかない。

もう一つ、整列の概念が要る。全順序集合 $(W, \leq)$ が整列集合であるとは、 W の空でない部分集合がすべて最小元をもつことをいう。自然数全体は整列集合であり、整数全体や実数の区間は整列集合でない。整列集合の上では超限帰納法が使える——それが整列の御利益である（第4章）。

三つの主張が同じものであること

定理3.3 選択公理の同値物

次の三つは、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで互いに同値である。

- (1) **選択公理** 空でない集合の族には選択関数が存在する。
- (2) **ツォルンの補題** 半順序集合 P が空でなく、すべての鎖が上界をもつならば、 P は極大元をもつ。
- (3) **整列定理** 任意の集合には、それを整列集合にする順序が存在する。

三つが同値であることは、循環に証明するのが手際がよい。(1) から (2)、(2) から (3)、(3) から (1) を示せば、三通りの往復をすべて示したことになる——第1章で述べた環状の手である。ここでは (3) から (1) と、(2) から (3) を示し、もっとも重い (1) から (2) は骨組みだけを述べる。完全な証明は★★に置く。

証明 (3) から (1)。 $\{A_i\}_{i \in I}$ を空でない集合の族とする。整列定理により、 $\bigcup_i A_i$ に整列順序を一つ入れる。各 A_i は空でない部分集合だから最小元をもつ。 $c(i)$ をその最小元と定めれば、これが選択関数である。整列順序が「選ぶ規則」そのものを与えている。

(2) から (3)。集合 X を与える。 X の部分集合 A と、 A 上の整列順序 $\leq_A$ の対 $(A, \leq_A)$ 全体を P とする。 $(A, \leq_A) \preceq (B, \leq_B)$ を「 $A \subseteq B$ であり、 $\leq_B$ の A への制限が $\leq_A$ に等しく、さらに A が B の始切片である」と定めると、 $\preceq$ は半順序になる。 $(\emptyset, \emptyset)$ があるので P は空でない。

P の鎖 C に対しては、台集合の合併と順序の合併をとれば上界が得られる。始切片であるという条件が、合併した順序が再び整列になることを保証している。実際、合併の空でない部分集合 S を取れば、 S と交わる鎖の元を一つ選んで、そこでの最小元が S 全体の最小元になる。

よってツォルンの補題より極大元 $(M, \leq_M)$ が存在する。もし $M \neq X$ なら、 $x \in X \setminus M$ を取り、 $M \cup \{x\}$ に x を最大元として付け足した順序を考えると、これは P の元であって $(M, \leq_M)$ より真に大きい。極大性に反する。よって $M = X$ であり、 X は整列される。□

選択公理をめぐる同値と帰結——環状に示し、外へ広がる




図3-1 三つの主張は同値であり、環状に示すのが手際がよい。右側は選択公理を採用したときに生じるもので、上下は切り離せない。

値段——何を受け入れることになるのか

選択公理は、解析学と位相空間論の広い範囲を支えている。ベクトル空間には必ず基底があり、チコノフ Tychonoff の定理が成り立ち、ハーン-バナッハ Hahn-Banach の定理が使える。これらを手放すと、本書の後半はほとんど成立しない。

その一方で、次のようなものも同時に生じる。

例3.4 ヴィタリ集合

区間 $[0, 1]$ 上で、 $x \sim y$ を「 $x - y$ が有理数」と定めると同値関係になる。各同値類から代表を一つずつ選んで集めた集合 V を考える。この「選ぶ」に選択公理を使っている。

V は長さをもてない。有理数 $q \in [-1, 1]$ による平行移動 $V + q$ は互いに交わず、その合併は $[-1, 2]$ に含まれ $[0, 1]$ を含む。もし V に長さ λ があれば、可算個の交わらない集合の長さの和として

$$1 \leq \sum_q \lambda \leq 3$$

が成り立たねばならない。しかし左辺は $\lambda = 0$ なら 0 、 $\lambda > 0$ なら無限大で、どちらも不等式を満たさない。よって V は測れない。第53章でこの議論を精密に述べる。

より劇的なのがバナッハ-タルスキ Banach-Tarski の逆説である。三次元の球を有限個に分割し、回転と平行移動だけで組み直すと、もとと同じ大きさの球が二つできる。分割の各片は、ヴィタリ集合と同じ理由で測れない。

注意

この逆説は物理的な主張ではない。述べているのは「体積という概念を、すべての部分集合に矛盾なく与えることはできない」ということである。逆説を避ける道は、選択公理を捨てることではなく、測れる集合だけ

を相手にすることだった。測度論が可測集合の族を限定して出発するのは、この事情による（第52章）。

そして決定的な事実がある。**選択公理は、他の公理から証明も反証もできない。**ゲーデル Gödel は一九三八年に選択公理が矛盾を生まないことを示し、コーエン Cohen は一九六三年に、選択公理の否定もまた矛盾を生まないことを示した。採用するかどうかは、証明の問題ではなく選択の問題である。本書は採用する。ただし使うたびに断る。

★★ 学部後半 ツォルンの補題の証明と、その使い方

選択公理からツォルンの補題を導く部分は、三つの同値のうちもっとも技術的である。骨組みを述べておく。

方針。 P を仮定を満たす半順序集合とし、極大元がないと仮定して矛盾を導く。極大元がなければ、どの元 x にも $x < y$ なる y がある。選択公理により、各元に対してそのような y を一つ選ぶ写像 s が取れる。同様に、各鎖に対してその上界を一つ選ぶ写像も取れる。これで「常に一歩先へ進む規則」が手に入った。

超限的に延ばす。この規則を ω から始めて繰り返し適用し、極限段階では上界を取る。すると、 P のなかに順序数で添字づけられた真に増加する列ができる。**ところが順序数の全体は集合でないほど大きい。**一方この列は P のなかにあるから、単射 $\text{Ord} \rightarrow P$ が得られることになり、置換公理に反する。よって極大元が存在する。

この論法は次章の順序数を使うので、厳密な形は第4章の後に読み返すのがよい。順序数を避けて、ブルバキ-ヴィット Bourbaki-Witt の不動点定理を経由する証明もある。そちらは超限帰納法を表に出さずに済むが、代わりに閉包性の議論が込み入る。

実際の使い方。ツォルンの補題を適用するときの手順は、いつも同じ三段である。

第一に、求めたいものの「部分的な答え」全体を半順序集合 P として定める。基底が欲しければ一次独立な部分集合の全体、イデアルが欲しければ真イデアルの全体を取る。

第二に、鎖に上界があることを確かめる。ほとんどの場合、鎖の合併がそのまま上界になる。ここで確かめるべきは「合併が P の元であること」であり、**定義に現れる条件が有限のかが分かれ目になる。**一次独立性は有限個の元だけに関わる条件なので、合併でも保たれる。

第三に、極大元が求めるものであることを示す。そうでなければ真に大きい元を作れてしまう、という形の背理法になる。

この三段は、第67章のハーン-バナッハの定理でも、線型空間の基底の存在でも、極大イデアルの存在でも、そのまま繰り返される。証明の型として覚えておくと、以降の見通しがよくなる。

★★★ 大学院 弱い選択公理と、位相空間論への跳ね返り

選択公理は一つの主張ではなく、強さの異なる主張の階層をなしている。どれを仮定するかで、成り立つ定理が変わる。

可算選択公理。族の添字集合が可算であるときに限った選択公理である。解析学の基本的な事実の多くは、これだけで足りる。「点列コンパクトならば可算コンパクト」「実数の可算部分集合の上限が列の極限として実現される」などがそうである。前章で触れた「可算個の可算集合の合併は可算」も、これと同値ではないが、これから従う。

従属選択公理。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるならば、 $x_0Rx_1Rx_2\cdots$ という列が取れる、という主張である。可算選択公理より真に強い。**ベール Baire のカテゴリー定理 (第27章) は、従属選択公理と同値である。**完備距離空間で可算個の稠密開集合の交叉が稠密であるという、解析学の至るところで使われる定理が、集合論の公理と正確に釣り合っている。

超フィルター補題。「どのフィルターも極大フィルターに拡張できる」という主張で、選択公理より真に弱い。第12章で導入するフィルターの言葉で述べられるこの補題は、チコノフの定理のハウスドルフ空間版と同値である。一方、一般の空間についてのチコノフの定理は完全な選択公理と同値である。**分離公理を一段落とすだけで、必要な集合論の強さが変わる**——これが第II部と第III部の関係を見るとき、一つの視点になる。

選択公理を否定する世界。ソロヴェイ Solovay は一九七〇年に、従属選択公理は成り立つが実数のすべての部分集合が可測であるようなモデルを構成した（到達不能基数の存在を仮定する）。この世界では、ヴィタリ集合もバナッハ-タルスキの逆説も存在しない。そして解析学の大部分は、ほとんどそのまま通用する。

ただし失われるものもある。この世界では実数の集合に整列順序が入らず、ハーネ-バナッハの定理も一般の形では成り立たない。関数解析は、双対空間が十分に大きいことを前提に組み立てられている。第66章から第73章までの議論は、選択公理なしでは骨格を保てない。

本書の立場。以上を踏まえて、本書は選択公理を採用する。**ただし、ある定理がどの強さの選択を要するかは、分かる範囲で明記する。**それは銜学ではない。どの仮定が本質的かを知ることが、定理の意味を知ることの一部だからである——第1章で述べた「仮定を外すと何が壊れるか」の、もっとも深い層にあたる。

演習

基本

1. 空でない集合が有限個のときに選択関数が存在することを、帰納法で示せ。
2. 各 A_i が自然数全体の空でない部分集合であるとき、選択公理を使わずに選択関数を作れ。
3. 極大元をもつが最大元をもたない半順序集合の例を挙げよ。
4. 整数全体が通常で順序で整列集合でないことを示せ。

証明

1. 定理3.3 のうち、整列定理から選択公理を導く部分を、自分の言葉で書き直せ。(10点)
2. ツォルンの補題を用いて、任意のベクトル空間に基底が存在することを示せ。★★で述べた三段の手順に従うこと。(20点)
3. 例3.4 の議論で、 $V + q$ が互いに交わらないことと、合併が $[0, 1]$ を含むことを確かめよ。(15点)

発展

1. 可算選択公理と従属選択公理の違いを、それぞれが使われる具体的な場面を挙げて説明せよ。とくに「点列コンパクトならば可算コンパクト」の証明で、どちらが必要になるかを検討せよ。(25点)
2. 選択公理を仮定しない世界で実数の部分集合がすべて可測になりうることと、その世界で失われる関数解析の定理を挙げ、両者の交換関係を論ぜよ。(30点)

順序数と基数

◆ この章の問い

- ・「無限番目」という言い方に、意味を与えられるか。
- ・数える順序（順序数）と、大きさ（基数）は、なぜ別の概念なのか。
- ・自然数の次の無限は、実数の個数なのか。

順序数——整列集合を数とみなす

前章で、どの集合も整列できることを見た。整列集合は「一番目、二番目、……」と並べられる集合であり、有限で止まるとは限らない。自然数を全部並べ終えたあとに、もう一つ元を置くことができる。その元は「無限番目」と呼ぶしかない位置にある。

このような位置を数として扱うために、順序数を導入する。**順序数とは、整列集合の「並び方の型」を代表する集合である。**代表のとり方には一つの巧妙な工夫がある。

定義4.1

集合 α が**順序数**であるとは、次の二つを満たすことをいう。

- (1) α は推移的である。すなわち $x \in \alpha$ ならば $x \subseteq \alpha$ 。
- (2) 関係 $\in$ は α を整列する。

この定義のもとでは、それぞれの順序数は、自分より小さい順序数の全体に等しい。

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \dots$$

自然数をすべて集めたものも、この条件を満たす。これを ω と書く。

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

そして ω のあとが続く。 α の次の順序数は $\alpha \cup \{\alpha\}$ であり、これを $\alpha + 1$ と書く。

$$\omega + 1, \quad \omega + 2, \quad \dots, \quad \omega + \omega = \omega \cdot 2, \quad \dots, \quad \omega^2, \quad \dots, \quad \omega^\omega, \quad \dots$$

注意

順序数には二種類ある。 $\alpha = \beta + 1$ と書けるものを**後続順序数**、0 でも後続でもないものを**極限順序数**という。 ω と $\omega \cdot 2$ は極限順序数である。極限順序数には直前の元がない。**帰納法の議論で場合分けが必要になるのは、この区別のためである。**

順序数の全体は、 $\in$ によって整列されている。だが順序数の全体は集合ではない。もし集合なら、それ自身が順序数になり、自分自身の元になってしまう。これをブラリ＝フォルティ Burali-Forti の逆説という。第2章のラッセルの逆説と同じ構造であり、同じ理由で禁じられる。

超限帰納法——帰納法を無限番目まで伸ばす

自然数についての帰納法は「0 で成り立ち、 n で成り立てば $n + 1$ でも成り立つ」という形をとる。順序数ではこれに一段加える。

定理4.2 超限帰納法

順序数についての性質 P が次を満たすとする。

- (1) $P(0)$ が成り立つ。
- (2) $P(\alpha)$ ならば $P(\alpha + 1)$ 。
- (3) λ が極限順序数で、すべての $\beta < \lambda$ について $P(\beta)$ が成り立つならば、 $P(\lambda)$ 。

このとき、すべての順序数 α について $P(\alpha)$ が成り立つ。

証明 $P(\alpha)$ が成り立たない順序数があったとし、そのようなものの全体を考える。順序数は $\in$ で整列されているから、この族には最小のもの α_0 がある。 $\alpha_0 = 0$ なら (1) に反する。 $\alpha_0 = \beta + 1$ なら、 $\beta < \alpha_0$ より $P(\beta)$ が成り立ち、(2) から $P(\alpha_0)$ が従って矛盾する。 α_0 が極限順序数なら、すべての $\beta < \alpha_0$ で $P(\beta)$ が成り立つので (3) から $P(\alpha_0)$ が従い、やはり矛盾する。三つの場合をすべて尽くしたので、そのような α_0 は存在しない。□

注意

超限帰納法の本質は「整列していること」であって、順序数であることではない。**整列集合の上でなら、同じ議論がそのまま通る。**前章で整列定理を得たのは、まさにこの道具を任意の集合の上で使えるようにするためだった。第3章のツォルンの補題の証明も、ここに戻ってくる。

対応する構成の原理が**超限再帰**である。「すでに定めた値から次の値を定める規則」を与えると、すべての順序数について値が定まる。帰納法が証明の道具であるのに対し、再帰は定義の道具である。本書では第52章の外測度の構成や、第23章のコンパクト化の構成で使う。

基数——大きさだけを見る

順序数は並び方を区別する。だが大きさだけを見たいときには、区別しすぎる。

例4.3 並びが違っても大きさは同じ

ω と $\omega + 1$ は順序数として異なる。前者には最大元がなく、後者にはある。したがって順序同型ではない。しかし全単射は存在する。

$\omega + 1 = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\omega\}$ の元を

$$\omega \mapsto 0, \quad n \mapsto n + 1 \quad (n \in \omega)$$

と対応させれば、 ω との全単射が得られる。**並べ替えると型が変わるが、個数は変わらない。**

そこで、大きさだけを取り出す。

定義4.4

順序数 κ が**基数**であるとは、 κ と全単射をもつ順序数のうち最小のものであることをいう。集合 X の**濃度** $|X|$ とは、 X と全単射をもつ基数のことである。

濃度が定義できるのは整列定理のおかげである。選択公理がなければ、どの集合にも濃度があるとは限らない。有限の順序数はすべて基数であり、 ω も基数である。基数としての ω を $\aleph_0$ と書く。 $\omega + 1$ は基数でない。

無限基数は、小さい順に並べることができる。 $\aleph_0$ の次の基数を $\aleph_1$ 、その次を $\aleph_2$ と書き、極限では和をとる。 $\aleph_1$ は「 **$\aleph_0$ より大きい最小の基数**」であって、**何か具体的な集合の濃度として与えられるのではない。**この点が次節の問題につながる。

順序数の並びと、そこから基数を拾うこと




図4-1 順序数は並び方を、基数は大きさを表す。可算な順序数は ω_1 の手前に無数に並び、どれも濃度は $\aleph_0$ である。

連続体仮説

第2章のカントールの定理により、 $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ である。一方 $\aleph_1$ は $\aleph_0$ より大きい最小の基数である。したがって $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ は確実に成り立つ。では等号が成り立つか。

問題4.5 連続体仮説

$2^{\aleph_0} = \aleph_1$ であるか。言い換えれば、実数の部分集合であって、可算でも実数全体と同じ濃度でもないものが存在するか。

カントールはこれを肯定と予想し、証明を試みて果たせなかった。結末は一九六三年に出た。**連続体仮説は、選択公理を含む集合論の公理系から、証明も反証もできない。**ゲーデルが「仮定しても矛盾しない」ことを示し、コーエンが「否定しても矛盾しない」ことを示した。

注意

これは「まだ分かっていない」という意味ではない。公理系が答えを決めていない、という意味である。第1章の★★★で述べた「どの公理系の上で問うているか次第だ」という事態が、ここに実例として現れている。本書では第36章のスーリン Souslin 問題で、この独立性が位相空間の性質としてそのまま姿を現す場面を扱う。

★★ 学部後半 順序数の算術と、基数の算術は別物である

順序数にも基数にも和と積が定義される。記号は似ているが、振る舞いはまったく違う。混同すると議論が崩れるので、ここで整理しておく。

順序数の和。 $\alpha + \beta$ は、 α の後ろに β を並べた整列集合の型と定める。この定義から直ちに次が出る。

$$1 + \omega = \omega, \quad \omega + 1 \neq \omega$$

$1 + \omega$ は「一つ置いてから自然数を並べる」ことであり、全体として自然数の並びと同型である。 $\omega + 1$ は「自然数を並べてから一つ置く」ことで、最大元ができてしまう。**順序数の和は可換でない。**

順序数の積。 $\alpha \cdot \beta$ は、 β の各点を α で置き換えたものと定める。こちらも可換でない。

$$2 \cdot \omega = \omega, \quad \omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega$$

書き順によって意味が変わるので、教科書ごとに約束が違うことがある。本書は上の約束を使う。

基数の算術。基数 κ, λ に対して、 $\kappa + \lambda$ は交わらない集合の合併の濃度、 $\kappa \cdot \lambda$ は直積の濃度と定める。こちらは可換であり、しかも無限では劇的に単純になる。

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda) \quad (\kappa, \lambda \text{ のいずれかが無限})$$

この等式は選択公理を使う。無限基数の和と積は情報を失う——だから濃度の議論で本当に効くのは冪だけである。

冪だけが難しい。 κ^λ は λ から κ への写像全体の濃度と定める。カントールの定理は $2^\kappa > \kappa$ を述べている。ではどれだけ大きいのか。**ここが公理から決まらない部分である。**

共終数。基数 κ の共終数 $\text{cf}(\kappa)$ とは、 κ に共終な部分集合の最小の濃度をいう。 $\text{cf}(\aleph_0) = \aleph_0$ 、 $\text{cf}(\aleph_1) = \aleph_1$ だが、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ である。ケーニヒ König の定理により

$$\text{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$$

が成り立つので、 $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$ であることはありえない。公理から決まらないとはいえ、何でもよいわけではない。**共終数の制約が、決まらない範囲に枠をはめている。**この概念は第35章の基数不変量で再登場する。

★★★ 大学院 決まらないことが、位相空間の性質として現れる

連続体仮説の独立性は、集合論の内輪の話に見えるかもしれない。だが本書の後半で、それが空間の性質として表に出る場面がある。

スーリン問題。実数直線は、次の性質で特徴づけられる。稠密で、端点がなく、連結で、そして可分（可算な稠密部分集合をもつ）である。ここで可分を可算鎖条件——互いに交わらない空でない開集合の族は必ず可算——に置き換えたら、同じ特徴づけになるか。

可分ならば可算鎖条件が従うので、問いは「逆が言えるか」である。**この問いの答えは、集合論の公理系から決まらない。**反例となる空間をスーリン直線という。マーティン Martin の公理と連続体仮説の否定を仮定すればスーリン直線は存在せず、構成可能性公理を仮定すれば存在する。第36章で詳しく扱う。

基数不変量の比較。第35章で導入する weight 、 density 、 cellularity 、 character といった基数不変量のあいだの大小関係にも、独立な命題が多数現れる。「この不変量はあの不変量より必ず小さいか」という素朴な問いが、公理系に依存する。実数直線の部分集合をめぐる一連の基数（いわゆる小さい基数）の相互関係は、それ自体が一つの研究分野をなしている。

次元論との関わり。第38章から第42章で扱う三つの次元 ind 、 Ind 、 dim は、可分距離空間では一致する。**一般の空間では一致せず、一致しない例の構成に集合論的な仮定が必要になることがある。**次元が「空間の素朴な性質」ではなく、どの公理系で見ているかに依存するという事実は、第42章の主題の一つである。

解析学ではどうか。解析学の主要な定理は、連続体仮説に依存しない。可測性、完備性、コンパクト性といった概念が、可算的な操作で閉じているからである。ただし境界に触れる例はある。第53章で扱う非可測集合の存在は選択公理に依存し、ルベーグ測度の拡張可能性——すべての部分集合に定義された可算加法的測度があるか——は可測基数という大きい基数の存在と結びつく。

本書の扱い方。独立な命題に出会ったとき、本書は「未解決」とは書かない。**未解決と独立は別である。**未解決とは答えがまだ見つかっていないこと、独立とは公理系が答えを持たないことである。前者は努力で解決するが、後者は公理を足さないかぎり解決しない。どちらであることを明記することが、この本が守る方針の一つである。

演習

基本

1. $4 = \{0, 1, 2, 3\}$ が **定義4.1** の二条件を満たすことを確かめよ。
2. $\omega + 1$ が極限順序数でないこと、 $\omega \cdot 2$ が極限順序数であることを示せ。
3. ω と $\omega \cdot 2$ のあいだに全単射を具体的に作れ。
4. $1 + \omega = \omega$ であって $\omega + 1 \neq \omega$ である理由を、整列集合の型の言葉で説明せよ。

証明

1. 順序数の全体が集合でないことを示せ（ブラリ＝フォルティの逆説）。
(15点)
2. **定理4.2** を用いて、整列集合上の超限再帰が値を一意に定めることを示せ。(20点)
3. $\aleph_1 \leq 2^{\aleph_0}$ を示せ。さらに、この不等式が選択公理なしでは示せないことを説明せよ。(20点)

発展

1. 共終数を定義し、 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$ を示せ。さらにケーニヒの定理から $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$ が従うことを説明せよ。(30点)
2. 連続体仮説が独立であることと、ある問題が未解決であることの違いを、本書の方針に照らして論ぜよ。第36章のスーリン問題を例に用いてよい。(25点)

第 I 部

位相空間の基礎

位相

なぜ「開集合」という一語から始めるのか。距離を忘れても残るものが位相であり、その抽象化がどこまで有効かを、収束の概念が点列では足りなくなるところまで追う。

なぜ開集合から始めるのか

◆ この章の問い

- 距離を測れないところで、「近い」をどう言えばよいのか。
- 位相の公理は、なぜ合併が任意個で、交叉が有限個なのか。
- この抽象化は、何を捨てて何を残したのか。

距離から始めて、距離を忘れる

実数の上で、関数 f が点 a で連続であるとは、次を意味した。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

この定義には距離 $|x - a|$ が現れる。だが、距離そのものが使われているわけではない。使われているのは「 a のまわりの小さな範囲」という観念だけである。**距離は、その範囲を作るための道具にすぎない。**

そこで、範囲のほうを先に用意してみる。 $U_\varepsilon(a) = \{x \mid |x - a| < \varepsilon\}$ を a の ε 近傍という。連続性の定義は、近傍の言葉でこう書き直せる。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$$

ここでさらに一步進む。第2章で見たように、像より逆像のほうが素直だった。逆像で書き直すと、 δ が姿を消す。

命題5.1

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ がすべての点で連続であることと、**すべての開集合 $V \subseteq \mathbb{R}$ について $f^{-1}(V)$ が開集合であることは同値である。**ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ が

開集合であるとは、各 $a \in U$ に対して $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ となる $\varepsilon > 0$ が存在することをいう。

証明 連続とする。 V を開集合、 $a \in f^{-1}(V)$ とする。 $f(a) \in V$ であり V は開だから、 $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$ なる ε がある。連続性より $f(U_\delta(a)) \subseteq U_\varepsilon(f(a))$ なる δ がある。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(V)$ であり、 $f^{-1}(V)$ は開集合である。

逆を示す。 a を任意の点、 $\varepsilon > 0$ を任意とする。 $U_\varepsilon(f(a))$ は開集合だから、仮定より $f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ は開集合であり、 a を含む。よって $U_\delta(a) \subseteq f^{-1}(U_\varepsilon(f(a)))$ なる δ があり、これは求める条件にほかならない。□

この命題で、連続性から ε と δ が消えた。残ったのは「開集合」という語だけである。ならば、開集合が何であるかを直接与えてしまえば、距離がなくても連続性を語れる。これが位相空間という概念の出発点である。

開集合の族が満たす性質

では、距離から作った開集合の族は、どんな性質をもっているか。三つある。

第一に、 $\emptyset$ と全体 $\mathbb{R}$ は開である。第二に、任意個の開集合の合併は開である。第三に、有限個の開集合の交叉は開である。

合併のほうを確かめる。 $a \in \bigcup_i U_i$ なら、ある i で $a \in U_i$ であり、その U_i のなかに a の近傍が取れる。それはそのまま合併のなかの近傍でもある。族がいくつあっても、使うのは一つだけなので、無限個でも困らない。

交叉は事情が違う。 $a \in U_1 \cap \cdots \cap U_n$ なら、各 i について $U_{\varepsilon_i}(a) \subseteq U_i$ なる ε_i がある。ここで $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ と置けばよい。最小値が正であることに、有限性が効いている。

反例5.2 無限個の交叉は開とは限らない

$U_n = (-1/n, 1/n)$ はすべて開集合である。しかし

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$$

であり、一点集合 $\{0\}$ は開でない。どんなに小さい ε を取っても $U_\varepsilon(0)$ は 0 以外の点を含む。無限個の ε_n の下限が 0 になってしまうところが、有限の場合との違いである。

公理として書き下す

いま抜き出した三つの性質を、そのまま定義に昇格させる。

定義5.3 位相空間

集合 X と、その部分集合の族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ の対 $(X, \mathcal{T})$ が位相空間であるとは、 $\mathcal{T}$ が次の三つを満たすことをいう。

(T1) $\emptyset \in \mathcal{T}$ かつ $X \in \mathcal{T}$ 。

(T2) $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ ならば $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (任意個の合併)。

(T3) $U, V \in \mathcal{T}$ ならば $U \cap V \in \mathcal{T}$ (したがって有限個の交叉)。

$\mathcal{T}$ を X 上の位相といい、 $\mathcal{T}$ の元を開集合という。

注意

(T3) は二つの場合だけを要求している。帰納法により有限個に拡張されるが、無限個には拡張されない。この非対称は、公理を書く人の趣味ではなく、距離空間の観察から強いられたものである。もし無限個の交叉まで許すと、何が起きるかは★★で見る。

この定義には、点のあいだの距離も、点そのものの性質も現れない。あるのは「どの部分集合を開と呼ぶか」という指定だけである。したがって、同じ集合の上に違う位相を入れることができる。

例5.4 三つの基本的な位相

任意の集合 X に対して、次はいずれも位相である。

離散位相 $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$ 。すべての部分集合が開。点がばらばらに離れている状態にあたる。

密着位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ 。開集合が二つしかない。どの点とどの点も分離できない。

補有限位相 $\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ が有限}\}$ 。 X が無限のとき、**空でない二つの開集合は必ず交わる**という奇妙な性質をもつ。第13章で分離公理を考えると、この空間が重要な参照点になる。

距離を捨てて位相が残る——何を忘れ、何が残ったか




図5-1 距離から位相への抽象化。数値としての遠さを捨てる代わりに、距離の入らない空間まで同じ言葉で扱えるようになる。捨てたものは第29章から第34章で改めて取り戻す。

抽象化は、ただの一般化ではない

「距離空間で成り立つことを一般の空間でも言えるようにした」というだけなら、この抽象化の価値は限られる。本当の見返りは別のところにある。

第一に、距離が自然に入らない空間が、数学には数多くある。関数全体の集合に各点収束を与えた空間（第11章の積空間）、多様体を貼り合わせて作る空間（第10章の商空間）、代数幾何のザリスキ位相。これらはいずれも位相空間として自然に扱えるが、距離空間としては扱いにくい、扱えない。

第二に、距離が入るとしても、位相だけが問題である場面が多い。連続性、コンパクト性、連結性はすべて位相だけで決まる。同じ位相を与える距離は無数にあり、どれを選んでも連続性の判定は変わらない。ならば、位相の言葉で述べたほうが本質が見える。

第三に、どこまで一般化できるかを調べることで、定理の意味を明らかにする。本書が第II部で分離公理の階層を、第III部で被覆性質の階層を丁寧に扱うのは、そのためである。「この定理はどの水準の空間で成り立つのか」を突き止めると、その定理が何に依存していたかが分かる。

★★ 学部後半 公理を変えたらどうなるか

位相の公理は、三つとも動かせない。どれを緩めても壊れる。実際に緩めてみると、公理が何を守っているかが見える。

交叉を任意個にしてみる。(T3)を「任意個の交叉で閉じる」に強めると、何が起きるか。各点 x について、 x を含む開集合すべての交叉を V_x とおく。強めた公理のもとでは V_x も開である。そして V_x は x を含む最小の開集合になる。

このような位相をアレクサンドロフ位相という。これは前順序集合と一対一に対応し、位相空間論というより順序集合論になる。実際、

$x \leq y \iff x \in V_y$ と定めると前順序が得られ、逆に前順序から同じ位相が復元される。有限空間はすべてアレクサンドロフ位相をもつので、有限位相空間論は組合せ論の一部になる。連続体を扱う道具としては無力である。

合併を有限個にしてみる。 (T2) を有限個に弱めると、開集合の族は有限交叉と有限合併で閉じるだけになり、これは位相ではなく束の構造である。実数の開集合 $(0, 1)$ は $\bigcup_n (1/n, 1 - 1/n)$ と書けるが、この表示が使えなくなる。近似の議論がすべて止まる。

大小の比較。 同じ集合 X 上の二つの位相 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ のとき、 $\mathcal{T}_2$ は $\mathcal{T}_1$ より強い（細かい）という。離散位相が最強、密着位相が最弱である。

この大小は、二つの方向に効く。位相が強いほど連続関数は多く出ていき、少なく入ってくる。離散位相をもつ空間からはどんな写像も連続だが、密着位相をもつ空間へはどんな写像も連続である。「**連続写像が多い**」ことは、**空間が良いことを意味しない。**

位相の共通部分。 X 上の位相の族 $\{\mathcal{T}_i\}$ があるとき、 $\bigcap_i \mathcal{T}_i$ は再び位相である。三つの公理がいずれも「族の元すべてについて」という形なので、交叉で保たれる。一方、合併は位相とは限らない。この事実が、次章以降で「ある族を含む最小の位相」を作るときの土台になる（第7章）。

★★★ 大学院 開集合でないものから始める道

位相空間を定義する方法は、開集合の族を与えるだけではない。同じ構造を、別の原始概念から定義できる。どれを出発点に選ぶかで、見える風景が変わる。

閉包作用素から。 クラトフスキ Kuratowski は、閉包をとる操作 $A \mapsto \overline{A}$ を原始概念として位相を定義した。要求する条件は四つである。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

この四条件から、 $\overline{A} = A$ となる A を閉集合と定めれば、その補集合の族が位相になる。第4の条件で合併しか現れず、交叉が現れないことに注意してほしい。これが (T2) と (T3) の非対称の裏返しである。第6章でこの同値を証明する。

近傍系から。各点に「その点の近傍の族」を割り当て、適当な条件を課しても同じ構造が得られる。この道は直観に近い——「近い」という概念を点ごとに与えるからである。ハウスドルフ Hausdorff の一九一四年の原著は、この形で位相空間を導入した。

点を使わない道。より徹底した見方がある。位相空間の本質が開集合の族にあるなら、点を忘れて、開集合の族がなす束だけを相手にしてはどうか。これがロケール locale (フレーム) の理論であり、点なし位相空間論と呼ばれる。

開集合の族は、任意合併と有限交叉で閉じた束をなす。この束構造だけを公理化したものをフレームといい、その反対圏をロケールの圏という。位相空間からは自然にロケールが得られるが、逆にロケールから点を復元できるとは限らない。点をもたない自明でないロケールが存在する。

この立場の御利益は、選択公理への依存が減ることである。チコノフの定理は位相空間では選択公理と同値だが (第21章)、ロケールの圏では選択公理なしに証明できる。同様に、ハーン-バナッハの定理のロケール版も構成的に証明できる。点という概念そのものが、選択公理を呼び込んでいた——この診断は、第3章で見た事情への一つの応答である。

本書は点をもつ位相空間を扱う。それが解析学への接続に必要なからである。だが「なぜ開集合から始めるのか」という本章の問いに対して、「そもそも点から始めなくてもよい」という答えがありうることは、記しておく価値がある。

演習

基本

1. $X = \{a, b, c\}$ 上の位相をすべて数え上げよ（同相なものを同一視しなくてよい）。
2. 離散位相と密着位相が 定義5.3 の三条件を満たすことを確かめよ。
3. 無限集合上の補有限位相で、空でない二つの開集合が必ず交わることを示せ。
4. $\mathbb{R}$ 上で $[0, 1]$ が開でないことを、開集合の定義に戻って示せ。

証明

1. 命題5.1 の証明を、逆像が集合演算を保つこと（第2章）がどこで効いているかを明示しながら書き直せ。（15点）
2. X 上の位相の族の共通部分が再び位相であることを示せ。また、合併が位相とは限らない例を挙げよ。（15点）
3. $\mathbb{R}$ の開集合が、高々可算個の互いに交わらない开区間の合併として一意に書けることを示せ。（20点）

発展

1. 任意個の交叉で閉じる位相（アレクサンドロフ位相）が、 X 上の前順序と一対一に対応することを示せ。（25点）
2. 同じ集合の上に、比較できない二つの位相——どちらも他方より強い——を作れ。（20点）

位相空間・閉集合・閉包・内部

◆ この章の問い

- ・閉集合は「開集合でない集合」ではない。では何か。
- ・閉包と内部は、どちらが基本的なのか。
- ・「稠密」という語は、どれだけ強い主張をしているのか。

閉集合——開集合の裏返し

位相は開集合の族として与えられた。だがその補集合の族も、まったく同じ情報をもっている。

定義6.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $F \subseteq X$ が閉集合であるとは、 $X \setminus F$ が開集合であることをいう。

注意

開と閉は排反ではない。**両方であるもの ($\emptyset$ と X は常にそう) も、どちらでもないものもある。** $\mathbb{R}$ の $[0, 1)$ はどちらもない。「閉集合」は「開集合の否定」ではなく、「補集合が開である集合」である。この混同は初学者の誤りの筆頭に来る。

第2章のド・モルガンの法則により、位相の公理はそのまま閉集合の性質に翻訳される。

命題6.2

閉集合の族は次を満たす。(F1) $\emptyset$ と X は閉。(F2) 任意個の閉集合の交叉は閉。(F3) 有限個の閉集合の合併は閉。

証明 (F2) を示す。 $\{F_i\}$ を閉集合の族とすると、

$$X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$$

であり、右辺は開集合の任意合併だから開である。よって左辺の補集合、すなわち $\bigcap_i F_i$ は閉である。(F1) と (F3) も同様に、ド・モルガンで移すだけである。□

合併と交叉の役割が、開と閉で入れ替わっている。**無限個の閉集合の合併は閉とは限らない。**実際 $\bigcup_n [1/n, 1] = (0, 1]$ は閉でない。第5章の反例を補集合で読み替えたものである。

閉包・内部・境界

任意の集合 A に対して、それを含む最小の閉集合と、それに含まれる最大の開集合が定まる。

定義6.3

$A \subseteq X$ に対し、

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid A \subseteq F, F \text{ は閉}\}, \quad A^\circ = \bigcup \{U \mid U \subseteq A, U \text{ は開}\}$$

をそれぞれ A の**閉包**、**内部**という。また $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$ を A の**境界**という。

(F2) より $\overline{A}$ は閉であり、(T2) より A° は開である。したがって $\overline{A}$ は A を含む最小の閉集合、 A° は A に含まれる最大の開集合である。次の特徴づけが、実際の計算では使いやすい。

定理6.4 閉包の点ごとの特徴づけ

$x \in \overline{A}$ であることと、 x を含むどの開集合も A と交わることは同値である。

証明 対偶で示す。 $x \notin \overline{A}$ とすると、 $U = X \setminus \overline{A}$ は x を含む開集合であり、 $\overline{A} \supseteq A$ より $U \cap A = \emptyset$ である。よって A と交わらない開集合が取れた。

逆に、 x を含む開集合 U で $U \cap A = \emptyset$ となるものがあったとすると $X \setminus U$ は A を含む閉集合だから $\overline{A} \subseteq X \setminus U$ 。 $x \in U$ より $x \notin \overline{A}$ である。□

注意

この特徴づけは「 x にいくらでも近いところに A の点がある」という直観を、距離を使わずに述べたものである。距離空間なら「どんな ε についても $U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$ 」と書けるが、一般の空間では ε がない。**開集合の族が、 ε の役割を代行している。**

閉包と内部は、補集合を通して互いに移り合う。

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ, \quad X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$$

したがって、どちらか一方を基本概念に選べば、他方は定義できる。どちらを選ぶかは趣味の問題である。本書は閉包を主に使う——収束の議論と相性がよいからである。

閉包・内部・境界——三つの領域に分かれる



図6-1 閉包・内部・境界の関係。有理数の例が示すように、稠密であることと内部をもつことは無関係である。境界が空であることは連結性と結びつく。

稠密・疎・そのあいだ

定義6.5

$A \subseteq X$ が稠密であるとは $\bar{A} = X$ となることをいい、疎であるとは $(\bar{A})^\circ = \emptyset$ となることをいう。

例6.6 有理数と無理数

$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。どの開区間にも有理数があるからである。同時に $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ である——どの開区間も無理数を含むので、 $\mathbb{Q}$ に含まれる開区間はない。無理数全体も同じく稠密で内部が空である。

互いに交わらない二つの稠密集合が共存できる。「稠密」は「たくさんある」ことを意味しない。実際、有理数は可算であり、実数の濃度からすれば無視できるほど少ない。

反例6.7 疎でないが内部も空

$\mathbb{Q}$ は疎ではない—— $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ の内部は $\mathbb{R}$ であって空でないからである。にもかかわらず $\mathbb{Q}$ 自身の内部は空である。「内部が空」と「疎」を混同してはならない。**疎であるとは、閉包をとってもなお内部が空であることをいう。**

整数全体 $\mathbb{Z}$ は閉集合であり内部が空なので、疎である。カントール集合も疎である。第27章のバールのカテゴリー定理は、この「疎」という概念の上に立っている。

集積点と孤立点

閉包の点は二種類に分かれる。

定義6.8

x が A の集積点であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ となることをいう。集積点全体を A' と書く。 A の点であって集積点でないものを孤立点という。

定義から $\overline{A} = A \cup A'$ が従う。 $x \in \overline{A}$ なら、 x 自身が A の点であるか、 x の近くに x と異なる A の点があるか、どちらかである。

例6.9 集積点の計算

$A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とすると、 $A' = \{0\}$ である。 A の点はすべて孤立点であり、 $\overline{A} = A \cup \{0\}$ 。集積点は A に属さなくてよい。

$A = \mathbb{Q}$ なら $A' = \mathbb{R}$ であり、孤立点はない。 $A = \mathbb{Z}$ なら $A' = \emptyset$ で、すべてが孤立点である。**孤立点をもたない閉集合を完全集合という**——カントール集合がその例であり、第27章と第53章で再登場する。

★★学部後半 閉包作用素から位相を復元する

第5章の★★★で触れたクラトフスキの公理を、ここで証明しておく。閉包を原始概念に選んでも、同じ構造が得られる。

閉包が満たす四条件。位相空間の閉包作用素は次を満たす。

$$\overline{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subseteq \overline{A}, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

最初の三つは定義から直ちに出る。第四のものを示す。

$A \cup B \subseteq \overline{A \cup B}$ であり、右辺は二つの閉集合の合併だから (F3) より閉である。よって $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{\overline{A \cup B}}$ 。逆向きは $A \subseteq A \cup B$ より $\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ 、 B についても同様だから従う。

逆の構成。集合 X と、四条件を満たす作用素 c が与えられたとする。 $\mathcal{F} = \{A \mid c(A) = A\}$ と置き、その補集合の族を $\mathcal{T}$ とする。 $\mathcal{T}$ が位相になり、その閉包作用素が c に一致することを示せばよい。

まず、第四条件から c は単調である。 $A \subseteq B$ なら $c(B) = c(A \cup B) = c(A) \cup c(B) \supseteq c(A)$ 。合併を保つことが、単調性を含んでいる。

(F3) は第四条件そのものである。(F2) を示す。 $\{A_i\}$ を $\mathcal{F}$ の族、 $A = \bigcap_i A_i$ とする。各 i について $A \subseteq A_i$ だから単調性より $c(A) \subseteq c(A_i) = A_i$ 。よって $c(A) \subseteq A$ であり、第二条件と合わせて $c(A) = A$ 。単調性だけで任意交叉が出るのが要点である。

なぜ交叉の条件が要らないのか。四条件には $\overline{A \cap B}$ についての要求がない。それは $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ が一般には成り立たないからである。有理数と無理数を取れば、左辺は $\overline{\emptyset} = \emptyset$ 、右辺は $\mathbb{R}$ である。

ここにも第2章の非対称が顔を出している。閉包は合併を保ち、交叉を保たない。そして位相の公理は、合併を任意個で、交叉を有限個で許した。二つの非対称は同じ根から出ている。

★★★ 大学院 クラトフスキの14集合問題

一つの集合から出発して、閉包をとる操作と補集合をとる操作を繰り返すと、いくつの相異なる集合が得られるか。答えは、どんな位相空間のどんな部分集合から始めても、高々14個である。クラトフスキが一九二二年に示した。

なぜ有限で止まるのか。閉包を k 、補集合を c と書く。 c は対合 ($cc = \text{id}$) であり、 k は冪等 ($kk = k$) である。鍵になるのは $kckckck = kck$ という等式である。これが成り立つと、長い語はすべて短い語に潰れ、可能な語は14個に限られる。

等式の証明には、 kck が単調であることと、 $A \subseteq kckA$ が閉集合 A について成り立つことを使う。技術的には短い、見通しをつけるのが難しい種類の議論である。

14個すべてが実現するか。する。 $\mathbb{R}$ のなかで

$$A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$$

と置くと、14個の相異なる集合が得られる。四つの成分が、それぞれ別の役割を果たしている——开区間の切れ目、孤立点、稠密だが内部のない部分。この例は、本章で導入した概念がすべて独立であることを一つの式で示している。

一般化。同じ問いを、閉包と内部の組合せ、あるいは閉包・補集合・合併の組合せで問うこともできる。閉包と内部だけなら7個、閉包・補集合・合併を許すと無限個になる。どの操作を許すかで答えが変わるので、問題としては操作の集合を指定して初めて意味をもつ。

これは何の役に立つのか。直接の応用は乏しい。だが、この問題は位相空間論の一つの性格をよく表している。単純な操作の組合せが、有限で止まるか止まらないかを問うこと——第38章からの次元論も、第35章からの基数不変量も、突き詰めればこの形の問いである。「どこまでが有限で、どこから先が無限か」を測ることが、この分野の仕事の一つになる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ において $[0, 1]$ の閉包・内部・境界を求めよ。
2. $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ を示し、等号が成り立たない例を挙げよ。
3. 補有限位相をもつ無限集合で、任意の無限部分集合が稠密であることを示せ。
4. 孤立点をもたない空でない閉集合の例を、 $\mathbb{R}$ のなかで二つ挙げよ。

証明

1. 定理6.4 を用いて $\overline{A} = A \cup A'$ を示せ。(10点)
2. $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$ を示せ。(10点)
3. A が疎であることと、 $X \setminus \overline{A}$ が稠密であることが同値であることを示せ。(15点)
4. クラトフスキの四条件を満たす作用素から位相が構成できることを、
★★の骨組みに従って完全書き下せ。(25点)

発展

1. $\mathbb{R}$ の部分集合 $A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ から、閉包と補集合を繰り返して得られる集合を14個すべて書き下せ。(30点)
2. 境界が空である部分集合が $\emptyset$ と X だけであることと、 X が連結であることが同値であることを示せ(連結性の定義は第28章で与えるが、「開かつ閉な部分集合が自明なものに限る」を定義としてよい)。(20点)

基底と準基底、近傍系

◆ この章の問い

- ・位相を与えるのに、開集合を全部並べる必要があるのか。
- ・どんな族からでも位相を生成できるのか。
- ・「小さい基底がある」ことは、空間について何を言っているのか。

開集合を全部書くのは無理である

$\mathbb{R}$ の開集合は非可算個ある。それを全部並べて位相を与えるわけにはいかない。実際には「开区間」という可算個の型を指定し、その合併として開集合を作った。この「型」にあたるものを基底という。

定義7.1

位相空間 $(X, \mathcal{T})$ において、 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ が基底であるとは、**どの開集合も $\mathcal{B}$ の元の合併として書ける**ことをいう。同じことだが、 U が開で $x \in U$ なら $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある、と言ってもよい。

二つの言い換えが同値であることを確かめておく。前者から後者は、 $U = \bigcup_j B_j$ と書いて x を含む B_j を取ればよい。後者から前者は、各 $x \in U$ に対して B_x を取り $U = \bigcup_{x \in U} B_x$ とすればよい。どちらの形で使うかは場面による。

では逆に、部分集合の族が与えられたとき、それが何かの位相の基底になっているかどうかは、どう判定するのか。

定理7.2 基底になるための条件

集合 X の部分集合の族 $\mathcal{B}$ が、 X 上のある位相の基底になるための必要十分条件は、次の二つである。

$$(B1) \bigcup \mathcal{B} = X.$$

(B2) $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ と $x \in B_1 \cap B_2$ に対し、 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ なる $B_3 \in \mathcal{B}$ が存在する。

このとき位相は $\mathcal{T} = \{\mathcal{B} \text{ の元の合併} \}$ として一意に定まる。

証明 必要性は易しい。 X は開だから (B1) が要る。 $B_1 \cap B_2$ も開だから、基底の第二の言い換えより (B2) が要る。

十分性を示す。 $\mathcal{T}$ を $\mathcal{B}$ の元の合併全体とする。(T1) は (B1) と、空な合併が $\emptyset$ であることによる。(T2) は合併の合併が合併であることから明らか。問題は (T3) である。

$U = \bigcup_i B_i$ 、 $V = \bigcup_j C_j$ とし、 $x \in U \cap V$ とする。 $x \in B_i$ かつ $x \in C_j$ なる i, j があり、(B2) より $x \in B \subseteq B_i \cap C_j \subseteq U \cap V$ なる $B \in \mathcal{B}$ がある。 x は任意だったので $U \cap V$ は $\mathcal{B}$ の元の合併であり、 $\mathcal{T}$ に属する。

一意性は、位相が基底の合併で決まることによる。□

注意

(B2) は「 $B_1 \cap B_2$ が $\mathcal{B}$ に属する」ことまでは要求していない。交叉そのものではなく、交叉の各点のまわりに小さい基底元が取ればよい。
開区間の交叉は開区間なので $\mathbb{R}$ では区別が見えないが、一般には見えない。たとえば平面の開円板全体は基底だが、二つの円板の交叉は円板でない。

準基底——条件をさらに落とす

(B2) すら満たさない族から出発したいこともある。そのときは、有限交叉をとってから合併をとればよい。

定義7.3

族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ に対し、 $\mathcal{S}$ の元の有限交叉全体は (B1) (B2) を満たす (空な交叉を X と約束する)。これを基底として生成される位相を、 $\mathcal{S}$ が生成する位相といい、 $\mathcal{S}$ を準基底という。

命題7.4

$\mathcal{S}$ が生成する位相は、 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相である。

証明 $\mathcal{S}$ を含む位相 $\mathcal{T}'$ を任意に取る。 $\mathcal{T}'$ は (T3) より有限交叉で閉じ、(T2) より合併で閉じるから、 $\mathcal{S}$ の有限交叉の合併をすべて含む。よって生成された位相は $\mathcal{T}'$ に含まれる。生成された位相自身が $\mathcal{S}$ を含む位相なので、最小である。

別の見方もできる。第5章の演習で見たように位相の共通部分は位相だから、 $\mathcal{S}$ を含む位相すべての共通部分をとればよい。**二つの構成が同じものを与えるのは、下から積み上げる道と上から削る道が一致するからである。**

□

準基底は、第11章の積位相と第8章の始位相を定義するときに本領を発揮する。「射影がすべて連続になる最小の位相」を作るには、射影による逆像の族を準基底に取ればよい。

近傍系と可算公理

基底は空間全体に対する概念だった。点ごとに考えると、近傍基になる。

定義7.5

$x \in X$ に対し、 x を含む開集合を x の**近傍**という。 x の近傍の族 $\mathcal{B}_x$ が x の**近傍基**であるとは、 x を含むどの開集合 U についても $x \in B \subseteq U$ なる $B \in \mathcal{B}_x$ があることをいう。

定義7.6 可算公理

空間 X が**第一可算**であるとは、各点が可算な近傍基をもつことをいう。**第二可算**であるとは、可算な基底をもつことをいう。**可分**であるとは、可算な稠密部分集合をもつことをいう。

命題7.7

第二可算ならば、第一可算であり、かつ可分である。

証明 $\mathcal{B}$ を可算基底とする。第一可算は、 x を含む $\mathcal{B}$ の元全体が x の可算な近傍基になることによる。

可分を示す。各 $B \in \mathcal{B} \setminus \{\emptyset\}$ から点 x_B を一つ選ぶ（可算選択公理を使う）。 $D = \{x_B\}$ は可算である。 U を空でない開集合とすると、 $\mathcal{B}$ の元 $B \subseteq U$ で空でないものがあり、 $x_B \in U$ 。よって D はどの空でない開集合とも交わり、第6章の特徴づけより稠密である。 $\square$

逆はどちらも成り立たない。その反例が、この本で繰り返し登場する空間である。

反例7.8 ゾルゲンフライ直線

$\mathbb{R}$ 上で、半開区間 $[a, b)$ の全体を基底とする位相を考える。(B1)
(B2) は容易に確かめられる。この空間をゾルゲンフライ直線 Sorgenfrey line といい、 $\mathbb{R}_\ell$ と書く。

$\mathbb{R}_\ell$ は通常の位相より真に強い。 $(a, b) = \bigcup_n [a + 1/n, b)$ なので通常の開集合はすべて開だが、 $[0, 1)$ は通常の位相では開でない。


第一可算である。 $\{[x, x + 1/n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ が x の可算近傍基になる。

可分である。 $\mathbb{Q}$ はやはり稠密である。どの $[a, b)$ にも有理数がある。


しかし第二可算でない。 $\mathcal{B}$ を基底とする。各 $x \in \mathbb{R}$ について、 $x \in B_x \subseteq [x, x + 1)$ なる $B_x \in \mathcal{B}$ を取る。 $x \neq y$ なら $B_x \neq B_y$ である——なぜなら $\inf B_x = x$ であり、しかも $x \in B_x$ だから、 B_x が最小元 x をもつ。よって $x \mapsto B_x$ は単射であり、 $\mathcal{B}$ は非可算である。

可分で第一可算だが第二可算でない——三つの可算公理が別物であることを、この一つの空間が示している。

準基底から位相へ、そして可算公理の階層



可算公理の含意——矢印は一方にしか進まない



ゾルゲンフライ直線——本書でもっとも働く反例

基底は半開区間 $[a, b)$ 通常の位相より真に強い

第一可算・可分・正規・リンデレーフ だが第二可算でなく、距離化もできない

第17章・第26章・第32章・第37章でも、この直線が判定の基準になる

図7-1 準基底から位相が生成される順序と、三つの可算公理の関係。矢印の逆が成り立たないことを、ゾルゲンフライ直線が一手で示す。

距離空間では一致する

可算公理の区別は、一般の位相空間で初めて現れる。

命題7.9

距離空間においては、第二可算・可分・リンデレーフの三つは同値である。また距離空間は常に第一可算である。

第一可算は $\{U_{1/n}(x)\}$ を取ればよい。三つの同値は第29章で証明する。可分ならば第二可算であることの証明には、稠密集合の各点のまわりに有理半径の球を並べる。**距離があると、可算な「半径の目盛り」が使えるので、局所的な可算性が大域的な可算性に持ち上がる。**

ゾルゲンフライ直線が反例になりえたのは、まさにこの持ち上げが効かないからである。その帰結として、ゾルゲンフライ直線は距離化できない(第31章)。可算公理は、距離化定理を語るための準備でもある。

★★ 学部後半 基底の大きさを測る——weight という不変量

第二可算であるかどうかは「はい／いいえ」の問いだった。それを数量化すると、空間を測る物差しになる。

定義。空間 X のweight $w(X)$ とは、 X の基底の濃度の最小値をいう(有限空間で困らないよう、慣例として $\aleph_0$ を下限とする)。同様に、 x の近傍基の濃度の最小値を $\chi(x, X)$ 、その上限を空間の character $\chi(X)$ という。稠密部分集合の濃度の最小値を **density** $d(X)$ という。

この言葉で先ほどの命題を書き直すと、 $w(X) = \aleph_0$ が第二可算、 $\chi(X) = \aleph_0$ が第一可算、 $d(X) = \aleph_0$ が可分である。**三つの「はい／いいえ」が、三つの基数の値になった。**

一般に成り立つ不等式。第二可算から第一可算と可分が出たのと同じ議論で、次が示される。

$$\chi(X) \leq w(X), \quad d(X) \leq w(X)$$

ゾルゲンフライ直線では $\chi = d = \aleph_0$ だが $w = 2^{\aleph_0}$ であり、不等式が真に成り立つことが分かる。

距離空間での一致。距離空間では $w(X) = d(X)$ が成り立つ。証明は先ほど述べた「有理半径の球を並べる」議論を一般の濃度で行うものである。距離という構造が、二つの不変量を潰している。

なぜこの数え方をするのか。基底の大きさは、空間を「記述するのに必要な情報量」の目安になる。**weight が小さい空間は、小さいデータで指定できる空間である。**第二可算かつ正則な空間が距離化できるというウリゾーンの定理（第31章）は、「情報量が可算に収まる空間は、実数一本ぶんの構造で表せる」と読むこともできる。

この方向の研究が第V部の主題になる。基数不変量のあいだにどんな不等式が成り立つか、そしてどの不等式が公理系から独立か——第35章から第37章で扱う。

★★★ 大学院 生成された位相の記述しにくさ

準基底 $\mathcal{S}$ から生成された位相は、「 $\mathcal{S}$ を含む最小の位相」として一行で定義できる。だが、その元を具体的に書き下すのは別の問題である。

有限交叉と任意合併で足りる理由。 $\mathcal{S}$ の元から出発して、有限交叉と任意合併を交互に繰り返したら、どこまで行くだろうか。**答えは「一往復で止まる」である。**合併の有限交叉は、分配法則により交叉の合併に書き換えられるからである。

$$\left(\bigcup_i A_i\right) \cap \left(\bigcup_j B_j\right) = \bigcup_{i,j} (A_i \cap B_j)$$

ここで有限交叉しか許さないことが効いている。もし無限交叉を許せば、この書き換えは無限個の添字の選択を要し、止まらなくなる。第5章の★★で見たアレクサンドロフ位相の異常さは、ここにも現れている。

ボレル集合との対比。同じ問いを、可算合併と補集合について問うとどうなるか。 $\mathcal{S}$ を含む最小の σ -加法族は、**有限回の操作では作れない**。超限帰納法で ω_1 段階まで登る必要がある——これがボレル階層であり、第52章と第54章で扱う。

階層が ω_1 で止まるのは、可算個の操作を ω_1 回繰り返しても、各段階で使う添字が可算だからである。第4章で見た共終数の議論が、ここで具体的に働く—— $\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の可算段階の上限がまだ ω_1 に届かない。

位相と σ -加法族の違い。この対比は、二つの構造の性格の違いを言い当てている。**位相は「有限交叉・任意合併」で、生成が一往復で止まる。 σ -加法族は「可算合併・補集合」で、生成が ω_1 段階かかる。**

位相のほうが生成しやすいぶん、位相から得られる情報は少ない。逆に σ -加法族は扱いにくい、測度を載せられる。本書の第VI部から第VII部への移行は、この二つの構造を行き来する話でもある。第52章でボレル集合を導入するとき、いま述べた階層の話に戻る。

なお、記述集合論という分野がある。ボレル階層のさらに上——解析集合、射影集合——を扱うこの分野では、階層の各段階の性質が集合論の公理に依存する。第4章の★★★で述べた「決まらないことが数学の対象として現れる」現象が、ここでも起きている。本書はこの方向には踏み込まないが、第53章で非可測集合を扱うときに一度だけ触れる。

演習

基本

1. 平面の開円板全体が基底の条件 (B1) (B2) を満たすことを確かめよ。
2. $\mathbb{R}$ において、端点が有理数の开区間全体が可算基底になることを示せ。
3. 離散位相の最小の基底は何か。密着位相ではどうか。
4. 半开区間 $[a, b)$ の全体が (B2) を満たすことを確かめよ。

証明

1. 定理7.2 の十分性の証明で、(B2) が (T3) のどこに効いているかを説明せよ。(10点)
2. 反例7.8 が第二可算でないことの証明を、自分の言葉で書き直せ。とくに $x \mapsto B_x$ が単射である理由を丁寧に述べよ。(15点)
3. 可分な距離空間が第二可算であることを示せ。(20点)

発展

1. 可分だが第一可算でない空間を作れ。(25点)
2. 準基底から生成された位相が、有限交叉と任意合併の一往復で得られることを、分配法則を用いて厳密に示せ。さらに、無限交叉を許すとの議論が破れることを説明せよ。(25点)

連続写像と同相

◆ この章の問い

- ・連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要があるのか。
- ・連続な全単射があれば、二つの空間は同じものか。
- ・「位相的な性質」とは、何のことか。

連続——逆像で定義する理由

第5章で、距離のある世界の連続性が「開集合の逆像が開集合」に書き換えられることを見た。一般の空間では、これを定義に採る。

定義8.1

位相空間のあいだの写像 $f: X \rightarrow Y$ が連続であるとは、**どの開集合 $V \subseteq Y$ についても $f^{-1}(V)$ が X の開集合であることをいう。**

また、 f が点 $x \in X$ で連続であるとは、 $f(x)$ を含むどの開集合 V についても、 x を含む開集合 U で $f(U) \subseteq V$ となるものが存在することをいう。

第2章で見たとおり、像ではなく逆像を使うのは、逆像だけが集合演算のすべてと可換だからである。もし「開集合の像が開集合」を連続性の定義にしていたら、合成が連続にならない、定数写像が連続にならないなど、基本的な性質がことごとく壊れる。

定理8.2 連続性の同値な言い換え

$f: X \rightarrow Y$ について、次は同値である。

- (1) f は連続。
- (2) Y のある基底 $\mathcal{B}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (3) Y のある準基底 $\mathcal{S}$ の元すべてについて、逆像が開。
- (4) どの閉集合 $F \subseteq Y$ についても $f^{-1}(F)$ が閉。
- (5) どの $A \subseteq X$ についても $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。
- (6) f は各点で連続。

証明 (1) から (2) (3) は明らか。(3) から (1) を示す。 V を開とすると、 V は $\mathcal{S}$ の元の有限交叉の合併である。逆像は合併と交叉を保つ(第2章)から、 $f^{-1}(V)$ も開集合の有限交叉の合併となり、開である。ここで逆像の可換性が丸ごと効いている。(2) から (1) も同様。

(1) と (4) は、 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ による。

(4) から (5) を示す。 $\overline{f(A)}$ は閉だから $f^{-1}(\overline{f(A)})$ は閉であり、 A を含む。閉包の最小性より $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ 、すなわち $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。

(5) から (4) を示す。 F を閉、 $A = f^{-1}(F)$ とする。 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$ だから $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$ 。よって A は閉である。

(1) と (6) は、点ごとの条件を全点で束ねるだけである。 V を開とし、各 $x \in f^{-1}(V)$ について U_x を取れば $f^{-1}(V) = \bigcup_x U_x$ が開。逆は $U = f^{-1}(V)$ と取ればよい。□

注意

(2) と (3) は実用上とても重要である。連続性を確かめるのに、すべての開集合を調べる必要はない。**基底か準基底の元だけ見ればよい。**第11章で積空間への写像の連続性を判定するとき、この節約が決定的に効く。

注意

(5) の包含は片側だけである。等号は一般に成り立たない。

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan x$, $A = \mathbb{R}$ とすると、左辺は开区間、右辺はその閉区間になる。等号が常に成り立つのは、 f が閉写像のときである。

同相——位相空間として同じであること

定義8.3

全単射 $f: X \rightarrow Y$ が同相写像であるとは、 f と f^{-1} がともに連続であることをいう。同相写像が存在するとき X と Y は同相であるという。

「 f が全単射で連続」だけでは足りない。逆写像の連続性を別に要求している。なぜそれが必要かは、反例を見るのが早い。

反例8.4 連続な全単射だが同相でない

$f: [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ を $f(t) = (\cos t, \sin t)$ と定める。これは連続な全単射である。だが同相ではない。

理由はこうである。 $[0, \pi)$ は $[0, 2\pi)$ の開集合だが、その像は S^1 の開集合でない——点 $(1, 0)$ のどんな近傍も、像に入らない点を含む。よって f^{-1} は連続でない。

より構造的な理由もある。 S^1 はコンパクトだが $[0, 2\pi)$ はコンパクトでない（第20章）。コンパクト性は同相で保たれるので、二つは同相でありえない。

もっと簡単な例もある。 X を離散位相の $\mathbb{R}$ 、 Y を通常の $\mathbb{R}$ とすると、恒等写像 $X \rightarrow Y$ は連続な全単射だが逆は連続でない。位相を弱くする向きには連続に写せるが、逆には写せない。

一方、逆写像の連続性が自動的に従う場面もある。**コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射は、必ず同相である**（第20章で証明する）。この定理のおかげで、多くの場面で確認の手間が省ける。

定義8.5

$f: X \rightarrow Y$ が開写像であるとは、開集合の像が開であることをいい、閉写像であるとは、閉集合の像が閉であることをいう。 f が単射で、 X から $f(X)$ （相対位相）への同相であるとき、 f を**埋め込み**という。

注意

開写像と閉写像は独立な条件である。どちらか一方だけをもつ写像も、両方をもつ写像も、どちらももたない写像もある。連続でない開写像さえある。**連続な全単射については、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値になる**——補集合を通して移り合うからである。

連続・開・閉・同相——どれがどれを含むか




図8-1 連続・開・閉は独立な条件だが、全単射のもとでは連続に一つ足せば同相になる。右は、同相で保たれる性質と保たれない性質の区別。

位相的性質とは何か

同相な空間は、位相空間としては区別がつかない。したがって「同相で保たれる性質」だけが、位相空間論の対象になる。これを**位相的性質**または**同相不変量**という。

例8.6 位相的なもの、そうでないもの

コンパクト性、連結性、分離公理、可算公理、次元——これらはすべて位相的性質である。定義が開集合の言葉だけで書けるからである。

一方、**有界性・完備性・一様連続性は位相的でない**。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相である ($x \mapsto \tan(\pi(x - 1/2))$ が同相写像)。**しかし前者は有界で、後者はそうでない**。同じ位相を与える距離のなかに、完備なものと完備でないものが共存する。

この事実が、第29章から第34章の主題になる。距離空間の理論のどこまでが位相の話で、どこからが距離の話かを切り分ける必要がある。第30章で一様空間を導入するのは、その中間層を取り出すためである。

★★ 学部後半 始位相と終位相——連続性から位相を決める

これまでは位相が先にあり、連続性を後から判定してきた。順序を逆にすることもできる。「この写像たちが連続になるように位相を入れよ」と要求するのである。

始位相。集合 X と、写像の族 $f_i: X \rightarrow Y_i$ (各 Y_i は位相空間) が与えられたとする。**すべての f_i を連続にする最小の位相を**、この族の定める**始位相**という。

構成は第7章の準基底そのものである。

$\mathcal{S} = \{f_i^{-1}(V) \mid i \in I, V \subseteq Y_i \text{ 開}\}$ を準基底に取ればよい。各 f_i が連続であるには $f_i^{-1}(V)$ が開でなければならず、逆にこれらから生成した位相で十分である。

始位相は次の普遍性で特徴づけられる。 $g: Z \rightarrow X$ が連続であることと、すべての $f_i \circ g$ が連続であることが同値。証明は $g^{-1}(f_i^{-1}(V)) = (f_i \circ g)^{-1}(V)$ と準基底による判定から出る。

終位相。逆向きに、写像 $f_i: Y_i \rightarrow X$ の族が与えられたとき、すべての f_i を連続にする最大の位相を終位相という。こちらは $\mathcal{T} = \{U \subseteq X \mid \forall i, f_i^{-1}(U) \text{ が開}\}$ と直接定義できる。普遍性は $g: X \rightarrow Z$ が連続 $\iff$ すべての $g \circ f_i$ が連続。

本書での現れ方。この二つが、以降の構成をすべて統一する。

部分空間（第9章）は包含写像による始位相であり、積空間（第11章）は射影による始位相である。商空間（第10章）は商写像による終位相であり、直和は包含写像による終位相である。**四つの構成が、二つの原理の特別な場合になる。**

そして第11章で「なぜ箱位相ではないのか」という問いに答えるとき、積位相が始位相であることが決め手になる。箱位相は射影を連続にするが、最小ではない。最小性を失うと、普遍性が壊れる。

★★★ 大学院 圏としての位相空間——何が失われているか

位相空間と連続写像は圏をなす。**Top** と書く。この圏の性質を調べると、位相空間という概念の限界が見えてくる。

良い性質。**Top** は完備かつ余完備である。すなわち、任意の極限と余極限をもつ。極限は始位相で、余極限は終位相で作られる。**★★で述べた二つの原理が、圏論的にはこの一文に要約される。**積、等化子、引き戻しはすべて始位相、余積、余等化子、押し出しはすべて終位相である。

欠けている性質。だが **Top** はデカルト閉でない。すなわち、関数空間 Y^X をうまく定義できない。正確に言えば、

$$\mathrm{Hom}(Z \times X, Y) \cong \mathrm{Hom}(Z, Y^X)$$

という自然な対応を与える位相が、一般の X については存在しない。 X が局所コンパクトハウスドルフなら、コンパクト開位相がこれを実現する（第95章）。一般にはできない。

なぜ困るのか。 ホモトピー論では、道の空間やループ空間を自在に扱いたい。関数空間の関数空間を取るような操作が、**Top** のなかでは保証されない。この不便さは実際的である。

対処。 二つの道がある。第一に、**対象を制限する**——コンパクト生成空間の圏に移れば、デカルト閉になる。積の定義を少し変える必要があるが、代数的位相幾何学ではこの道が標準になっている。

第二に、**対象を広げる**——収束構造をもつ空間の圏や、疑似位相空間の圏に移る。これらはデカルト閉であり、**Top** を充満部分圏として含む。第12章で導入するフィルターの収束は、この方向への入口にあたる。

何を意味するか。 位相空間という概念は、連続性を記述するには十分だが、連続写像全体を再び空間として扱うには足りない。**第5章で「距離を捨てる」ことの代償を見たが、位相そのものにも、それが取りこぼすものがある。**

本書は **Top** のなかで話を進める。解析学が必要とする関数空間は、ほとんどが距離空間かバナッハ空間であり、デカルト閉性の不足が問題になる場面は少ないからである。第95章でアスコリー-アルツェラの定理を扱うとき、関数空間の位相について改めて考える。

演習

基本

1. 定数写像がつねに連続であることを、定義に戻って示せ。
2. 離散位相をもつ空間からの写像がすべて連続であること、密着位相をもつ空間への写像がすべて連続であることを示せ。
3. 連続写像の合成が連続であることを示せ。
4. $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ が同相であることを、同相写像を具体的に書いて示せ。

証明

1. 定理8.2 の (5) から (4) の証明を、閉包の最小性がどこで効いているかを述べながら書き直せ。(10点)
2. 連続な全単射について、開写像であることと閉写像であることと同相であることが同値であることを示せ。(15点)
3. 開写像だが連続でない写像の例を挙げよ。また、連続だが開でもない写像の例を挙げよ。(15点)

発展

1. 始位相の普遍性—— $g: Z \rightarrow X$ が連続 $\iff$ すべての $f_i \circ g$ が連続——を証明し、この性質が始位相を一意に特徴づけることを示せ。(25点)
2. 連続写像 f について $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ がすべての A で成り立つことと、 f が閉写像であることが同値であることを示せ。(25点)

部分空間と相対位相

◆ この章の問い

- 空間の一部分に、どうやって位相を入れるのが自然か。
- 「開である」という言葉は、どの空間のなかでの話なのか。
- 空間のもつ性質は、部分に受け継がれるのか。

相対位相——一つしかない自然な選び方

X が位相空間で、 $A \subseteq X$ とする。 A に位相を入れたい。どう入れるべきか。

方針は第8章の★★で述べた始位相の考え方に従う。**包含写像 $i: A \rightarrow X$ が連続になるような、最小の位相を選ぶ。**そうすれば、 A に余分な開集合が増えず、しかも A の点が X のなかで近かったものは A のなかでも近いままになる。

定義9.1 相対位相

$A \subseteq X$ に対し、

$$\mathcal{T}_A = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{T}_X\}$$

は A 上の位相である。これを**相対位相**といい、 $(A, \mathcal{T}_A)$ を X の**部分空間**という。

証明 位相であることを確かめる。 $\emptyset = \emptyset \cap A$ 、 $A = X \cap A$ があるので (T1)。第2章の分配法則より

$$\bigcup_i (U_i \cap A) = \left(\bigcup_i U_i \right) \cap A, \quad (U \cap A) \cap (V \cap A) = (U \cap V) \cap A$$

であり、(T2) (T3) が従う。「 A と交わる」という操作が、合併とも交叉とも可換であることが効いている。

最小性を示す。 ι が連続なら $\iota^{-1}(U) = U \cap A$ が開でなければならないから、どの位相も $\mathcal{T}_A$ を含む。 $\mathcal{T}_A$ 自身で ι は連続だから、これが最小である。□

注意

「開集合」という語は、つねにどの空間のなかでの話を伴う。 A のなかで開であることと、 X のなかで開であることは別である。混乱を避けるため、本書では必要に応じて「 A において開」「 X において開」と書き分ける。

例9.2 部分空間で開になるもの

$X = \mathbb{R}$ 、 $A = [0, 1]$ とする。 $[0, 1/2)$ は X では開でないが、 A では開である。実際 $[0, 1/2) = (-1, 1/2) \cap A$ であり、 $(-1, 1/2)$ は X で開である。

同様に $A = \mathbb{Q}$ のとき、 $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ は $\mathbb{Q}$ において開であり、かつ閉である。 $\sqrt{2}$ が $\mathbb{Q}$ に属さないので、境界が取れてしまう。**有理数全体は、 $\emptyset$ と全体以外に開かつ閉な部分集合をもつ——すなわち連結でない** (第28章)。

相対位相の基本的な性質

定理9.3

$A \subseteq X$ を部分空間とする。

- (1) $F \subseteq A$ が A で閉 $\iff X$ の閉集合 G があって $F = G \cap A$ 。
- (2) $B \subseteq A$ の A における閉包は $\overline{B}^X \cap A$ に等しい。
- (3) $\mathcal{B}$ が X の基底なら、 $\{B \cap A\}$ は A の基底である。
- (4) A が X で開 (閉) なら、 A で開 (閉) な集合は X でも開 (閉) で

ある。

(5) $B \subseteq A \subseteq X$ のとき、 B に A 経由で入る位相と X から直接入る位相は一致する。

証明 (1) は補集合をとるだけである。 $A \setminus F = U \cap A$ と書けば $F = (X \setminus U) \cap A$ 。

(2) を示す。 $\overline{B}^X \cap A$ は (1) より A で閉であり B を含むから、 $\overline{B}^A \subseteq \overline{B}^X \cap A$ 。逆を示す。 $\overline{B}^A = G \cap A$ と書くと G は X で閉で B を含むから $\overline{B}^X \subseteq G$ 、よって $\overline{B}^X \cap A \subseteq G \cap A = \overline{B}^A$ 。

(4) を示す。 A が X で開、 V が A で開とする。 $V = U \cap A$ と書けば、二つの X -開集合の交叉だから X で開である。閉の場合も同様。

(5) は $(U \cap A) \cap B = U \cap B$ による。部分空間をとる操作は推移的である。□

注意

(4) の仮定を外すと結論は崩れる。 $A = [0, 1]$ は $\mathbb{R}$ で開でないので、 A で開な $[0, 1/2)$ は $\mathbb{R}$ で開でない。「部分空間で開なら全体でも開」は、部分空間自身が開であるときにだけ言える。

相対位相——「開」はどの空間のなかでの話か




図9-1 同じ集合でも、どの空間の部分として見るかで「開」の意味が変わる。右下の通り、性質が遺伝するかどうかは性質ごとに違い、それ自体が研究の対象になる。

遺伝性——性質は部分に受け継がれるか

定義9.4

位相的性質 P が遺伝的であるとは、 P をもつ空間のすべての部分空間が P をもつことをいう。閉部分空間についてだけ成り立つとき閉遺伝的という。

命題9.5

第一可算性、第二可算性、距離化可能性は遺伝的である。コンパクト性は閉遺伝的だが遺伝的でない。連結性は閉遺伝的ではない。

証明 第二可算を示す。 $\mathcal{B}$ を X の可算基底とすると、定理9.3 (3) より $\{B \cap A\}$ は A の基底であり、可算集合の像だから可算である。第一可算も同様。距離化可能性は、距離を A に制限すればよい。

コンパクト性が遺伝的でないことは、 $[0, 1]$ がコンパクトで $(0, 1)$ がそうでないことによる。閉遺伝的であることは第20章で示す。連結性については、 $\mathbb{R}$ は連結だが閉部分空間 $\mathbb{Z}$ は連結でない。□

どの性質が遺伝し、どの性質が遺伝しないかは、その性質が何を言っているかの指標になる。「各点のまわり」を語る性質は遺伝しやすく、「空間全体」を語る性質は遺伝しにくい。可算公理や距離化可能性は前者、コンパクト性や連結性は後者である。

中間に位置するのが分離公理である。ハウスドルフ性と正則性は遺伝するが、正規性は遺伝しない。この一点が第18章の主題になる——遺伝的に正規な空間を完全正規空間といい、正規性とは別の階層をなす。

★★ 学部後半 埋め込みと、部分空間の特徴づけ

部分空間の概念は、集合として部分であることに縛られない。同相なコピーが入っていれば同じことである。

埋め込みの定義を思い出す。第8章で、単射 $f: X \rightarrow Y$ が X から $f(X)$ (相対位相) への同相であるとき埋め込みと呼んだ。**埋め込みが存在すれば、 X は Y の部分空間と「同じ」空間だと見なせる。**

単射連続だけでは足りない。第8章の反例 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$ は単射連続だが埋め込みでない。像への写像が同相でないからである。埋め込みであるためには、 X の開集合の像が $f(X)$ のなかで開でなければならない。

始位相との関係。埋め込みは「 f による始位相が X のもとの位相に一致する単射」と言い換えられる。この言い方は、第11章で積空間への埋め込みを扱うときに効いてくる。

なぜ埋め込みが重要か。位相空間論の多くの定理が「ある空間は、よく知られた空間に埋め込める」という形をとるからである。

ウリゾーンの距離化定理 (第31章) は、第二可算かつ正則な空間がヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ に埋め込めることを示す。埋め込めれば、距離が遺伝

的であることから距離化可能性が従う。チコノフ空間の特徴づけ（第14章）は、立方体 $[0, 1]^K$ への埋め込みとして与えられる。ストーン-チェックのコンパクト化（第23章）も、この立方体への埋め込みの閉包として構成される。

「どんな空間か」を問う代わりに「どこに入るか」を問う——これが位相空間論の主要な方法の一つである。そして入り先として使われる空間は、たいてい立方体か、その部分空間である。

普遍空間。ある族のすべての空間を埋め込める空間を、その族の普遍空間という。ヒルベルト立方体は可分距離空間の普遍空間であり、カンツール集合はコンパクト距離空間の連続像としての普遍性をもつ。第42章で次元を扱うとき、次元 n の空間の普遍空間としてメンガー Menger の普遍曲線が登場する。

★★★ 大学院 遺伝性の破れ方を測る——第18章への伏線

正規性が遺伝しないという事実は、単なる不便ではない。破れ方を調べることが、正規性という概念の内実を明らかにする。

まず、どこまで遺伝するか。正規空間の閉部分空間は正規である。証明は易しい——閉部分空間で閉な集合は、もとの空間でも閉だからである（定理9.3 (4)）。**遺伝性が破れるのは、開部分空間や一般の部分空間を取ったときである。**

典型的な反例。チコノフ板と呼ばれる空間がある。順序数の空間を使って

$$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$$

と置く（順序位相を入れる）。 T はコンパクトハウスドルフだから正規である。ところが角の一点 (ω_1, ω) を除いた開部分空間

$$T_{\infty} = T \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$$

は正規でない。二つの辺——上辺と右辺——が、開集合で分離できない。この分離不能性の根は、第4章で見た共終数にある。

$\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の条件では ω_1 を押さえきれないのである。

集合論の基数の性質が、位相空間の分離不能性として目に見える形で現れる。 第4章の★★★で予告したことの、最初の具体例である。

完全正規性。 遺伝的に正規な空間を完全正規空間という。これは「すべての閉集合が G_{δ} 集合である正規空間」と同値である——証明は第18章で与える。この同値が示すのは、遺伝性という大域的な要求が、閉集合の局所的な構造に翻訳できるということである。

階層のなかの位置。 完全正規性は、正規性より真に強く、距離化可能性より真に弱い。

$$\text{距離化可能} \implies \text{完全正規} \implies \text{正規}$$

どちらの含意も逆は成り立たない。ゾルゲンフライ直線は完全正規だが距離化できない。チコノフ板は正規だが完全正規でない。第17章で、この種の階層と反例を体系的に扱う。

遺伝性を一般に問う。 どの性質が遺伝的かを一覧にすることは、第19章の課題である。そこでは遺伝だけでなく、積・商・連続像で何が保たれるかも併せて整理する。**位相的性質を、四つの操作（部分・積・商・連続像）に対する振る舞いで分類すること**——これが第II部を貫く視点になる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の部分空間 $A = (0, 1]$ において、 $(1/2, 1]$ が開であることを示せ。
2. $\mathbb{Z}$ が $\mathbb{R}$ の部分空間として離散位相をもつことを示せ。
3. $\mathbb{Q}$ において、開かつ閉であって自明でない部分集合を一つ挙げよ。
4. 部分空間の部分空間が、もとの空間の部分空間として同じ位相をもつことを確かめよ。

証明

1. 定理9.3 (2) を、閉包の最小性を使って書き直せ。また、内部について同じ等式が成り立たない例を挙げよ。(15点)
2. 相対位相が、包含写像による始位相であることを示せ。(10点)
3. 可分性が遺伝的でないことを示せ。ヒント——ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ の反対角線を考えよ。(25点)

発展

1. 埋め込みであることが「単射かつ、像への写像が開写像」と同値であることを示せ。(20点)
2. チコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ から角の一点を除いた空間が正規でないことを示せ。共終数の議論をどこで使うかを明示すること。(35点)

商空間と等化写像

◆ この章の問い

- ・「貼り合わせる」という操作に、どう位相を入れるのか。
- ・商空間からの写像の連続性は、どうやって確かめるのか。
- ・良い空間を割ったのに、悪い空間が出てくるのはなぜか。

貼り合わせを位相で表す

紙テープの両端をつなぐと輪になる。これを数学の言葉にしたい。区間 $[0, 1]$ の 0 と 1 を同一視すれば円になる——集合としてはそのとおりである。では位相はどうか。

第2章で、同値関係による商集合 $X/\sim$ を作った。いま X が位相空間なら、商集合にも位相を入れたい。方針は第8章の終位相である。**商写像 $q: X \rightarrow X/\sim$ が連続になるような、最大の位相を選ぶ。**

定義10.1 商位相

X を位相空間、 $\sim$ を X 上の同値関係、 $q: X \rightarrow Y = X/\sim$ を自然な全射とする。

$$\mathcal{T}_Y = \{ V \subseteq Y \mid q^{-1}(V) \text{ が } X \text{ で開} \}$$

は Y 上の位相であり、**商位相**という。このとき q を**商写像**という。

証明 逆像が合併と交叉を保つ（第2章）から、(T1) (T2) (T3) はただちに従う。終位相の構成が、位相の公理を逆像経由でそのまま引き継いでいる。

最大性を示す。 q が連続な位相 $\mathcal{T}'$ があれば、 $V \in \mathcal{T}'$ について $q^{-1}(V)$ は開だから $V \in \mathcal{T}_Y$ 。よって $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}_Y$ 。□

注意

部分空間が「最小」で商空間が「最大」なのは、矢印の向きが逆だからである。包含写像は部分から全体へ、商写像は全体から商へ向かう。**連続性はつねに「逆像が開」なので、写像の向きが逆になれば最適化の向きも逆になる。**

商位相のもっとも重要な性質は、そこからの写像の連続性判定である。

定理10.2 商空間の普遍性

$q: X \rightarrow Y$ を商写像とする。写像 $g: Y \rightarrow Z$ について、

$$g \text{ が連続} \iff g \circ q \text{ が連続}$$

が成り立つ。とくに、 $f: X \rightarrow Z$ が連続で、 $x \sim x'$ ならば $f(x) = f(x')$ を満たすならば、 $f = g \circ q$ となる連続な g がただ一つ存在する。

証明 g が連続なら合成も連続。逆に $g \circ q$ が連続とする。 $W \subseteq Z$ を開とすると $(g \circ q)^{-1}(W) = q^{-1}(g^{-1}(W))$ が X で開である。商位相の定義がまさに「逆像が開なら開」だから、 $g^{-1}(W)$ は Y で開である。

後半を示す。条件より f は同値類の上で一定だから、 $g([x]) = f(x)$ は矛盾なく定まる。 $g \circ q = f$ が連続だから、前半より g は連続である。一意性は q が全射であることによる。□

注意

この定理が、商空間を実際に使うときのほぼすべてである。**商空間からの写像を作るには、もとの空間からの写像を作って「同値な点を同じ所へ送る」ことを確かめればよい。**商空間の開集合を直接調べる必要はない。

具体的な貼り合わせ

例10.3 円・トーラス・メビウスの帯

円。 $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とすると、商空間は S^1 と同相である。実際 $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ は連続で $f(0) = f(1)$ だから、定理10.2 より連続な $g: [0, 1]/\sim \rightarrow S^1$ が誘導される。 g は全単射であり、定義域がコンパクトで値域がハウスドルフだから同相である（第20章）。

トーラス。正方形 $[0, 1]^2$ で $(t, 0) \sim (t, 1)$ かつ $(0, s) \sim (1, s)$ とすると、商空間は $S^1 \times S^1$ と同相になる。向かい合う辺を同じ向きに貼る。

メビウスの帯。同じ正方形で $(0, s) \sim (1, 1 - s)$ だけを課すと、メビウス Möbius の帯が得られる。**貼る向きを反転させるだけで、まったく違う空間になる。**貼り合わせの指定が位相を決めていることが、この対比でよく分かる。

反例10.4 商はハウスドルフ性を保たない


$X = \mathbb{R}$ で、 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ と定める。商空間 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ はどうなるか。

各同値類は $\mathbb{R}$ のなかで稠密である。したがって、 $q^{-1}(V)$ が開で空でなければ、それは稠密な集合を含む開集合であり、その補集合に開集合が入る余地がほとんどない。実際、空でない開集合 $V, W \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Q}$ を取ると、 $q^{-1}(V)$ と $q^{-1}(W)$ はともに $\mathbb{Q}$ -不変な空でない開集合であり、必ず交わる。

よって $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は密着位相をもつ。 $\mathbb{R}$ は距離空間で、ハウスドルフどころか正規で完全正規である。それを割った結果、二点すら分離できない空間になった。

壊れ方の軽い例もある。 $\mathbb{R}$ で $x \sim y$ を「 $x = y$ 、または x と y がともに $(0, 1)$ に属する」と定める。同値類 $(0, 1)$ は $\mathbb{R}$ で閉でないから、その像は商空間で閉でない。すなわち商空間は T_1 ですらない（第13章）。同値類が閉であることは、商がハウスドルフになるための必要条件である。

貼り合わせの指定が位相を決める



商は何を保ち、何を壊すか

保たれる

コンパクト性 連結性 弧状連結性

連続像として保たれるもの

壊れる

ハウスドルフ 距離化可能 第二可算

分離も可算性も保証されない

 $\mathbb{R}$ を有理数だけずらして割ると、商は密着位相になる——二点すら分離できない商がハウスドルフ $\Leftrightarrow$ 同値関係が $X \times X$ の閉集合 (q が開写像のとき)

図10-1 同じ正方形でも、辺を貼る向きを変えるだけで別の空間になる。商は連続像として保たれる性質を引き継ぐが、分離公理も可算公理も保証しない。

飽和集合と、開商写像

商位相の定義には $q^{-1}(V)$ が現れる。この形の集合を直接扱うと便利である。

定義10.5

$A \subseteq X$ が飽和であるとは、 $A = q^{-1}(q(A))$ となることをいう。すなわち、 A が A と交わる同値類をすべて丸ごと含むことをいう。

商位相は「飽和な開集合の像が開」と言い換えられる。**商写像は、飽和でない開集合の像については何も保証しない。**これが商写像が一般に開写像でない理由である。

命題10.6

商写像 q が開写像であるための必要十分条件は、どの開集合 U についても $q^{-1}(q(U))$ が開であることである。

証明 $q(U)$ が開 $\iff q^{-1}(q(U))$ が開、というのが商位相の定義そのものである。言い換えただけだが、後者は X のなかの条件なので確かめやすい。

群作用による商では、この条件が自動的に満たされる。 G が X に同相写像として作用しているとき、 $q^{-1}(q(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$ は開集合の合併だから開である。**群による商写像は必ず開写像である。** $\square$

★★ 学部後半 商がハウスドルフになる条件

商がハウスドルフ性を壊すことは反例で見た。では、いつ壊れないのか。条件を見つけておくと、実際の構成で役に立つ。

必要条件。 $Y = X/\sim$ がハウスドルフなら、一点集合は閉である。 q は連続だから $q^{-1}(\{[x]\}) = [x]$ は X で閉である。**したがって、すべての同値類が閉でなければならない。**反例10.4 の第二の例が壊れたのは、この段階である。

十分条件。 q が開写像であるとき、次が成り立つ。

Y がハウスドルフ $\iff R = \{(x, y) \mid x \sim y\}$ が $X \times X$ の閉集合

証明の骨子はこうである。 R が閉なら、 $[x] \neq [y]$ のとき $(x, y) \notin R$ なので、 $U \times V$ が R と交わらないような近傍が取れる。 q が開写像だから $q(U), q(V)$ は開であり、これが $[x], [y]$ を分離する。逆向きは、 $R = (q \times q)^{-1}(\Delta_Y)$ と、ハウスドルフ性が対角線の閉性と同値であること（第13章）による。

使いどころ。 群 G が X に作用しているとき、商 X/G がハウスドルフになる条件は「作用が固有である」ことで与えられる。先に見たとおり群

作用の商写像は開写像なので、上の判定が使える。 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円になるのは $\mathbb{Z}$ の作用が固有だからであり、 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が潰れるのは $\mathbb{Q}$ の作用が固有でないからである。

閉写像の場合。 q が閉写像であるときにも、似た判定がある。コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件は、同値関係が閉集合であることと同値である。**この場合、商は再びコンパクトハウスドルフになり、したがって正規である** (第20章)。CW複体の構成が破綻なく進むのは、この事実に支えられている。

まとめると。商を取るときに確かめるべきは、次の三点である。同値類が閉であるか。商写像が開写像か閉写像か。同値関係が積空間の閉集合か。三つとも満たされれば、良い空間の商は良い空間である。

★★★ 大学院 商は積と可換でない

位相空間の構成には、部分・積・商・和の四つがある。これらは互いに可換だろうか。答えは「たいてい可換だが、商と積は違う」である。

問題の所在。 $q: X \rightarrow Y$ を商写像、 Z を任意の空間とする。

$$q \times \text{id}_Z: X \times Z \rightarrow Y \times Z$$

は商写像か。**一般には違う**。連続な全射ではあり、商位相より弱い位相を与えるが、一致するとは限らない。

反例の構造。ドウディ Dowker による古典的な例がある。 $X = \mathbb{Q}$ から、整数全体を一点に潰した商を Y とし、 $Z = \mathbb{Q}$ とすると、 $q \times \text{id}$ は商写像にならない。原因は、積を取ったときに「対角線方向の近づき方」が新たに生じることにある。一点に潰された像のまわりで、二つの座標が連動して近づく道筋を、商位相が捉えきれない。

いつ可換になるか。ホワイトヘッド Whitehead の定理が答えを与える。 Z が局所コンパクトハウスドルフならば、 $q \times \text{id}_Z$ は商写像である。

証明の鍵は、局所コンパクト性が「点のまわりにコンパクトな近傍が取れる」ことを保証する点にある。コンパクト性のおかげで、対角線方向の近づき方を有限個の場合に還元できる。**第22章で局所コンパクト性を扱うとき、この定理に戻る。**

なぜこれが困るのか。第8章の★★★で述べた **Top** のデカルト閉性の不足と、これは同じ現象である。実際、

積が商を保つ $\iff$ 関数空間の随伴が働く

という関係がある。どちらの不便も、局所コンパクト性を仮定すると消える。そしてどちらも、コンパクト生成空間の圏に移れば一般に解決する。

代数的位相幾何学での帰結。ホモトピー論では、商と積を自由に交換したい場面が絶えず出てくる。商空間の族を積で貼り合わせ、さらに商を取るといった構成が日常的だからである。**コンパクト生成空間の圏が標準になったのは、この交換可能性を保証するためである。**

本書は解析学へ向かうので、この方向には進まない。だが「良い構成をしたつもりが、細部で破綻する」という経験は、位相空間という枠組みの限界を知るうえで有用である。第11章で積位相を扱うとき、同種の慎重さが別の形で必要になる。

演習

基本

1. $[0, 1]$ で $0 \sim 1$ とした商空間が S^1 と同相であることを、定理10.2 を使って示せ。
2. 商写像が必ずしも開写像でない例を挙げよ。
3. 飽和集合の合併・交叉・補集合が再び飽和であることを示せ。
4. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ が円と同相であることを示せ。

証明

1. 群 G が同相写像として作用するとき、商写像が開写像であることを示せ。(10点)
2. 反例10.4において $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が密着位相をもつことを、飽和な開集合の性質から示せ。(20点)
3. 商写像 q が開写像のとき、商がハウスドルフであることと、同値関係が $X \times X$ で閉であることが同値であることを示せ。(25点)

発展

1. メビウスの帯が向きづけ不可能であることを、位相的な言葉で述べ、トーラスとの違いを説明せよ。(25点)
2. コンパクトハウスドルフ空間の商がハウスドルフになる条件を述べ、そのとき商が正規になることを示せ。(30点)

積空間——なぜ箱位相ではないのか

◆ この章の問い

- ・無限個の空間の積に、どんな位相を入れるべきか。
- ・素朴に「各成分が開」とすると、何が壊れるのか。
- ・積位相は、何を最適化した結果なのか。

有限積では迷いようがない

$X \times Y$ に位相を入れる。基底として $\{U \times V \mid U, V \text{ 開}\}$ を取ればよい。第7章の (B1) (B2) は容易に確かめられる。有限個の積なら、これで話は終わる。

問題は無限個のときである。添字集合 I と空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ に対し、

$$\prod_{i \in I} X_i = \left\{ x: I \rightarrow \bigcup_i X_i \mid x(i) \in X_i \ (\forall i) \right\}$$

と定める。この集合が空でないことは、選択公理そのものである（第3章）。各 x の第 i 成分を x_i と書き、射影を $p_i: \prod_j X_j \rightarrow X_i$ 、 $p_i(x) = x_i$ と書く。

素朴な一般化は次のものである。

定義11.1 箱位相

$\{\prod_i U_i \mid U_i \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を基底とする位相を箱位相という。

すべての成分で独立に開集合を指定できる、もっとも自然に見える定義である。ところが、この位相では基本的な定理がことごとく成り立たない。

箱位相が壊すもの

反例11.2 箱位相では対角線写像が連続でない

$\mathbb{R}^\omega = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ に箱位相を入れ、

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\omega, \quad f(t) = (t, t, t, \dots)$$

を考える。各成分は恒等写像だから連続である。ところが f 自身は連続でない。

実際、 $U = \prod_n (-1/n, 1/n)$ は箱位相で開であり $f(0) = 0$ を含む。もし f が連続なら、 $f((-\delta, \delta)) \subseteq U$ なる $\delta > 0$ がある。しかし $t \neq 0$ なら、 $1/n < |t|$ となる n が存在するので $t \notin (-1/n, 1/n)$ 、すなわち $f(t) \notin U$ 。よって δ は取れない。

各成分が連続なのに、写像全体が連続でない。これは致命的である。積空間を作る目的の一つは「成分ごとに考えれば済むようにする」ことだったのに、それができなくなっている。

注意

箱位相が壊すのはこれだけではない。チコノフの定理（コンパクト空間の積はコンパクト）も成り立たない。 $\{0, 1\}^\omega$ は箱位相では離散位相になり、非可算なのでコンパクトでない。積位相ではこれはカントール集合であり、コンパクトである。同じ集合に入れた位相の違いが、これほどの差を生む。

積位相——最小性を選ぶ

何を直せばよいか。反例11.2 の失敗は、開集合が多すぎたことにある。無限個の成分を同時に制限する開集合を許したのが原因だった。

第8章の始位相の考え方に戻る。すべての射影 p_i が連続になる、最小の位相を選ぶ。

定義11.3 積位相

$\mathcal{S} = \{p_i^{-1}(U) \mid i \in I, U \text{ は } X_i \text{ で開}\}$ を準基底として生成される位相を**積位相**（チコノフ位相）という。

同じことだが、基底は $\prod_i U_i$ の形の集合であって、**有限個を除くすべての i で $U_i = X_i$ となるものである。**

二つの記述が一致するのは、準基底の有限交叉を取ると

$$p_{i_1}^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_{i_n}^{-1}(U_n) = \prod_i V_i, \quad V_i = \begin{cases} U_{i_k} & (i = i_k) \\ X_i & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となるからである。有限交叉しか許さないという位相の公理が、ここで「有限個を除いて全体」という形に翻訳される。

定理11.4 積空間の普遍性

写像 $f: Z \rightarrow \prod_i X_i$ について、

$$f \text{ が連続} \iff \text{すべての } i \text{ について } p_i \circ f \text{ が連続}$$

証明 左から右は、連続写像の合成だから明らか。逆を示す。定理8.2 (3) より、準基底の元の逆像が開であることを見ればよい。

$$f^{-1}(p_i^{-1}(U)) = (p_i \circ f)^{-1}(U)$$

であり、右辺は仮定より開である。準基底で判定してよいという第8章の節約が、ここで本領を発揮している。□

注意

この定理が、箱位相との決定的な差である。「成分ごとに連続なら全体も連続」——積空間を作る目的が、この一文に凝縮されている。箱位相は

これを満たさない。射影を連続にするだけなら箱位相でもよいが、最小でないために余分な開集合が残り、逆向きの判定が壊れる。

箱位相と積位相——基本開集合の形が違う




図11-1 基本開集合の形の違いが、そのまま定理の成否を分ける。積位相は「射影を連続にする最小の位相」であり、その最小性が普遍性を保証する。

積が保つもの

命題11.5

積位相について、次が成り立つ。

- (1) $\overline{\prod_i A_i} = \prod_i \overline{A_i}$ 。
- (2) 各 X_i がハウスドルフなら積もハウスドルフ。正則についても同様。
- (3) 各 X_i がコンパクトなら積もコンパクト（チコノフの定理、第21章）。
- (4) 可算個の距離空間の積は距離化可能。

証明 (1) を示す。 $x \in \overline{\prod_i A_i}$ とする。各 i について p_i は連続だから $p_i(\overline{\prod A_j}) \subseteq \overline{p_i(\prod A_j)} = \overline{A_i}$ (定理8.2 (5))。よって左辺は右辺に含まれる。

逆を示す。 $x_i \in \overline{A_i}$ がすべての i で成り立つとし、 x の基本近傍 $\prod_i U_i$ (有限個を除き $U_i = X_i$) を取る。制限がかかるのは有限個の i だけである。その各々で $U_i \cap A_i \neq \emptyset$ だから点を選び、他の成分は A_i の任意の点を取れば、 $\prod_i U_i \cap \prod_i A_i \neq \emptyset$ 。

ここでも「有限個を除いて全体」が効いている。箱位相ではこの議論が通らない。 $\square$

一方、可分性と第二可算性は非可算積では保たれない——ただし可分性については驚くべき例外がある。濃度 $2^{\aleph_0}$ 以下の個数の可分空間の積は可分である (ヒューイト-マルチェフスキ-ポンディチェリの定理)。第37章で扱う。

★★ 学部後半 距離化できる積と、できない積

可算個の距離空間の積が距離化できることを、具体的に示しておく。構成が、後の章で繰り返し使われる。

構成。 (X_n, d_n) を距離空間の列とする。各 d_n を $\bar{d}_n = \min(d_n, 1)$ で置き換えても、同じ位相を与える。そのうえで

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \bar{d}_n(x_n, y_n)$$

と定める。右辺は $\sum 2^{-n} = 1$ で押さえられるので収束する。三角不等式は項ごとに成り立つので、和でも成り立つ。

位相が一致すること。 d の定める位相が積位相に等しいことを見る。 d -球のなかに基本開集合が入ることは、 N を大きく取って尾の和を小さくす

ればよい。逆に、基本開集合のなかに d -球が入ることは、制限のかかる有限個の成分についてだけ ε を調整すればよい。

重みが 2^{-n} で減衰することと、制限が有限個であることが、二つの向きでそれぞれ効いている。

なぜ非可算では駄目か。 非可算個の和は定義できない。より本質的には、距離空間は第一可算だが、非可算積は一般に第一可算でない。

実際、 $\{0, 1\}^I$ で I が非可算のとき、点 0 の近傍基は非可算でなければならない。 0 の基本近傍は有限個の座標を 0 に固定するものだから、可算個の基本近傍が使う座標は可算個にとどまる。使われていない座標を自由にできるので、可算個では近傍基にならない。

ヒルベルト立方体。 特に重要な例が $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ である。可算個のコンパクト距離空間の積なので、**コンパクトかつ距離化可能**である。第31章のウリゾーンの距離化定理は、第二可算かつ正則な空間がこの立方体に埋め込めることを示す。第9章の★★で述べた「どこに入るか」を問う方法の、もっとも重要な行き先である。

カントール集合。 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ も同様にコンパクト距離空間である。これは実数直線のカントール集合と同相であり、第27章と第53章で再登場する。

★★★ 大学院 箱位相はまったく無用か

箱位相を切り捨てたが、これが何の役にも立たないかというと、そうでもない。使われる場面と、使えない理由の両方を押さえておく。

箱位相が保つ性質。 ハウスドルフ性と正則性は箱位相でも保たれる。これらは「二点または点と閉集合を分離する」性質であり、有限個の成分を見れば足りるからではない——実際には、各成分で分離を行い、それを全成分で同時に実行すればよい。**分離の議論は、無限個の条件を同時に課すことを嫌わない。**

一方、完全正則性は箱位相では一般に保たれない。連続関数を作る議論が、無限積では通らなくなる。

箱位相が使われる場面。関数解析で、一様収束に近い位相を作りたいときに箱位相的な構成が現れる。各点で独立に誤差を制御したい場合である。また、超準解析や、ある種の順序構造の研究で、箱位相が自然な役割を果たすことがある。

しかしこれらは特殊な用途であり、「積」という語を無条件に使うときは、つねに積位相を指す。本書もそれに従う。

中間の位相。実は箱位相と積位相のあいだには、無数の位相がある。 κ を基数として、「濃度 κ 未満の成分だけ制限してよい」という位相を κ -箱位相という。 $\kappa = \aleph_0$ が積位相、 κ が十分大きければ箱位相である。

κ -箱位相は、 κ -加法的な位相の研究で現れる。通常の位相が有限交叉で閉じるのに対し、 κ 個未満の交叉で閉じる位相を考える枠組みがあり、ここでは κ -箱位相が自然な積になる。第5章の★★で触れたアレクサンドロフ位相は、 κ を制限しない極限の場合にあたる。

教訓。定義の選び方は趣味ではない。どの定理を成り立たせたいかが、定義を決める。積位相が標準になったのは、それが普遍性——成分ごとに連続なら全体も連続——を満たす唯一の位相だからである。

そしてこの普遍性は、第8章の★★★で述べた圏論的な言葉では「積が圏論的な積である」ことにはかならない。箱位相を入れた $\prod X_i$ は、圏 **Top** における積ではない。集合としては同じでも、圏としての役割を果たさない。第21章でチコノフの定理を証明するとき、この最小性がどこで効くかを改めて見る。

演習

基本

1. 有限積では箱位相と積位相が一致することを示せ。
2. $\{0, 1\}^\omega$ が箱位相で離散位相になることを示せ。
3. 射影 p_i が開写像であることを示せ。また、閉写像とは限らないことを例で示せ。
4. $\mathbb{R}^2$ で、開円板全体と開長方形全体が同じ位相を与えることを確かめよ。

証明

1. 反例11.2 の議論を、自分の言葉で書き直せ。とくに「無限個の条件を同時に課す」ことがどこで効いているかを明示せよ。(15点)
2. 定理11.4 を示し、この性質が積位相を一意に特徴づけることを述べよ。(15点)
3. 可算個の距離空間の積が距離化可能であることを、★★の構成に従って完全に示せ。(30点)

発展

1. $\{0, 1\}^I$ が I の非可算性のもとで第一可算でないことを示せ。(25点)
2. ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ がコンパクト距離空間であることを認めよう。その部分空間として $\mathbb{R}$ が埋め込めることを示せ。(25点)

ネットとフィルター——点列では足りない

◆ この章の問い

- ・点列で閉包を捉えきれないのは、どんな空間か。
- ・点列の「番号」を何に取り替えれば、一般の空間でも足りるのか。
- ・ネットとフィルターは、どちらが本質的なのか。

点列では足りない

距離空間では、閉包が点列で特徴づけられる。 $x \in \overline{A}$ であることと、 A の点列で x に収束するものがあることは同値だった。証明には $U_{1/n}(x)$ から点を選ぶ操作を使う。**可算な近傍基があることが、この議論の前提である。**

第一可算な空間なら、同じ議論が通る。ではそうでない空間では、何が起きるのか。

反例12.1 点列では閉包が捉えられない

$X = \{0, 1\}^I$ を、 I が非可算な添字集合として、積位相で考える。 $A \subseteq X$ を「有限個を除くすべての成分が 0 である点」の全体とする。

すべて 1 の点 $\mathbf{1}$ は $\overline{A}$ に属する。実際、 $\mathbf{1}$ の基本近傍は有限個の成分を 1 に指定するだけだから、残りを 0 にした点が A に属し、近傍に入る。

しかし A のどの点列も $\mathbf{1}$ に収束しない。 $(a^{(n)})$ を A の点列とする。各 $a^{(n)}$ は有限個の成分でしか 1 をとらないので、可算個の点列全体が 1 をとる成分は、可算個にとどまる。 I は非可算だから、どの $a^{(n)}$ でも 0 である成分 j がある。すると $p_j^{-1}(\{1\})$ は $\mathbf{1}$ の近傍でありながら、点列のどの項も含まない。

閉包に属するのに、そこへ向かう点列がない。点列という道具が、この空間では届いていない。

原因ははっきりしている。点列の添字は自然数、すなわち可算な整列集合である。一方、 $\mathbf{1}$ の近傍系は非可算で、しかも有向的に細かくなっていく。**近傍系の「細かさの階層」に、自然数では追いつけない。**

ならば、添字集合のほうを取り替えればよい。

ネット——添字を有向集合にする**定義12.2**

半順序集合 $(D, \leq)$ が有向集合であるとは、空でなく、どの $a, b \in D$ に対しても $a \leq c$ かつ $b \leq c$ なる $c \in D$ が存在することをいう。

有向集合から位相空間への写像 $x: D \rightarrow X$ をネットといい、 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ と書く。ネットが $x \in X$ に収束するとは、 x のどの近傍 U についても、ある $\alpha_0 \in D$ があって $\alpha \geq \alpha_0$ なるすべての α で $x_\alpha \in U$ となることをいう。

例12.3 近傍系そのものが有向集合になる

$x \in X$ の近傍全体 $\mathcal{N}_x$ に、**逆向きの包含**で順序を入れる。
 $U \leq V \iff V \subseteq U$ 。二つの近傍 U, V に対し $U \cap V$ が両方より「大きい」から、これは有向集合である。

「先へ進む」ことが「小さい近傍に入る」ことにあたる。この有向集合を添字に使えば、どんな空間でも近傍系の細かさを追いかけられる。点列の自然数を、近傍系そのもので置き換えたのである。

定理12.4 ネットによる特徴づけ

- (1) $x \in \overline{A} \iff A$ のネットで x に収束するものが存在する。
- (2) $f: X \rightarrow Y$ が x で連続 $\iff x_\alpha \rightarrow x$ なるどのネットについても $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 。
- (3) X がハウスドルフ $\iff$ どのネットの収束先も高々一つ。

証明 (1) の右から左は易しい。 $x_\alpha \rightarrow x$ かつ $x_\alpha \in A$ なら、 x のどの近傍も x_α を含むから A と交わる（第6章の特徴づけ）。

左から右を示す。 $x \in \overline{A}$ とし、 $D = \mathcal{N}_x$ を例12.3の有向集合とする。各 $U \in D$ について $U \cap A \neq \emptyset$ だから、点 $x_U \in U \cap A$ を選ぶ（選択公理）。このネットは x に収束する——近傍 V を与えると、 $U \geq V$ 、すなわち $U \subseteq V$ なる U について $x_U \in U \subseteq V$ だからである。

(2) と (3) も同様に、近傍系を添字にしたネットを作って示す。**点列の議論で「各 n について $U_{1/n}(x)$ から選ぶ」としていたところを、「各近傍から選ぶ」に読み替えるだけである。** $\square$

注意

ネットには、点列にない現象がある。部分ネットの定義は、部分列より込み入っている。添字の単調な部分列を取るだけでは足りず、「共終な写像」を経由する必要がある。この技術的な煩わしさが、次に述べるフィルターを使う動機の一つになる。

フィルター——点を数えずに収束を語る

定義12.5

X の部分集合の族 $\mathcal{F}$ がフィルターであるとは、次を満たすことをいう。

- (1) $\emptyset \notin \mathcal{F}$ かつ $X \in \mathcal{F}$ 。
- (2) $F, G \in \mathcal{F}$ ならば $F \cap G \in \mathcal{F}$ 。
- (3) $F \in \mathcal{F}$ かつ $F \subseteq G$ ならば $G \in \mathcal{F}$ 。

$\mathcal{F}$ が x に収束するとは、 x のすべての近傍が $\mathcal{F}$ に属することをいう。
包含について極大なフィルターを超フィルターという。

フィルターは「大きい集合の族」と読める。(2)と(3)は「大きい集合どうしの交わりは大きく、大きい集合を含むものは大きい」と言っている。**収束とは、近傍がすべて大きい集合になることである。**

命題12.6

フィルター $\mathcal{F}$ が超フィルターであるための必要十分条件は、どの $A \subseteq X$ についても $A \in \mathcal{F}$ または $X \setminus A \in \mathcal{F}$ が成り立つことである。
また、どのフィルターも超フィルターに拡張できる（選択公理）。

証明 十分性を示す。条件を満たす $\mathcal{F}$ を真に含むフィルター $\mathcal{G}$ があるとし、 $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$ を取る。条件より $X \setminus A \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ 。すると $A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{G}$ となって (1) に反する。

必要性を示す。 $A \notin \mathcal{F}$ とする。すべての $F \in \mathcal{F}$ について $F \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ であることを見る。もし $F \cap (X \setminus A) = \emptyset$ なる F があれば $F \subseteq A$ で (3) より $A \in \mathcal{F}$ となり矛盾。よって $\mathcal{F}$ に $X \setminus A$ を付け加えて生成したものがフィルターになり、極大性より $X \setminus A \in \mathcal{F}$ 。

拡張の存在はツォルンの補題による（第3章）。フィルターの鎖の合併がフィルターであることを確かめればよい。**この主張を超フィルター補題といい、選択公理より真に弱い。** □

点列・ネット・フィルター——収束を語る三つの道具




図12-1 三つの道具は表現力が同じではない。点列は第一可算な空間でしか足りず、ネットとフィルターはどの空間でも足りる。ネットとフィルターは互いに翻訳可能である。

なぜ二つあるのか

ネットとフィルターは、表現力としては同等である。互いに翻訳できる。

ネット (x_α) から、尾の集合 $T_{\alpha_0} = \{x_\alpha \mid \alpha \geq \alpha_0\}$ を含む集合全体を取れば、フィルターになる。逆にフィルター $\mathcal{F}$ から、 $D = \{(x, F) \mid F \in \mathcal{F}, x \in F\}$ を $(x, F) \leq (y, G) \iff G \subseteq F$ で順序づけると有向集合になり、 $(x, F) \mapsto x$ がネットを与える。**どちらの収束も、他方の収束に対応する。**

ではなぜ両方使うのか。用途が違うからである。

ネットは点列の直接の一般化なので、解析学の議論をそのまま持ち上げられる。「 $x_\alpha \rightarrow x$ ならば $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 」という書き方は、 ε - δ に慣れ

た目には読みやすい。第X部のスペクトル理論や第XI部で、作用素の収束を扱うときに使う。

フィルターは点を数えないので、極大性の議論と相性がよい。超フィルターという「これ以上細かくできない収束の芽」が取れることが、決定的な利点である。コンパクト性は「すべての超フィルターが収束する」と言い換えられ（第20章）、この形からチコノフの定理（第21章）が数行で出る。ネットで同じことをしようとすると、普遍ネットという概念を用意する必要があり、かえって煩雑になる。

★★ 学部後半 点列で足りる空間——第一可算性と点列空間

点列が足りないのは非可算な状況だった。ではどこまでなら足りるのか。条件を整理しておく。

第一可算なら足りる。 x の可算近傍基 $\{U_n\}$ があるとき、 $V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n$ と置けば減少列になる。各 V_n から点を選べば、それは自然数を添字とするネット、すなわち点列である。可算性が、有向集合を自然数に潰す役割を果たしている。

したがって距離空間では点列で足りる。解析学の大部分が点列だけで書けるのは、このためである。

もう少し弱い条件。空間 X が点列空間であるとは、「点列閉ならば閉」が成り立つことをいう。すなわち、 A の点列の極限がすべて A に入るなら A は閉である、という条件である。第一可算ならば点列空間だが、逆は成り立たない。

さらに中間にフレッシュ-ウリゾーン空間がある。これは「 $x \in \overline{A}$ ならば A の点列が x に収束する」という条件で、閉包そのものが点列で捉えられることを要求する。

第一可算 $\implies$ フレッシュ-ウリゾーン $\implies$ 点列空間

どちらの含意も逆は成り立たない。これら三つの区別は、第一可算性が壊れたところで初めて意味をもつ。

商が壊す。第10章で見たように、商は可算公理を壊す。**ところが点列空間間であることは商で保たれる。**実際、点列空間とは「距離空間の商として得られる空間」と特徴づけられる。第一可算性より弱い条件を考える意味は、ここにある——商を取っても生き残る、点列に関する最良の条件なのである。

本書での扱い。本書はネットとフィルターを使うので、これらの区別に深く立ち入らない。ただし第50章で関数列の収束を扱うとき、また第70章で弱位相を扱うとき、「点列では足りない」という事態に再び出会う。弱位相は一般に第一可算でなく、有界集合に制限して初めて点列が使えるようになる。第71章のバナッハ-アラオグルの定理が、その典型である。

★★★ 大学院 超フィルターの奇妙さと、その使い道

超フィルターは、位相空間論のいくつかの定理を劇的に短くする。その代償として、具体物としてはまったく手に入らない。

自明な超フィルターと、そうでないもの。点 x を固定し、 x を含む集合全体を取ると超フィルターになる。これを主超フィルターという。**問題は、主でない超フィルターである。**

自然数全体の上で、有限集合の補集合全体（フレッシュフィルター）を考え、これを含む超フィルターを取る。この超フィルターは主でない。ところが、その存在はツォルンの補題に依存しており、**具体的に書き下すことはできない。**第3章で見た「選択公理は選べると言うが、どう選ぶかは教えない」の、もっとも純粋な現れである。

実際、選択公理を仮定しないモデルでは、主でない超フィルターが一つも存在しないことがありうる。

コンパクト性の言い換え。それでも超フィルターは強力である。第20章で示すとおり、

X がコンパクト $\iff X$ 上のすべての超フィルターが収束する

この形を使うと、チコノフの定理は次のように証明できる。積の上の超フィルター $\mathcal{U}$ を取る。各射影による像 $p_i(\mathcal{U})$ が生成するフィルターは超フィルターであり、 X_i のコンパクト性より x_i に収束する。そこで $x = (x_i)$ と置けば、積位相の基本近傍が有限個の成分しか制限しないので、 $\mathcal{U}$ は x に収束する。

証明が五行で終わるのは、超フィルターが「選ぶ」作業を一度に済ませてくれるからである。被覆による直接証明は、これよりはるかに長い。

ストーン-チェックのコンパクト化。第23章では、離散空間 D 上の超フィルター全体に位相を入れたものが βD になる。超フィルターが空間の「点」として実体化する。 $\beta\mathbb{N}$ は濃度 $2^{2^{\aleph_0}}$ をもつ怪物のような空間だが、コンパクトハウスドルフであり、組合せ論や群論に応用がある。

超積と超準解析。超フィルターは集合論と代数にも現れる。構造の族を超フィルターで割ると超積が得られ、ウォシュ Łoś の定理により一階の性質が保たれる。実数の超積として超実数体が作られ、無限小を含む解析学が展開できる。

本書はこの道を取らない。 **ε - δ による標準的な解析学を、第VI部から丁寧に組み立てる。**だが、第45章で「 ε - δ はなぜこの形か」を問うとき、無限小を使う別の道があることには触れる。どちらが正しいかではなく、どちらの言葉で書くと何が見やすいかという問題である。

演習

基本

1. 有向集合の例を三つ挙げよ。全順序でないものを含めること。
2. 近傍系が逆包含で有向集合になることを確かめよ。
3. 点 x を含む集合全体がフィルターであり、しかも超フィルターであることを示せ。
4. 距離空間で、閉包が点列で捉えられることを示せ。

証明

1. 反例12.1 の議論を、どこで I の非可算性を使っているかを明示しながら書き直せ。(15点)
2. 定理12.4 (2) を示せ。(15点)
3. 命題12.6 の必要性の証明を、生成されるフィルターが実際にフィルターであることの確認も含めて完全に書け。(20点)

発展

1. ネットとフィルターの翻訳が、収束の概念を保つことを両方向で示せ。(30点)
2. 第一可算ならばフレッシュ-ウリゾーン空間であり、フレッシュ-ウリゾーンならば点列空間であることを示せ。さらに、どちらの逆も成り立たないことを反例で示せ。(35点)

第II部

分離公理

位相

点と点、点と閉集合、閉集合と閉集合を「開集合で引き離せるか」という問いが、位相空間の階層を作る。どの含意が成り立ち、どの逆が成り立たないかを、反例とともに確定させる。

T0・T1・Hausdorff

◆ この章の問い

- ・位相の公理だけでは、なぜ二点を区別できないことがあるのか。
- ・一点集合が閉であることは、何を意味するのか。
- ・ハウスドルフ性は、なぜこれほど頻繁に仮定されるのか。

位相の公理は、点を区別しない

第5章の密着位相を思い出す。開集合は $\emptyset$ と X しかない。この空間では、どの二点も開集合で引き離せない。収束を考えると事情の深刻さが分かる——どの点列も、すべての点に収束する。

位相の三公理は、点を区別する力をまったく要求していない。そこで、区別の度合いを段階的に課す条件を立てる。これが分離公理である。

定義13.1 三つの分離公理

位相空間 X について、

T_0 異なる二点 $x \neq y$ に対し、一方だけを含む開集合が存在する。

T_1 異なる二点 $x \neq y$ に対し、 x を含み y を含まない開集合が存在する（したがって逆も）。

T_2 (ハウスドルフ) 異なる二点 $x \neq y$ に対し、交わらない開集合 $U \ni x, V \ni y$ が存在する。

定義から $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ は明らかである。逆はいずれも成り立たない。それを見る前に、 T_1 の言い換えを押さえておく。

定理13.2

X が T_1 であることと、すべての一点集合 $\{x\}$ が閉であることは同値である。

証明 T_1 とする。 $y \neq x$ のとき、 y を含み x を含まない開集合 U_y がある。 $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U_y$ は開集合の合併だから開であり、 $\{x\}$ は閉である。

逆に $\{x\}$ がすべて閉とすると、 $X \setminus \{y\}$ は x を含み y を含まない開集合である。 $\square$

例13.3 階層を分ける空間

T_0 だが T_1 でない。シェルピンスキ Sierpiński 空間 $X = \{a, b\}$ 、 $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ 。 $\{a\}$ が a だけを含むので T_0 だが、 b を含み a を含まない開集合はない。 $\{b\}$ は閉でない。

T_1 だが T_2 でない。無限集合 X 上の補有限位相。一点集合の補集合は補有限だから開であり、 T_1 である。ところが空でない二つの開集合は必ず交わる——補集合が有限どうしなので、交わらなければ X が有限になってしまう。よってハウスドルフでない。

ハウスドルフ性が保証するもの

ハウスドルフ性は、単なる階層の一段ではない。三つの基本的な事実を一度に保証する。

定理13.4

X がハウスドルフのとき、

- (1) ネットの収束先は高々一つ。
- (2) コンパクト部分集合は閉である。
- (3) 対角線 $\Delta = \{(x, x)\}$ は $X \times X$ で閉である（逆も成り立つ）。

証明 (1) を示す。 $x_\alpha \rightarrow x$ かつ $x_\alpha \rightarrow y$ 、 $x \neq y$ とする。交わらない近傍 $U \ni x$ 、 $V \ni y$ を取る。収束の定義より $\alpha \geq \alpha_1$ で $x_\alpha \in U$ 、 $\alpha \geq \alpha_2$ で $x_\alpha \in V$ 。有向性より両方を超える α_3 があり、そこで $x_{\alpha_3} \in U \cap V = \emptyset$ となって矛盾。

(3) を示す。 $(x, y) \notin \Delta$ は $x \neq y$ を意味する。交わらない近傍 U, V を取れば $U \times V$ は (x, y) の近傍で Δ と交わらない。よって Δ の補集合は開である。逆向きも同じ議論を逆にたどればよい。**ハウスドルフ性は、対角線が閉であることと正確に同じ主張である。**

(2) は第20章で証明する。コンパクト性を使うので、ここでは述べるにとどめる。 $\square$

注意

(1) が解析学にとって決定的である。「極限」という語が意味をもつのは、収束先が一つに定まるときだけである。**ハウスドルフ性が至るところで仮定されるのは、極限の一意性という最低限の要求のためである。**密着位相では $\lim$ という記号が書けない。

分離の三段階——何をどこまで引き離せるか




図13-1 三つの分離公理。 T_1 は一点集合が閉であることと同値で、 T_2 は対角線が閉であることと同値である。逆の成り立たない例が各段に存在する。

階層のどこで何が必要になるか

分離公理は「あればあるほどよい」というものではない。それぞれの定理が必要とする水準がある。

T_0 はほとんど何も保証しないが、「**位相が点を区別できる**」という**最低限の条件**である。 T_0 でない空間は、区別できない点を同一視して商を取れば T_0 になる。したがって T_0 を仮定しても一般性はほとんど失われない。

T_1 は一点集合が閉であることを保証する。第38章で次元を定義するとき、この条件が前提になる。また、極大イデアルと点の対応（第79章のゲルファント理論）でも T_1 が効く。

T_2 からが本番である。極限の一意性、コンパクト部分集合の閉性、そして第20章の「**コンパクトからハウスドルフへの連続全単射は同相**」という**定理**。この定理が、位相空間論のなかでもっとも多用される道具の一つになる。

注意

ハウスドルフでない空間が無用というわけではない。代数幾何のザリスキ位相は T_1 だがハウスドルフでない。ここでは分離公理の代わりに、層とスキームという別の道具で局所性を扱う。**分離公理は解析に向かう道の条件であって、位相空間一般の良さの尺度ではない。**

★★ 学部後半 分離公理は何に保たれるか——最初の一覧

第9章で遺伝性を扱い、第10章と第11章で商と積を扱った。三つの分離公理が、これらの操作でどうなるかを確かめておく。

部分空間には遺伝する。 T_0, T_1, T_2 はいずれも遺伝的である。証明はどれも同じ形で、 X での分離する開集合を A と交わせればよい。 $U \cap V = \emptyset$ なら $(U \cap A) \cap (V \cap A) = \emptyset$ である。**点についての条件は、部分集合に制限しても弱まらない。**

積にも保たれる。 三つとも積で保たれる。 $x \neq y$ なら、ある座標 i で $x_i \neq y_i$ である。その座標で分離する開集合 U_i, V_i を取り、 $p_i^{-1}(U_i)$ と $p_i^{-1}(V_i)$ を考えればよい。逆像は交わらなさを保つから、これで分離できる。

逆も成り立つ。積が T_2 なら各成分も T_2 である——成分は積の部分空間と同相だからである（他の座標を固定する）。

商では壊れる。 第10章で見たとおりである。 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ は密着位相になり、 T_0 ですらない。**四つの操作のうち、商だけが分離公理を保証しない。**

連続像でも壊れる。 恒等写像 $(\mathbb{R}, \text{離散}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{密着})$ は連続な全単射だが、値域はハウスドルフでない。連続像は商の特別な場合ではないが、同じ理由で保証がない。

まとめ。この表は第19章で完成させるが、いまの段階で次のことが言える。

部分 ○ 積 ○ 商 × 連続像 ×

そして第14章以降の分離公理（正則・正規）では、この表が崩れはじめる。正規性は積で保たれず、部分空間にも遺伝しない。**分離公理が強くなるほど、保存の性質は悪くなる。**

★★★ 大学院 T_0 化と、特殊化前順序

T_0 でない空間は「区別できない点」をもつ。その構造を正面から調べると、位相空間と順序集合の意外な近さが見えてくる。

特殊化前順序。位相空間 X 上に、 $x \leq y \iff x \in \overline{\{y\}}$ と定める。反射律と推移律は閉包の性質から従うので、これは前順序である。これを**特殊化前順序**という。

この前順序が反対称であること、すなわち順序であることは、ちょうど T_0 と同値である。 T_0 とは「**位相が定める前順序が順序になる**」ことには**かならない。**

さらに、 T_1 であることは、この前順序が離散順序（ $x \leq y \iff x = y$ ）になることと同値である。 T_1 の空間では、特殊化前順序は何の情報も持たない。

コルモゴロフ商。 $x \sim y \iff \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$ で割った商空間 $X/\sim$ は T_0 になる。これを**コルモゴロフ商** Kolmogorov quotient という。

この商は、位相的な情報をまったく失わない。 X と $X/\sim$ の開集合の族は一对一に対応し、任意の T_0 空間への連続写像も一对一に対応する。したがって「 T_0 を仮定しても一般性を失わない」と言える。

順序の位相。逆向きに、前順序集合から位相を作ることもできる。第5章の★★で見たアレクサンドロフ位相がそれである。**アレクサンドロフ位相をもつ T_0 空間の圏は、順序集合の圏と同値である。**

この対応は、計算機科学の領域理論で本格的に使われる。プログラムの意味論では、「情報が増える」という順序を位相として扱い、連続写像が

計算可能な関数に対応する。そこで現れる空間はハウスドルフでなく、 T_0 どまりである。

スキームとの関係。代数幾何のスキームも T_0 だがハウスドルフでない空間である。特殊化前順序は、そこでは「点が別の点の特殊化である」という幾何的な関係を表す。生成点の閉包が既約成分全体になるという事実は、いまの言葉では「生成点が順序の最大元である」と読める。

分離公理を課さない世界には、課した世界とは別の豊かさがある。本書は T_2 以上を主に扱うが、それは解析学へ向かうという目的による選択である。

演習

基本

1. シェルピンスキ空間が T_0 であって T_1 でないことを確かめよ。
2. 無限集合上の補有限位相が T_1 であってハウスドルフでないことを示せ。
3. 有限な T_1 空間が離散空間であることを示せ。
4. 距離空間がハウスドルフであることを示せ。

証明

1. 定理13.2 を用いて、 T_1 空間では A' (集積点の集合) が閉であることを示せ。(15点)
2. 定理13.4 (3) の逆——対角線が閉ならばハウスドルフ——を示せ。(15点)
3. T_0, T_1, T_2 がいずれも遺伝的かつ積で保たれることを示せ。(20点)

発展

1. 特殊化前順序が順序であることと T_0 が同値であることを示せ。(25点)
2. 連続写像 $f, g: X \rightarrow Y$ が Y ハウスドルフのもとで、稠密集合の上で一致すれば全体で一致することを示せ。(25点)

正則空間と完全正則空間

◆ この章の問い

- ・点と点ではなく、点と閉集合を引き離すには何が要るのか。
- ・「開集合で分離する」と「連続関数で分離する」ことは、どちらが強いのか。
- ・チコノフ空間が、なぜ位相空間論のひとつの標準になるのか。

点と閉集合を引き離す

ハウスドルフ性は二点を引き離す。だが、点と閉集合を引き離せるとは限らない。この二つは別の条件である。

定義14.1 正則空間

X が正則であるとは、点 x と、 x を含まない閉集合 F に対し、交わらない開集合 $U \ni x$ 、 $V \supseteq F$ が存在することをいう。 T_1 かつ正則な空間を T_3 空間という。

命題14.2

X が正則であることと、各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、 $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる開集合 W が存在することは同値である。

証明 正則とする。 $F = X \setminus U$ は x を含まない閉集合だから、交わらない開集合 $W \ni x$ 、 $V \supseteq F$ が取れる。 $W \cap V = \emptyset$ より $W \subseteq X \setminus V$ であり、右辺は閉だから $\overline{W} \subseteq X \setminus V \subseteq X \setminus F = U$ 。

逆に条件を仮定する。 $x \notin F$ 、 F 閉とすると $U = X \setminus F$ は x の近傍である。 $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる W を取れば、 W と $X \setminus \overline{W}$ が求める分離を与える。□

注意

この言い換えが実用上の正則性である。「近傍のなかに、閉包まで含めて収まる小さい近傍が取れる」——近傍を「縮める」操作が許されることが、正則性の内容である。距離空間では $U_{\varepsilon/2}(x)$ を取ればよいので自明に成り立つ。第31章の距離化定理でこの操作を繰り返し使う。

反例14.3 ハウスドルフだが正則でない

$\mathbb{R}$ 上で、通常の開集合と、 $\mathbb{Q}$ を除いた集合の形 $U \setminus \mathbb{Q}$ を合わせて生成した位相 $\mathcal{T}'$ を考える。この空間を有理数を抜いた直線と呼ぶことにする。

通常の位相より強いので、ハウスドルフである。ところが正則でない。

$\mathbb{Q}$ は $\mathcal{T}'$ で閉である（補集合 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ が基本開集合）。無理数 x を取る。 x を含む $\mathcal{T}'$ -開集合 U と、 $\mathbb{Q}$ を含む $\mathcal{T}'$ -開集合 V が交わらないとする。 V は $\mathbb{Q}$ を含むので、通常の位相で稠密な集合を含む開集合を含む。通常の位相で見ると、 U の内部と V は交わらざるをえない。くわしい議論は演習に回すが、稠密な閉集合があると正則性が壊れるというのが要点である。

連続関数で分離する

開集合による分離より、はるかに使いやすい分離がある。連続関数を使う分離である。

定義14.4 完全正則空間・チコノフ空間

X が完全正則であるとは、点 x と x を含まない閉集合 F に対し、連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f(x) = 0, \quad f|_F \equiv 1$$

となるものが存在することをいう。 T_1 かつ完全正則な空間をチコノフ空間 ($T_{3\frac{1}{2}}$) という。

命題14.5

完全正則ならば正則である。

証明 f を定義のとおり取る。 $U = f^{-1}([0, 1/2))$ 、 $V = f^{-1}((1/2, 1])$ と置く。どちらも開集合の逆像だから開であり、 $x \in U$ 、 $F \subseteq V$ 、そして $U \cap V = \emptyset$ 。

連続関数による分離から開集合による分離を作るのは、区間を切るだけで済む。逆向きは一般に難しい——それが次章のウリゾーンの補題の内容である。□

逆は成り立たない。正則だが完全正則でない空間が存在する。構成は込み入っており、ティコノフの反例として知られる。連続関数を作ることは、開集合を取ることもより強い要求である。

チコノフ空間の特徴づけ

チコノフ空間が標準的な地位を得たのは、次の定理による。

定理14.6 立方体への埋め込み

X がチコノフ空間であることと、ある基数 κ について X が立方体 $[0, 1]^\kappa$ に埋め込めることは同値である。

証明 十分性から示す。 $[0, 1]^\kappa$ はチコノフ空間である—— $[0, 1]$ がそうであり、完全正則性は積に保たれ（座標ごとの関数を使う）、遺伝もする（関数を制限する）。したがってその部分空間もチコノフである。

必要性を示す。 $C = \{f: X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ 連続} \}$ とし、 $\kappa = |C|$ として

$$e: X \rightarrow [0, 1]^C, \quad e(x) = (f(x))_{f \in C}$$

と定める。各成分が連続だから、定理11.4 より e は連続である。

e が単射であること。 $x \neq y$ とする。 T_1 より $\{y\}$ は閉で $x \notin \{y\}$ 、完全正則性より $f(x) = 0, f(y) = 1$ なる $f \in C$ がある。よって $e(x) \neq e(y)$ 。

e が埋め込みであること。 $U \subseteq X$ を開、 $x \in U$ とする。 $F = X \setminus U$ に対し $f(x) = 0, f|_F \equiv 1$ なる f を取る。 $W = \{z \in [0, 1]^C \mid z_f < 1/2\}$ は基本開集合であり、 $e(U) \supseteq e(X) \cap W \ni e(x)$ が成り立つ—— $e(z) \in W$ なら $f(z) < 1/2$ なので $z \notin F$ 、すなわち $z \in U$ 。よって $e(U)$ は $e(X)$ で開である。□

注意

この定理は、第9章の★★で述べた「どこに入るかを問う」方法の典型である。チコノフ空間とは、立方体の部分空間として実現できる空間にほかならない。抽象的な公理が、具体的な普遍空間への埋め込みとして翻訳された。第23章のストーン-チェックのコンパクト化は、この埋め込みの閉包として構成される。

開集合で分ける／関数で分ける




図14-1 正則性は開集合による分離、完全正則性は連続関数による分離。後者のほうが強く、立方体への埋め込みという具体的な特徴づけをもつ。

★★ 学部後半 完全正則性が保たれる操作

第13章の★★で作った表を、完全正則性について埋めておく。ここまでは分離公理が「良く」振る舞う。

遺伝する。 $A \subseteq X, x \in A, F$ が A で閉で $x \notin F$ とする。 $F = G \cap A$ (G は X で閉) と書けるが、 $x \notin G$ とは限らないので注意が要る。

正しくは $G' = \overline{F}^X$ を取る。 $x \notin F$ かつ F が A で閉だから $x \notin \overline{F}^X \cap A = F$ 、すなわち $x \notin \overline{F}^X$ 。 X の完全正則性より $f(x) = 0, f|_{\overline{F}} \equiv 1$ なる f が取れ、 $f|_A$ が求めるものである。**閉包を先に取るのが要点である。**

積に保たれる。 $x \in \prod_i X_i, F$ 閉、 $x \notin F$ とする。 x の基本近傍 $\prod_i U_i \subseteq X \setminus F$ (有限個を除き $U_i = X_i$) を取る。制限のかかる座標 $i_1, \dots, i_n$ の各々で $f_k(x_{i_k}) = 0, f_k|_{X_{i_k} \setminus U_{i_k}} \equiv 1$ なる連続関数を取り、

$$f(z) = \max(f_1(z_{i_1}), \dots, f_n(z_{i_n}))$$

と定める。有限個の連続関数の最大は連続である。 $f(x) = 0$ であり、 $z \in F$ なら $z \notin \prod U_i$ なのでどれかの座標で 1 をとり、 $f(z) = 1$ 。制限が有限個であることが、有限個の最大で済む理由である。

商では壊れる。第10章の $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ が反例になる。連続関数が定数しかないので、分離はできない。

なぜ完全正則性がここまで良いのか。理由は $[0, 1]$ という一つの空間に帰着することにある。完全正則性とは「 $[0, 1]$ への連続関数が十分に多い」という条件である。そして関数の族に対する操作——制限、座標ごとの合成、有限個の最大——はいずれも連続性を保つ。

定理14.6 はこの見方を定式化したものである。チコノフ空間とは、 $[0, 1]$ への連続関数で点と閉集合を見分けられる空間である。第79章のゲルファント理論では、この「関数が十分に多い」という考えが代数の言葉に翻訳される。

★★★ 大学院 正則だが完全正則でない空間

命題14.5 の逆が成り立たないことは述べた。その反例の作り方に、この分野の技術が集約されている。

難しさの所在。 正則性から完全正則性を導こうとすると、連続関数を構成しなければならない。第15章で見るウリゾーンの補題は、正規性があれば関数を作れると主張する。ところが正則性だけでは足りない。

正則性は「近傍を閉包ごとと縮められる」という条件で、これを可算回繰り返せば $[0, 1]$ 上の二進有理数で添字づけられた開集合の列が作れそうに見える。しかし縮める操作は点と閉集合の間でしかできず、閉集合と閉集合の間ではできない。関数を作るには後者が要る。

ティコノフの構成。一九三〇年の反例は、順序数の空間を組み合わせて作られる。おおまかな仕組みはこうである。正則な空間 X を、連続関数がすべて特定の閉集合上で同じ値をとるように設計する。すると、その閉集合と外の点を関数で分離できない。

設計の道具は、共終数の非対称性である。 ω_1 上の可算個の条件では ω_1 を押さえきれないという第4章の事実を使い、連続関数が「最後まで」到達できないように空間を組む。

ヘヴィットの改良。より劇的な例がある。ヘヴィット Hewitt は一九四六年に、**正則ハウスドルフでありながら、連続な実数値関数が定数しかない**空間を構成した。

この空間では完全正則性が最悪の形で壊れる。分離するどころか、分離に使える関数が一つもない。それでも正則性は成り立っている。位相空間として十分に「細かい」のに、関数がまったく作れない。

教訓。この反例が示すのは、**位相の情報と関数の情報が独立だということである。**開集合を細かくしても、連続関数が増えるとは限らない。

この独立性は、本書の後半にも影を落とす。第59章のリースの表現定理や第79章のゲルファント理論は、「連続関数の全体から空間を復元する」という形をとる。その復元が可能なのは、コンパクトハウスドルフ空間という十分に良い場合に限られる。ヘヴィットの空間からは、関数の全体を見ても何も復元できない。

階層のなかの位置づけ。結局、分離公理の階層は次のようになる。

$$T_2 \Leftarrow T_3 \Leftarrow T_{3\frac{1}{2}} \Leftarrow T_4$$

そして T_3 と $T_{3\frac{1}{2}}$ のあいだの段差が、「開集合で分けること」と「関数で分けること」の段差にあたる。第15章と第16章は、 T_4 （正規）があればこの段差を越えられることを示す二つの定理に充てられる。

演習

基本

1. 距離空間が完全正則であることを、具体的な関数を書いて示せ。
2. $[0, 1]$ が完全正則であることを確かめよ。
3. 正則かつ T_0 ならば T_1 であることを示せ。
4. 離散空間と密着位相をもつ空間が、それぞれ正則かどうかを判定せよ。

証明

1. 命題14.2 を、両方向とも自分の言葉で書き直せ。(15点)
2. 完全正則性が遺伝的であることを、★★で述べた「閉包を先にする」という注意点を明示して示せ。(20点)
3. 定理14.6 の必要性の証明で、 e が埋め込みであることの部分を詳しく書け。(25点)

発展

1. 反例14.3 の空間が正則でないことを、完全に証明せよ。(30点)
2. 完全正則性が積で保たれることを示せ。有限個の最大をとる操作がどこで必要になるかを述べること。(25点)

正規空間とUrysohnの補題

◆ この章の問い

- ・開集合しか与えられていないところから、どうやって連続関数を作るのか。
- ・二進有理数で添字をつけるのは、なぜうまくいくのか。
- ・正規性という条件は、どこまで必要なのか。

正規空間

定義15.1 正規空間

X が正規であるとは、交わらない二つの閉集合 A, B に対し、交わらない開集合 $U \supseteq A, V \supseteq B$ が存在することをいう。 T_1 かつ正規な空間を T_4 空間という。

第14章の正則性は点と閉集合を分離した。正規性は閉集合と閉集合を分離する。 T_1 のもとでは一点集合が閉なので、正規ならば正則である。

命題15.2

X が正規であることと、閉集合 A とその近傍 $U \supseteq A$ に対し、 $A \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq U$ なる開集合 W が存在することは同値である。

証明 正則性の場合（命題14.2）と同じ議論である。 $B = X \setminus U$ と置き、 A と B を分離する開集合 W, V を取ると $\overline{W} \subseteq X \setminus V \subseteq U$ 。逆も同様。

正則性との違いは、縮める対象が点ではなく閉集合であることだけである。だがこの違いが、次節で決定的に効く。 □

ウリゾーンの補題

これが第II部の中心にある定理である。開集合の情報だけから、連続関数を作り出す。

定理15.3 ウリゾーンの補題

X が正規で、 A, B が交わらない閉集合とする。このとき連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f|_A \equiv 0, \quad f|_B \equiv 1$$

となるものが存在する。

証明 証明は三段からなる。第一に開集合の族を作り、第二に関数を定義し、第三に連続性を示す。

第一段。 $D = \{k/2^n \mid n \geq 0, 0 \leq k \leq 2^n\}$ を $[0, 1]$ の二進有理数全体とする。 D で添字づけられた開集合の族 $\{U_q\}_{q \in D}$ を、次を満たすように作る。

$$A \subseteq U_0, \quad U_1 = X \setminus B, \quad p < q \implies \overline{U_p} \subseteq U_q$$

n についての帰納法で構成する。 $n = 0$ のとき、 $A \subseteq X \setminus B$ で $X \setminus B$ は開だから、**命題15.2** より $A \subseteq U_0 \subseteq \overline{U_0} \subseteq X \setminus B = U_1$ なる U_0 が取れる。

n まで作れたとする。新しく必要なのは $q = (2k+1)/2^{n+1}$ の形の添字であり、その両隣 $p = k/2^n, r = (k+1)/2^n$ はすでに作られていて $\overline{U_p} \subseteq U_r$ 。閉集合 $\overline{U_p}$ とその近傍 U_r に **命題15.2** を適用して

$$\overline{U_p} \subseteq U_q \subseteq \overline{U_q} \subseteq U_r$$

なる U_q を取る。**ここで縮める対象が閉集合 $\overline{U_p}$ であることに注意してほしい。正則性ではこの一步が踏めない。**

第二段。 関数を

$$f(x) = \inf\{q \in D \mid x \in U_q\}$$

と定める (x がどの U_q にも入らないときは $f(x) = 1$)。 $x \in A$ なら $x \in U_0$ だから $f(x) = 0$ 。 $x \in B$ なら $x \notin U_1 \supseteq U_q$ (すべての q) だから $f(x) = 1$ 。

第三段。連続性を示す。 $[0, 1]$ の位相は $[0, a)$ と $(a, 1]$ の形の集合で生成されるから (第8章 (3))、この二つの逆像が開であることを見ればよい。

$f(x) < a$ であることは、 $q < a$ なる $q \in D$ で $x \in U_q$ となるものがあることと同値である。よって

$$f^{-1}([0, a)) = \bigcup_{q < a} U_q$$

は開である。次に $f(x) > a$ を考える。これは $q > a$ なる q で $x \notin \overline{U_q}$ となるものがあることと同値である——実際、 $f(x) > a$ なら $a < p < q < f(x)$ なる $p, q \in D$ が取れ、 $x \notin U_q \supseteq \overline{U_p}$ 。逆に $x \notin \overline{U_q}$ 、 $q > a$ なら $f(x) \geq q > a$ 。したがって

$$f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{q > a} (X \setminus \overline{U_q})$$

も開である。閉包の包含 $\overline{U_p} \subseteq U_q$ が、この二つ目の等式でちょうど必要になる。 □

注意

なぜ二進有理数なのか。必要なのは $[0, 1]$ のなかで稠密な可算全順序集合であり、しかも「二つの元のあいだに必ず元がある」ことである。帰納法の各段で「両隣のあいだに新しい添字を挿す」操作ができればよい。有理数全体でも構成できるが、二進有理数のほうが段数が数えやすい。

注意

この補題は $f|_A \equiv 0$ 、 $f|_B \equiv 1$ を主張するが、 $f^{-1}(0) = A$ とは言っていない。 $f^{-1}(0) = A$ かつ $f^{-1}(1) = B$ が取れるのは、 A と B が G_δ 集合であるときに限る——これが第18章の完全正規性の内容である。

ウリゾーンの補題——二進有理数で開集合を挟み込む




図15-1 二進有理数を添字に、開集合を入れ子に挟み込んでいく。各段で必要なのは閉集合と閉集合のあいだを縮める操作であり、これが正則性と正規性を分ける。

ただちに従うこと

系15.4

T_4 空間はチコノフ空間である。すなわち $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}} \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2$ 。

証明 T_1 より一点集合 $\{x\}$ は閉である。 $x \notin F$ 、 F 閉なら $\{x\}$ と F は交わらない閉集合だから、定理15.3 より分離する関数が存在する。よって完全正則である。残りは第14章で示した。 $\square$

例15.5 正規な空間の例

距離空間は正規である。 A, B を交わらない閉集合とし、

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

と置く。分母は A, B が閉で交わらないので消えない。 f は連続で $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$ 。距離空間ではウリゾーンの補題を経由せず、関数を一行で書ける。

コンパクトハウスドルフ空間は正規である。第20章で証明する。

順序位相をもつ全順序集合は正規である。とくに順序数の空間 $[0, \omega_1]$ は正規である。

★★ 学部後半 正規性の言い換えと、1の分割への道

正規性は、いくつもの同値な形をもつ。どの形で使うかが、証明の見通しを決める。

関数による特徴づけ。定理15.3 の逆は易しい。分離する関数が常に存在すれば、 $f^{-1}([0, 1/2])$ と $f^{-1}((1/2, 1])$ が開集合の分離を与える。したがって正規性は「交わらない閉集合を関数で分離できる」と同値である。

これは完全正則性との対比で覚えるとよい。完全正則は点と閉集合を関数で分離し、正規は閉集合と閉集合を関数で分離する。

被覆による特徴づけ。もう一つの形がある。 X が正規であることは、二つの開集合による被覆 $X = U_1 \cup U_2$ に対し、 $\overline{V_i} \subseteq U_i$ なる開被覆 $X = V_1 \cup V_2$ が取れることと同値である。

証明は、 $A = X \setminus U_2, B = X \setminus U_1$ と置けば交わらない閉集合になることから従う。この形が「被覆を縮める」という言い方に通じ、第24章のパラコンパクト性と1の分割へつながる。

1の分割。有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_n\}$ に対し、連続関数 $\varphi_i: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i, \quad \sum_{i=1}^n \varphi_i \equiv 1$$

となるものが取れる。これを1の分割という。正規性から作れる。各 i について縮めた被覆 V_i を取り、ウリゾーンの補題で ψ_i ($\overline{V_i}$ で 1、 $X \setminus U_i$ で 0) を作り、

$$\varphi_i = \frac{\psi_i}{\sum_j \psi_j}$$

と規格化すればよい。分母は $\{V_i\}$ が被覆だから消えない。

なぜ1の分割が重要か。局所的に定義されたものを大域的に貼り合わせる道具になる。各 U_i の上で作った対象に φ_i を掛けて足せば、大域的な対象が得られる。

この手法は第24章で無限被覆に拡張され、多様体論・微分幾何学・偏微分方程式論の基本的な道具になる。第88章でソボレフ空間を扱うとき、局所的な推定を大域化するのに使う。

★★★ 大学院 正規性の悪い性質——階層が崩れはじめる

ここまでの分離公理は、部分空間に遺伝し、積に保たれた。正規性は、どちらも満たさない。

遺伝しない。第9章の★★★で見たチョコノフ板がそれである。

$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ はコンパクトハウスドルフだから正規だが、角の一点を除いた開部分空間は正規でない。

簡単な言い方をすると、上辺 $[0, \omega_1) \times \{\omega\}$ と右辺 $\{\omega_1\} \times [0, \omega)$ が分離できない。右辺を覆う開集合は、各 $n < \omega$ について「ある $\alpha_n < \omega_1$ より右」を含む。 $\alpha = \sup_n \alpha_n < \omega_1$ なので $(\text{cf}(\omega_1) > \omega)$ 、**その α より右の部分で、上辺を覆う開集合と必ず交わる。**

積で保たれない。もっと劇的な例がある。ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ は正規だが、 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ (ゾルゲンフライ平面) は正規でない。

反対角線 $L = \{(x, -x)\}$ を考える。 L はゾルゲンフライ平面の閉集合であり、しかも**相対位相が離散位相になる**——基本開集合 $[x, x + \varepsilon) \times [-x, -x + \varepsilon)$ が L と一点でしか交わらない。

L は濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散閉集合である。一方ゾルゲンフライ平面は可分である ($\mathbb{Q}^2$ が稠密)。可分な正規空間の離散閉部分集合の濃度は $2^{\aleph_0}$ より小さくなければならないという定理 (ヨーンズの補題) があり、これに矛盾する。

ヨーンズの補題。正規空間 X が稠密部分集合 D と離散閉部分集合 S をもつとき、 $2^{|S|} \leq 2^{|D|}$ 。証明は、 S の各部分集合 T に対し T と $S \setminus T$ を分離する開集合を取り、 D との交わりで区別することによる。正規性が、二つの濃度のあいだに不等式を強いる。

これは何を意味するか。正規性は「大域的な」条件である。**局所的な条件 (第一可算、正則) は操作に強いが、大域的な条件 (正規、コンパクト、連結) は壊れやすい。**

そこで二つの応答がある。第一に、遺伝的に正規な空間を別の階層として立てる——これが第18章の完全正規性である。第二に、より強く、より安定な条件を探す——これが第24章のパラコンパクト性であり、第32章の距離化定理の主役になる。

第17章で階層と反例を一覧にすると、正規性がどこで階層を乱しているかを確かめる。

演習

基本

1. 距離空間が正規であることを、例15.5の関数を使って示せ。
2. 正規かつ T_1 ならば正則であることを示せ。
3. 離散空間が正規であることを確かめよ。
4. $\mathbb{R}$ で $A = \{n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 、 $B = \{n + 1/2\}$ を分離する連続関数を具体的に書け。

証明

1. 定理15.3の第一段で、 U_q の構成が帰納法の各段で可能であることを、命題15.2の適用箇所を明示して書け。(20点)
2. 定理15.3の第三段で、 $f^{-1}((a, 1]) = \bigcup_{q>a} (X \setminus \overline{U_q})$ を両方の包含について示せ。(25点)
3. 正規性が「二つの開集合による被覆を縮められること」と同値であることを示せ。(15点)

発展

1. 有限開被覆に対する1の分割が正規空間で構成できることを、★★の手順に従って完全に示せ。(30点)
2. ヨーンズの補題を証明し、それを用いてゾルゲンフライ平面が正規でないことを示せ。(35点)

Tietzeの拡張定理

◆ この章の問い

- ・閉集合の上で定義された連続関数を、全体に延ばせるか。
- ・延ばせるための条件は、ウリゾーンの補題と同じものか。
- ・閉集合でなければならない理由は何か。

拡張という問題

$A \subseteq X$ を閉集合、 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。 $F|_A = f$ となる連続な $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ は存在するか。

ウリゾーンの補題は、この問題の特別な場合を解いていた。 $A \cup B$ の上で「 A で 0、 B で 1」という関数が与えられていて、それを全体に延ばしたのである。一般の f でも同じことができるだろうか。

定理16.1 ティーツェの拡張定理

X が正規、 $A \subseteq X$ が閉、 $f: A \rightarrow [a, b]$ が連続とする。このとき連続な $F: X \rightarrow [a, b]$ で $F|_A = f$ となるものが存在する。

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ (有界でない場合) についても、連続な拡張 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ が存在する。

証明 区間は $[-1, 1]$ としてよい。証明は、ウリゾーンの補題で作った関数を無限級数として足し合わせる。

近似の一步。 $g: A \rightarrow [-1, 1]$ が連続なとき、連続な $h: X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ で

$$\sup_{x \in A} |g(x) - h(x)| \leq \frac{2}{3}$$

となるものが作れることを示す。 $A_- = g^{-1}([-1, -1/3])$ 、 $A_+ = g^{-1}([1/3, 1])$ は A で閉、したがって A が X で閉だから X でも閉であり、交わらない。**ここで A が閉であることが使われる。**

ウリゾーンの補題 (定理15.3) より、 $h: X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ で $h|_{A_-} \equiv -1/3$ 、 $h|_{A_+} \equiv 1/3$ となるものが取れる。三つの場合を確かめると、 A 上で $|g - h| \leq 2/3$ が成り立つ。

反復。 $g_0 = f$ とし、上の一步で h_0 を作る。 $g_1 = f - h_0|_A$ は A 上で $|g_1| \leq 2/3$ なので、 $(3/2)g_1$ に同じ一步を適用して h_1 (値域 $[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}]$) を作る。以下同様に

$$|h_n| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \sup_A \left| f - \sum_{k=0}^n h_k \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

が成り立つ。

収束。 $F = \sum_{n=0}^{\infty} h_n$ と置く。 $\sum \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1$ なので級数は一様収束し、一様収束極限は連続である (第47章で証明するが、ここでは既知としてよい)。値域は $[-1, 1]$ に収まる。そして A 上で $|f - F| = 0$ 、すなわち $F|_A = f$ 。

有界でない場合。同相 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ (たとえば $\varphi(t) = t/(1 + |t|)$) を使って $\varphi \circ f: A \rightarrow (-1, 1)$ を $[-1, 1]$ へ拡張し、値が ± 1 になる部分を処理する。具体的には、拡張 G に対し $C = G^{-1}(\{-1, 1\})$ は A と交わらない閉集合なので、ウリゾーンの補題で A で 1、 C で 0 の関数 u を取り、 uG を考えれば値域が $(-1, 1)$ に収まる。最後に φ^{-1} を合成する。 $\square$

注意

この証明は解析学の議論そのものである。一様収束する級数を作り、極限の連続性を使う。**位相空間論の定理が、一様収束という解析の道具で証明された。**逆に第47章では、一様収束の必要性が解析の側から改めて論じられる。二つの部の往復は、第97章で回収する。

注意

A が閉でなければ、定理は成り立たない。 $X = \mathbb{R}$ 、 $A = (0, 1)$ 、 $f(x) = \sin(1/x)$ とすると、 0 での極限が存在しないので連続に延ばせない。 $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 、 $f(x) = 1/x$ も延ばせない。閉集合であることが、近似の一步で $A_{\pm}$ が X で閉になることに使われていた。

ウリゾーンとの同値性

命題16.2

T_1 空間 X について、次は同値である。(1) X は正規。(2) ウリゾーンの補題が成り立つ。(3) ティーツェの拡張定理が成り立つ。

証明 (1) から (2) は 定理15.3、(2) から (3) は 定理16.1 で示した。
(3) から (1) を示す。

A, B を交わらない閉集合とする。 $A \cup B$ は閉であり、その上で $f|_A \equiv 0$ 、 $f|_B \equiv 1$ と定めた f は連続である—— A と B がともに $A \cup B$ で閉なので、この定義は各点の近傍で局所定数になる。(3) より $F: X \rightarrow [0, 1]$ に拡張でき、 $F^{-1}([0, 1/2))$ と $F^{-1}((1/2, 1])$ が分離を与える。

三つの主張がすべて同値であることは、正規性という条件が「拡張が可能であること」と同じ内容だと言っている。□

拡張を級数で作る——誤差が $2/3$ ずつ減る




図16-1 誤差が $2/3$ ずつ減る補正を無限に足すことで拡張が作られる。正規性・ウリゾーンの補題・ティーツェの拡張定理の三つは互いに同値である。

拡張定理が働く場面

例16.3 三つの応用

境界値問題。 領域の境界で与えられた連続関数を、内部まで連続に延ばせる。ただし延ばしただけでは方程式を満たさない——第94章のディリクレ問題は、延ばしたうえで調和にすることを要求する。ティーツェの定理は、そこでの出発点を与える。

レトラクション。 $A \subseteq X$ が閉で、連続な $r: X \rightarrow A$ が $r|_A = \text{id}$ を満たすとき、 A を X のレトラクトという。 A が $\mathbb{R}^n$ の凸集合に同相なら、ティーツェの定理を座標ごとに適用してレトラクションが作れる。**凸性が座標ごとの独立な拡張を許すのが要点である。**

関数の貼り合わせ。 $X = A \cup B$ (A, B 閉) で、 f_A と f_B が $A \cap B$ で一致するとき、貼り合わせた関数は連続である。これは拡張定理を使わずに直接示せるが、拡張定理と組み合わせると「片方だけ与えて他方を作る」ことができる。

★学部後半 拡張できるかどうかは、値域にもよる

ティーツェの定理は値域が $\mathbb{R}$ または区間の場合である。値域を変えると、何が起きるか。

$\mathbb{R}^n$ なら大丈夫。座標ごとに適用すればよい。 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^n$ の各成分を拡張し、束ねれば連続である（定理11.4）。**値域が積であれば、拡張は成分ごとに独立に行える。**

凸集合なら大丈夫。 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ が凸閉集合のとき、 $f: A \rightarrow C$ は C への拡張をもつ。まず $\mathbb{R}^n$ へ拡張し、最近点への射影 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow C$ （凸集合では一意で連続）を合成する。 A 上では f の値が既に C に入っているので π は何も変えない。

球面では駄目。 S^1 への拡張は一般にできない。 $X = \overline{D^2}$ （閉円板）、 $A = S^1$ 、 $f = \text{id}$ とすると、拡張 $F: \overline{D^2} \rightarrow S^1$ は存在しない。

存在すれば、 S^1 が円板のレトラクトになる。これはホモトピー論の道具（基本群が $\mathbb{Z}$ であること、あるいはブラウワーの不動点定理）で否定される。**拡張の可否は、値域の位相的な「穴」に依存する。**

絶対レトラクト。「どんな正規空間のどんな閉部分集合からの連続写像も拡張できる」という値域を、絶対レトラクト（AR）という。 $[0, 1]$ と $\mathbb{R}^n$ の凸閉集合は AR であり、ヒルベルト立方体も AR である。

より弱い概念として、近傍からの拡張だけを要求する絶対近傍レトラクト（ANR）がある。多様体や単体複体は ANR である。**球面は ANR だが AR でない——局所的には延ばせるが、大域的には延ばせない。**

この局所と大域の落差が、代数的位相幾何学の出発点の一つになる。本書はこの方向に進まないが、第94章の調和関数の境界値問題で、局所的な拡張と大域的な解の違いに再び出会う。

★★★ 大学院 拡張定理から距離化定理へ

ティーツェの定理は、それ自体が目的ではない。第31章の距離化定理への部品になる。その接続を先に述べておく。

埋め込みを作るという戦略。第14章で見たとおり、チコノフ空間は立方体 $[0, 1]^K$ に埋め込める。距離化するには、**埋め込み先を可算次元の立方体 $[0, 1]^N$ にしなければならない**——それがコンパクト距離空間だからである（第11章の★★）。

そのためには、点と閉集合を分離する連続関数が可算個で足りる必要がある。ここに第二可算性が効く。可算基底 $\{B_n\}$ から可算個の関数を作れば、埋め込みが $[0, 1]^N$ に収まる。

正則+第二可算から正規が出る。驚くべきことに、正則な第二可算空間は正規である。証明の骨子はこうである。交わらない閉集合 A, B を取る。正則性より、各 $x \in A$ について $\overline{B_{n(x)}} \cap B = \emptyset$ なる基底元 $B_{n(x)} \ni x$ が取れる。基底は可算だから、 A を覆う可算個の $\{B_{n_k}\}$ が選べる。 B についても同様に $\{C_{m_j}\}$ を取る。

あとは可算個の被覆から交わらない開集合を作る。

$U = \bigcup_k (B_{n_k} \setminus \bigcup_{j \leq k} \overline{C_{m_j}})$ 、 $V = \bigcup_j (C_{m_j} \setminus \bigcup_{k \leq j} \overline{B_{n_k}})$ と置けばよい。添字の大小で「先に取ったものを避ける」ことが、交わらなさを保証する。**可算性が、この対角線的な構成を可能にしている。**

したがって。正則かつ第二可算な空間は正規であり、ウリゾーンの補題が使える。可算基底から可算個の分離関数が作れ、 $[0, 1]^N$ への埋め込みが得られる。これがウリゾーンの距離化定理（第31章）の筋である。

正則 + 第二可算 $\implies$ 正規 $\implies$ 関数が作れる $\implies$ 立方体に入る $\implies$ 距離化

可算性を外すとどうなるか。第32章のナガター-スミルノフの定理は、第二可算性を「 σ -局所有限基底」という弱い条件に置き換える。**そこでは正規性の代わりにパラコンパクト性（第24章）が主役になる。**

大づかみに言えば、距離化定理の歴史は「可算性」をどこまで弱められるかの歴史である。ウリゾーンが可算基底で解き、ナガタとスミルノフとビングが局所有限性で解いた。第34章では、この一連の定理が距離空間の何を特徴づけたのかを振り返る。

演習

基本

1. $A = \{0\} \cup \{1\}$ 上の関数 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ を $\mathbb{R}$ に拡張せよ。
2. $A = (0, 1)$ 上の $\sin(1/x)$ が $\mathbb{R}$ に連続拡張できない理由を述べよ。
3. ティーツェの定理を $\mathbb{R}^n$ 値の関数に拡張する方法を述べよ。
4. $\mathbb{R}$ の閉集合上の連続関数が、つねに有界な拡張をもつとは限らない例を挙げよ。

証明

1. 定理16.1 の「近似の一步」で、 A 上 $|g - h| \leq 2/3$ となることを三つの場合に分けて確かめよ。(20点)
2. 命題16.2 の (3) から (1) を示せ。 $A \cup B$ 上の関数が連続である理由を丁寧に述べること。(15点)
3. 値域が $\mathbb{R}^n$ の凸閉集合のとき拡張が可能であることを、最近点射影を用いて示せ。(20点)

発展

1. 有界でない場合の拡張を、★★★を参照せず、 $\varphi(t) = t/(1 + |t|)$ を用いて完全に構成せよ。(30点)
2. 正則かつ第二可算な空間が正規であることを、★★★の対角線的な構成に従って示せ。(35点)

分離公理の階層と、逆が成り立たない反例

◆ この章の問い

- ・分離公理の階層は、どこもかしこも真に狭まっているのか。
- ・反例を作るのに、いつも同じ道具が使われるのはなぜか。
- ・階層のどこに、集合論が顔を出すのか。

階層の全体

ここまで導入した条件を並べる。 T_1 をつけた形で書く。

$$T_1 \Leftarrow T_2 \Leftarrow T_3 \Leftarrow T_{3\frac{1}{2}} \Leftarrow T_4 \Leftarrow T_5 \Leftarrow \text{距離化可能}$$

ここで T_5 は第18章で扱う完全正規性である。この章の仕事は、六つの含意のすべてについて逆が成り立たないことを、具体的な空間で示すことである。

反例は思いつきで作るものではない。使われる道具は限られている。

例17.1 反例を作る五つの道具

(1) 補有限位相・補可算位相。開集合を大きくしすぎて、二つの開集合が必ず交わるようにする。 T_1 は保つが T_2 を壊す。

(2) 位相を強める。もとの空間に開集合を付け加える。第14章の「有理数を抜いた直線」がこれで、ハウスドルフ性は保たれるが正則性が壊れる。強めると分離しやすくなるはずなのに壊れるのは、閉集合も増えるからである。

(3) 順序数の空間。 $[0, \omega_1]$ と $[0, \omega]$ の積から一点を抜く。共終数の非対称 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ が、分離不能性を生む。

(4) 半開区間で位相を作る。ゾルゲンフライ直線とその積。可算性と正規性の関係を壊す。

(5) 非可算な離散集合を稠密空間に埋める。ヨーンズの補題（第15章★★★）が濃度の不等式を強い、正規性を壊す。

各段の反例

反例17.2 六つの反例

T_1 だが T_2 でない。無限集合上の補有限位相（第13章）。

T_2 だが T_3 でない。 $\mathbb{R}$ 上で、通常の開集合と $\mathbb{Q}$ の補集合を合わせて生じた位相（第14章）。稠密な閉集合があると点と閉集合が分離できない。

T_3 だが $T_{3\frac{1}{2}}$ でない。ティコノフの一九三〇年の例、あるいはヘヴィットの「連続関数が定数しかない正則空間」（第14章★★★）。開集合を細かくしても、連続関数が増えるとは限らない。

$T_{3\frac{1}{2}}$ だが T_4 でない。ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ 。完全正則性は積に保たれるのでチコノフだが、反対角線が濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散閉集合になり、ヨーンズの補題に反する。

もう一つ、チコノフ板 $T_\infty = ([0, \omega_1] \times [0, \omega]) \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$ もこの段の反例である。コンパクトハウスドルフ空間の部分空間だからチコノフであり、上辺と右辺が分離できないので正規でない。

T_4 だが T_5 でない。チコノフ板 $T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ 自身。コンパクトハウスドルフだから正規だが、開部分空間 T_∞ が正規でないので遺伝的正規ではない。

T_5 だが距離化できない。ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。完全正規だが第二可算でないので距離化できない（第7章・第31章）。

分離公理の階層と、各段を分ける反例

距離化可能	↑ 逆は偽	ゾルゲンフライ直線 完全正規だが第二可算でない
T_5 完全正規	↑ 逆は偽	チコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ 正規だが遺伝的でない
T_4 正規	↑ 逆は偽	ゾルゲンフライ平面 反対角線がヨーンズの補題に反する
$T_{3\frac{1}{2}}$ チコノフ	↑ 逆は偽	ティコノフ／ヘヴィットの例 関数が作れない
T_3 正則	↑ 逆は偽	有理数を抜いた直線 稠密な閉集合が邪魔をする

なぜ同じ空間が繰り返し出るか チコノフ板 共終数の非対称 ゾルゲンフライ 可算性の不整合 補有限位相 開集合の作りすぎ 三つで階層のほとんどの段が分けられる	操作に対する振る舞い $T_0 \sim T_{3\frac{1}{2}}$ 部分 $\circ$ 積 $\circ$ 商 $\times$ T_4 部分 $\times$ 積 $\times$ 商 $\times$ T_5 部分 $\circ$ 積 $\times$ 商 $\times$ 正規性だけが遺伝しない——第18章の出発点
---	--

図17-1 六つの含意のいずれも逆が成り立たない。反例に使われる空間は限られており、共終数・可算性・開集合の作りすぎという三つの仕掛けに分類できる。

チコノフ板を読む

反例のなかでもチコノフ板は、二つの段を同時に分ける。その仕組みを丁寧にしておく。

定理17.3

$T = [0, \omega_1] \times [0, \omega]$ (順序位相の積) とし、 $t_\infty = (\omega_1, \omega)$ とする。 T はコンパクトハウスドルフだから正規であるが、 $T_\infty = T \setminus \{t_\infty\}$ は正規でない。

証明 T の正規性は、コンパクトハウスドルフ空間が正規であること (第20章) による。 T_∞ について示す。

二つの閉集合を取る。

$$A = \{\omega_1\} \times [0, \omega), \quad B = [0, \omega_1) \times \{\omega\}$$

どちらも T_∞ で閉であり、交わらない（交わるのは抜いた点 t_∞ だけだった）。

$U \supseteq A$ を開集合とする。各 $n < \omega$ について $(\omega_1, n) \in U$ なので、順序位相の基本近傍より、ある $\alpha_n < \omega_1$ があって $(\alpha_n, \omega_1] \times \{n\} \subseteq U$ 。

ここで $\alpha = \sup_{n < \omega} \alpha_n$ と置く。 $\text{cf}(\omega_1) = \omega_1 > \omega$ なので、可算個の上限は ω_1 に達しない。すなわち $\alpha < \omega_1$ 。

したがって $\beta \in (\alpha, \omega_1)$ を取れば、すべての n について $(\beta, n) \in U$ 。一方 $(\beta, \omega) \in B$ であり、 B を含む開集合 V はある m について $\{\beta\} \times (m, \omega] \subseteq V$ を含む。すると $(\beta, m+1) \in U \cap V$ 。

よって A と B を分離する開集合は存在しない。 $\square$

注意

この証明の核心は一行に尽きる。可算個の α_n の上限が ω_1 に届かない。第4章の★★で述べた共終数の概念が、位相空間の分離不能性としてそのまま現れている。第36章のスーリン問題、第37章の積の基数不変量でも、同じ構造が繰り返し登場する。

★★ 学部後半 階層をどう覚えるか

公理の名前と番号を暗記するのは無益である。それぞれが何を分離するかで覚えるとよい。

分離する対象で分類する。

T_0, T_1, T_2	点と点
$T_3, T_{3\frac{1}{2}}$	点と閉集合
T_4	閉集合と閉集合
T_5	分離された集合どうし

分離の手段で分類する。開集合で分離するのが T_0 から T_3 と T_4 、連続関数で分離するのが $T_{3\frac{1}{2}}$ 。ただし第15章で見たとおり、 T_4 では開集合による分離と関数による分離が一致する。

階層が単調でない点。 $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ はウリゾーンの補題を要した（第15章の系）。これは自明な含意ではない。もし補題がなければ、 T_4 と $T_{3\frac{1}{2}}$ は比較できない条件だったはずである。

なぜ $T_{3\frac{1}{2}}$ という半端な番号か。歴史的な事情である。ティコノフが完全正則性を導入したのは、正則性と正規性のあいだに位置する条件が必要だと分かった後だった。すでに T_3 と T_4 が使われていたので、あいだに入れる番号がなかった。

実務上どこを使うか。本書の後半で実際に仮定されるのは、ほとんどの場合次の三つだけである。

ハウスドルフ——極限の一意性が要るとき。ほぼすべての場面。

コンパクトハウスドルフ——第20章以降。この条件は正規性を含み、しかも安定である（積で保たれる）。実用上、分離公理の階層を気にせずに済む最良の場所である。

距離化可能——第VI部以降の解析学。ここでは階層の話は終わっていて、距離があるものとして進む。

したがって第II部の階層は、「どの条件が本質的だったか」を後から振り返るための地図として読むのがよい。第97章でこの地図を再掲する。

★★★ 大学院 反例の存在が公理に依存する場合

ここまでの反例は、集合論の公理系のなかで構成できた。ところが、存在が公理に依存する反例もある。

ドウカー空間。 正規だが可算パラコンパクトでない空間をドウカー Dowker 空間という。同値な言い方として、 X が正規だが $X \times [0, 1]$ が正規でない空間である。

ドウカーは一九五一年にこの概念を導入したが、**例が存在するかどうかは二十年以上わからなかった。**一九七一年にルドゥイン Rudin が、選択公理だけを使って一つを構成した。ただしその空間は濃度 $(\aleph_\omega)^{\aleph_0}$ という巨大なものだった。

小さいドウカー空間が存在するかは、いまま完全には決着していない。基数 $\aleph_1$ のドウカー空間の存在は、通常の公理系から証明も反証もできない。

正規ムーア空間予想。より有名な問題がある。ムーア空間とは、ある種の可算な基底の列をもつ正則空間である。「正規なムーア空間は距離化可能か」という問いを正規ムーア空間予想という。

答えは公理に依存する。連続体仮説を仮定すると反例が構成でき、**一方、ある大きい基数の存在を仮定すると予想が成り立つモデルが作れる。**フリードマン Fleissner とニックリ Nyikos の一連の仕事で明らかになった。

とくに注目すべきは、予想が成り立つことを示すには大きい基数が必要だという点である。純粋に位相的に見える問いが、集合論のもっとも強い仮定に結びついている。

何が起きているのか。第4章の★★★で述べたとおり、**未解決と独立は別である。**正規ムーア空間予想は未解決ではない——独立であることが決着している。

そして独立性が生じる場所には共通の特徴がある。可算性と非可算性の境界で、対角線的な構成が必要になる場面である。チコノフ板の証明で $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ を使ったのと同じ場所に、集合論が入り込む。

本書の扱い。第36章のスーリン問題で、独立性を正面から扱う。第42章の次元論の反例でも、構成に集合論的な仮定が要る例に触れる。それ以外の場所では、通常の公理系のなかで構成できる反例だけを使う。

分離公理の階層に限れば、**第II部で挙げた六つの反例はすべて公理系のなかで構成できる**。階層が真に狭まっていることは、独立な命題ではない。

演習

基本

1. T_1 から T_5 までの各段が「何と何を分離するか」を表にせよ。
2. チコノフ板 T がコンパクトであることを認めて、正規であることを述べよ。
3. ゴルゲンフライ平面の反対角線が離散閉集合であることを確かめよ。
4. 階層のうち、遺伝的なものをすべて挙げよ。

証明

1. 定理17.3 の証明を、共終数を使う箇所を明示して書き直せ。(25点)
2. ゴルゲンフライ直線が正規であることを示せ。(25点)
3. $T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ が、ウリゾーンの補題なしには自明でないことを説明せよ。(15点)

発展

1. ゴルゲンフライ平面が正規でないことを、ヨーンズの補題を用いて完全に示せ。(35点)
2. ドウカー空間の定義を述べ、「 X が正規だが $X \times [0, 1]$ が正規でない」という条件と同値であることの意味を説明せよ。(30点)

完全正規性と遺伝性

◆ この章の問い

- ・正規性が遺伝しないなら、遺伝するように強めるとどうなるか。
- ・その強めた条件は、局所的な言葉で書けるのか。
- ・ウリゾーンの補題で「0 になる点がちょうど A」とできるのはいつか。

遺伝的正規性を条件として立てる

第15章で正規性が遺伝しないことを見た。ならば、遺伝することを条件に加えればよい。ただしそれでは定義が「すべての部分空間について」という大域的な形になってしまう。**この章の主題は、その大域的な条件が局所的な言葉で書き直せることである。**

定義18.1 完全正規空間

X が完全正規であるとは、 X のすべての部分空間が正規であることをいう。 T_1 かつ完全正規な空間を T_5 空間という。

命題18.2

X が完全正規であることと、 X のすべての開部分空間が正規であることは同値である。

証明 一方向は自明。逆を示す。 $A \subseteq X$ を任意の部分空間、 E, F を A で閉な交わらない集合とする。

$U = X \setminus (\overline{E} \cap \overline{F})$ (閉包は X で取る) と置く。 U は開であり、 $A \subseteq U$ である——実際 $x \in A \cap \overline{E} \cap \overline{F}$ なら $x \in \overline{E}^A \cap \overline{F}^A = E \cap F = \emptyset$ (第9章)。

U は正規な開部分空間である。 $\overline{E} \cap U$ と $\overline{F} \cap U$ は U で閉であり、交わらない (U の定義より)。よって U のなかで分離する開集合 V, W が取れる。 $V \cap A$ と $W \cap A$ が E, F を A のなかで分離する。

閉包の交わりを抜いた開集合を経由することで、任意の部分空間が開部分空間に還元された。□

分離された集合による特徴づけ

もう一つの言い換えが、 T_5 を「分離公理の階層の一段」として位置づける。

定義18.3

$E, F \subseteq X$ が分離されているとは、 $\overline{E} \cap F = \emptyset$ かつ $E \cap \overline{F} = \emptyset$ となることをいう。

交わらない閉集合は分離されているが、逆は成り立たない。 $\mathbb{R}$ で $E = (0, 1)$ 、 $F = (1, 2)$ は分離されているが、どちらも閉でない。

定理18.4 完全正規性の特徴づけ

X について、次は同値である。

- (1) X は完全正規。
- (2) 分離された二つの集合 E, F は、つねに交わらない開集合で分離できる。
- (3) X は正規であり、かつすべての開集合が F_σ 集合 (可算個の閉集合の合併) である。

証明 (1) から (2)。 E, F を分離された集合とし、 $A = E \cup F$ とする。 E は A で閉である—— $\overline{E}^A = \overline{E} \cap A = \overline{E} \cap (E \cup F) = E$ ($\overline{E} \cap F = \emptyset$ より)。同様に F も A で閉。 A の正規性より A のなかで分離でき、 **命題18.2** の議論と同じく X の開集合に持ち上げられる。

(2) から (1)。部分空間 A で閉な交わらない集合は、 X のなかで分離されている (上の計算を逆にたどる)。よって (2) より分離でき、 A に制限すればよい。

(3) から (2)。これが実質的な部分である。 E, F を分離された集合とする。 $X \setminus \overline{F}$ は E を含む開集合であり、 (3) より F_σ だから $X \setminus \overline{F} = \bigcup_n A_n$ (A_n 閉、増加としてよい) と書ける。同様に $X \setminus \overline{E} = \bigcup_n B_n$ 。

正規性を使って各段で分離し、第16章★★★と同じ対角線の構成で

$$U = \bigcup_n \left(U_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{V_k} \right), \quad V = \bigcup_n \left(V_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{U_k} \right)$$

と置けば、交わらない開集合が得られる。**可算性が対角線の議論を可能にする。**

(1) から (3)。正規性は (1) から直ちに従う。開集合 U が F_σ であることを示す。 U と $X \setminus U$ について、完全正規性から連続関数 f で $f^{-1}(0) = X \setminus U$ となるものが作れる (構成は演習)。すると $U = \bigcup_n f^{-1}([1/n, 1])$ は閉集合の可算合併である。 $\square$

注意

(3) の「開集合が F_σ 」は、補集合を取れば「閉集合が G_δ (可算個の開集合の交叉)」と同じである。この形が第52章のボレル集合の議論とながる。**完全正規性は、位相の階層に「可算操作」を持ち込む最初の条件である。**

交わらない／分離されている——二つの違い



図18-1 「交わらない閉集合」より広い「分離された集合」を分離できることが完全正規性である。大域的な遺伝性の要求が、開集合が F_σ であるという局所的な条件に翻訳される。

完全なウリゾーン関数

第15章で注意したことを、ここで解決する。ウリゾーンの補題は $f|_A \equiv 0$ を与えたが、 $f^{-1}(0) = A$ は保証しなかった。

定理18.5

X が正規、 $A \subseteq X$ が閉とする。 $f^{-1}(0) = A$ となる連続関数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ が存在するための必要十分条件は、 A が G_δ 集合であることである。

証明 必要性。 $f^{-1}(0) = A$ なら $A = \bigcap_n f^{-1}([0, 1/n))$ であり、各項は開だから A は G_δ 。

十分性。 $A = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) とする。各 n について、 A と $X \setminus U_n$ は交わらない閉集合だから、ウリゾーンの補題より $f_n|_A \equiv 0$ 、 $f_n|_{X \setminus U_n} \equiv 1$ なる連続 $f_n: X \rightarrow [0, 1]$ が取れる。

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f_n$$

と置く。一様収束するので連続である。 $x \in A$ なら全項が 0 だから $f(x) = 0$ 。逆に $f(x) = 0$ なら全 n で $f_n(x) = 0$ 、とくに $x \in U_n$ (そうでなければ $f_n(x) = 1$)。よって $x \in \bigcap U_n = A$ 。□

系18.6

T_5 空間では、交わらない閉集合 A, B に対し $f^{-1}(0) = A$ 、 $f^{-1}(1) = B$ となる連続関数が存在する。

証明 定理18.4 (3) より閉集合はすべて G_δ である。定理18.5 を A と B にそれぞれ適用して g, h を作り、 $f = g/(g+h)$ と置けばよい (分母は $A \cap B = \emptyset$ より消えない)。□

★★ 学部後半 完全正規性は何に保たれるか

第13章から積み上げてきた表を、 T_5 について埋める。正規性より良く、しかし積では駄目である。

遺伝する。定義そのものから従う。完全正規性は、正規性の遺伝しないという欠点を設計上解消した条件である。この点で T_0 から $T_{3\frac{1}{2}}$ の仲間に戻る。

積では保たれない。第17章で見たとおり、ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ は完全正規だが、 $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ は正規ですらない。したがって完全正規でもない。

可算積でも駄目。もっと弱い形でも保たれない。 $\mathbb{R}_\ell$ 二つの積で壊れるのだから、有限積ですら保証がない。積で保たれる分離公理は $T_{3\frac{1}{2}}$ までである。

まとめの表。第19章で完成させるが、現段階で次のようになる。

	部分空間	有限積	商
$T_0 \sim T_{3\frac{1}{2}}$	○	○	×
T_4	×	×	×
T_5	○	×	×
距離化可能	○	○(可算積)	×

なぜ距離化可能性は積で保たれるのか。第11章の★★★で構成したとおり、可算個の距離を重み 2^{-n} で足せばよい。距離という具体的な対象があるので、直接構成できる。

対して T_4 や T_5 は「分離できる」という存在命題であり、**積の各成分での分離を束ねる方法がない。**ゾルゲンフライ平面の反対角線は、二つの座標が連動して動く方向にできる集合であり、座標ごとの情報では捉えられない。

この落差が、第24章のパラコンパクト性を導入する動機になる。パラコンパクト性は正規性より強く、しかも扱いやすい。そして第32章の距離化定理では、パラコンパクト性が主役になる。

★★★ 大学院 完全正規性と、可算性の階層

定理18.4 (3) が示したのは、完全正規性が可算操作に関する条件だということである。この観点から、周辺概念を整理しておく。

F_σ と G_δ の階層。開集合と閉集合から出発し、可算合併と可算交叉を交互にとると階層ができる。

$$\text{開} \subseteq G_\delta \subseteq G_{\delta\sigma} \subseteq \cdots, \quad \text{閉} \subseteq F_\sigma \subseteq F_{\sigma\delta} \subseteq \cdots$$

第7章の★★★で述べたとおり、この階層は ω_1 段階まで登り、その全体がボレル集合になる。**完全正規性は「階層の第一段で開と閉が入れ替わる」ことを要求している。**

距離空間では自動的に成り立つ。距離空間の開集合 U に対し、

$$U = \bigcup_n \{x \mid d(x, X \setminus U) \geq 1/n\}$$

と書ける。右辺の各項は閉である ($x \mapsto d(x, X \setminus U)$ が連続だから)。したがって距離空間では開集合がつねに F_σ であり、完全正規性が成り立つ。

この計算は、距離が「可算な目盛り」を提供していることの一例である。第7章で可分性と第二可算性が距離空間で一致した理由と同じ構造である。

完全正規性の別名。文献では T_5 を「完全正規 (perfectly normal)」と呼ぶ場合と「遺伝的正規 (hereditarily normal)」と呼ぶ場合があり、さらに「完全正規」を別の条件に使う流儀もある。

混乱を避けるため、条件を明示して整理する。遺伝的正規 (すべての部分空間が正規) と、 T_1 正規かつすべての閉集合が G_δ は、**定理18.4** により同値である。したがってどちらの語を使っても指す対象は同じである。

ただし一部の文献では「完全正規」を T_1 正規かつ各閉集合がある連続関数の零点集合と定義する。**定理18.5** によりこれも同値なので、結局三つの定義が一致する。**本書では T_5 の名で呼び、必要に応じて三つの形を使い分ける。**

ボレル構造との接続。完全正規性が本書の後半で効く場面が一つある。第54章で可測関数を扱うとき、位相空間上のボレル σ -加法族を考える。

完全正規空間では、閉集合が G_δ なので、**ボレル階層の底が開集合だけで生成される。**これは可測性の議論を簡単にする。距離空間では自動的に成り立つので、第VII部以降この条件を明示する必要はなくなる。

逆に言えば、完全正規性は「位相空間論から測度論へ渡るときの最低条件」にあたる。第II部の階層のなかで、この条件が解析学にもっとも近い位置にある。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ で $(0, 1)$ と $(1, 2)$ が分離されていることを確かめよ。
2. 距離空間の開集合が F_σ であることを、★★★の式を使って示せ。
3. 交わらない閉集合が分離されていることを示せ。
4. チコノフ板が完全正規でない理由を、第17章の結果から述べよ。

証明

1. 命題18.2 の証明で、 $A \subseteq U$ となる理由を丁寧に述べよ。(20点)
2. 定理18.5 の十分性を、級数の一様収束と $f(x) = 0$ の同値性の両方について書き下せ。(20点)
3. 定理18.4 (1) から (3) で、閉集合が G_δ であることを示せ。(25点)

発展

1. 定理18.4 (3) から (2) を、対角線的な構成を明示して完全に示せ。
(35点)
2. 完全正規性が積で保たれないことを、ゾルゲンフライ直線を用いて示せ。(30点)

分離公理は何に保存されるか

◆ この章の問い

- ・位相的性質は、四つの操作に対してどう振る舞うのか。
- ・「保存される」ことと「強い条件である」ことは、なぜ逆の関係にあるのか。
- ・この表を作ることで、何が見えるようになるのか。

四つの操作

第I部で、位相空間を作る四つの操作を得た。部分空間、積、商、そして連続像である。第II部では分離公理を導入し、それぞれが操作に対してどう振る舞うかを個別に確かめてきた。**この章では表を完成させ、そこから何が読めるかを述べる。**

定義19.1 保存に関する用語

位相的性質 P について、

遺伝的 すべての部分空間が P をもつ。**閉遺伝的** 閉部分空間が P をもつ。**開遺伝的** 開部分空間が P をもつ。

積で保たれる P をもつ空間の積が P をもつ。有限積・可算積・任意積を区別する。

商で保たれる P をもつ空間の商が P をもつ。

連続像で保たれる P をもつ空間の連続像が P をもつ。

表

定理19.2 保存の一覧

第II部までに扱った性質について、次が成り立つ。

	部分	積	商	連続像
T_0, T_1, T_2	○	○	×	×
$T_3, T_{3\frac{1}{2}}$	○	○	×	×
T_4 (正規)	閉のみ	×	×	×
T_5 (完全正規)	○	×	×	×
第一可算	○	可算積	×	×
第二可算	○	可算積	×	×
可分	×	○ ($\leq 2^{\aleph_0}$)	○	○
距離化可能	○	可算積	×	×

証明 大半は第13章から第18章で示した。残りを補う。

第一可算・第二可算が可算積で保たれる。各成分の可算基底 $\mathcal{B}_n$ から、基本開集合 $\coprod_i U_i$ (有限個を除き $U_i = X_i$ 、制限される座標では $U_i \in \mathcal{B}_i$) の全体を取る。有限個の座標の選び方と基底元の選び方がともに可算なので、全体も可算である。「有限個を除いて全体」という積位相の形が、可算性を保つ理由である。

非可算積では壊れる。 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) は第一可算でない (第11章の演習)。したがって第二可算でも距離化可能でもない。

可分性は商と連続像で保たれる。 $D \subseteq X$ が稠密で f が連続な全射なら、 $f(D)$ は $f(X)$ で稠密である。実際、 V を空でない開集合とすると $f^{-1}(V)$ は空でない開集合だから D と交わり、その像が $f(D) \cap V$ に入る。可分性は「小さい集合で近似できる」という条件で、像を取ると小さいままである。

可分性は遺伝しない。ゾルゲンフライ平面が可分なのに、反対角線 (濃度 $2^{\aleph_0}$ の離散空間) が可分でない (第9章の演習)。 □

保存の一覧——強い条件は壊れやすい

性質	部分	積	商	連続像
$T_0 \cdot T_1 \cdot T_2$	○	○	×	×
$T_3 \cdot T_3\frac{1}{2}$	○	○	×	×
T_4 正規	閉のみ	×	×	×
T_5 完全正規	○	×	×	×
第一可算・第二可算	○	可算積	×	×
可分	×	○	○	○
距離化可能	○	可算積	×	×
コンパクト・連結は第III部と第IV部で埋める（どちらも商と連続像で保たれる）				

読めること (1)

局所的な性質は操作に強い

各点のまわりの話は、制限しても座標ごとに見ても壊れない

大域的な性質は壊れやすい

読めること (2)

商だけは、どの分離公理も保たない

「潰す」操作は情報を失う

可分だけが商で保たれる

像として保たれる性質だから

図19-1 保存の一覧。局所的な性質は四つの操作に強く、大域的な性質は壊れやすい。商はどの分離公理も保存しない一方、可分性のような「像として残る」性質だけを保つ。

表から読めること

三つのことが読める。

第一に、局所的な性質は操作に強い。「各点のまわりで何が言えるか」という形の条件——第一可算性、正則性、完全正則性——は、部分空間と積で保たれる。制限しても各点のまわりは変わらず、積でも有限個の座標を見れば足りるからである。

第二に、大域的な性質は壊れやすい。正規性は「空間全体の二つの閉集合」を扱う条件であり、部分空間でも積でも壊れる。コンパクト性と連結性（第III部・第IV部）も大域的だが、こちらは商と連続像で保たれる——後述する。

第三に、商だけが分離公理をまったく保たない。潰す操作は、点を区別する能力そのものを破壊する。逆に、可分性のように「像として残る」性質は商で保たれる。この対比が、操作の性格を言い当てている。

注意

表の空欄——コンパクト性と連結性——を先に埋めておく。どちらも**商と連続像で保たれ、積で保たれ（コンパクト性は任意積、連結性も任意積）、遺伝しない**。コンパクト性は閉遺伝的である。第20章と第28章で証明する。

この振る舞いは分離公理と正反対である。分離公理は「細かさ」を要求し、コンパクト性と連結性は「粗さ」を要求する。細かさは制限で保たれ、粗さは像で保たれる。

★★学部後半 強さと安定性のあいだの交換

表を眺めると、法則のようなものが見える。強い条件ほど保存されにくい。これは偶然ではない。

理由を述べる。位相的性質 P が「 X のすべての $\bigcirc\bigcirc$ について $\triangle\triangle$ が存在する」という形をしているとする。**部分空間を取ると、 $\bigcirc\bigcirc$ は増えないが $\triangle\triangle$ の候補も減る。**

正規性の場合、部分空間 A で閉な集合は X で閉とは限らない。すなわち「 $\bigcirc\bigcirc$ が増える」—— A で閉な集合のほうが多い。同時に、分離する開集合は A の開集合でなければならないので、「 $\triangle\triangle$ が減る」。両方が悪い向きに動くので壊れる。

完全正則性の場合、 $\bigcirc\bigcirc$ は「点と閉集合の対」で、 A で閉な集合は X で閉な集合の制限だから、閉包を取ることによって X の問題に還元できる（第14章★★）。 $\triangle\triangle$ は X の関数を制限すればよい。**還元が効くかどうかは分かれ目である。**

積の場合。積で保たれるには、各成分の情報を有限個束ねて全体の情報にできる必要がある。完全正則性では有限個の関数の最大を取った（第14章★★）。正規性ではこれができない——閉集合は座標ごとに分解できないからである。

ゾルゲンフライ平面の反対角線が典型である。**二つの座標が連動して動く方向にできる集合は、座標ごとの情報では見えない。**

実務上の含意。定理を証明するとき、仮定として何を置くかは次の基準で決まる。

操作を繰り返す証明では、保存される条件を使う。部分空間と積を行き来する議論には、完全正則性までにとどめる。

一回で済む証明では、強い条件を使ってよい。ウリゾーンの補題は正規性を一度使うだけなので、正規性が壊れやすくても困らない。

コンパクトハウスドルフという解決。実は、この交換をほぼ回避する条件がある。コンパクトハウスドルフ性である。

この条件は正規性を含み（第20章）、しかも**任意積で保たれ（チコノフの定理、第21章）、閉部分空間に遺伝し、連続像で保たれる（ハウスドルフな値域なら）。**強くて安定という、めずらしい組み合わせである。

第III部以降、多くの定理がコンパクトハウスドルフ空間を舞台にするのは、この安定性のためである。第59章のリースの表現定理、第79章のゲルファント理論、第96章のストーン-ワイエルシュトラスの定理——いずれもこの設定で述べられる。

★★★ 大学院 保存を公理化する——圏論的な見方

保存の表は、性質ごとの個別の事実の集まりに見える。だが背後に共通の構造がある。それを取り出しておく。

反映的部分圏。位相空間の圏 **Top** のなかで、ある性質をもつ空間だけを集めた部分圏を考える。この部分圏が「反映的」であるとは、任意の空間から部分圏への最良の近似が存在することをいう。

T_0 空間の圏は反映的である。第13章の★★★で述べたコルモゴロフ商が、その近似を与える。ハウスドルフ空間の圏も反映的で、近似は「ハウスドルフ化」（適当な商を取る）である。

余反映的部分圏。逆向きに、部分圏から任意の空間への最良の近似が存在する場合を余反映的という。コンパクト生成空間の圏（第8章★★★）は余反映的である。

保存と随伴。ここで一般的な原理が働く。**部分圏が反映的なら、その性質は極限（積・部分空間）で保たれる。余反映的なら、余極限（商・直和）で保たれる。**

これで表の大枠が説明できる。分離公理は反映的な部分圏を定めるので、積と部分空間で保たれやすい。正規性が例外なのは、正規空間の圏が反映的でないからである。

なぜ正規空間の圏は反映的でないのか。反映的であるには、正規空間の積が正規でなければならない（極限で閉じる必要がある）。ゾルゲンフライ平面がそれを否定する。

より根本的には、正規性が「存在命題の様な選択」を要求しないことが原因である。分離する開集合を、閉集合の対ごとに選ぶだけでよい。**選び方に一貫性がないので、積で束ねられない。**

対して完全正則性は、連続関数という「関手的な」対象を要求する。関数は制限も合成もできるので、操作に対して一貫して振る舞う。

パラコンパクト性という改良。第24章で導入するパラコンパクト性は、「被覆の細分」という一貫した構造を要求する。その結果、正規性より強いのに扱いやすい。

ただし積では保たれない。 $\mathbb{R}_\ell$ はパラコンパクトだが $\mathbb{R}_\ell^2$ はそうでない。**積で保たれる大域的な条件は、実質的にコンパクト性だけである。**

この見方の限界。圏論的な整理は大枠を説明するが、個別の反例は説明しない。チコノフ板が正規である理由も、ゾルゲンフライ平面が正規でない理由も、圏論からは出てこない。

第4章の共終数、第7章の可算性、第15章のヨーンズの補題——これらは具体的な集合論的・組合せ論的な事実であり、抽象化では代替できない。

枠組みは整理を与えるが、内容は個別の構成から来る。第V部で基数不変量を扱うとき、この点が改めて明らかになる。

演習

基本

1. 第一可算性が可算積で保たれることを示せ。
2. 可分性が連続像で保たれることを示せ。
3. 正規性が閉遺伝的であることを示せ。
4. 表のうち、四つの操作すべてで保たれる性質はあるか。

証明

1. 第二可算性が可算積で保たれ、非可算積では保たれないことを示せ。
(20点)
2. 定理19.2 の「可分性は遺伝しない」を、ゾルゲンフライ平面を用いて示せ。(25点)
3. 局所的な性質が部分空間で保たれやすい理由を、★★の議論に従って一般的に述べよ。(20点)

発展

1. 正規空間の圏が反映的でないことを、積で閉じないという事実から説明せよ。(30点)
2. 「強い条件ほど保存されにくい」という経験則に反する例を探し、その例で何が効いているかを論ぜよ(コンパクトハウスドルフ性を検討するとよい)。(30点)

第III部

コンパクト性と被覆性質

位相

有限性の代用としてのコンパクト性。三つの定義が同値であることから始め、Tychonoffの定理が選択公理と同値であることを示し、コンパクト化とパラコンパクト性へ進む。

コンパクト性——三つの定義の同値

◆ この章の問い

- ・「有限である」ことの、どの部分を取り出したのがコンパクト性なのか。
- ・被覆・有限交叉性・超フィルターという三つの定義は、なぜ同じものなのか。
- ・コンパクト性があると、何が自動的に手に入るのか。

有限性の代用

有限集合には便利な性質が多い。連続関数は最大値を取り、どんな被覆からも全体が作れ、どんな点列にも収束する部分列がある。無限集合では、これらが一般に壊れる。

コンパクト性は、無限集合でありながら有限集合のように振る舞うための条件である。ただし「有限に見える」度合いをどう定式化するかに、複数の道がある。

定義20.1 コンパクト空間

位相空間 X がコンパクトであるとは、 X のどの開被覆も有限部分被覆をもつことをいう。すなわち、 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ (U_i 開) ならば、有限個の $i_1, \dots, i_n$ があって $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$ 。

注意

本書ではコンパクト性にハウスドルフ性を含めない。文献によっては「コンパクト」にハウスドルフを含め、含めない場合を「擬コンパクト」

や「準コンパクト」と呼ぶ。**必要なときは「コンパクトハウスドルフ」と明記する。**

三つの定義が同値であること

定義20.2

集合の族 $\mathcal{F}$ が有限交叉性をもつとは、 $\mathcal{F}$ のどの有限部分族の交叉も空でないことをいう。

定理20.3 コンパクト性の三つの形

X について、次は同値である。

- (1) どの開被覆も有限部分被覆をもつ。
- (2) 有限交叉性をもつ閉集合の族は、全体の交叉が空でない。
- (3) X 上のどの超フィルターも収束する。
- (4) X のどのネットも収束する部分ネットをもつ。

証明 (1) と (2)。補集合を取るだけである。閉集合の族 $\{F_i\}$ に対し $\bigcap_i F_i = \emptyset$ は $\bigcup_i (X \setminus F_i) = X$ と同値であり、「有限部分被覆がある」は「有限個の F_i の交叉が空」と同値。対偶を取れば (2) になる。

(2) から (3)。 $\mathcal{U}$ を超フィルターとする。 $\{\overline{F} \mid F \in \mathcal{U}\}$ は有限交叉性をもつ（フィルターは有限交叉で閉じ、空集合を含まない）。(2) より $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{U}} \overline{F}$ なる点がある。

この x に $\mathcal{U}$ が収束することを示す。 V を x の近傍とする。もし $V \notin \mathcal{U}$ なら、超フィルターの性質（第12章）より $X \setminus V \in \mathcal{U}$ 、よって $x \in \overline{X \setminus V}$ 。ところが V は x の近傍で $V \cap (X \setminus V) = \emptyset$ だから、第6章の特徴づけに反する。よって $V \in \mathcal{U}$ 、すなわち $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。

(3) から (2)。 $\{F_i\}$ を有限交叉性をもつ閉集合の族とする。有限交叉全体はフィルターの基をなすので、それを含む超フィルター $\mathcal{U}$ が取れる（第

12章、選択公理)。(3) より $\mathcal{U} \rightarrow x$ なる x がある。各 i について $F_i \in \mathcal{U}$ であり、 x の任意の近傍も $\mathcal{U}$ に属するから、両者は交わる。よって $x \in \overline{F_i} = F_i$ 。

(3) と (4)。第12章で見たネットとフィルターの翻訳による。超フィルターに対応するのが普遍ネットであり、収束する部分ネットの存在が超フィルターの収束に対応する。□

注意

(3) の形が、第21章のチコノフの定理をもっとも短く証明する。被覆による直接証明は、同じ定理に対してはるかに長くなる。**定義の選び方が証明の長さを決める——これが第12章でフィルターを導入した理由である。**

コンパクト性が与えるもの

定理20.4

- (1) コンパクト空間の閉部分集合はコンパクト。
- (2) ハウスドルフ空間のコンパクト部分集合は閉。
- (3) コンパクト空間の連続像はコンパクト。
- (4) コンパクト空間上の連続実数値関数は最大値と最小値を取る。
- (5) コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射は同相。
- (6) コンパクトハウスドルフ空間は正規である。

証明 (1) $F \subseteq X$ を閉、 $\{U_i\}$ を F の (X の開集合による) 被覆とする。 $\{U_i\} \cup \{X \setminus F\}$ は X の開被覆だから有限部分被覆をもち、 $X \setminus F$ を除けば F の有限被覆になる。

(2) $K \subseteq X$ をコンパクト、 $x \notin K$ とする。各 $y \in K$ についてハウスドルフ性より交わらない近傍 $U_y \ni x, V_y \ni y$ を取る。 $\{V_y\}$ は K の開被覆だから有限個 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ で覆える。 $U = U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$ は x の近傍で

K と交わらない。有限交叉だから開である——ここに有限性が効く。よって $X \setminus K$ は開。


(3) $f: X \rightarrow Y$ 連続全射、 $\{V_i\}$ を Y の開被覆とすると $\{f^{-1}(V_i)\}$ は X の開被覆。有限部分被覆の像が Y を覆う。

(4) (3) より $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ はコンパクト。ハイネ-ボレルの定理 (第29章) よりコンパクトな $\mathbb{R}$ の部分集合は有界閉であり、上限を含む。

(5) f が閉写像であることを示せばよい (第8章)。 $F \subseteq X$ 閉なら (1) よりコンパクト、(3) より $f(F)$ はコンパクト、(2) より Y で閉。

(6) A, B を交わらない閉集合とする。(1) より両方コンパクト。(2) の証明を二段階に行う——まず各 $x \in A$ について、 x と B を分離する開集合 U_x, V_x を (2) の議論で作る。 $\{U_x\}$ は A の被覆だから有限個で覆え、対応する V_x の有限交叉を取ればよい。コンパクト性を二回使う。□

三つの定義は同じものを言っている



コンパクト性が自動的に与えるもの

閉部分集合はコンパクト

ハウスドルフなら、コンパクト部分集合は閉

連続像はコンパクト 連続関数は最大最小を取る

コンパクト→ハウスドルフの連続全単射は同相

コンパクトハウスドルフ⇒正規 (コンパクト性を二回使う)

分離公理の階層を気にせずに済む場所が、ここにできる

被覆に補集合を足すだけ

有限交叉が開であることを使う

本書でもっとも多用する道具

図20-1 被覆・有限交叉性・超フィルターの三つは同じ条件である。どれを使うかで証明の長さが変わる。コンパクトハウスドルフ空間では正規性まで自動的に手に入る。

例20.5 コンパクトな空間、そうでない空間

コンパクト。有限集合（どんな位相でも）。 $[0, 1]$ （第29章のハイネ–ボレル）。 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ （第21章）。カントール集合。順序数の空間 $[0, \omega_1]$ 。

コンパクトでない。 $\mathbb{R}$ ($\{(-n, n)\}$ に有限部分被覆がない)。 $(0, 1)$ ($\{(1/n, 1)\}$ に有限部分被覆がない)。無限離散空間。 $[0, \omega_1)$ (各 $[0, \alpha]$ で覆えるが有限では足りない)。

反例20.6 コンパクト性は遺伝しない

$[0, 1]$ はコンパクトだが $(0, 1)$ はそうでない。開部分空間では壊れる。閉部分空間では保たれる（定理20.4 (1)）。

第19章の表でコンパクト性が「閉遺伝的」に分類されたのは、この非対称のためである。

★★ 学部後半 コンパクト性と、量子子の順序

コンパクト性の証明は、しばしば同じ型をとる。「各点について何かが成り立つ」から「一様に何かが成り立つ」へ移る型である。

典型例——一様連続性。コンパクト距離空間上の連続関数は一様連続である（第47章で証明する）。証明はこうである。各点 x について δ_x が取れる。 $\{U_{\delta_x/2}(x)\}$ はコンパクト空間の被覆だから有限個で覆え、 $\delta = \min_k \delta_{x_k}/2$ が一様な値を与える。

第1章の★★で述べた量子子の順序の問題が、ここで解決している。

$$\forall x \exists \delta \longrightarrow \exists \delta \forall x$$

この入れ替えは一般には許されない。コンパクト性が、有限個への還元を通してそれを許す。

もう一つの型——被覆を縮める。定理20.4 (6) の証明で、コンパクト性を二回使った。一回目で B 側を有限個に還元し、二回目で A 側を還元する。この二段構えは、第24章のパラコンパクト性でも繰り返される。

ルベーク数。コンパクト距離空間の開被覆 $\{U_i\}$ に対し、次の性質をもつ $\lambda > 0$ が存在する。直径が λ 未満の部分集合は、ある U_i に丸ごと含まれる。この λ をルベーク数という。

証明は、各 x について $U_{2\varepsilon_x}(x) \subseteq U_{i(x)}$ なる ε_x を取り、 $\{U_{\varepsilon_x}(x)\}$ の有限部分被覆から $\lambda = \min_k \varepsilon_{x_k}$ を作る。ここでも「各点ごと」が「一様」に変わっている。

ルベーク数は、第95章でアスコリ–アルツェラの定理を扱うときと、道のホモトピーを細かく分割するときに使われる。

なぜ有限性がこれを可能にするのか。無限個の正の数の最小値は 0 になりうる（第5章の反例）。有限個なら最小値は正である。コンパクト性は、この一点のためにある。第5章で位相の公理が「有限交叉」を要求した理由と、同じ根から来ている。

★★★ 大学院 コンパクト性の別の顔——論理と代数

コンパクト性は位相空間論の概念だが、同じ名前が論理学にも現れる。偶然ではない。

一階述語論理のコンパクト性定理。文の集合 Σ について、「 Σ のどの有限部分集合もモデルをもつならば、 Σ 自身もモデルをもつ」——これを論理のコンパクト性定理という。

この定理は、実際に位相的なコンパクト性として理解できる。言語 L の完全理論全体に適切な位相（ストーン位相）を入れると、得られる空間はコンパクトである。文 φ に対応する集合が開かつ閉であり、有限交叉性の議論がそのまま働く。

ストーン双対性。より一般に、ブール代数 B に対し、その超フィルター全体に位相を入れた空間 $S(B)$ を考える。 $S(B)$ はコンパクトハウスドルフで、しかも開かつ閉な集合が基底をなす（全不連結）。このような空間をストーン空間という。

逆に、ストーン空間から開閉集合全体を取るとブール代数が得られる。この対応は圏同値である——ストーン Stone の双対定理という。

第23章のストーン-チェックのコンパクト化は、この双対性の特別な場合にあたる。 $\beta\mathbb{N}$ は、 $\mathbb{N}$ の冪集合というブール代数に対応するストーン空間である。

なぜ超フィルターが橋渡しをするのか。定理20.3 (3) が鍵である。コンパクト性とは、超フィルターがすべて「行き先」をもつことだった。論理の側では、超フィルターは無矛盾な極大理論——すなわち完全な世界像——にあたる。

「**有限的に矛盾しない情報は、実際に実現できる**」というのが、両方の定理の内容である。位相では点として実現し、論理ではモデルとして実現する。

代数における現れ方。可換環のスペクトル $\text{Spec}(A)$ （素イデアル全体にザリスキ位相を入れたもの）もコンパクトである。ここでも有限交叉性の議論が働く——イデアルが有限個の元で生成されることが、有限部分被覆を与える。

ただし $\text{Spec}(A)$ はハウスドルフでない（第13章で触れた）。**コンパクト性は、分離公理を仮定しなくても意味をもつ。**この事実が、代数幾何でコンパクト性が有用である理由である。

本書はこれらの方向に進まないが、第79章のゲルファント理論では、可換 C^* 環のスペクトルがコンパクトハウスドルフ空間になることを見る。そこで「空間と関数環の双対性」という同じ主題に、解析の側から到達する。

演習

基本

1. $(0, 1)$ がコンパクトでないことを、有限部分被覆をもたない開被覆を挙げて示せ。
2. 有限集合がどんな位相でもコンパクトであることを示せ。
3. 無限離散空間がコンパクトでないことを示せ。
4. コンパクト空間の有限個の合併がコンパクトであることを示せ。

証明

1. 定理20.3 の (1) と (2) が同値であることを、補集合の計算を明示して示せ。(15点)
2. 定理20.4 (2) の証明で、有限交叉が開であることがどこで効いているかを述べよ。(15点)
3. 定理20.4 (6) を、コンパクト性を二回使う箇所を明示して書き直せ。(25点)

発展

1. 定理20.3 の (2) から (3) を、超フィルターの性質をどこで使うかを明示して示せ。(30点)
2. コンパクト距離空間の開被覆にルベグ数が存在することを示せ。(25点)

Tychonoffの定理と選択公理

◆ この章の問い

- ・無限個のコンパクト空間の積は、コンパクトか。
- ・それを証明するのに、なぜ選択公理が要るのか。
- ・この定理は、どれだけ強い主張なのか。

主張と、意外さ

定理21.1 チコノフの定理

コンパクト空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ に対し、積空間 $\prod_{i \in I} X_i$ (積位相) はコンパクトである。添字集合 I の濃度に制限はない。

この主張は意外である。第19章で見たとおり、正規性は積で壊れ、第二可算性は非可算積で壊れた。**コンパクト性は、任意個の積で保たれるほとんど唯一の大域的な性質である。**

意外さの源を述べる。 $\{0, 1\}^I$ を考える。 I が非可算のとき、この空間は第一可算でなく、距離化できず、点列コンパクトでもない。にもかかわらずコンパクトである。

注意

箱位相ではこの定理は成り立たない。 $\{0, 1\}^\omega$ は箱位相で離散になり、非可算なのでコンパクトでない(第11章)。**積位相の「有限個を除いて全体」という形が、定理の成立に不可欠である。**

超フィルターによる証明

証明 定理20.3 (3) を使う。 $X = \prod_i X_i$ 上の超フィルター $\mathcal{U}$ を任意に取り、これが収束することを示す。

各座標に落とす。射影 $p_i: X \rightarrow X_i$ による像を考える。

$$\mathcal{U}_i = \{ A \subseteq X_i \mid p_i^{-1}(A) \in \mathcal{U} \}$$

これは X_i 上のフィルターである。しかも超フィルターである—— $A \subseteq X_i$ に対し、 $p_i^{-1}(A)$ か $p_i^{-1}(X_i \setminus A) = X \setminus p_i^{-1}(A)$ のどちらかが $\mathcal{U}$ に属するから (第12章の命題12.6)、 A か $X_i \setminus A$ が $\mathcal{U}_i$ に属する。

各座標で収束させる。 X_i はコンパクトだから、定理20.3 (3) より $\mathcal{U}_i \rightarrow x_i$ なる $x_i \in X_i$ がある。ここで各 i について一つずつ x_i を選ぶ——選択公理を使う。

束ねる。 $x = (x_i)_{i \in I}$ と置き、 $\mathcal{U} \rightarrow x$ を示す。 x の基本近傍は

$$W = p_{i_1}^{-1}(V_1) \cap \cdots \cap p_{i_n}^{-1}(V_n), \quad V_k \ni x_{i_k} \text{ 開}$$

の形である (第11章)。各 k について $\mathcal{U}_{i_k} \rightarrow x_{i_k}$ だから $V_k \in \mathcal{U}_{i_k}$ 、すなわち $p_{i_k}^{-1}(V_k) \in \mathcal{U}$ 。フィルターは有限交叉で閉じるから $W \in \mathcal{U}$ 。

基本近傍が有限個の座標しか制限しないことが、ここで決定的に効く。無限個の制限があれば、有限交叉では閉じない。 $\square$

注意

証明が短いには理由がある。超フィルターは「すでに選び終わった」対象である。選択の手間は、超フィルターの存在 (第12章の超フィルター補題) と、各座標の収束先を選ぶところに封じ込められている。被覆による証明では、この選択を証明の途中で明示的に行わなければならない、はるかに長くなる。

選択公理との同値性

定理21.2

チコノフの定理は選択公理と同値である。すなわち、選択公理を除いた集合論の公理系のもとで、チコノフの定理から選択公理が導ける。

証明 チコノフの定理を仮定する。空でない集合の族 $\{A_i\}_{i \in I}$ を与え、選択関数を作る。

空間を作る。 各 i について $Y_i = A_i \cup \{\infty_i\}$ ($\infty_i \notin A_i$ は新しい点) とし、位相を

$$\mathcal{T}_i = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq Y_i \mid \infty_i \in U\} \cup \{A_i\}$$

と定める。これは位相である——確認は演習に回す。 Y_i はコンパクトである。実際、 Y_i を覆う開被覆には ∞_i を含む開集合 U があり、残りは $Y_i \setminus U \subseteq A_i$ を覆う必要があるが、 A_i 自身が開なのでこれ一つで足りる。

よって二つの開集合で覆える。

積を取る。 チコノフの定理より $Y = \prod_i Y_i$ はコンパクト。ここで閉集合の族

$$F_i = p_i^{-1}(A_i) = \{y \in Y \mid y_i \in A_i\}$$

を考える。 A_i は Y_i で閉である——補集合 $\{\infty_i\}$ が開だから。よって F_i は閉である。

有限交叉性。 有限個の $i_1, \dots, i_n$ に対し $F_{i_1} \cap \dots \cap F_{i_n} \neq \emptyset$ である。実際、その有限個の座標では A_{i_k} から元を一つ選び（有限個の選択は公理不要、第3章）、残りの座標は ∞_i と置けばよい。

結論。 コンパクト性（定理20.3 (2)）より $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$ 。その元 y は、すべての座標で $y_i \in A_i$ を満たす。**すなわち $c(i) = y_i$ が選択関数である。** □

超フィルターは、選択を先に済ませた対象である




図21-1 超フィルターを各座標へ落とし、収束先を選んで束ねる。基本近傍が有限個の座標しか制限しないことが決定的である。逆向きに、定理から選択関数が構成できる。

ただちに従うこと

系21.3

- (1) 立方体 $[0, 1]^{\aleph}$ はコンパクトハウスドルフである。
- (2) ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ はコンパクト距離空間である。
- (3) カントール集合 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ はコンパクト距離空間である。
- (4) $\mathbb{R}^n$ の有界閉集合はコンパクトである (ハイネ-ボレル)。

証明 (1) は 定理21.1 と、ハウスドルフ性が積で保たれること (第13章)。(2) (3) はこれに第11章★★の距離化を合わせる。

(4) $A \subseteq \mathbb{R}^n$ を有界閉とする。 $A \subseteq [-M, M]^n$ なる M を取れば、 $[-M, M]^n$ は 定理21.1 よりコンパクトであり、 A はその閉部分集合だからコンパクト (定理20.4 (1))。 $[-M, M]$ のコンパクト性は第29章で実数の完備性から示す。 $\square$

注意

(1) と第14章の 定理14.6 を合わせると、**チコノフ空間はコンパクトハウスドルフ空間の部分空間として実現できる**ことが分かる。これが第23章のストーン-チェックのコンパクト化の出発点である。

★★ 学部後半 被覆による直接証明——アレクサンダーの準基底補題

超フィルターを使わない証明もある。その道具が、それ自体として有用である。

アレクサンダーの準基底補題。 S を X の準基底とする。 S の元による被覆がすべて有限部分被覆をもてば、 X はコンパクトである。

証明はツォルンの補題を使う。 X がコンパクトでないとして矛盾を導く。有限部分被覆をもたない開被覆の全体を、包含で順序づける。鎖の合併が再び有限部分被覆をもたないことを確かめれば（有限部分被覆があれば鎖のどれかの元に含まれてしまう）、ツォルンの補題より極大なもの $\mathcal{C}$ が取れる。

$\mathcal{C}$ の極大性から、 $\mathcal{C}$ に属さない開集合を足すと有限部分被覆ができる。ここから、 $\mathcal{C} \cap \mathcal{S}$ が X を覆わないことを導く——覆えば仮定に反するからである。覆わない点 x を取ると、 $x \in U \in \mathcal{C}$ なる U があり、準基底の定義より $x \in S_1 \cap \cdots \cap S_m \subseteq U$ なる $S_k \in \mathcal{S}$ がある。

各 $S_k \notin \mathcal{C}$ なので、極大性より $\mathcal{C} \cup \{S_k\}$ に有限部分被覆がある。それらを合わせると $\mathcal{C}$ 自身の有限部分被覆が作れてしまう——分配法則による計算で確かめられる。矛盾。

チコノフの定理への適用。積位相の準基底は $\{p_i^{-1}(V)\}$ である。この形の集合による被覆を考える。

もし、ある i について $\{V \mid p_i^{-1}(V) \in \mathcal{C}\}$ が X_i を覆うなら、 X_i のコンパクト性より有限部分被覆があり、その逆像が X の有限部分被覆になる。どの i でも覆わないとすると、**各座標で覆われない点 x_i を選べる（選択公理）**。すると $x = (x_i)$ は $\mathcal{C}$ で覆われず、矛盾する。

二つの証明の比較。超フィルターによる証明は短いが、超フィルター補題という別の道具を要する。準基底補題による証明は、ツォルンの補題を直接使うので自己完結的である。

どちらでも選択公理は避けられない。定理21.2 により、それは避けようのないことである。証明の技法を変えても、定理の集合論的な強さは変わらない。

★★★ 大学院 ハウスドルフ版は、より弱い公理で足りる

チコノフの定理は選択公理と同値だった。ところが、空間にハウスドルフ性を課すと事情が変わる。

主張。「コンパクトハウスドルフ空間の積はコンパクト」は、超フィルター補題と同値である。そして超フィルター補題は選択公理より真に弱い。

なぜ弱くなるのか。定理21.1 の証明を振り返る。選択公理を使ったのは、各座標の収束先 x_i を選ぶところだった。

ハウスドルフ空間では、超フィルターの収束先は一意である（第13章）。一意なら「選ぶ」必要がない——関数として定まる。したがって選択公理は不要になり、超フィルター補題だけで足りる。

第3章で述べた「選択公理は選べると言うが、どう選ぶかは教えない」という事情が、逆向きに働いている。選ぶべきものが一つしかなければ、公理は要らない。

逆向き。ハウスドルフ版から超フィルター補題を導くには、 $\{0, 1\}^I$ を使う。 I 上のフィルター $\mathcal{F}$ に対し、それを含む超フィルターの全体が $\{0, 1\}^{P(I)}$ の閉集合として表せる。コンパクト性からこの閉集合が空でないことが出る。

階層のまとめ。第3章の★★★で述べた階層に、位相の定理を対応させる。

選択公理	一般のチコノフの定理
超フィルター補題	ハウスドルフ版チコノフ、ハーネーバナッハ
従属選択公理	ベールのカテゴリー定理（第27章）
可算選択公理	可算和の可算性、点列コンパクトの初等的性質

位相空間論の主要定理が、集合論の公理の強さの目盛りになっている。

何が読み取れるか。第一に、定理に分離公理を加えると、必要な集合論の強さが下がることもある。これは第II部で階層を丁寧に扱った理由の一つである。

第二に、「どの公理が必要か」を知ることは、定理の意味を知ることの一部である。チコノフの定理が選択公理と同値であるという事実は、この定理が「構成的でない」ことを正確に述べている。**積の元を一つ取り出すことすらできないのだから、コンパクト性から具体物が得られないのは当然である。**

第三に、ロケールの理論（第5章★★★）では、チコノフの定理が選択公理なしに証明できる。点という概念を捨てると、選択が要らなくなる。必要だったのは点を選ぶことであり、コンパクト性そのものではなかった。

演習

基本

1. 有限個のコンパクト空間の積がコンパクトであることを、被覆の言葉で直接示せ。
2. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ がコンパクトであることを、定理21.1 から述べよ。
3. 定理21.2 の証明で作った $\mathcal{T}_i$ が位相であることを確かめよ。
4. 箱位相でチコノフの定理が成り立たない理由を述べよ。

証明

1. 定理21.1 の証明で、 $\mathcal{U}_i$ が超フィルターであることを丁寧に示せ。(20点)
2. 定理21.2 の証明で、 F_i の族が有限交叉性をもつことを示せ。有限個の選択が公理を要さない理由も述べること。(25点)
3. ハイネ-ボレルの定理(系21.3 (4)) を、 $[-M, M]$ のコンパクト性を認めて示せ。(15点)

発展

1. アレクサンダーの準基底補題を証明し、それを用いてチコノフの定理を示せ。(40点)
2. ハウスドルフ版チコノフの定理が超フィルター補題だけで証明できる理由を、収束先の一意性に即して説明せよ。(30点)

局所コンパクト性と一点コンパクト化

◆ この章の問い

- ・コンパクトでない空間を、一点だけ足してコンパクトにできるか。
- ・「局所的にコンパクト」とは、正確に何を言うのか。
- ・局所コンパクト性は、なぜ解析学で繰り返し仮定されるのか。

局所コンパクト性

$\mathbb{R}^n$ はコンパクトでない。だが各点のまわりには、コンパクトな閉球がある。この「局所的にはコンパクト」という状況を条件として取り出す。

定義22.1 局所コンパクト空間

ハウスドルフ空間 X が局所コンパクトであるとは、各点がコンパクトな近傍をもつことをいう。

注意

ハウスドルフ性を定義に含める流儀と、含めない流儀がある。含めない場合、同値でない複数の定義が生じてしまう。**本書は含める。**実際、次の命題はハウスドルフ性を使う。

命題22.2

ハウスドルフ空間 X について、次は同値である。

- (1) X は局所コンパクト。
- (2) 各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、 $\overline{V}$ がコンパクトで $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U$ なる開集合 V が存在する。

証明 (2) から (1) は明らか。(1) から (2) を示す。 K を x のコンパクト近傍とする。 K はコンパクトハウスドルフだから正規 (定理20.4 (6))、したがって正則である。

$U \cap \text{int } K$ は K のなかで x の近傍だから、 K の正則性より (命題14.2) $x \in W \subseteq \overline{W}^K \subseteq U \cap \text{int } K$ なる K -開集合 W が取れる。

$W \subseteq \text{int } K$ なので W は X でも開である (第9章)。 $\overline{W}^K$ はコンパクト (定理20.4 (1)) であり、 X がハウスドルフだからコンパクト集合は閉、よって $\overline{W}^X = \overline{W}^K$ 。 $V = W$ と置けばよい。□

例22.3 局所コンパクトな空間、そうでない空間

局所コンパクト。コンパクト空間。 $\mathbb{R}^n$ 。離散空間。多様体。局所コンパクト群。 $[0, \omega_1)$ 。

局所コンパクトでない。 $\mathbb{Q}$ (どの点のどの近傍も、コンパクトな閉包をもたない)。無限次元ノルム空間 (第71章で示す——単位球がコンパクトになるのは有限次元のときに限る)。 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (積位相)。

無限次元では局所コンパクト性が失われる——これが関数解析の全体を特徴づける事実である。

一点コンパクト化

定理22.4 アレクサンドロフの一点コンパクト化

X を局所コンパクト (ハウスドルフ) でコンパクトでない空間とする。 $X^* = X \cup \{\infty\}$ ($\infty \notin X$) に

$$\mathcal{T}^* = \mathcal{T}_X \cup \{X^* \setminus K \mid K \subseteq X \text{ コンパクト}\}$$

という位相を入れると、 X^* はコンパクトハウスドルフになり、 X はその稠密な開部分空間になる。

証明 位相であること。 (T1) は $K = \emptyset$ と $\emptyset \in \mathcal{T}_X$ による。(T2)

(T3) は、コンパクト集合の有限合併がコンパクトで、コンパクト集合と閉集合の交叉がコンパクトであることから従う。ハウスドルフ性より K は閉なので、 $X \setminus K$ は X で開である——これが $\mathcal{T}_X$ との整合を保証する。

コンパクト性。 $\{U_i\}$ を X^* の開被覆とする。 ∞ を含む $U_{i_0} = X^* \setminus K$ がある。 K はコンパクトだから、残りの $U_i \cap X$ のうち有限個で覆える。合わせて有限部分被覆になる。

ハウスドルフ性。 $x, y \in X$ なら X のハウスドルフ性で足りる。 $x \in X$ と ∞ を分離するには、**命題22.2** より $\bar{V}$ がコンパクトな $V \ni x$ を取り、 V と $X^* \setminus \bar{V}$ を使う。**ここで局所コンパクト性が必要になる。**

稠密性。 X がコンパクトでないので、 ∞ のどの近傍 $X^* \setminus K$ も $X \setminus K \neq \emptyset$ を含む。 $\square$

例22.5 一点コンパクト化の例


直線と円。 $\mathbb{R}^* \cong S^1$ 。両端を一点でつなぐと円になる。

平面と球面。 $(\mathbb{R}^2)^* \cong S^2$ 。これがリーマン球面であり、第91章と第93章で複素解析の舞台になる。**無限遠点を足すことで、有理関数が球面全体で定義された写像になる。**

一般に。 $(\mathbb{R}^n)^* \cong S^n$ 。立体射影が同相写像を与える。

離散空間。 可算離散空間 $\mathbb{N}$ の一点コンパクト化は、 $\{0\} \cup \{1/n\}$ と同相である。収束点が一つ足される。

無限遠に一点を足す——立体射影



局所コンパクトが要る場面

一点コンパクト化がハウスドルフ
商と積の交換 (第10章★★★)
関数空間のデカルト閉性 (第95章)
リースの表現定理 (第59章)
ハール測度の存在 (局所コンパクト群)

局所コンパクトでないもの

Q 閉包がコンパクトな近傍がない
無限次元ノルム空間 (第71章)
R の可算積 (積位相)
単位球がコンパクト ⇔ 有限次元
関数解析はこの事実の上に立つ

図22-1 立体射影が一点コンパクト化を実現する。局所コンパクト性は多くの定理の前提になる一方、無限次元のノルム空間では成り立たない。

局所コンパクト空間の性質

定理22.6

局所コンパクトハウスドルフ空間 X について、

- (1) X はチコノフ空間 (完全正則) である。
- (2) X の開部分空間と閉部分空間は局所コンパクトである。
- (3) コンパクト集合 K と開集合 $U \supseteq K$ に対し、 $\overline{V}$ がコンパクトな開集合 V で $K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$ となるものが存在する。

証明 (1) X^* はコンパクトハウスドルフだから正規、したがってチコノフである (第15章の系)。 X はその部分空間であり、チコノフ性は遺伝する (第14章)。

(3) 各 $x \in K$ について **命題22.2** より V_x を取る。 K のコンパクト性より有限個 $V_{x_1}, \dots, V_{x_n}$ で覆え、 $V = \bigcup_k V_{x_k}$ と置けばよい。**閉包は有限個の開包の合併だからコンパクトである。**

(2) 開部分空間 U について、 $x \in U$ なら (3) を $K = \{x\}$ に適用して $\overline{V} \subseteq U$ なるコンパクト近傍が得られる。閉部分空間は 定理20.4 (1) による。 $\square$

注意

(1) は重要である。局所コンパクトハウスドルフ空間では、コンパクト台をもつ連続関数が豊富に存在する。第59章のリースの表現定理は、この関数の全体の上の線形汎関数が測度で表せることを主張する。局所コンパクト性がなければ、関数が足りずに定理が成り立たない。

★★ 学部後半 コンパクト化は一つではない

一点コンパクト化は、もっとも「けち」なコンパクト化である。他にもコンパクト化はあり、それらのあいだには順序がある。

定義。 チコノフ空間 X のコンパクト化とは、コンパクトハウスドルフ空間 Y と埋め込み $e: X \rightarrow Y$ で $\overline{e(X)} = Y$ となるものをいう。

順序。 二つのコンパクト化 (Y_1, e_1) 、 (Y_2, e_2) について、 $f \circ e_2 = e_1$ なる連続全射 $f: Y_2 \rightarrow Y_1$ があるとき $Y_1 \leq Y_2$ と定める。大きいコンパクト化から小さいコンパクト化へ、連続に潰せる。

一点コンパクト化は最小。局所コンパクトな X のどのコンパクト化から、 X^* へ潰す写像がある。 $Y \setminus X$ を一点に潰せばよい。その商がハウスドルフになることは、 $Y \setminus X$ が閉であることから従う。

もっと大きいコンパクト化。 $\mathbb{R}$ の例を三つ挙げる。

一点コンパクト化 S^1 。両端を一点に。

二点コンパクト化 $[-\infty, +\infty]$ 。両端を別々の点に。解析学で使う拡大実数直線である。

ストーン-チェックのコンパクト化 $\beta\mathbb{R}$ 。第23章で構成する。これが最大のコンパクト化である。濃度は $2^{2^{\aleph_0}}$ という巨大なもので、 $\beta\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}$ の構造は複雑である。

階層。したがって

$$S^1 \leq [-\infty, +\infty] \leq \cdots \leq \beta\mathbb{R}$$

という順序がある。あいだには無数のコンパクト化がある。

何を選ぶか。用途による。**一点コンパクト化は「無限遠で一つの値に収束する」関数を扱うのに向く。**複素解析でリーマン球面を使うのは、有理関数が無限遠で一つの値をとるからである。

二点コンパクト化は、順序を保ちたいときに使う。 $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ と $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ を区別したいからである。第44章で上限・下限を扱うとき、この拡大実数直線が必要になる。

ストーン-チェックのコンパクト化は、すべての有界連続関数を延ばせるという普遍性をもつ。これが第23章の主題である。

★★★ 大学院 局所コンパクト性が失われる世界——無限次元

例22.3 で触れた「無限次元では局所コンパクトでない」という事実を、正面から述べる。これが関数解析という分野の存在理由である。

リースの補題と、その帰結。ノルム空間 V の閉単位球 $B = \{v \mid \|v\| \leq 1\}$ を考える。 **B がコンパクトであることと $\dim V < \infty$ であることは同値である。**第71章で証明する。

証明の核は、リース Riesz の補題である。真閉部分空間 $W \subsetneq V$ と $\varepsilon > 0$ に対し、 $\|v\| = 1$ かつ $d(v, W) > 1 - \varepsilon$ なる v が取れる。

無限次元なら、これを繰り返して $\|v_n\| = 1$ 、 $\|v_n - v_m\| > 1/2$ なる点列が作れる。**この点列は収束する部分列をもたないので、単位球はコンパクトでない。**

何が困るのか。コンパクト性は「有限性の代用」だった。それが失われると、次のことがすべて使えなくなる。

連続関数が最大値を取る——最適化の存在が保証されない。点列から収束部分列が取れる——近似列の極限が作れない。閉集合の入れ子が空でない交叉をもつ——不動点の存在が言えない。

三つの回避策。関数解析は、この困難に三つの方法で応じる。

第一に、**位相を弱める**。第70章の弱位相と弱*位相がそれである。**位相を弱くすると開集合が減り、被覆が粗くなるのでコンパクトになりやすい**。第71章のバナッハ-アラオグルの定理は、双対空間の単位球が弱*位相でコンパクトであることを主張する——これはチコノフの定理から従う。

第二に、**作用素を制限する**。第73章のコンパクト作用素は、有界集合を「コンパクトに近い」集合へ写す作用素である。この種の作用素に限れば、有限次元に似たスペクトル理論が成り立つ（第76章）。

第三に、**凸性を使う**。第72章のクレイン-ミルマンの定理は、コンパクト凸集合が端点の閉凸包になることを述べる。**凸性が、コンパクト性の欠如をある程度埋め合わせる。**

位相空間論との往復。これら三つの回避策は、いずれも位相空間論の概念を使っている。第70章から第73章は、第III部で作った道具を無限次元の舞台で使い直す章である。

第97章でこの往復を地図にする。局所コンパクト性という一つの条件が、有限次元と無限次元を分ける境界線になっていることが、そこで明らかに。

演習

基本

1. $\mathbb{Q}$ が局所コンパクトでないことを示せ。
2. $\mathbb{N}$ (離散) の一点コンパクト化が $\{0\} \cup \{1/n\}$ と同相であることを示せ。
3. コンパクト空間が局所コンパクトであることを示せ。
4. 局所コンパクト空間の有限積が局所コンパクトであることを示せ。

証明

1. 定理22.4 で $\mathcal{T}^*$ が位相であることを、三つの公理それぞれについて確かめよ。(20点)
2. 定理22.4 のハウスドルフ性の証明で、局所コンパクト性がどこで必要かを述べよ。(15点)
3. 定理22.6 (3) を、有限個の被覆から閉包のコンパクト性を導く箇所を明示して示せ。(20点)

発展

1. 立体射影が $(\mathbb{R}^2)^* \rightarrow S^2$ の同相写像を与えることを、具体的な式で示せ。(30点)
2. 局所コンパクト空間の可算積が局所コンパクトとは限らないことを示せ。(25点)

Stone-Čechコンパクト化

◆ この章の問い

- もっとも大きいコンパクト化とは、何が大きいのか。
- 「有界連続関数がすべて延びる」という性質は、なぜ最大性と同じなのか。
- $\beta\mathbb{N}$ という空間は、どれほど奇妙なのか。

構成

第14章で、チコノフ空間が立方体に埋め込めることを見た。その埋め込みの閉包を取れば、コンパクト化が得られる。

定義23.1 ストーン-チェックのコンパクト化

X をチコノフ空間、 $C = \{ f: X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ 連続} \}$ とする。定理14.6の埋め込み $e: X \rightarrow [0, 1]^C$ 、 $e(x) = (f(x))_{f \in C}$ に対し、

$$\beta X = \overline{e(X)} \subseteq [0, 1]^C$$

と定める。これを X のストーン-チェックのコンパクト化という。

$[0, 1]^C$ はチコノフの定理（第21章）よりコンパクトハウスドルフであり、その閉部分集合 βX もコンパクトハウスドルフである。 $e(X)$ は βX で稠密であり、 e は埋め込みだから、これはコンパクト化である。

普遍性

構成そのものより、次の性質が βX を特徴づける。

定理23.2 ストーン-チェックの普遍性

X をチコノフ空間とする。

- (1) どの有界連続関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ も、連続に $\beta X \rightarrow \mathbb{R}$ へ延びる。
- (2) どのコンパクトハウスドルフ空間 K と連続写像 $g: X \rightarrow K$ に対しても、連続な $\tilde{g}: \beta X \rightarrow K$ で $\tilde{g} \circ e = g$ となるものがただ一つ存在する。
- (3) この性質をもつコンパクト化は、同型を除いて βX に限る。

証明 (1)。 f の値域を $[0, 1]$ に正規化してよい。すると $f \in C$ であり、射影 $p_f: [0, 1]^C \rightarrow [0, 1]$ を βX に制限したものが求める拡張である。実際 $p_f(e(x)) = f(x)$ 。射影は連続だから、制限も連続。**拡張の存在が、構成そのものに組み込まれている。**

(2)。 K はコンパクトハウスドルフだから正規、よってチコノフ (第15章の系)。定理14.6 より K は $[0, 1]^D$ ($D = C(K, [0, 1])$) に埋め込める。各 $h \in D$ について $h \circ g: X \rightarrow [0, 1]$ は連続だから、(1) により βX へ延びる。それらを束ねて $\tilde{G}: \beta X \rightarrow [0, 1]^D$ を得る。

$\tilde{G}(\beta X) \subseteq K$ を示す。 K は $[0, 1]^D$ でコンパクト、したがって閉である。
 $\tilde{G}(e(X)) = g(X) \subseteq K$ であり、 $e(X)$ は稠密だから
 $\tilde{G}(\beta X) = \tilde{G}(\overline{e(X)}) \subseteq \overline{\tilde{G}(e(X))} \subseteq K$ (第8章 (5))。

一意性は、稠密集合上で一致する連続写像がハウスドルフな値域では全体で一致すること (第13章の演習) による。

(3)。普遍性をもつ二つのコンパクト化のあいだには、互いに逆な連続写像が誘導される。一意性より、それらの合成は恒等写像である。 $\square$

注意

(2) が「最大のコンパクト化」の意味である。どのコンパクト化 Y についても、 Y 自身がコンパクトハウスドルフだから、 $\beta X \rightarrow Y$ という潰す写像がある。第22章の★★で導入した順序で、 βX が最大元になる。

$\beta\mathbb{N}$ ——離散空間のコンパクト化

もっとも研究されているのが $\beta\mathbb{N}$ である。離散空間 $\mathbb{N}$ のコンパクト化だが、その構造は驚くほど複雑である。

定理23.3

$\beta\mathbb{N}$ は、 $\mathbb{N}$ 上の超フィルター全体の集合と自然に同一視できる。位相は、 $A \subseteq \mathbb{N}$ に対する

$$\hat{A} = \{\mathcal{U} \mid A \in \mathcal{U}\}$$

の全体を基底とする。各 $\hat{A}$ は開かつ閉である。

証明 骨子だけ述べる。 $n \in \mathbb{N}$ には主超フィルター (n を含む集合の全体) を対応させる。これが $\mathbb{N}$ の埋め込みを与える。

超フィルター全体がコンパクトハウスドルフになることは、第20章★★★のストーン双対性による。 $\hat{A}$ の補集合が $\widehat{\mathbb{N} \setminus A}$ であることは、超フィルターの性質 (命題12.6) から直ちに従う。したがって $\hat{A}$ は開かつ閉であり、空間は全不連結である。

普遍性の確認。有界連続 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (すなわち有界数列) に対し、 $\tilde{f}(\mathcal{U}) = \lim_{\mathcal{U}} f$ (超フィルターに沿った極限) と定めれば連続な拡張になる。有界数列は、どの超フィルターに沿っても極限をもつ。 $\square$

例23.4 $\beta\mathbb{N}$ の奇妙さ

濃度。 $|\beta\mathbb{N}| = 2^{2^{\aleph_0}}$ 。可算集合のコンパクト化が、実数全体よりはるかに大きい。

点列が収束しない。 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ のなかの点列で、収束するものは最終的に定数になるものに限る。コンパクトなのに点列コンパクトでない。

稠密だが小さい。 $\mathbb{N}$ は可算で稠密。したがって $\beta\mathbb{N}$ は可分である——濃度 $2^{2^{\aleph_0}}$ の可分空間。

主でない超フィルターは見えない。 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ の点は、選択公理なしには一つも存在を示せない（第12章★★★）。この空間の大部分は、構成的には手に入らない。

コンパクト化の順序— βX が最大



図23-1 コンパクト化には順序があり、一点コンパクト化が最小、ストーン-チェックが最大である。 $\beta\mathbb{N}$ は可算集合のコンパクト化でありながら、濃度も構造も極端に大きい。

★★ 学部後半 コンパクト化からもとの空間を復元できるか

βX は X の情報をどれだけ保っているのか。逆に、 βX から X を取り出せるのか。

関数環との対応。 $C^b(X)$ を X 上の有界連続実数値関数の全体とする。

定理23.2 (1) より、

$$C^b(X) \cong C(\beta X)$$

という対応がある。 βX は「 X 上の有界連続関数を作る代数」を空間として実現したものである。

したがって、 βX が決まれば $C^b(X)$ が決まる。逆に $C^b(X)$ から βX が復元できる——これが第79章のゲルファント理論の内容である。

X は復元できない。 $\beta X = \beta Y$ でも $X \neq Y$ でありうる。たとえば $X = \mathbb{N}$ と $Y = \mathbb{N} \cup \{p\}$ ($p \in \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を一つ足した部分空間) は、同じストーン-チェックのコンパクト化をもつ。

より一般に、 $X \subseteq Y \subseteq \beta X$ なる Y はすべて $\beta Y = \beta X$ を満たす。**したがって βX は X を決めない。**

復元できる場合、 X がコンパクトなら $\beta X = X$ である。コンパクト空間は自分自身のストーン-チェックのコンパクト化である。

これが第79章で効く。**コンパクトハウスドルフ空間 K は、関数環 $C(K)$ から完全に復元できる。**ゲルファント-ナイマルクの定理は、可換 C^* 環とコンパクトハウスドルフ空間が圏同値であることを述べる。

実用的な帰結。コンパクト化の理論は、次の形で解析学に入ってくる。

第59章のリースの表現定理—— $C(K)$ 上の正線形汎関数が K 上の測度で表せる。 K がコンパクトであることが本質的である。

第96章のストーン-ワイエルシュトラスの定理—— $C(K)$ の部分代数が稠密になる条件。ここでもコンパクト性が前提になる。

局所コンパクトな X については、 $C_0(X)$ (無限遠で消える連続関数) を使い、一点コンパクト化 X^* 経由で $C(X^*)$ の話に帰着させる。ストーン-チェックではなく一点コンパクト化を使うのは、そのほうが小さくて扱いやすいからである。

★★★ 大学院 $\beta\mathbb{N}$ の余部分——組合せ論と独立性

$\mathbb{N}^* = \beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を考える。この空間の構造には、集合論が深く入り込む。

P点は存在するか。 $\mathcal{U} \in \mathbb{N}^*$ がP点であるとは、可算個の近傍の交叉が再び近傍を含むことをいう。言い換えれば、 $\mathcal{U}$ の可算個の元 A_n に対し、 $A \setminus A_n$ が有限になる $A \in \mathcal{U}$ が存在する。

P点の存在は、集合論の公理系から証明も反証もできない。連続体仮説を仮定すれば存在する（ルドウイン）。一方、シェラー Shelah はP点が存在しないモデルを構成した。

第4章の★★★で述べた独立性が、ここでも具体的な空間の点の存在として現れている。

組合せ論への応用。 $\beta\mathbb{N}$ には半群の構造が入る。 $\mathbb{N}$ の加法を超フィルターへ延ばすと、

$$A \in \mathcal{U} + \mathcal{V} \iff \{n \mid \{m \mid n + m \in A\} \in \mathcal{V}\} \in \mathcal{U}$$

という演算が定まる。この演算は結合的で、片側からは連続である。

エリス Ellis の定理により、コンパクトな右位相半群には冪等元が存在する。 **$\mathcal{U} + \mathcal{U} = \mathcal{U}$ なる超フィルターが存在する。**

この事実から、ヒンドマン Hindman の定理が短く証明できる。自然数を有限個に色分けすると、ある色のなかに、無限集合のすべての有限和が含まれる。組合せ論の定理が、位相的な議論で出てくる。

ファン・デル・ヴェルデンの定理も同様。「自然数を有限個に色分けすると、ある色に任意の長さの等差数列が含まれる」という定理も、 $\beta\mathbb{N}$ の力学系を使って証明できる。

なぜこれが可能なのか。 $\beta\mathbb{N}$ はコンパクトである。**コンパクト性が「無限に続く選択」を一つの点として実体化する。**組合せ論で「うまい部分集合を取り続ける」という議論が、位相では「ある超フィルターを取る」という一行になる。

第20章の★★★で述べた論理のコンパクト性定理と、同じ構図である。有限的な情報の整合性が、無限の対象の存在を保証する。

本書の扱い。この方向には進まない。だが $\beta\mathbb{N}$ は、本書の後半で一度だけ顔を出す。第71章でバナッハ極限を扱うとき、「収束しない有界数列に極限を割り当てる」という操作が、超フィルターに沿った極限として実現される。ハーン-バナッハの定理（第67章）による構成と、 $\beta\mathbb{N}$ による構成は、同じものを別の言葉で述べている。

演習

基本

1. コンパクトハウスドルフ空間 K について $\beta K = K$ であることを示せ。
2. $\hat{A}$ が $\beta\mathbb{N}$ で開かつ閉であることを示せ。
3. $\beta\mathbb{N}$ が可分であることを述べよ。
4. 一点コンパクト化とストーン-チェックのコンパクト化が一致する空間の例を挙げよ。

証明

1. 定理23.2 (1) を、射影の制限が拡張を与えることを明示して示せ。(15点)
2. 定理23.2 (2) で $\tilde{G}(\beta X) \subseteq K$ を示す部分を、第8章の結果を引用しながら書き直せ。(25点)
3. $X \subseteq Y \subseteq \beta X$ なら $\beta Y = \beta X$ であることを示せ。(25点)

発展

1. 有界数列が超フィルターに沿って極限をもつことを示し、それが $\beta\mathbb{N}$ への拡張を与えることを説明せよ。(30点)
2. $\beta\mathbb{N}$ がコンパクトでありながら点列コンパクトでないことを示せ。(35点)

パラコンパクト性と1の分割

◆ この章の問い

- ・有限部分被覆が取れないとき、代わりに何が取ればよいのか。
- ・「局所有限」という条件は、なぜ有限性の代用になるのか。
- ・1の分割は、どんな問題を解くのか。

局所有限性——有限性の局所化

コンパクト性は有限部分被覆を要求した。それでは強すぎる。 $\mathbb{R}^n$ も多様体も、コンパクトとは限らない。

そこで要求を緩める。**全体として有限であることは諦め、各点のまわりで有限であることを求める。**

定義24.1 局所有限・細分

部分集合の族 $\mathcal{A}$ が局所有限であるとは、各点が近傍をもち、その近傍と交わる $\mathcal{A}$ の元が有限個であることをいう。

被覆 $\mathcal{B}$ が被覆 $\mathcal{A}$ の細分であるとは、 $\mathcal{B}$ の各元がある $\mathcal{A}$ の元に含まれることをいう。

定義24.2 パラコンパクト空間

ハウスドルフ空間 X がパラコンパクトであるとは、どの開被覆も局所有限な開細分をもつことをいう。

注意

「有限部分被覆」から「局所有限な開細分」へと、二か所が緩んでい
る。部分被覆でなく細分でよく、有限でなく局所有限でよい。**コンパクト
ならパラコンパクトである**——有限部分被覆は局所有限な細分だからであ
る。

例24.3 パラコンパクトな空間

距離空間はすべてパラコンパクト。スミルノフ Smirnov とストーン
Stone の定理。証明は込み入っており、選択公理を使う。この事実が第32
章の距離化定理の土台になる。

コンパクト空間。定義から直ちに。

局所コンパクトで σ -コンパクトな空間。 $\mathbb{R}^n$ や多様体がこれにあたる。
コンパクト集合の増大列で覆えることを使って、局所有限な細分を作る。

ゾルゲンフライ直線。パラコンパクトである。ところが**ゾルゲンフライ
平面 $\mathbb{R}_\ell^2$ はパラコンパクトでない**——第17章で正規でないことを見たが、
パラコンパクトなら正規なので（次の定理）、当然である。

パラコンパクト性は正規性を含む

定理24.4

パラコンパクト空間は正規である。

証明 まず正則性を示す。 $x \notin F$ 、 F 閉とする。各 $y \in F$ について、ハウ
スドルフ性より交わらない開集合 $U_y \ni x$ 、 $V_y \ni y$ を取る。
 $\{V_y\}_{y \in F} \cup \{X \setminus F\}$ は開被覆だから、局所有限な開細分 $\mathcal{W}$ がある。

$V = \bigcup \{W \in \mathcal{W} \mid W \cap F \neq \emptyset\}$ と置く。局所有限な族の合併の閉包
は、閉包の合併に等しい（次の補題）。したがって

$$\overline{V} = \bigcup \{\overline{W} \mid W \cap F \neq \emptyset\}$$

である。各 W はある V_y に含まれるので $\overline{W} \subseteq \overline{V_y} \subseteq X \setminus U_y$ 。 x の近傍で有限個の W としか交わらないものを取り、対応する U_y の有限交叉と合わせれば、 x の近傍で $\overline{V}$ と交わらないものが得られる。 **よって正則。**

正規性は、同じ議論で点 x を閉集合 A に置き換えれば得られる。正則性を使って各 $y \in B$ のまわりを取り、局所有限な細分で束ねる。 $\square$

補題24.5

$\mathcal{A}$ が局所有限なら $\overline{\bigcup \mathcal{A}} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$ 。

証明 $\supseteq$ は明らか。 $\subseteq$ を示す。 $x \in \overline{\bigcup \mathcal{A}}$ とし、 x の近傍 N で有限個の $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ としか交わらないものを取る。

もし $x \notin \overline{A_k}$ がすべての k で成り立つなら、 $N \cap \bigcap_k (X \setminus \overline{A_k})$ は x の近傍で $\bigcup \mathcal{A}$ と交わらない。有限個の交叉なので開である。これは $x \in \overline{\bigcup \mathcal{A}}$ に反する。 **局所有限性が、無限個の閉包の合併を閉にしている。** $\square$

注意

この補題が、局所有限性が「有限性の代用」として働く理由である。一般には無限個の閉集合の合併は閉でない（第6章）。 **局所有限なら閉である。** 各点のまわりで有限個しか効かないので、有限合併の議論がそのまま通る。

1の分割

定義24.6

開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ に従属する1の分割とは、連続関数の族 $\{\varphi_i: X \rightarrow [0, 1]\}$ で次を満たすものをいう。

- (1) $\text{supp } \varphi_i = \overline{\{x \mid \varphi_i(x) \neq 0\}} \subseteq U_i$ 。
- (2) $\{\text{supp } \varphi_i\}$ は局所有限。
- (3) 各点で $\sum_i \varphi_i(x) = 1$ (局所有限性より、各点で有限和)。

定理24.7

ハウスドルフ空間 X がパラコンパクトであることと、どの開被覆にも従属する1の分割が存在することは同値である。

証明 逆向き (1の分割から)。 $\{\varphi_i\}$ を取れば $\{\text{supp } \varphi_i\}$ の内部が局所有限な開細分を与える。

順向き。 $\{U_i\}$ を開被覆とする。パラコンパクト性と正規性 (定理24.4) から、被覆を二段階縮める。すなわち、局所有限な開被覆 $\{V_i\}$ 、 $\{W_i\}$ で $\overline{W_i} \subseteq V_i \subseteq \overline{V_i} \subseteq U_i$ となるものを作る。各段で正規性 (命題15.2) を使う。

ウリゾーンの補題 (定理15.3) より、 $\overline{W_i}$ で 1、 $X \setminus V_i$ で 0 となる連続 ψ_i が取れる。 $\{V_i\}$ が局所有限だから $\Psi = \sum_i \psi_i$ は局所有限和であり連続、かつ $\{W_i\}$ が被覆だから $\Psi > 0$ 。 $\varphi_i = \psi_i / \Psi$ と置けばよい。□

局所有限な細分と、1の分割




図24-1 局所有限な細分は無限個でよいが、各点のまわりでは有限個しか重ならない。1の分割は、この性質を使って局所的な構成を大域化する。

何が解けるようになるか

例24.8 1の分割の用途

リーマン計量の構成。多様体の各座標近傍で内積を定め、1の分割で足し合わせる。正定値性は凸結合で保たれるので、和も内積になる。**これが「どんな多様体にもリーマン計量が入る」という定理の証明である。**

積分の定義。多様体上の微分形式の積分は、座標近傍ごとの積分を1の分割で足し合わせて定義する。局所有限性が、和が有限であることを保証する。

偏微分方程式の局所解の貼り合わせ。第88章でソボレフ空間を扱うとき、局所的な評価から大域的な評価を得るのに使う。

ティーツェの拡張定理の別証明。第16章の定理は、1の分割を使っても証明できる。

★★ 学部後半 パラコンパクト性の同値な形

パラコンパクト性には、細分の種類を変えた同値な言い換えがいくつもある。どれを使うかで証明の見通しが変わる。

マイケルの定理。 正則空間 X について、次は同値である。

(1) パラコンパクト。 (2) どの開被覆も局所有有限な細分（開とは限らない）をもつ。 (3) どの開被覆も σ -離散な開細分をもつ。 (4) どの開被覆も σ -局所有有限な開細分をもつ。

ここで σ -局所有有限とは、局所有有限な族の可算合併であることをいう。

(4) が第32章のナガタースミルノフの距離化定理で使われる形である。

なぜ σ -局所有有限で足りるのか。可算個の局所有有限な族があれば、それらを「一段ずつ削る」ことで真に局所有有限な族が作れる。第16章★★★と第18章で使った対角線的な構成と同じ手法である。

$$W_{n,i} = V_{n,i} \setminus \bigcup_{m < n} \bigcup_i \overline{V_{m,i}}$$

可算性が、この削り方を可能にする。

被覆を縮める形。 もう一つの同値な形がある。 X がパラコンパクトであることと、どの開被覆 $\{U_i\}$ に対しても、 $\overline{V_i} \subseteq U_i$ なる局所有有限な開被覆 $\{V_i\}$ が存在することは同値である。

この形は、第15章の★★で述べた正規性の「被覆を縮める」形の無限版である。**正規性は有限被覆を縮め、パラコンパクト性は任意の被覆を縮める。**

階層のなかの位置。

$$\text{コンパクト} \implies \text{パラコンパクト} \implies \text{正規}$$

どちらの逆も成り立たない。 $\mathbb{R}$ はパラコンパクトだがコンパクトでない。第17章のチコノフ板 $[0, \omega_1] \times [0, \omega]$ は正規（コンパクトだから）だが、その部分空間 $[0, \omega_1)$ は正規でパラコンパクトでない。

$[0, \omega_1)$ がパラコンパクトでない理由は、共終数にある。 $\{[0, \alpha)\}_{\alpha < \omega_1}$ という被覆の局所有限な細分を取ろうとすると、**可算個の条件では ω_1 に届かない**という第4章の事実突き当たる。

★★★ 大学院 パラコンパクト性は積で壊れる——ドウカー空間再訪

第19章の表を、パラコンパクト性について埋める。結果は正規性とほぼ同じで、良くない。

遺伝しない。開部分空間には遺伝するが、一般の部分空間には遺伝しない。閉部分空間には遺伝する。

積で壊れる。 $\mathbb{R}_\ell$ はパラコンパクトだが $\mathbb{R}_\ell^2$ はそうでない。**積で保たれる被覆性質は、実質的にコンパクト性だけである。**

コンパクト空間との積。ただし一つ救いがある。パラコンパクト空間とコンパクト空間の積はパラコンパクトである。証明は、コンパクトな成分を有限個で覆えることを使う「チューブ補題」による。

可算パラコンパクト性。可算な開被覆に限って局所有限な細分を要求する条件を、可算パラコンパクト性という。パラコンパクトより真に弱い。

第17章の★★★で触れたドウカー空間は、**正規だが可算パラコンパクトでない空間**である。ドウカーの定理により、これは $X \times [0, 1]$ が正規でないことと同値である。

なぜ $[0, 1]$ との積が関わるのか。証明の筋を述べる。 X が正規で可算パラコンパクトなら、可算開被覆 $\{U_n\}$ を縮めて $\overline{V_n} \subseteq U_n$ とし、1の分割を作る。その関数を使って $X \times [0, 1]$ のなかの閉集合を分離できる。

逆に、可算パラコンパクトでなければ、縮められない可算被覆があり、それを使って $X \times [0, 1]$ のなかに分離できない閉集合の対が作れる。**積の第二成分 $[0, 1]$ が、可算な「目盛り」の役割を果たしている。**

ルドゥインの構成。一九七一年に構成された最初のドウカー空間は、 $\aleph_\omega$ のまわりの順序数を使う。共終数 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ という性質が本質的であ

る。可算個で届いてしまうのに、各段では届かない——この微妙な状況が、正規性と可算パラコンパクト性を分ける。

第4章で共終数を導入したとき、それが位相空間の性質として現れると予告した。チコノフ板 ($\text{cf}(\omega_1) > \omega$ を使う) とドウカー空間 ($\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ を使う) は、その二つの現れ方である。

本書の扱い。可算パラコンパクト性は第25章で改めて扱う。そこではリンドレーフ性や可算コンパクト性との関係を整理する。第26章で被覆性質の相互関係を一覧にし、どの含意が成り立ちどの反例があるかを確定させる。

演習

基本

1. コンパクト空間がパラコンパクトであることを示せ。
2. 離散空間がパラコンパクトであることを示せ。
3. $\mathbb{R}$ の開被覆 $\{(n-1, n+1)\}$ が局所有限であることを確かめよ。
4. 局所有限な族の部分族が局所有限であることを示せ。

証明

1. 補題24.5 を証明し、これが局所有限性の要点であることを説明せよ。
(20点)
2. 定理24.4 の正則性の部分を、補題をどこで使うか明示して書き直せ。
(25点)
3. 定理24.7 の順向きを、被覆を二段階縮める部分を明示して示せ。(30点)

発展

1. $[0, \omega_1)$ が正規だがパラコンパクトでないことを示せ。共終数をどこで使うか明示すること。(35点)
2. σ -局所有限な開細分から局所有限な開細分が作れることを、対角線的な構成で示せ。(30点)

Lindelöf・可算コンパクト・点列コンパクト

◆ この章の問い

- ・「有限」を「可算」に置き換えると、何が変わるのか。
- ・点列コンパクトとコンパクトは、なぜ一致しないのか。
- ・距離空間では、これらがすべて一致するのはなぜか。

三つの弱いコンパクト性

定義25.1

位相空間 X について、

リンデレーフ どの開被覆も可算部分被覆をもつ。

可算コンパクト どの可算開被覆も有限部分被覆をもつ。

点列コンパクト どの点列も収束する部分列をもつ。

擬コンパクト どの連続実数値関数も有界。

コンパクト性の定義には二つの「有限」が現れていた。「どの開被覆も」の部分と「有限部分被覆」の部分である。**前者を可算に制限したのが可算コンパクト性、後者を可算に緩めたのがリンデレーフ性である。**

命題25.2

X がコンパクトであることと、リンデレーフかつ可算コンパクトであることは同値である。

証明 コンパクトなら両方は明らか。逆に、開被覆 $\mathcal{U}$ を取る。リンデレーフ性より可算部分被覆 $\{U_n\}$ があり、可算コンパクト性よりその有限部分被

覆がある。二つの条件が、ちょうど補い合って完全なコンパクト性を作る。 $\square$

含意の関係

定理25.3

- (1) コンパクト $\Rightarrow$ 可算コンパクト $\Rightarrow$ 擬コンパクト。
- (2) 点列コンパクト $\Rightarrow$ 可算コンパクト。
- (3) 第一可算かつ可算コンパクト $\Rightarrow$ 点列コンパクト。
- (4) 第二可算 $\Rightarrow$ リンデレーフ。
- (5) 正則かつリンデレーフ $\Rightarrow$ パラコンパクト、したがって正規。

証明 (1) の後半。 f が非有界なら $U_n = f^{-1}((-n, n))$ は可算開被覆で有限部分被覆をもたない。

(2) 可算開被覆 $\{U_n\}$ が有限部分被覆をもたないとする。各 n について $x_n \notin U_1 \cup \dots \cup U_n$ を選ぶ。点列コンパクト性より収束部分列 $x_{n_k} \rightarrow x$ がある。 $x \in U_m$ なる m を取ると、 $n_k \geq m$ なる k について $x_{n_k} \notin U_m$ となり、収束に反する。

(3) 点列 (x_n) を取る。 $A_n = \{x_k \mid k \geq n\}$ とすると、 $\{\overline{A_n}\}$ は有限交叉性をもつ閉集合の族である。可算コンパクト性より $x \in \bigcap_n \overline{A_n}$ がある。
 第一可算性より x の可算減少近傍基 $\{V_m\}$ を取り、各 V_m から A_m の点を選べば部分列になる。

(4) 可算基底 $\mathcal{B}$ を取る。開被覆 $\mathcal{U}$ に対し、 $B \subseteq U$ なる $U \in \mathcal{U}$ が存在する $B \in \mathcal{B}$ を集める。それらは可算で、各 B に一つずつ U を選べば可算部分被覆になる。

(5) は証明を省く。第24章のマイケルの定理の系である。 $\square$

反例25.4 逆が成り立たない例

可算コンパクトだがコンパクトでない。 $[0, \omega_1)$ 。可算個の $[0, \alpha_n)$ の合併は $[0, \sup \alpha_n)$ で、 $\sup \alpha_n < \omega_1$ だから被覆にならない——すなわち可算開被覆は必ず有限で足りる。一方 $\{[0, \alpha)\}_{\alpha < \omega_1}$ は有限部分被覆をもたない。リンデレーフでない。

コンパクトだが点列コンパクトでない。 $\{0, 1\}^I$ (I の濃度 $2^{\aleph_0}$ より大)。第12章の議論による。また $\beta\mathbb{N}$ もそうである (第23章)。

点列コンパクトだがコンパクトでない。 $[0, \omega_1)$ 。可算な部分集合は有界なので、どの点列も収束部分列をもつ。

擬コンパクトだが可算コンパクトでない。構成は込み入るが存在する。完全正則な空間では擬コンパクトと可算コンパクトが一致するので、そうでない空間を作る必要がある。

リンデレーフだが第二可算でない。ゾルゲンフライ直線。第7章で第二可算でないことを見た。リンデレーフであることは、被覆から可算個を選ぶ議論で示せる。

弱いコンパクト性の関係——距離空間ではすべて一致する




図25-1 コンパクト性の定義に現れる二つの「有限」を、それぞれ可算に置き換えると二つの弱い条件が得られる。一般には互いに独立だが、距離空間ではすべて一致する。

距離空間ではすべて一致する

定理25.5

距離空間 X について、次は同値である。(1) コンパクト。(2) 可算コンパクト。(3) 点列コンパクト。(4) 全有界かつ完備。

証明 詳細は第29章で扱う。骨子だけ述べる。距離空間は第一可算だから、定理25.3 (2) (3) により (2) と (3) は同値である。

(3) から (1) を示すのが要点である。点列コンパクトな距離空間は全有界である——そうでなければ、互いに ε 以上離れた点列が作れ、収束部分列をもたない。全有界性から可分性が従い、可分な距離空間は第二可算 (第7章)、したがってリンデレーフ (定理25.3 (4))。リンデレーフかつ可算コンパクトならコンパクトである (命題25.2)。□

注意

証明の鍵は「点列コンパクト $\Rightarrow$ 可分 $\Rightarrow$ 第二可算 $\Rightarrow$ リンデレーフ」という経路である。距離があることで、局所的な可算性が大域的な可算性に持ち上がる (第7章)。この持ち上げが、可算と有限の差を消している。

★★ 学部後半 擬コンパクト性——関数の側から見る

擬コンパクト性は、開被覆ではなく連続関数で定義された。この違いが何を意味するかを見ておく。

完全正則なら可算コンパクトと一致する。完全正則空間 X が擬コンパクトなら可算コンパクトである。

証明。可算開被覆 $\{U_n\}$ (増加としてよい) が有限部分被覆をもたないとする。各 n について $x_n \notin U_n$ を選ぶ。完全正則性より、 x_n で n をとり $X \setminus U_{n+1}$ の外で急速に消える関数 f_n が作れる。和 $f = \sum_n f_n$ が局

所有有限和になるよう調整すると、連続で非有界な関数が得られる。**擬コンパクト性に反する。**

完全正則でなければ一致しない。関数が足りない空間では、擬コンパクト性は何も言わない。極端な例として、第14章★★★のヘヴィットの空間——連続関数が定数しかない正則空間——は自動的に擬コンパクトである。可算コンパクトである必要はない。

解析学での意味。擬コンパクト性は「有界性が自動的に成り立つ」条件である。第20章で見たとおり、コンパクト空間上の連続関数は最大値を取った。擬コンパクト性は、最大値までは保証しないが有界性は保証する。

第VIII部で関数空間を扱うとき、 $C(X)$ が有界関数の空間になる条件として、この概念が背後にある。 $C(X) = C^b(X)$ であることが、まさに擬コンパクト性である。

第23章との接続。第23章で $C^b(X) \cong C(\beta X)$ を見た。 X が擬コンパクトなら $C(X) = C^b(X) \cong C(\beta X)$ である。

したがって擬コンパクトな空間は、関数の側から見ると βX と区別がつかない。「有界でない関数が作れない」ということは、「コンパクト化しても関数が増えない」ということである。

まとめ。四つの弱いコンパクト性のうち、リンデレーフ性だけが被覆の側を緩め、他の三つは有限性の側を緩めている。この非対称が、命題25.2の分解に現れている。

★★★ 大学院 $[0, \omega_1)$ という空間を読む

反例25.4 で三度登場した $[0, \omega_1)$ を、正面から調べる。この空間は、位相空間論のあらゆる反例に顔を出す。

基本的な性質。順序位相を入れる。基本開集合は (α, β) の形である。 $[0, \omega_1)$ は

局所コンパクト——各 α の近傍 $[0, \alpha]$ はコンパクト。

可算コンパクト——可算個の順序数の上限は ω_1 未満 ($\text{cf}(\omega_1) > \omega$)。

点列コンパクト——同じ理由。可算な点列は有界。

正規——順序位相をもつ全順序集合は正規 (第15章)。

第一可算——後続順序数は孤立点、極限順序数 λ には $\text{cf}(\lambda) = \omega$ より可算な近傍基がある。

しかし、コンパクトでなく、リンデレーフでなく、パラコンパクトでなく、可分でなく、第二可算でない。

閉非有界集合。この空間を理解する鍵は、閉非有界集合 (クラブ集合) という概念である。 $C \subseteq \omega_1$ がクラブとは、閉であって非有界であることをいう。

二つのクラブの交叉はクラブである。さらに、可算個のクラブの交叉もクラブである。この性質が、 $[0, \omega_1)$ の連続関数の振る舞いを決める。

連続関数は最終的に定数。驚くべき事実がある。連続関数

$f: [0, \omega_1) \rightarrow \mathbb{R}$ は、ある $\alpha < \omega_1$ より先で定数になる。

証明の筋。各 n について、 $|f(\beta) - f(\gamma)| < 1/n$ がすべての $\beta, \gamma \geq \alpha_n$ で成り立つような α_n が取れることを示す。そうでなければ、 $1/n$ 以上離れた値をとる増加列が作れ、その上限で連続性が壊れる。

$\alpha = \sup_n \alpha_n < \omega_1$ と置けばよい。

したがって $[0, \omega_1)$ は擬コンパクトであり、 $\beta([0, \omega_1)) = [0, \omega_1]$ である——一点コンパクト化とストーン-チェックのコンパクト化が一致する珍しい例である。

プレッシング・ダウン補題。より強い道具がある。 f が退行的 ($f(\alpha) < \alpha$) なら、 f はある定常集合の上で定数である。フォドア Fodor の補題という。

これは第36章のスーリン問題や、第V部の基数不変量の議論で使われる。 ω_1 の組合せ論が、位相空間の性質を決めている。

なぜこの空間が重要か。 $[0, \omega_1)$ は、「可算では届かないが、それより上はない」という最小の非可算性を体現している。第4章で共終数を導入した目的が、ここに集約される。

本書の後半では、この空間は表に出てこない。解析学は可算な操作で閉じているからである。だが第36章と第42章では、非可算性が本質的に効く場面が現れる。そこでこの空間に戻る。

演習

基本

1. 第二可算空間がリンデレーフであることを示せ。
2. $\mathbb{R}$ がリンデレーフだが可算コンパクトでないことを示せ。
3. 離散空間が可算コンパクトになるのはどんなときか。
4. コンパクト空間が擬コンパクトであることを示せ。

証明

1. 命題25.2 を示せ。(10点)
2. 定理25.3 (3) を、第一可算性をどこで使うか明示して示せ。(20点)
3. $[0, \omega_1)$ が可算コンパクトでリンデレーフでないことを示せ。(25点)

発展

1. 点列コンパクトな距離空間が全有界であることを示し、そこから定理25.5 の経路を完成させよ。(35点)
2. $[0, \omega_1)$ 上の連続実数値関数が最終的に定数になることを示せ。(35点)

被覆性質の相互関係と反例

◆ この章の問い

- ・被覆性質の全体は、どんな図になるのか。
- ・どの含意が成り立ち、どの逆が破れるのか。
- ・反例に使われる空間は、なぜ順序数ばかりなのか。

図を描く

第20章から第25章で導入した条件を並べる。第II部の分離公理と同じく、階層と反例を確定させるのがこの章の仕事である。

定理26.1 被覆性質の含意

ハウスドルフ空間について、次の含意が成り立つ（すべて逆は偽）。

$$\begin{aligned}
 &\text{コンパクト} \implies \text{パラコンパクト} \implies \text{正規} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{リンデレーフ} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{可算コンパクト} \implies \text{擬コンパクト} \\
 &\text{点列コンパクト} \implies \text{可算コンパクト} \\
 &\text{コンパクト} \implies \text{局所コンパクト} \\
 &\text{第二可算} \implies \text{リンデレーフ} \\
 &\text{正則} + \text{リンデレーフ} \implies \text{パラコンパクト} \\
 &\text{リンデレーフ} + \text{可算コンパクト} \iff \text{コンパクト}
 \end{aligned}$$

注意

パラコンパクト性とリンデレーフ性は、どちらもコンパクト性の弱化だが互いに独立である。離散な非可算集合はパラコンパクトだがリンデレー

フでない。一方、正則なリンデレーフ空間はパラコンパクトなので、正則性を仮定すれば一方向の含意が入る。

反例の一覧

反例26.2 八つの反例

(1) $\mathbb{R}$ 。パラコンパクト・リンデレーフ・局所コンパクトだがコンパクトでない。可算コンパクトでも点列コンパクトでもない。

(2) 非可算離散空間 D 。パラコンパクト・局所コンパクトだがリンデレーフでない。可算コンパクトでもない。パラコンパクトとリンデレーフが独立であることを示す。

(3) $[0, \omega_1)$ 。可算コンパクト・点列コンパクト・正規・局所コンパクト・第一可算だが、コンパクトでもリンデレーフでもパラコンパクトでも可分でもない（第25章★★★）。

(4) $\{0, 1\}^I$ ($|I| > 2^{\aleph_0}$)。コンパクトだが点列コンパクトでない。第一可算でない。

(5) ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。リンデレーフ・パラコンパクト・完全正規・第一可算・可分だが、第二可算でも局所コンパクトでも距離化可能でもない。

(6) ゾルゲンフライ平面 $\mathbb{R}_\ell^2$ 。可分・完全正則だが、正規でもパラコンパクトでもリンデレーフでもない。リンデレーフ性が有限積で壊れる例である。

(7) チコノフ板 T_∞ （第17章）。局所コンパクト・チコノフだが正規でない。したがってパラコンパクトでもない。

(8) $\mathbb{Q}$ 。第二可算・リンデレーフ・パラコンパクト・距離化可能だが、局所コンパクトでない。

被覆性質の全体図——矢印はすべて一方向




図26-1 被覆性質の全体図。パラコンパクト性とリンデレーフ性は互いに独立で、正則性を仮定すると一方向の含意が入る。順序数の空間が多くの段を分ける。

なぜ順序数ばかりなのか

反例の多くが順序数の空間である。これは偶然ではない。

被覆性質は「**どれだけの個数で覆えるか**」を問う条件である。そして順序数は、「個数」を測るためにこそ作られた対象である（第4章）。したがって、被覆の個数に関する反例を作るには順序数がもっとも直接的な道具になる。

具体的には、三つの性質が使われる。

第一に、共終数の非対称。 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ なので、可算個の条件では ω_1 に届かない。これが $[0, \omega_1)$ が可算コンパクトである理由である。

第二に、順序位相の局所構造。後続順序数は孤立点、極限順序数には共終数と同じ長さの近傍基がある。**局所的な性質を細かく制御できる。**

第三に、整列性。超限帰納法で構成ができる。「各段で条件を満たすものを選び、極限で集める」という議論が、順序数の上では自然に書ける。

注意

順序数以外の反例は、ゾルゲンフライ直線とその積、そして立方体 $\{0,1\}^I$ である。前者は「半開区間」という向きの非対称、後者は積位相の「有限個を除いて全体」という形を使う。三種類の仕掛けで、被覆性質の階層のほとんどが分けられる。

★★ 学部後半 操作に対する保存——第19章の表を埋める

第19章で分離公理と可算公理について作った表に、被覆性質を加える。

	部分	積	商	連続像
コンパクト	閉のみ	○	○	○
パラコンパクト	閉のみ	×	×	×
リンデレーフ	閉のみ	×	○	○
可算コンパクト	閉のみ	×	○	○
点列コンパクト	閉のみ	可算積	○	○
局所コンパクト	開と閉	有限積	×	×

読めること。第一に、被覆性質はどれも閉部分空間に遺伝し、一般の部分空間には遺伝しない。大域的な条件の典型的な振る舞いである。

第二に、ほとんどが連続像と商で保たれる。これは分離公理と正反対である（第19章）。理由は明快で、被覆の逆像が被覆になるからである。

第三に、積で保たれるのはコンパクト性だけである。点列コンパクト性が可算積で保たれるのは、対角線論法で部分列を取れるからである。

局所コンパクト性の特異さ。この条件だけは開部分空間にも遺伝する。局所的な条件だからである。一方、商では壊れる——潰すと局所構造が変わる。

リンデレーフ性が積で壊れる理由。ゾルゲンフライ平面が反例だった。 $\mathbb{R}_\ell$ はリンデレーフだが、平面では反対角線 L が非可算離散閉集合になる。閉部分空間に遺伝するので、非可算離散空間がリンデレーフでないことから結論が出る。

実用上の指針。第19章の★★で述べた基準が、ここでも当てはまる。操作を繰り返す証明ではコンパクト性を、一度使うだけならパラコンパクト性やリンデレーフ性を使う。

第32章の距離化定理でパラコンパクト性が主役になるのは、そこでは積を取らないからである。被覆を細分する操作を一度行うだけなので、積で壊れることが問題にならない。

★★★ 大学院 被覆性質を基数で測る——第V部への橋

被覆性質は「はい／いいえ」の条件だった。第7章の★★で可算公理を基数化したのと同じことを、被覆性質についても行える。

リンデレーフ数。 X のリンデレーフ数 $L(X)$ とは、どの開被覆も濃度 $L(X)$ 以下の部分被覆をもつような最小の基数をいう。

$L(X) = \aleph_0$ がリンデレーフ性、 $L(X) = 1$ (有限) がコンパクト性にあたる。**一つの基数不変量が、二つの条件を統一する。**

拡張。 κ -コンパクト性 (どの開被覆も濃度 κ 未満の部分被覆をもつ)、 κ -パラコンパクト性 (濃度 κ 未満の被覆が局所有限な細分をもつ) などが定義できる。

これらのあいだの関係を調べるのが、第V部の仕事である。

不等式の網。基数不変量のあいだには、いくつもの不等式が成り立つ。例として、

$$L(X) \leq d(X) \cdot \chi(X), \quad |X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$$

後者はアルハンゲリスキー Arhangel'skii の不等式である。**リンデレーフかつ第一可算なハウスドルフ空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である。**

この定理は、被覆性質と局所的な性質から空間全体の大きさが制限されることを示す。抽象的な条件が、具体的な濃度の上限を与える。

独立な命題。この方向の問いには、公理系から決まらないものが多い。

たとえば、

「リンデレーフな T_3 空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下か」——第一可算性を外すと、答えは公理に依存する。

「リンデレーフ空間の積がリンデレーフになるのはいつか」——ここにも独立性が現れる。

第V部への見通し。第35章で weight、density、character、cellularity を導入し、第36章でスーリン問題を通して独立性を扱い、第37章で積の基数不変量を調べる。

その後、第38章から第42章で次元論に移る。次元も一種の基数不変量である——ただし値が自然数（または ∞ ）に限られる。「**大きさ**」を測るのが基数不変量、「**太さ**」を測るのが次元である。

第III部で被覆性質を丁寧に扱ったのは、第V部の準備でもある。次元の定義（第40章の被覆次元 $\dim$ ）は、被覆の重なり方を数えることで与えられる。局所有限性と細分という概念が、そこで再び中心に来る。

演習

基本

1. 非可算離散空間がパラコンパクトでリンデレーフでないことを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ が距離化可能で局所コンパクトでないことを示せ。
3. コンパクト性が連続像で保たれることを示せ。
4. リンデレーフ性が閉部分空間に遺伝することを示せ。

証明

1. リンデレーフ性が連続像で保たれることを示せ。(15点)
2. ゴルゲンフライ平面がリンデレーフでないことを、反対角線を用いて示せ。(25点)
3. 点列コンパクト性が可算積で保たれることを、対角線論法で示せ。(30点)

発展

1. 反例26.2 の八つの空間について、六つの被覆性質の成否を表にまとめ、各段の分離を確認せよ。(35点)
2. アルハンゲリスキーの不等式 $|X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$ の主張を述べ、リンデレーフかつ第一可算な場合に何が得られるかを説明せよ。(30点)

Baireのカテゴリー定理

◆ この章の問い

- ・「ほとんどすべての点」という言い方に、測度を使わずに意味を与えられるか。
- ・可算個の疎集合で空間を覆えないのは、なぜか。
- ・この定理は、解析学のどこで使われるのか。

第一類集合と第二類集合

第6章で「疎」という概念を導入した。 A が疎とは $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ となることである。疎集合は「どこにも隙間なく詰まっていない」集合である。

定義27.1

$A \subseteq X$ が第一類（やせた集合）であるとは、可算個の疎集合の合併として書けることをいう。第一類でない集合を第二類という。

A の補集合が第一類であるとき、 A は余やせであるという。

注意

「小さい」という語には二種類ある。測度が零であることと、第一類であることは別の概念である。**どちらでもあるもの、一方だけのものが存在する。**第53章で、測度零だが第二類である集合、第一類だが測度が正である集合を構成する。

ベールのカテゴリー定理

定義27.2

位相空間 X がベール空間であるとは、可算個の稠密開集合の交叉がつねに稠密であることをいう。同値な言い方として、空でない開集合が第一類でないことをいう。

定理27.3 ベールのカテゴリー定理

- (1) 完備距離空間はベール空間である。
- (2) 局所コンパクトハウスドルフ空間はベール空間である。

証明 (1)。 $\{U_n\}$ を稠密開集合の列とし、 W を任意の空でない開集合とする。 $W \cap \bigcap_n U_n \neq \emptyset$ を示す。

U_1 が稠密開だから $W \cap U_1$ は空でない開集合であり、閉球 $\overline{B}(x_1, r_1) \subseteq W \cap U_1$ ($r_1 < 1$) が取れる。次に $B(x_1, r_1) \cap U_2$ のなかに $\overline{B}(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$, $r_2 < 1/2$ を取る。以下、帰納的に

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq B(x_n, r_n) \cap U_{n+1}, \quad r_{n+1} < 2^{-n}$$

と選ぶ。ここで各段の選択を可算回行う——**従属選択公理**を使う。

(x_n) はコーシー列である ($m, n \geq N$ で $d(x_m, x_n) < 2r_N \rightarrow 0$)。完備性より $x_n \rightarrow x$ がある。各 N について $n \geq N$ の項がすべて $\overline{B}(x_N, r_N)$ に入るので、 $x \in \overline{B}(x_N, r_N)$ 。よって $x \in W$ かつ $x \in U_N$ がすべての N で成り立つ。


(2)。同じ構成を、閉球のかわりに閉包がコンパクトな開集合で行う

(第22章の **定理22.6** (3))。列 $\overline{V_1} \supseteq \overline{V_2} \supseteq \cdots$ は減少するコンパクト集合の列だから、**有限交叉性より交叉が空でない** (**定理20.3** (2))。完備性の代わりにコンパクト性が働く。□

注意

二つの証明は同じ形をしている。入れ子の列を作り、その交叉が空でないことを使う。完備性とコンパクト性は、この一点で同じ役割を果たしている。第29章で「完備かつ全有界＝コンパクト」を見るが、両者の共通部分がここに現れている。

入れ子の球を作り、交叉が空でないことを使う



各段の作り方

U_n が稠密開 → 前段の球と交わる
 交わりは空でない開集合
 → そこに半径 2^{-n} 未満の開球を取る

完備なら中心列がコーシー列 → 極限が交叉に入る
 局所コンパクトなら減少コンパクト列 → 交叉が空でない
 可算回の選択（従属選択公理）を使う

この定理から出る四つの定理

一様有界性の原理（第68章）
 開写像定理（第69章）
 閉グラフ定理（第69章）
 連続でない点が稠密な関数の存在
 関数解析の基本定理の三つが、位相の一つの定理から出る

二つの「小さい」は別物

第一類 可算個の疎集合の合併
 測度零 ルベーグ測度が0

どちらでもある集合、一方だけの集合が
 どちらも存在する（第53章）

$\mathbb{R}$ を第一類集合と測度零集合の二つに分割できる

図27-1 稠密開集合の列に沿って入れ子の球を作る。完備性がコンパクト性が、交叉が空でないことを保証する。第一類であることと測度が零であることは別の概念である。

応用

例27.4 四つの帰結

(1) $\mathbb{R}$ は可算個の疎集合では覆えない。とくに $\mathbb{R}$ は可算でない——一点集合は疎だから。カントールの対角線論法とは別の、非可算性の証明である。

(2) $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ のなかで G_δ でない。 $\mathbb{Q} = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) なら、各 U_n は $\mathbb{Q}$ を含むので稠密。バールの定理より $\bigcap_n U_n$ は稠密。ところが $\mathbb{Q}$ の補集合も稠密なので、 $\mathbb{Q}$ は開集合を含まない。矛盾するには $\mathbb{Q}$ と無理数

の両方が G_δ だと仮定すればよい——両方の交叉が空なのに、両方稠密な G_δ になってしまう。

(3) 至るところ微分可能でない連続関数は「ほとんどすべて」。

$C([0, 1])$ (一様ノルム) のなかで、ある点で微分可能な関数の全体は第一類である。したがって余やせな集合の関数は、どこでも微分可能でない。

ワイエルシュトラスが一つ構成した例外的な関数が、実は典型だった。

(4) 関数解析の基本定理。第68章の一様有界性の原理、第69章の開写像定理と閉グラフ定理は、いずれもベールの定理から導かれる。

命題27.5

ベール空間の稠密開部分空間、および G_δ 部分空間はベール空間である。

証明 $Y \subseteq X$ を稠密開とし、 $\{V_n\}$ を Y の稠密開集合の列とする。各 V_n は X でも開であり (第9章)、 Y が稠密だから X でも稠密である。したがって X のベール性より $\bigcap_n V_n$ は X で稠密、よって Y でも稠密。 G_δ の場合も同様の議論を可算回行う。 $\square$

★★ 学部後半 従属選択公理との同値性

定理27.3 (1) の証明で、可算回の選択を行った。これは避けられるのか。

答えは否である。完備距離空間に対するベールのカテゴリー定理は、従属選択公理と同値である。

なぜ従属選択が要るのか。各段で x_{n+1} を選ぶとき、その選択は x_n に依存する。可算選択公理では「あらかじめ与えられた族から一つずつ選ぶ」ことしかできない。第3章の★★★で述べた区別が、ここで効いている。

逆向きの証明。関係 R について、どの x にも xRy なる y があるとす
る。 $x_0Rx_1R\cdots$ という列を作りたい。

集合 X の上に、有限列の全体を考える。「 R に沿った有限列」全体に
適当な距離を入れると完備距離空間になり、ベールの定理を適用すること
で無限列の存在が出る。**空間の完備性が、列を「最後まで」延ばすことを
可能にする。**

局所コンパクト版はどうか。定理27.3 (2) の証明では、減少コンパクト
列の交叉を使った。これも可算回の選択を要する。したがって局所コンパ
クト版も従属選択公理を必要とする。

ただし、コンパクトハウスドルフ空間に限れば事情が変わる。そこでは
超フィルター補題で足りる場合がある——選択の仕方によるが、より弱い
公理で済むことが知られている。

第3章の階層に位置づける。

選択公理	チコノフの定理 (第21章)
超フィルター補題	ハウスドルフ版チコノフ、ハーン-バナッハ
従属選択公理	ベールのカテゴリー定理
可算選択公理	可算和の可算性

ベールの定理は、階層のなかで中くらいの強さに位置する。それでい
て、第IX部の関数解析の基本定理三つを支えている。

何が読み取れるか。関数解析の基本定理が「構成的でない」ことが、こ
れで正確に述べられる。一様有界性の原理は、有界性を保証するが、境界
の値を与えない。開写像定理も同様である。第69章でこの点に触れる。

★★★ 大学院 二つの「小さい」——測度とカテゴリー

定義27.1 の注意で述べたことを、正面から扱う。第一類であることと測
度が零であることは、どう違うのか。

共通点。どちらも「小さい」という直観に合う性質をもつ。可算合併で閉じ、部分集合に受け継がれ、全体は小さくない（ベールの定理／測度の正値性）。**両者は σ -イデアルをなす。**

相違点。どちらでもない集合の例。カントール集合は第一類で測度零である。一方、

測度零だが第二類な集合が存在する。 $\mathbb{R}$ の稠密な G_δ 集合で測度零のものが作れる——各 n で有理数のまわりに幅 2^{-n} の区間を取り、その合併の補集合を考える（測度は正だがこれを補正する）。

第一類だが測度が正の集合も存在する。 $[0, 1]$ のなかで、疎な閉集合の可算合併として測度 1 のものが作れる。**各段で「太い」カントール型の集合を取り、合併すればよい。**

実数直線の分割。 もっと劇的な事実がある。

$$\mathbb{R} = A \cup B, \quad A \text{ は第一類}, \quad B \text{ は測度零}$$

という分割が存在する。したがって「小さい」の二つの意味は、まったく両立しない。 $\mathbb{R}$ 全体を、一方の意味で小さい集合と、他方の意味で小さい集合の二つに分けられる。

双対性。 二つの概念のあいだには形式的な双対性がある。エルデシュ・シェルピンスキ Erdős-Sierpiński の双対定理により、連続体仮説のもとでは、測度零イデアルと第一類イデアルを交換する $\mathbb{R}$ の全単射が存在する。

両者は構造として同型でありながら、具体的な集合としてはまったく違うものを小さいと呼んでいる。

基数不変量。 この二つの σ -イデアルに対して、いくつかの基数不変量が定義される。 $\mathbb{R}$ を覆うのに必要な小さい集合の最小個数 (covering number)、小さくない集合を作るのに必要な最小個数 (additivity) など。

これらのあいだの不等式は、シハリ図式 Cichoń's diagram として整理されている。図式に現れる不等式の多くは証明できるが、**いくつかは公理系から独立である。**

本書での扱い。第53章で、測度零と第一類の具体的な違いを構成で示す。第55章で「ほとんどすべての点で」という語を測度の意味で定義するが、そのとき「カテゴリーの意味でのほとんどすべて」とは別であることを明記する。

第VII部の測度論と、この第III部のベールの定理は、同じ直観を別の言葉で定式化したものである。どちらが「正しい」かではなく、どちらの言葉で何が言えるかという問題になる。第97章でこの対比を地図に載せる。

演習

基本

1. 一点集合が $\mathbb{R}$ で疎であることを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ が $\mathbb{R}$ で第一類であることを示せ。
3. $\mathbb{Q}$ (部分空間として) がベール空間でないことを示せ。
4. カントール集合が第一類で測度零であることを述べよ。

証明

1. 定理27.3 (1) の証明で、 $x \in \overline{B}(x_N, r_N)$ となる理由を丁寧に述べよ。
(20点)
2. 定理27.3 (2) を、局所コンパクト性をどこで使うか明示して書き直せ。
(20点)
3. 命題27.5 の G_δ の場合を示せ。
(25点)

発展

1. $C([0, 1])$ のなかで、ある点で微分可能な関数の全体が第一類であることを示せ。
(40点)
2. $\mathbb{R}$ が第一類集合と測度零集合の合併として書けることを示せ。
(35点)

第Ⅳ部

連結性・距離空間・距離化

位相

距離から位相へ抽象化したあと、逆の問いを立てる。どんな位相空間が距離から来るのか。Urysohn・Nagata-Smirnov・Bing という三つの距離化定理が、その答えを与える。

連結性・弧状連結・成分

◆ この章の問い

- ・「つながっている」を、開集合だけでどう言うのか。
- ・道でつなげることと、切り離せないことは同じか。
- ・連結成分は開集合か。

切り離せないこと

直観的には、 $[0, 1]$ はつながっていて、 $[0, 1] \cup [2, 3]$ は二つに分かれている。この違いを開集合の言葉で述べたい。

後者では、 $[0, 1]$ と $[2, 3]$ がそれぞれ全体のなかで開かつ閉である。前者では、開かつ閉な部分集合は $\emptyset$ と全体しかない。これを定義に採る。

定義28.1 連結空間

位相空間 X が連結であるとは、 X を二つの空でない交わらない開集合の合併として書けないことをいう。同値な言い方として、開かつ閉な部分集合が $\emptyset$ と X に限ることをいう。

命題28.2

X が連結であることと、 X から二点離散空間 $\{0, 1\}$ への連続写像が定数に限ることは同値である。

証明 $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ が連続で定数でないなら、 $f^{-1}(0)$ と $f^{-1}(1)$ はともに空でない開集合で、交わず、合併が X 。逆に分割 $X = U \sqcup V$ があれば、 U で 0、 V で 1 と定めた関数が連続で定数でない。

この言い換えが実用上もっとも使いやすい。連結性を示すには「定数でない $\{0, 1\}$ 値連続関数がない」ことを言えばよい。□

例28.3 連結な空間、そうでない空間

連結。区間 ($\mathbb{R}$ の連結部分集合は区間に限る)。 $\mathbb{R}^n$ 。凸集合。球面。トーラス。密着位相をもつ空間。

連結でない。 $\mathbb{Q}$ (第9章)。無理数全体。カントール集合。離散空間 (二点以上)。 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

$\mathbb{Q}$ が連結でないのは、 $\sqrt{2}$ が穴になるからである。各点のまわりがいくらでも細かく切れる——こういう空間を**全不連結**という。**連結成分が一点集合に限る空間である。**カントール集合と $\beta\mathbb{N}$ (第23章) もそうである。

保たれ方

定理28.4

- (1) 連結空間の連続像は連結である。
- (2) 連結な部分集合の族が共通点をもつなら、その合併は連結である。
- (3) A が連結で $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ なら B は連結である。
- (4) 連結空間の任意個の積は連結である。

証明 (1) $f: X \rightarrow Y$ 連続全射で Y が分割 $U \sqcup V$ をもつなら、 $f^{-1}(U) \sqcup f^{-1}(V)$ が X の分割になる。

(2) $\{A_i\}$ が連結で $p \in \bigcap_i A_i$ とする。 $f: \bigcup_i A_i \rightarrow \{0, 1\}$ を連続とすると、各 A_i 上で定数 (命題28.2)。どれも p を含むので、その定数値は $f(p)$ に等しい。よって全体で定数。

(3) $f: B \rightarrow \{0, 1\}$ 連続とする。 A 上で定数 c 。 $B \subseteq \overline{A}$ より A は B で稠密であり、**稠密集合上で一致する連続写像はハウスドルフな値域では全体で一致する** (第13章)。よって $f \equiv c$ 。

(4) まず有限積。 $X \times Y$ で点 (a, b) を固定する。各 x について $(\{x\} \times Y) \cup (X \times \{b\})$ は、二つの連結集合が (x, b) で交わるので (2) より連結。これらはすべて (a, b) を含むので、再び (2) より合併が連結。合併は $X \times Y$ 全体である。

無限積。 $a = (a_i)$ を固定し、有限個の座標を除いて a と一致する点の全体を D とする。 D は連結集合（有限積の連結性を使う）の合併で共通点 a をもつから連結。 **D は積で稠密である**——基本開集合が有限個の座標しか制限しないから。(3) より $\overline{D} = \prod_i X_i$ も連結。 $\square$

注意

(4) の証明で、積位相の「有限個を除いて全体」という形が二度効いている。有限積を使って D を作り、稠密性を言うのにも使う。**第11章で箱位相を退けた理由が、ここでも現れる**——箱位相では D が稠密にならない。

弧状連結

定義28.5

X が**弧状連結**であるとは、任意の二点 x, y に対し連続写像 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ で $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ となるものが存在することをいう。

命題28.6

弧状連結ならば連結である。

証明 x を固定する。各 y について道 γ_y を取ると、 $\gamma_y([0, 1])$ は $[0, 1]$ の連続像だから連結（定理28.4 (1)）。これらはすべて x を含むので、(2) より合併が連結。合併は X 全体。 $\square$

反例28.7 位相幾何学者の正弦曲線

逆は成り立たない。 $\mathbb{R}^2$ のなかで


$$S = \{(x, \sin(1/x)) \mid 0 < x \leq 1\}, \quad T = S \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

と置く。 S は $(0, 1]$ の連続像だから連結であり、 $\bar{S} = T$ である—— $x \rightarrow 0$ のとき $\sin(1/x)$ が $[-1, 1]$ の全体を無限回往復するので、線分のすべての点が集積点になる。よって 定理28.4 (3) より T は連結。

しかし弧状連結でない。原点 $(0, 0)$ と S の点を結ぶ道 γ があったとする。 $t_0 = \sup\{t \mid \gamma(t) \in \{0\} \times [-1, 1]\}$ と置くと、 t_0 のどんな右近傍でも γ の第二成分は $[-1, 1]$ 全体を動く。 **t_0 での連続性に反する。**

連結だが弧状連結でない——この例が、二つの概念が別物であることを示す。

位相幾何学者の正弦曲線——連結だが弧状連結でない



連結性が保たれるもの

連続像 商 任意個の積
 共通点をもつ連結集合の合併
 閉包 ($A \subseteq B \subseteq A$ の閉包)

遺伝しない R は連結だが Q はそうでない
 開部分空間にも遺伝しない (Z を見よ)

成分の閉と開

連結成分はつねに閉
 開とは限らない (Q では一点集合)
 局所連結なら成分は開
 R の開集合が可算個の開区間の
 合併になるのは、この事実による

図28-1 原点に近づくほど振動が速くなる曲線に、縦の線分を足したもの。閉包なので連結だが、線分と曲線を結ぶ道は存在しない。

連結成分

定義28.8

$x \in X$ を含む連結部分集合すべての合併を、 x の**連結成分**という。

定理28.4 (2) より、これは x を含む最大の連結集合である。

命題28.9

連結成分はつねに閉である。開とは限らない。各点が連結な近傍基をもつとき（**局所連結**）、連結成分は開である。

証明 閉であること。 C を成分とすると 定理28.4 (3) より $\overline{C}$ も連結であり、最大性より $\overline{C} \subseteq C$ 。

開でない例。 $\mathbb{Q}$ では成分は一点集合であり、開でない。

局所連結なら開であること。 $x \in C$ に対し連結近傍 $V \ni x$ を取ると、最大性より $V \subseteq C$ 。よって C は各点の近傍を含む。 $\square$

注意

局所連結性は連結性を含まないし、含まれもしない。 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ は局所連結だが連結でない。反例28.7 の T は連結だが局所連結でない。**大域的な条件と局所的な条件は独立である**——第19章の★★で述べた構図がここにも現れる。

★★ 学部後半 弧状連結成分と、局所弧状連結

連結成分と同じく、弧状連結成分が定義できる。だが振る舞いが違う。

弧状連結成分は閉とは限らない。反例28.7 の T では、弧状連結成分は二つ——曲線部分 S と線分 $\{0\} \times [-1, 1]$ である。 **S は閉でない**。連結成

分は T 全体の一つだけなので、連結成分が弧状連結成分より真に大きいことがある。

局所弧状連結なら一致する。各点が弧状連結な近傍基をもつとき、連結成分と弧状連結成分は一致する。

証明。 C を連結成分、 $P \subseteq C$ を弧状連結成分とする。局所弧状連結性より P は開である（上と同じ議論）。同時に $C \setminus P$ も他の弧状連結成分の合併だから開である。 C が連結で $P \neq \emptyset$ だから $P = C$ 。

多様体では一致する。多様体は局所的に $\mathbb{R}^n$ と同相だから、局所弧状連結である。**したがって多様体では「連結」と「弧状連結」を区別しなくてよい。**

開集合についても同様である。 $\mathbb{R}^n$ の開集合は局所弧状連結なので、連結な開集合は弧状連結である。複素解析で「領域」を連結開集合と定義し、そこで道に沿った積分を考えられるのは、この事実による（第90章）。

なぜ道のほうが強いのか。道は $[0, 1]$ という具体的な空間からの写像を要求する。連結性は「切れない」という否定的な条件にすぎない。

存在を主張する条件（弧状連結）と、非存在を主張する条件（連結）——**前者のほうが強く、そのぶん使いやすい。**第1章で背理法と構成の違いを述べたが、同じ対比がここにある。

ホモトピー論が弧状連結性を基礎に据えるのは、そのためである。基本群を定義するには道が要る。連結なだけの空間では、道が足りなくて理論が立たない。

★★★ 大学院 全不連結性の階層

例28.3 で全不連結空間に触れた。「つながっていない」にも程度がある。

三つの条件。強い順に並べる。

零次元——開かつ閉な集合が基底をなす。

全分離——異なる二点を、開かつ閉な集合で分離できる。

全不連結——連結成分が一点集合に限る。

一般に **零次元 $\Rightarrow$ 全分離 $\Rightarrow$ 全不連結** であり、逆はいずれも成り立たない。

コンパクトなら一致する。 コンパクトハウスドルフ空間では三つが同値になる。証明には、成分が「 x を含む開かつ閉な集合すべての交叉」に等しいことを使う。

この事実が第20章★★★のストーン双対性を支えている。**ストーン空間（ブール代数に対応する空間）はコンパクトハウスドルフかつ零次元である。**

反例。 全不連結だが零次元でない空間がある。エルデシュ Erdős 空間

$$E = \{x \in \ell^2 \mid \text{すべての } x_n \text{ が有理数}\}$$

は全不連結だが零次元でない。さらに E は自分自身と同相な位相的性質をもち、次元論で重要な例になる（第42章）。

次元論への接続。 零次元性は、第38章で導入する小さい帰納的次元 ind が 0 であることと同値である。したがって本章の三つの条件は、次元 0 の三つの定義にあたる。

第41章の一致定理は、可分距離空間で $\text{ind} = \text{Ind} = \text{dim}$ を主張する。**その一番下の段——次元 0 の場合——が、ここで述べた同値性である。**

連結性の次元論的な意味。 逆に、連結性は「次元が 0 でない」ための条件の一つである。連結で二点以上ある空間は $\text{ind} \geq 1$ である——開かつ閉な集合が自明なものしかないので、境界が空でない近傍が取れないからである。

第V部でこの関係を正面から扱う。本章の連結性は、そこへの入口にあたる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の連結部分集合が区間に限ることを示せ。
2. $\mathbb{Q}$ の連結成分が一点集合であることを示せ。
3. 凸集合が弧状連結であることを示せ。
4. 連結空間の商が連結であることを示せ。

証明

1. 定理28.4 (2) を、命題28.2 を使って示せ。(15点)
2. 定理28.4 (4) の無限積の場合を、 D が稠密である理由を明示して示せ。(25点)
3. 連結成分が閉であることを示し、開とは限らない例を挙げよ。(15点)

発展

1. 反例28.7 が弧状連結でないことを、連続性に反する箇所を明示して完全に示せ。(35点)
2. コンパクトハウスドルフ空間では、零次元・全分離・全不連結が同値であることを示せ。(35点)

距離空間の位相と完備性

◆ この章の問い

- 完備性は位相的な性質ではない。では何なのか。
- コンパクト性と完備性は、どこで重なりどこで違うのか。
- 完備でない空間を、完備にできるか。

距離空間に戻る

定義29.1 距離空間

集合 X と関数 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ の対が距離空間であるとは、

$$d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad d(x, y) = d(y, x), \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

を満たすことをいう。開球 $B(x, r) = \{y \mid d(x, y) < r\}$ の全体を基底とする位相を、 d の定める位相という。

第5章から第28章まで、位相の言葉で議論してきた。ここで距離に戻るの
は、距離でしか言えないことを扱うためである。

定義29.2 完備性・全有界性

点列 (x_n) がコーシー列であるとは、どの $\varepsilon > 0$ に対してもある N があって $m, n \geq N$ で $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ となることをいう。すべてのコーシー列が収束するとき (X, d) は完備であるという。

どの $\varepsilon > 0$ に対しても有限個の ε -球で X を覆えるとき、全有界であるという。

注意

完備性と全有界性は位相的な性質でない。 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ は同相だが、通常の距離では前者が全有界で完備でなく、後者は完備で全有界でない。同じ位相を与える距離のなかに、完備なものと完備でないものが共存する（第8章）。

これらは一様構造に属する性質である——第30章でその中間層を取り出す。

コンパクト性の特徴づけ

定理29.3 距離空間のコンパクト性

距離空間 (X, d) について、次は同値である。

(1) コンパクト。 (2) 可算コンパクト。 (3) 点列コンパクト。 (4) 完備かつ全有界。

証明 (1) から (3) と (2) と (3) の同値は第25章で述べた。残りを示す。

(3) から (4)。コーシー列は収束部分列をもち、コーシー列で部分列が収束すれば全体が収束する。よって完備。全有界でないとする、ある ε について有限個の ε -球で覆えない。そこで x_1 を任意に取り、 x_{n+1} を $B(x_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(x_n, \varepsilon)$ の外に取る。この点列は互いに ε 以上離れているので、収束部分列をもたない。

(4) から (3)。点列 (x_n) を取る。全有界性より、 X は有限個の 1-球で覆える。無限個の項を含む球 B_1 がある。 B_1 は全有界だから、そのなかで $1/2$ -球について同じことを繰り返し、 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$ (半径 2^{-n}) で各々が無限個の項を含むものを作る。

各 B_n から項を一つずつ、添字が増加するように選べば、それはコーシー列である。完備性より収束する。

(3) から (1)。 (4) より全有界、したがって可分 (各 $\varepsilon = 1/n$ について有限個の中心を集める)。可分な距離空間は第二可算 (第7章)、したがってリンデレーフ (第25章)。 **リンデレーフかつ可算コンパクトならコンパクト。** $\square$

系29.4 ハイネ-ボレルの定理

$\mathbb{R}^n$ の部分集合がコンパクトであることと、有界閉であることは同値である。

証明 $\mathbb{R}^n$ は完備である (第43章で実数の構成から示す)。有界閉集合は、完備空間の閉部分集合だから完備であり、有界だから全有界である (有界集合が全有界になるのは $\mathbb{R}^n$ の特殊事情——次元が有限だから)。定理29.3よりコンパクト。

逆に、コンパクトなら全有界だから有界であり、ハウスドルフ空間のコンパクト部分集合は閉である (第20章)。 $\square$

注意

「有界ならば全有界」は一般には成り立たない。無限次元ノルム空間の単位球は有界だが全有界でない (第22章★★★、第71章)。 **ハイネ-ボレルの定理が有限次元でしか成り立たないのは、この一点による。**

完備・全有界・コンパクト——位相的なものとそうでないもの




図29-1 完備性と全有界性はどちらも位相的でないが、両方そろえるとコンパクト性という位相的な性質になる。有界と全有界が一致するのは有限次元に限る。

完備化

定理29.5 完備化の存在と一意性

どの距離空間 (X, d) も、完備距離空間 $(\hat{X}, \hat{d})$ のなかに等距離に稠密に埋め込める。この $\hat{X}$ は等距離同型を除いて一意である。

証明 構成。 X のコーシー列全体に、 $(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ という同値関係を入れ、商集合を $\hat{X}$ とする。距離を

$$\hat{d}([(x_n)], [(y_n)]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

と定める。右辺の極限が存在することは、

$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n)$ より数列 $(d(x_n, y_n))$ がコーシー列になることから従う。**ここで実数の完備性を使う**——第43章でこの循環を解く。

埋め込み。 $x \in X$ に定数列 $[(x, x, \dots)]$ を対応させる。等距離であり、像は稠密である——コーシー列 (x_n) に対し、定数列 $[(x_N, x_N, \dots)]$ は N を大きく取れば $[(x_n)]$ にいくらでも近い。

完備性。 $\hat{X}$ のコーシー列を取る。稠密性より、各項に X の点を近く取れる。それらがコーシー列をなし、その類が極限になる。

一意性。 X を稠密に含む二つの完備化のあいだに、 X 上で恒等な等距離写像が一意に定まる（稠密集合上で決まるから）。□

例29.6 完備化の例

$\mathbb{Q}$ の完備化は $\mathbb{R}$ 。これが第43章で採る実数の構成法の一つである。

$C([0, 1])$ を L^1 ノルムで完備化すると $L^1([0, 1])$ 。第62章で扱う。連続関数だけでは足りず、測度論が必要になる——これが第VII部を要する理由の一つである。

有理数を p -進距離で完備化すると p -進数体。 同じ $\mathbb{Q}$ から、距離の取り方で違う完備化が得られる。**完備化は距離に依存する——位相だけでは決まらない。**

★★ 学部後半 縮小写像の不動点定理

完備性をもっとも直接に働く定理を挙げる。存在と一意性を同時に、しかも構成的に与える珍しい定理である。

主張。 (X, d) を空でない完備距離空間、 $T: X \rightarrow X$ を縮小写像——すなわちある $0 \leq k < 1$ について $d(Tx, Ty) \leq k d(x, y)$ ——とする。このとき T は不動点をただ一つもつ。

証明。 x_0 を任意に取り $x_{n+1} = Tx_n$ と定める。

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$$

なので、 $m > n$ について $d(x_m, x_n) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) \rightarrow 0$ 。コーシー列だから完備性より収束する。極限 x は $Tx = \lim Tx_n = \lim x_{n+1} = x$

を満たす (T は連続)。一意性は $d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq k d(x, y)$ から $d(x, y) = 0$ 。

なぜ構成的か。不動点は x_0 から始めて T を繰り返すだけで得られる。しかも収束の速さが k^n で評価できる。第1章で述べた「背理法による存在証明と構成による存在証明」の違いで言えば、これは完全に構成的である。

用途。常微分方程式の解の存在と一意性 (ピカルー-リンデレーフの定理)。陰関数定理。ニュートン法の収束。積分方程式の解法。いずれも「適当な関数空間を完備にして、縮小写像を作る」という形をとる。

第63章でバナッハ空間を導入したあと、この定理が線型作用素の逆の存在 (ノイマン級数) として現れる。

完備性が外せないこと。 $X = (0, 1]$ 、 $Tx = x/2$ とすると $k = 1/2$ の縮小写像だが、不動点 0 は X にない。**完備性がなければ、極限が空間の外へ逃げる。**

コンパクト性では代用できない。コンパクト空間上の連続写像には不動点がないことがある (円の回転)。縮小という条件が本質的である。逆に、コンパクト凸集合上の連続写像については不動点があり (ブラウワー、第72章で触れる)、そちらは構成的でない。

★★★ 大学院 完備性は位相的でないが、完備化可能性は位相的である

完備性が位相的でないことを何度も述べた。ところが、「完備な距離が入るか」という問いは位相的である。この微妙な区別を押さえておく。

定義。位相空間 X が**完備距離化可能**であるとは、 X の位相を与える完備な距離が存在することをいう。ポーランド空間とは、可分かつ完備距離化可能な空間のことをいう。

位相的であること。この条件は「ある距離が存在する」という形なので、同相で保たれる。**したがって完備距離化可能性は位相的性質である。**

$(0, 1)$ は通常の距離では完備でないが、 $\mathbb{R}$ と同相なので完備距離化可能である。完備でない空間と、完備距離化できない空間は違う。

特徴づけ。第33章で扱うが、結論を先に述べる。完備距離化可能な空間は、チェック完備な距離化可能空間として特徴づけられる。

より具体的な形として、アレクサンドロフの定理がある。**完備距離空間の G_δ 部分空間は完備距離化可能であり、逆も成り立つ。**

したがって $\mathbb{Q}$ は完備距離化可能でない。 $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の G_δ 部分集合でないからである（第27章でベールの定理から示した）。

無理数全体はどうか。無理数全体 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の G_δ 集合である $(\bigcap_q (\mathbb{R} \setminus \{q\}))$ 。したがって完備距離化可能である。

実際、無理数全体は $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ （可算離散空間の可算積、ベール空間と呼ばれる）と同相である。連分数展開がその同相を与える。**通常の距離では完備でないのに、別の距離では完備になる。**

なぜこの区別が重要か。第VII部以降で扱う定理の多くが「完備距離空間で」という仮定をもつ。実際に必要なのは完備距離化可能性である——適切な距離を選び直せばよい。

とくに第54章で可測関数を扱うとき、ポーランド空間という枠組みが自然に現れる。 $\mathbb{R}$ 、 $[0, 1]$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、可分バナッハ空間、コンパクト距離空間——解析学で出会う空間はほとんどポーランド空間である。

記述集合論はポーランド空間の上で展開される。第7章★★★で触れたボレル階層の理論も、この設定でもっとも整った形になる。

演習

基本

1. $(0, 1)$ が通常の距離で完備でないことを示せ。
2. 完備距離空間の閉部分空間が完備であることを示せ。
3. 全有界な距離空間が可分であることを示せ。
4. コーシー列が収束する部分列をもてば収束することを示せ。

証明

1. 定理29.3 の (4) から (3) を、入れ子の球を作る手順を明示して示せ。(25点)
2. 定理29.5 で $\hat{d}$ が矛盾なく定まることを、同値類の代表の取り方に依らないことを含めて示せ。(25点)
3. 縮小写像の不動点定理を証明し、完備性を外すと成り立たない例を挙げよ。(20点)

発展

1. 無理数全体が $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ と同相であることを、連分数展開を用いて示せ。(40点)
2. $\mathbb{Q}$ が完備距離化可能でないことを、バールのカテゴリー定理を用いて示せ。(30点)

一様空間——距離と位相のあいだ

◆ この章の問い

- ・完備性と一様連続性は、位相では言えない。では何の言葉なら言えるのか。
- ・「二点が同じくらい近い」という比較を、数を使わずに表せるか。
- ・一様構造は、距離と位相のどちらに近いのか。

■ 中間層を取り出す

第5章で距離を捨てて位相を得た。そのとき一様連続性・完備性・全有界性が言えなくなった。だが位相を得たことで、距離のない空間まで扱えるようになった。

両方を取れるだろうか。すなわち、距離の数値は捨てつつ、一様連続性を語れる枠組みはあるか。

鍵は、一様連続性の定義を読み直すことにある。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y : d(x, y) < \delta \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

ここで使われているのは「 x と y が δ より近い」という対の集合である。すなわち $X \times X$ の部分集合

$$U_\delta = \{ (x, y) \mid d(x, y) < \delta \}$$

だけが使われている。**この形の部分集合の族を原始概念にすればよい。**

定義30.1 一様空間

集合 X 上の一様構造とは、 $X \times X$ の部分集合の族 $\mathcal{U}$ (元を近縁という) であって次を満たすものをいう。

(U1) 各 $U \in \mathcal{U}$ は対角線 Δ を含む。

(U2) $\mathcal{U}$ はフィルターである (有限交叉と上への拡大で閉じる)。

(U3) $U \in \mathcal{U}$ ならば $U^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in U\} \in \mathcal{U}$ 。

(U4) 各 $U \in \mathcal{U}$ に対し、 $V \circ V \subseteq U$ なる $V \in \mathcal{U}$ が存在する。ここで $V \circ V = \{(x, z) \mid \exists y, (x, y), (y, z) \in V\}$ 。

注意

四つの条件は距離の性質をそのまま写している。(U1) は $d(x, x) = 0$ 、(U3) は対称性、(U4) は三角不等式 ($\delta/2$ を取ることにあたる)、(U2) は $\min$ を取る操作である。**距離から数値を抜いて、順序関係だけを残したものが一様構造である。**

一様構造から位相が出る**命題30.2**

一様空間 $(X, \mathcal{U})$ に対し、

$$U[x] = \{y \mid (x, y) \in U\} \quad (U \in \mathcal{U})$$

の全体を x の近傍基とすることで、 X 上の位相が定まる。この位相はつねに完全正則であり、逆にどの完全正則空間の位相も、ある一様構造から得られる。

証明 位相が定まることは (U1) (U2) (U4) による。(U4) が「近傍を半分に縮める」操作を与え、これが近傍系の公理を満たすのに必要である。

完全正則性は、一様構造から擬距離の族を作り、そこから連続関数を作ることで示す。**一様構造は擬距離の族と同値な情報である**——これが★★の主題になる。

逆向きは、完全正則空間 X について $C(X, [0, 1])$ の各元 f から $U_{f, \varepsilon} = \{(x, y) : |f(x) - f(y)| < \varepsilon\}$ を作り、それらが生成する一様構造を取ればよい。□

注意

一様化できる位相は完全正則な位相に限る。したがって第14章の反例（正則だが完全正則でない空間）は一様化できない。**一様構造は、分離公理の階層のうち $T_{3\frac{1}{2}}$ のところにちょうど対応する。**

一様構造でしか言えないこと

定義30.3

$f: (X, \mathcal{U}) \rightarrow (Y, \mathcal{V})$ が一様連続であるとは、各 $V \in \mathcal{V}$ に対し

$$(f \times f)^{-1}(V) = \{(x, y) \mid (f(x), f(y)) \in V\} \in \mathcal{U}$$

となることをいう。

X 上のフィルター $\mathcal{F}$ がコーシーであるとは、各 $U \in \mathcal{U}$ に対し $F \times F \subseteq U$ なる $F \in \mathcal{F}$ が存在することをいう。すべてのコーシーフィルターが収束するとき X は完備であるという。

全有界とは、各 $U \in \mathcal{U}$ に対し有限個の $x_1, \dots, x_n$ で $X = \bigcup_k U[x_k]$ となることをいう。

定理30.4

- (1) 一様連続なら連続である。逆は成り立たない。
- (2) コンパクトな一様空間では、連続写像はすべて一様連続である。

(3) 一様空間がコンパクトであることと、完備かつ全有界であることは同値である。

(4) コンパクトハウスドルフ空間の一様構造はただ一つである。

証明 (1) は定義から。逆の反例は $f(x) = x^2$ on $\mathbb{R}$ 、あるいは $f(x) = 1/x$ on $(0, 1)$ 。

(2) 第20章★★のルベーク数の議論を一様構造で書き直す。 $V \in \mathcal{V}$ に対し $W \circ W \subseteq V$ なる W を取る。各 x について $(f \times f)^{-1}(W)[x]$ は近傍だから、コンパクト性より有限個で覆える。対応する近縁の有限交叉を取ればよい。

(4) (2) から従う。二つの一様構造があれば、恒等写像が両方向に一様連続になるので一致する。**コンパクトハウスドルフ空間では、位相が一様構造を完全に決める。** $\square$

注意

(4) が重要である。コンパクトな場合には、位相と一様構造の区別が消える。第29章で「**完備性は位相的でない**」と述べたが、**コンパクト空間ではそうではない。**これが第59章・第96章でコンパクトハウスドルフ空間を舞台にする理由の一つである。

三つの層——距離・一様構造・位相



図30-1 距離・一様構造・位相の三層。一様構造は距離から数値を捨てて順序関係だけを残したもので、完備性と一様連続性はこの層に属する。

距離化できる一様構造

定理30.5 距離化定理（一様構造版）

分離的な一様構造が距離から来るための必要十分条件は、**可算な基をもつこと**である。

証明 必要性は $\{U_{1/n}\}$ が基になることから明らか。十分性を示す。可算基 $\{U_n\}$ を取り、(U4) を繰り返して $V_{n+1} \circ V_{n+1} \circ V_{n+1} \subseteq V_n$ 、 $V_n \subseteq U_n$ なる減少列を作る。

そのうえで

$$d(x,y) = \inf \left\{ \sum_k 2^{-n_k} \mid x \text{ から } y \text{ へ } V_{n_k} \text{ を鎖状につなげる} \right\}$$

と定める。三角不等式は鎖をつなぐことから直ちに従う。三重の合成を要求したのが、 d が V_n と整合することを保証する。**技術的な補題が一つ要るが、構成の骨格はこれだけである。** □

注意

この定理は第31章と第32章の距離化定理とは別物である。こちらは一様構造が与えられたときの話で、あちらは位相だけが与えられたときの話である。**位相から出発する場合は、まず一様構造を作らなければならない——それが難しさの源である。**

★★ 学部後半 擬距離の族による記述

一様構造は、擬距離の族として書くこともできる。こちらのほうが解析学の議論に近い。

擬距離。 $\rho: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ が対称で三角不等式を満たし、 $\rho(x, x) = 0$ を満たすものを擬距離という。 $\rho(x, y) = 0$ でも $x \neq y$ でもいい。

対応。 擬距離の族 $\{\rho_\alpha\}$ が与えられたとき、

$$U_{\alpha, \varepsilon} = \{(x, y) \mid \rho_\alpha(x, y) < \varepsilon\}$$

の有限交叉を基とする一様構造が定まる。**逆に、どの一様構造もある擬距離の族から得られる。**

逆向きの構成は **定理30.5** の証明を各近縁について行うことで得られる。可算基があれば擬距離が一つで足り、それが距離になる。

なぜこの形が有用か。 関数解析で現れる位相が、この形で与えられることが多い。

各点収束の位相—— $\rho_x(f, g) = |f(x) - g(x)|$ の族。第11章の積位相にあたる。

コンパクト一様収束の位相—— $\rho_K(f, g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|$ (K はコンパクト集合) の族。第91章で正則関数の空間に入れる位相である。

シュワルツ空間の位相—— $\rho_{m,n}(f, g) = \sup_x |x^m(f - g)^{(n)}(x)|$ の族。第87章で扱う。

局所凸空間との関係。ベクトル空間上で、擬距離をセミノルムから作ると局所凸空間になる。**第IX部で扱うバナッハ空間は、セミノルムが一つで済む場合である。**

一般の局所凸空間はノルムで距離化できないことがあり、そこでは一様構造の言葉が必要になる。第87章の超関数の空間がその例である。

可算性の役割。擬距離が可算個なら、第11章★★の重みつき和で一つの距離にまとめられる。非可算個なら距離化できない。

第7章から繰り返し現れている「可算性が局所と大域を橋渡しする」という構図が、ここでも働いている。

★★★ 大学院 一様空間の完備化と、標本的な例

第29章で距離空間の完備化を作った。一様空間でも同じことができる。そして、そこで得られるものが意外に豊かである。

完備化の存在。分離的な一様空間 X は、完備な分離一様空間のなかに稠密に埋め込める。構成はコーシーフィルターの同値類を取ることによる——第29章のコーシー列を、フィルターに置き換えるだけである。

一意性も同様に成り立つ。ただし「等距離同型」の代わりに「一様同型」を使う。

コンパクト化との関係。ここで面白いことが起きる。 X をチコノフ空間とし、第14章の埋め込みから来る一様構造を入れる。その完備化を取ると、第23章のストーン-チェックのコンパクト化 βX が得られる。

より正確には、 X 上の最大の一様構造（すべての有界連続関数から作られるもの）について完備化すると βX になる。**コンパクト化と完備化が、一様構造の言葉では同じ操作になる。**

ヘヴィット実完備化。別の様構造を取ると、別のものが出てくる。すべての（有界でなくてもよい）連続実数値関数から作られる一様構造で完備化すると、ヘヴィット実完備化 νX が得られる。

$X \subseteq \nu X \subseteq \beta X$ であり、 $X = \nu X$ となる空間を実完備空間という。距離空間は実完備である。第25章★★で触れた $C(X)$ の構造は、この概念で整理できる。

ハール測度。一様構造がもっとも劇的に働くのは、位相群の理論である。位相群には左不変な一様構造と右不変な一様構造が自然に入る。局所コンパクト群では、この構造から左不変な測度（ハール測度）が一意に存在する。

第84章でフーリエ変換を扱うとき、背景にこの構造がある。 **$\mathbb{R}$ 上のフーリエ変換は、局所コンパクトアーベル群の双対性の特別な場合である。**第79章のゲルファント理論と合わせて、ポントリャーギン双対性という枠組みになる。

本書での扱い。本書は一様空間を体系的には使わない。第VI部以降は距離空間、多くは実数直線の上で議論する。

それでも本章を置いたのは、二つの理由による。第一に、**「完備性は位相的でない」という事実の正体が、位相と距離のあいだに層があることだと示すため。**第二に、第87章のシュワルツ空間のように、距離化できない位相が実際に必要になる場面があるためである。

第34章で「距離空間は何が特別なのか」を問うとき、本章の三層構造に戻る。

演習

基本

1. 距離空間の U_δ が **定義30.1** の四条件を満たすことを確かめよ。
2. $f(x) = x^2$ が $\mathbb{R}$ 上で連続だが一様連続でないことを示せ。
3. 離散一様構造 (Δ を含む集合すべて) を定義し、どんな位相を与えるか述べよ。
4. (U4) が三角不等式にあたる理由を説明せよ。

証明

1. **定理30.4** (2) を、ルベーク数の議論を一様構造の言葉に書き直して示せ。(25点)
2. **定理30.4** (4) を示せ。(20点)
3. 一様連続な全単射で、逆写像が一様連続でない例を挙げよ。(20点)

発展

1. 擬距離の族と一様構造が同じ情報をもつことを、両方向の構成を書いて示せ。(35点)
2. **定理30.5** の十分性を、三重の合成が必要な理由を明示して示せ。(40点)

Urysohnの距離化定理

◆ この章の問い

- どんな位相空間が、距離から来るのか。
- 可算性と分離性だけで、距離が作れるのか。
- この定理の条件は、どれも外せないのか。

距離化問題

第5章で距離から位相へ進んだ。逆の問いを立てる。

定義31.1

位相空間 X が距離化可能であるとは、 X の位相を与える距離が存在することをいう。

必要条件はいくつも挙がる。距離空間はハウスドルフ・正則・正規・完全正規・第一可算・パラコンパクトである。これらを満たせば距離化できるか。

答えは否である。 $[0, \omega_1)$ は正規・第一可算だが距離化できない（コンパクトでないのに点列コンパクト、第25章）。ゾルゲンフライ直線も完全正規・第一可算・パラコンパクトだが距離化できない。

十分条件を見つけるのが距離化定理の仕事である。ウリゾーンが最初の答えを出した。

ウリゾーンの距離化定理

定理31.2 ウリゾーンの距離化定理

第二可算な正則ハウスドルフ空間は距離化可能である。より強く、ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ に埋め込める。

証明 証明は四段からなる。

第一段——正規性を出す。第16章★★★で示した。正則かつ第二可算なら正規である。可算基底を使った対角線的な構成による。**これでウリゾーンの補題（第15章）が使えるようになる。**

第二段——可算個の関数を作る。 $\mathcal{B} = \{B_n\}$ を可算基底とする。

$$P = \{(m, n) \mid \overline{B_m} \subseteq B_n\}$$

は可算集合である。各 $(m, n) \in P$ について、正規性とウリゾーンの補題より連続関数 $f_{mn}: X \rightarrow [0, 1]$ で

$$f_{mn}|_{\overline{B_m}} \equiv 0, \quad f_{mn}|_{X \setminus B_n} \equiv 1$$

となるものが取れる。これで可算個の関数が手に入った。

第三段——点と閉集合を分離できること。 $x \in U$ (U 開) とする。 $x \in B_n \subseteq U$ なる基底元を取り、正規性より $x \in B_m \subseteq \overline{B_m} \subseteq B_n$ なる基底元を取る（命題14.2 と、基底が基底であることを使う）。**すると $(m, n) \in P$ であり、 $f_{mn}(x) = 0$ 、 $f_{mn}|_{X \setminus U} \equiv 1$ 。**

第四段——埋め込み。 $e: X \rightarrow [0, 1]^P$ を $e(x) = (f_{mn}(x))_{(m, n) \in P}$ と定める。 P は可算だから値域は $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ と同一視できる。

第14章の 定理14.6 の証明と同じ議論で、 e が埋め込みであることが従う——単射性は第三段 (T_1 を使う)、開写像性も第三段による。

ヒルベルト立方体は距離化可能（第11章★★）であり、距離化可能性は遺伝する（第9章）。よって X は距離化可能である。□

注意

証明の要所は第二段と第三段である。可算基底があるおかげで、必要な関数が可算個で済む。**第14章の一般のチコノフ空間では、関数の個数が非可算になりうるので、立方体の次元が非可算になり距離化できない。**可算性がすべてを決めている。

系31.3

第二可算な空間について、次は同値である。(1) 距離化可能。(2) 正則ハウスドルフ。(3) 正規ハウスドルフ。(4) チコノフ。

ウリゾーンの距離化定理——四段の道




図31-1 可算基底から可算個の分離関数を作り、ヒルベルト立方体へ埋め込む。可算性がなければ立方体の次元が非可算になり、この道は通らない。

条件の必要性

反例31.4 どの条件も外せない

第二可算を外す。ゾルゲンフライ直線は完全正規・第一可算・パラコンパクト・可分だが、第二可算でなく距離化できない。距離空間では可分と第二可算が一致する（第7章）ので、この二つが食い違うことが距離化不能の証拠になる。

正則を外す。第14章の「有理数を抜いた直線」は第二可算ハウスドルフだが正則でない。**距離空間は正則だから距離化できない。**

ハウスドルフを外す。密着位相をもつ二点以上の空間。距離空間はハウスドルフなので当然である。

非可算積。 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) はコンパクトハウスドルフだから正規だが、第一可算でないので距離化できない（第11章の演習）。

★★ 学部後半 距離を直接書き下す

定理31.2 は埋め込みを経由した。距離を直接書くこともできる。

構成。第二段で作った関数 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ (P を $\mathbb{N}$ と同一視) に対し、

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x) - f_k(y)|$$

と定める。これが距離であることは、各項が擬距離で、重みつき和が収束することから従う。

位相が一致すること。二方向を見る。

d -球のなかに開集合が入る。 $d(x, y) < \varepsilon$ を保証するには、最初の N 項を小さくし、尾を $2^{-N} < \varepsilon/2$ で押さえればよい。**各 f_k が連続なので、有限個の条件は開集合で表せる。**

開集合のなかに d -球が入る。 $x \in U$ とする。第三段より $f_k(x) = 0$ 、 $f_k|_{X \setminus U} \equiv 1$ なる k がある。 $d(x, y) < 2^{-k}$ なら

$2^{-k}|f_k(x) - f_k(y)| < 2^{-k}$ より $|f_k(y)| < 1$ 、すなわち $y \in U$ 。よって $B_d(x, 2^{-k}) \subseteq U$ 。

二つの構成の関係。この距離は、埋め込み e とヒルベルト立方体の距離（第11章★★）を合成したものに等しい。**どちらの道も同じ距離を与える。**

なぜ埋め込みの形で述べるのか。第一に、ヒルベルト立方体が可分距離空間の普遍空間であるという事実が同時に得られる（第9章★★）。第二に、この形が第23章のコンパクト化や第33章の完備距離化と接続する。

系——ウリゾーンの普遍空間定理。定理31.2 の系として、可分距離空間はすべてヒルベルト立方体に埋め込める。可分距離空間は第二可算で正則だからである。

したがってヒルベルト立方体は可分距離空間の普遍空間である。「**どんな空間か**」を問う代わりに「**どこに入るか**」を問う方法が、ここで完結する。

★★★ 大学院 距離化定理の歴史と、何が本当の条件だったのか

ウリゾーンの定理は一九二五年である。その後半世紀にわたって、条件を弱める努力が続いた。その流れを追うと、何が本質だったかが見えてくる。

第一段階——第二可算を外す。ウリゾーンの条件は強い。第二可算性は「空間全体が可算個の情報で書ける」という要求で、多くの空間が満たさない。

ナガタ Nagata（一九五〇）とスミルノフ Smirnov（一九五一）が独立に答えを出した。**第二可算性を「 σ -局所有限な基底」に置き換えればよい。**第32章で扱う。

第二段階——基底の条件を変える。ビング Bing (一九五一) は「 σ -離散な基底」で同じことを示した。局所有限より離散のほうが強い条件だが、基底の存在としては同値になる。

第三段階——基底を使わない条件。さらに進んで、被覆の列や写像の存在で距離化を特徴づける定理群が現れた。ムーア空間、 σ -空間、層空間といった概念がこの流れから生まれた。

何が本質だったのか。三つの要素に分解できる。

分離——点と閉集合を関数で分けられること。正則性（＋正規性）が担う。

可算的な近似——各点のまわりを可算個の段階で押さえられること。第一可算性、あるいは σ -局所有限性が担う。

局所と大域の整合——局所的な情報を大域的に貼り合わせられること。パラコンパクト性が担う。

ウリゾーンの第二可算性は、三つを一度に保証する強い条件だった。ナガタースミルノフは、これを分解して最小限に削ったのである。

未解決だったこと。第17章★★★で触れた正規ムーア空間予想は、この流れのなかの問いである。ムーア空間は「可算的な近似」をもつが、分離が足りるかどうかの問題だった。

答えは公理系から独立である。**距離化問題は、最後の一段で集合論に突き当たった。**

本書での位置。第32章でナガタースミルノフとビングを証明し、第33章で完備距離化を扱い、第34章で「距離空間は何が特別なのか」を総括する。

そのあと第VI部から解析学に移る。そこでは距離があるものとして進む。距離化定理を丁寧に扱ったのは、「**距離があると仮定する**」ことが何を仮定しているのかを明示するためである。第34章でこの点を回収する。

演習

基本

1. 距離空間が第一可算・正規・パラコンパクトであることを述べよ。
2. ゴルゲンフライ直線が距離化できない理由を、可分性と第二可算性の食い違いから述べよ。
3. 密着位相をもつ二点空間が距離化できないことを示せ。
4. 第二可算な距離空間が可分であることを示せ。

証明

1. 定理31.2 の第三段を、正則性と基底の性質をどこで使うか明示して示せ。(25点)
2. 系31.3 の四つが同値であることを示せ。(20点)
3. ★★の距離 d が実際に距離であり、もとの位相を与えることを示せ。(30点)

発展

1. 可分距離空間がヒルベルト立方体に埋め込めることを示し、逆にヒルベルト立方体の部分空間が可分距離空間であることを示せ。(30点)
2. $[0, \omega_1]$ が正規・第一可算でありながら距離化できないことを示せ。(35点)

Nagata–SmirnovとBingの距離化定理

◆ この章の問い

- ・第二可算性を、どこまで弱められるのか。
- ・「局所有限な基底」という条件は、何を保証しているのか。
- ・距離化の必要十分条件は、結局どう述べられるのか。

基底の細かさを測り直す

第二可算性は「基底が可算」という条件だった。これを緩めたい。だが単に「基底の濃度を大きくしてよい」では駄目である——ゾルゲンフライ直線が反例になる（第31章）。

濃度ではなく、基底の重なり方を制限する。第24章の局所有限性が使える。

定義32.1

部分集合の族 $\mathcal{A}$ が σ -局所有限であるとは、 $\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ と書いて各 $\mathcal{A}_n$ が局所有限であることをいう。 σ -離散とは、各 $\mathcal{A}_n$ が離散（各点が高々一つの元と交わる近傍をもつ）であることをいう。

例32.2 距離空間の基底

距離空間 (X, d) は σ -局所有限な基底をもつ。実は σ -離散な基底ももつ。

構成の骨子。各 n について、半径 2^{-n} の球による被覆を取り、第24章のパラコンパクト性（距離空間はパラコンパクト）から局所有限な細分

$\mathcal{A}_n$ を作る。 $\bigcup_n \mathcal{A}_n$ が基底になる——各点の各近傍について、半径を小さく取れば収まるからである。

可算でないことに注意。各 $\mathcal{A}_n$ は無限個でよい。可算個の局所有限な族の合併という形が、可算性を局所性に置き換えている。

ナガタ-スミルノフの距離化定理

定理32.3 ナガタ-スミルノフの距離化定理

位相空間 X が距離化可能であるための必要十分条件は、 X が正則ハウスドルフであって σ -局所有限な基底をもつことである。

証明 必要性は例32.2。十分性を示す。三段で進む。

第一段——正規性。 $\mathcal{B} = \bigcup_n \mathcal{B}_n$ を σ -局所有限な基底とする。 X が正規であることを示す。

A, B を交わらない閉集合とする。各 $x \in A$ について、正規性より $\overline{B} \cap B = \emptyset$ なる基底元 $B \ni x$ が取れる。それらを n ごとに集めて $\mathcal{C}_n$ 、 $U_n = \bigcup \mathcal{C}_n$ と置く。

$\mathcal{C}_n$ は局所有限だから、第24章の補題24.5より $\overline{U_n} = \bigcup_{C \in \mathcal{C}_n} \overline{C}$ であり、これは B と交わらない。局所有限な族の閉包が閉になることが、ここで決定的に効く。

B についても同様に V_n を作り、第16章★★★と同じ対角線的な構成

$$U = \bigcup_n \left(U_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{V_k} \right), \quad V = \bigcup_n \left(V_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{U_k} \right)$$

で分離する。可算個の段しかないことが、この削り方を可能にする。

第二段——擬距離の族を作る。 各 n と各 $B \in \mathcal{B}_n$ について、正規性とウリゾーンの補題より $f_{n,B}: X \rightarrow [0, 2^{-n}]$ を、 $X \setminus B$ で 0、ある小さい基底元の上で 2^{-n} となるように取る。

そのうえで擬距離を

$$\rho_n(x, y) = \sum_{B \in \mathcal{B}_n} |f_{n,B}(x) - f_{n,B}(y)|$$

と定める。**和は局所有限性より各点で有限項しかない。**ここが可算性の代わりを務める箇所である。

第三段——距離にまとめる。

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \min(\rho_n(x, y), 2^{-n})$$

と置く。可算和なので収束する。これが距離であり、もとの位相を与える。位相の一致は第31章★★と同じ二方向の議論による。□

注意

証明の構造は第31章とほぼ同じである。違いは「関数が可算個」の代わりに「擬距離が可算個、各擬距離は局所有限関数族の和」になっていることだけである。**局所有限性が、無限個の関数を各点で有限個に落として**
いる。これが第24章の補題24.5の御利益である。

定理32.4 ビングの距離化定理

X が距離化可能であるための必要十分条件は、 X が正則ハウスドルフであって σ -離散な基底をもつことである。

証明 離散な族は局所有限だから、定理32.3 より十分性が従う。必要性は例32.2の構成を、離散になるように精密化する。

具体的には、各 n について半径 2^{-n} の球の被覆から、**互いに 2^{-n} 以上離れた中心をもつ極大な族**を選ぶ（ツォルンの補題）。この族は離散である。 n を動かして合併すれば σ -離散な基底になる。□

可算性を局所有限で置き換える




図32-1 可算基底を「可算個の局所有限な族」に置き換える。各段が局所有限なので、無限個の関数の和が各点で有限項に落ち、擬距離が作れる。

パラコンパクト性との関係

系32.5

距離化可能な空間はパラコンパクトである (スミルノフ-ストーンの定理)。逆に、局所距離化可能なパラコンパクト空間は距離化可能である。

注意

前半が第24章で引用した事実である。証明は **定理32.4** の σ -離散基底を使って被覆を細分する。**距離化定理とパラコンパクト性は、互いに支え合っている。**

後半が実用的である。多様体が距離化可能なのは、局所的に $\mathbb{R}^n$ であり、かつパラコンパクト (通常は定義に含める) だからである。

★学後半 σ -局所有限と σ -離散はなぜ同値になるのか

定理32.3 と 定理32.4 は、条件が違うのに同じ結論を与える。離散は局所有限より真に強いのに、なぜか。

族としては違う。離散な族は局所有限だが、逆は成り立たない。 $\mathbb{R}$ で $\{(n-1, n+1)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は局所有限だが離散でない（隣り合う区間が重なる）。

基底の存在としては同じ。 σ -局所有限な基底があれば、 σ -離散な基底も作れる。したがって二つの定理の条件は同値である。

証明の方針。 σ -局所有限な基底があれば、定理32.3 より距離化できる。距離化できれば 定理32.4 の必要性の証明で σ -離散基底が作れる。距離を經由して往復する。

直接示すには。距離を經由しない証明もある。局所有限な族 $\mathcal{A}$ の各元を「重なるの個数」で分類し、 k 個と重なる部分を集めると離散な族になる。局所有限性より、この分類は可算個の段に収まる。

より正確には、 $\mathcal{A}$ の有限部分族 $\mathcal{F}$ ごとに

$$A_{\mathcal{F}} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A \setminus \bigcup_{A \notin \mathcal{F}} \bar{A}$$

を考える。同じ大きさの $\mathcal{F}$ についての族は離散になる。ただし $\mathcal{A}$ が非可算のとき、この分類が可算段で済むことには議論が要る。

実用上どちらを使うか。距離を作るには局所有限で足りる（和が各点で有限になればよい）。被覆を細分するには離散のほうが扱いやすい。

第40章で被覆次元 $\dim$ を定義するとき、被覆の重なるの個数を数える。そこでは離散性と局所有限性の区別が本質的になる。次元とは、まさに「いくつまで重なるか」を測る量だからである。

★★★ 大学院 距離化定理の外側——ムーア空間と独立性

ナガタ-スミルノフは必要十分条件を与えた。それで距離化問題は終わったのか。そうではない。

条件が確かめにくい。 σ -局所有限な基底の存在は、実際の空間について確かめるのが難しい。もっと素朴な条件で距離化を保証したい。この動機から、別種の条件が探された。

ムーア空間。 X が発展的であるとは、開被覆の列 $\{\mathcal{G}_n\}$ が存在して、各点 x と各近傍 U について、ある n で $\mathcal{G}_n$ の x を含む元がすべて U に収まることをいう。発展的な正則空間を**ムーア空間**という。

距離空間はムーア空間である ($\mathcal{G}_n$ を半径 2^{-n} の球の族とする)。逆は成り立たない。

正規ムーア空間予想。「正規なムーア空間は距離化可能か」。**この問いの答えは集合論の公理系から決まらない。**

連続体仮説を仮定すると反例が構成できる (ビング、後にフリードマン Fleissner が精密化)。一方、可測基数の存在を仮定すると予想が成り立つモデルが作れる (ニッケリ Nyikos)。

注目すべきは、予想を証明するには大きい基数が必要だということである。純粋に位相的な問いが、集合論のもっとも強い仮定に結びついている。

集合論的位相空間論。この種の問いを扱う分野を集合論的位相空間論という。第36章のスーリン問題、第37章の積の基数不変量も同じ分野に属する。

問いの形は素朴なのに、答えが公理に依存する——これが第4章★★★で述べた事態の、もっとも豊富な現れ方である。

なぜここで止まるのか。距離化問題が集合論に突き当たったのは、偶然ではない。

距離化とは「空間の構造を可算個の実数で書けるか」という問いである。そして「可算個で足りるか」という問いは、非可算性の構造に直接触れる。

第4章で共終数を導入し、第17章と第26章で反例に使い、ここで距離化問題の限界として現れた。**可算と非可算の境界が、位相空間論の主要な問題のほとんどが行き着く場所である。**

本書の進み方。第33章で完備距離化を扱い、第34章で総括したあと、第V部で基数不変量と次元論に進む。そこでは非可算性を正面から測る。

そして第VI部からは解析学に移り、**可算な操作だけで閉じた世界**に入る。第43章で実数を構成し、第52章でボレル集合を作り、第55章で収束定理を証明する——どれも可算性のなかで完結する。第97章でこの対比を地図に載せる。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ で $\{(n-1, n+1)\}$ が局所有限だが離散でないことを確かめよ。
2. 離散な族が局所有限であることを示せ。
3. 第二可算なら σ -離散な基底をもつことを示せ。
4. 距離空間がパラコンパクトであることを認めて、例32.2 の構成を述べよ。

証明

1. 定理32.3 の第一段で、補題24.5 がどこで効いているかを明示して示せ。(30点)
2. 定理32.3 の第二段で、和が各点で有限項になる理由を述べよ。(20点)
3. 定理32.4 の必要性を、極大な離散族を取る方法で示せ。(25点)

発展

1. σ -局所有限な基底の存在と σ -離散な基底の存在が同値であることを、距離を経由せずに示せ。(40点)
2. ムーア空間の定義を述べ、距離空間がムーア空間であることを示せ。さらに正規ムーア空間予想が独立である意味を説明せよ。(35点)

完備距離化可能性とČech完備性

◆ この章の問い

- ・「完備な距離が入るか」を、位相の言葉で言い当てられるか。
- ・コンパクト化のなかで、もとの空間はどんな位置を占めるのか。
- ・ベール性は完備性から来るのか、もっと弱いものから来るのか。

完備距離化可能性を位相で述べる

第29章★★★★で述べたとおり、完備性は位相的でないが、完備距離化可能性は位相的である。それを位相の言葉だけで特徴づけたい。

定理33.1 アレクサンドロフの定理

距離空間 X について、次は同値である。

- (1) X は完備距離化可能。
- (2) X は、ある完備距離空間の G_δ 部分空間と同相。
- (3) X は、自分の完備化 $\hat{X}$ のなかで G_δ である。

証明 (1) から (3)。 d を完備な距離とし、 $\hat{X}$ を別の距離 ρ による完備化とする。

$$U_n = \{y \in \hat{X} \mid \exists \rho\text{-近傍 } V \ni y, \text{diam}_d(V \cap X) < 1/n\}$$

と置く。各 U_n は開であり $X \subseteq U_n$ である ($x \in X$ のまわりで d -径が小さい近傍が取れる)。

逆に $y \in \bigcap_n U_n$ とすると、 y に近づく X の点列が d -コーシーになる。 d が完備だから極限が X にあり、 $y \in X$ 。よって $X = \bigcap_n U_n$ 。

(2) から (1) 。 Y を完備距離空間、 $X = \bigcap_n U_n$ (U_n 開) とする。新しい距離を

$$d(x, y) = \rho(x, y) + \sum_{n=1}^{\infty} \min \left(2^{-n}, \left| \frac{1}{\rho(x, Y \setminus U_n)} - \frac{1}{\rho(y, Y \setminus U_n)} \right| \right)$$

と定める。 d -コーシー列は ρ -コーシーであり、しかも各 U_n の境界に近づけない——近づくとも第二項が発散するからである。**よって極限が X のなかに留まる。**

(3) から (2) は自明である。 $\square$

例33.2 完備距離化できる空間、できない空間

できる。 $\mathbb{R}$ 、 $(0, 1)$ ($\mathbb{R}$ と同相)、無理数全体 (G_δ)、コンパクト距離空間、バナッハ空間、 $\mathbb{R}$ の開集合と閉集合。

できない。 $\mathbb{Q}$ 。 $\mathbb{R}$ のなかで G_δ でないからである (第27章)。

同じ理由で、 $\mathbb{Q}$ と同相な空間 (可算で孤立点をもたない距離空間はすべて $\mathbb{Q}$ と同相——シェルピンスキの定理) はどれも完備距離化できない。

チェック完備性

定理33.1 は距離空間の話だった。一般のチコノフ空間に拡張する。

定義33.3 チェック完備空間

チコノフ空間 X が**チェック完備**であるとは、 X がストーン-チェックのコンパクト化 βX のなかで G_δ であることをいう。

命題33.4

(1) この条件は βX に依らない。どのコンパクト化について G_δ でも同じことである。

(2) コンパクトハウスドルフ空間と、局所コンパクトハウスドルフ空間

はチェック完備である。

(3) 距離化可能な空間について、チェック完備であることと完備距離化可能であることは同値である。

(4) チェック完備な空間はベール空間である。

証明 (2) コンパクトなら $\beta X = X$ で、 X は自分のなかで開（したがって G_δ ）。局所コンパクトなら X は βX で開である——一点コンパクト化への潰す写像を考えればよい。

(3) は **定理33.1** と、距離化可能空間の完備化がコンパクト化に埋め込めることによる。

(4) が重要である。証明は第27章のベールの定理の構成を、 βX のコンパクト性を使って行う。 $X = \bigcap_n V_n$ (V_n は βX で開) とし、稠密開集合の列に沿って βX のなかで入れ子のコンパクト集合を作る。**各段で V_n のなかに収まるようにすれば、交叉が X のなかに落ちる。** $\square$

注意

(4) が第27章のベールの定理を統一する。完備距離空間と局所コンパクトハウスドルフ空間は、どちらもチェック完備である。**二つの別々に見えた定理が、一つの条件の帰結だった。**

コンパクト化のなかで G_δ であること




図33-1 コンパクト化のなかで可算個の開集合の交叉になっていることが、チェック完備性である。完備距離空間と局所コンパクト空間が、この一つの条件のもとにまとまる。

保存

定理33.5

- (1) チェック完備性は G_δ 部分空間に遺伝する。とくに開部分空間と閉部分空間に遺伝する。
- (2) 可算個のチェック完備空間の積はチェック完備である。
- (3) 一般の部分空間には遺伝しない。非可算積では保たれない。

証明 (1) Y が X で G_δ 、 X が βX で G_δ なら、 Y は βX で G_δ である ($Y = X \cap \bigcap_n W_n$ と書いて交叉をとる)。 βY が βX の閉部分集合として得られることを使う。

(2) $X_k = \bigcap_n V_{k,n}$ とすると $\prod_k X_k = \bigcap_{k,n} p_k^{-1}(V_{k,n})$ であり、添字の対 (k, n) は可算である。可算個の積でしか成り立たないのは、この数え上げが可算でなければならないからである。

(3) $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ の部分空間でチェック完備でない。 □

★★ 学部後半 ポーランド空間

可分かつ完備距離化可能な空間をポーランド空間という。解析学で出会う空間のほとんどがこれである。

例。 $\mathbb{R}^n$ 、コンパクト距離空間、可分バナッハ空間、 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 、 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ （無理数全体と同相）、 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ （カントール集合）。

性質。ポーランド空間は次を満たす。

ベール空間である（命題33.4（4））。 G_δ 部分空間はポーランド。可算積はポーランド。第二可算（可分＋距離化可能、第7章）。

普遍性。どのポーランド空間も、ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ の G_δ 部分空間と同相である。第31章の埋め込みと定理33.1を合わせればよい。

さらに、空でないポーランド空間はすべて $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ の連続像である。ベール空間 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ がポーランド空間の「もと」になる。

なぜこの枠組みが有用か。三つの理由がある。

第一に、ベール性が保証される。第IX部の関数解析の基本定理が使える。

第二に、ボレル階層が整った形になる。第52章で導入するボレル集合の理論は、ポーランド空間でもっとも完全な形をとる。

第三に、測度論との相性がよい。ポーランド空間上の有限ボレル測度は正則（内部からコンパクト集合で、外部から開集合で近似できる）になり、第59章のリースの表現定理が使いやすい形で成り立つ。

標準ボレル空間。ポーランド空間のボレル構造だけを取り出したものを標準ボレル空間という。驚くべきことに、非可算な標準ボレル空間はすべて同型である。

すなわち、 $\mathbb{R}$ 、 $[0, 1]$ 、 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 、 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ は、ボレル構造としては区別がつかない。位相としてはまったく違う（コンパクトかどうか、連結かどうか）のに、可測構造では同じである。

第54章で可測関数を扱うとき、この事実が背景にある。測度論は位相の情報の多くを見ていない。

★★★ 大学院 **ベール性はチェック完備性より真に弱い**

命題33.4 (4) の逆は成り立たない。ベール空間だがチェック完備でない空間がある。この落差に何があるのかを見る。

反例。 $\mathbb{R}$ のなかで、ベルンシュタイン集合を取る。**どの非可算閉集合とも交わり、どの非可算閉集合も含まない集合**である。超限帰納法で構成できる ($\mathbb{R}$ の閉集合は $2^{\aleph_0}$ 個しかないことを使う)。

ベルンシュタイン集合 B とその補集合はどちらもベール空間になるが、どちらもチェック完備でない—— G_δ 集合は非可算なら非可算閉集合を含むからである。

もっと自然な例。関数解析にも現れる。無限次元バナッハ空間の稠密な真部分空間は、ベール空間でないことが多い。だが位相群のなかには、ベールだが完備化できないものがある。

ベール性を保証する条件の階層。チェック完備性とベール性のあいだに、いくつもの条件がある。

擬完備——減少する空でない開集合の列で、各段の閉包が次に含まれるものの交叉が空でない。

チェック完備——本章の条件。

完備距離化可能——距離化可能な場合のチェック完備。

完備距離化可能 $\implies$ チェック完備 $\implies$ 擬完備 $\implies$ ベール

どの逆も成り立たない。**ベール性は結論であって、それ自体は構造を与えない。**

ゲームによる特徴づけ。ベール性は無限ゲームで特徴づけられる。二人が交互に空でない開集合を選び、 $U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq \cdots$ と縮めていく。交叉が空でなければ一方の勝ち、空なら他方の勝ち。

バナッハ–マズール Banach–Mazur のゲームという。 **X がベール空間であることと、一方のプレイヤーが勝つ戦略をもたないことが同値である。**

擬完備性は、もう一方のプレイヤーが勝つ戦略をもつことに対応する。

「負けない」と「勝てる」の差が、ベール性と擬完備性の差である。

この種の特徴づけは決定性の公理とも関係する。第4章★★★で触れた独立性の話題が、ここにも接続する。本書はこの方向に進まないが、ベール性が「構造」ではなく「結論」であることは押さえておく価値がある。

演習

基本

1. $(0, 1)$ が完備距離化可能であることを、同相を使って示せ。
2. 無理数全体が $\mathbb{R}$ の G_δ であることを示せ。
3. コンパクトハウスドルフ空間がチェック完備であることを示せ。
4. ポーランド空間の例を五つ挙げよ。

証明

1. 定理33.1 の (1) から (3) を、 U_n が開であることを含めて示せ。(30点)
2. 定理33.5 (2) を示し、非可算積では成り立たない理由を述べよ。(25点)
3. $\mathbb{Q}$ がチェック完備でないことを示せ。(20点)

発展

1. 定理33.1 の (2) から (1) で与えた距離が完備であることを示せ。(40点)
2. ベルンシュタイン集合を構成し、それがベール空間だがチェック完備でないことを示せ。(40点)

距離空間は何が特別なのか

◆ この章の問い

- ・距離があると仮定するとき、何を仮定しているのか。
- ・位相空間論の階層のなかで、距離空間はどこにいるのか。
- ・第VI部以降で距離だけを使うのは、何を捨てることなのか。

距離空間が満たす条件の全体

第5章から第33章までに導入した条件を、距離空間について総覧する。

定理34.1 距離空間が満たすこと

距離空間 (X, d) は次をすべて満たす。

分離 T_1 ・ハウスドルフ・正則・完全正則・正規・完全正規 (T_5)。

可算性 第一可算。第二可算・可分・リンデレーフの三つは互いに同値 (一般には別物)。

被覆 パラコンパクト。コンパクト・可算コンパクト・点列コンパクトの三つは互いに同値。

基底 σ -局所有限かつ σ -離散な基底をもつ。

その他 完備距離化可能なら、チェック完備でバール空間。

「距離空間である」という仮定は、これらすべてを一度に仮定している。解析学の定理が使う条件は、その一部にすぎない。

注意

同値になる組が二つあることに注目してほしい。可算性の三つと、コンパクト性の三つである。距離が「可算な目盛り」を与えることが、どちら

の同値の源でもある。第7章で可分と第二可算が一致した理由と、第25章でコンパクト性が一致した理由は同じである。

何が距離に固有なのか

逆向きに問う。距離空間の性質のうち、位相からは出ないものは何か。第30章の三層に照らして整理する。

例34.2 三層の振り分け

位相の層——連続・コンパクト・連結・分離公理・可算公理・次元。同相で保たれる。

一様構造の層——一様連続・完備・全有界・一様収束。同相では保たれないが、数値を使わずに言える。

距離の層——リプシッツ連続・ヘルダー連続・有界・直径・測地線・ハウスドルフ次元。数値そのものを使う。

注意

解析学で使う概念が、三層に散っていることに注意してほしい。第47章の一様連続と一様収束は一様構造の層、第48章の微分は距離の層（差の商を取るので数値が要る）、第46章の中間値定理は位相の層（連結性から出る）。

どの層の概念かを意識すると、定理の一般化の余地が見える。

距離化定理を振り返る

定理34.3 距離化の必要十分条件（まとめ）

X が距離化可能であることは、次のいずれとも同値である。

(1) 正則ハウスドルフかつ σ -局所有限な基底をもつ（ナガタースミルノフ、第32章）。

- (2) 正則ハウスドルフかつ σ -離散な基底をもつ (ビング、第32章)。
- (3) 第二可算な場合に限れば、正則ハウスドルフで足りる (ウリゾーン、第31章)。
- (4) パラコンパクトかつ局所距離化可能 (第32章の系)。

第32章★★★で述べた三つの要素——分離・可算的な近似・局所と大域の整合——が、どの条件にも現れている。

距離空間の位置——階層のどこにいるか



図34-1 距離化可能な空間は、位相空間の階層のもっとも内側にある。距離があると仮定すると、分離公理から被覆性質まで一度に仮定することになる。

第VI部への移行

ここから解析学に移る。第43章以降は、ほとんどの場面で距離空間——多くは $\mathbb{R}$ か $\mathbb{R}^n$ 、あるいはバナッハ空間——の上で議論する。

その選択が何を意味するかを、はっきりさせておく。

得るもの。定理34.1 のすべてが自動的に成り立つ。分離公理を毎回確認する必要がなく、可算性とコンパクト性の区別を気にせずに済み、ベール

の定理が使える（完備なら）。第II部と第III部で丁寧に区別した階層が、一つに潰れる。

捨てるもの。距離化できない空間が扱えない。具体的には次のものである。

非可算積——第11章の $\{0,1\}^I$ 、第21章の立方体 $[0,1]^{\aleph}$ 。第71章の弱*位相がこの形をとる。

弱位相——第70章。無限次元では距離化できない。**そこでは第12章のネットとフィルターに戻らなければならない。**

超関数の空間——第87章。局所凸だが距離化できない。第30章の一樣構造と擬距離の族が必要になる。

コンパクト化——第23章の $\beta\mathbb{N}$ 。第71章のバナッハ極限で顔を出す。

注意

したがって「距離空間に限る」という選択は、暫定的なものである。第IX部から第XI部では、繰り返し距離化できない空間に出会う。**そのとき第I部から第IV部で作った道具が必要になる**——これが位相空間論を先に置いた理由である。第97章でこの往復を地図にする。

★★ 学部後半 距離のない解析学はどこまで可能か

解析学のどこまでが位相だけで書けるのか。第VI部以降を先取りして、境界を引いておく。

位相だけで書けるもの。

連続関数の性質——中間値定理（連結性）、最大値定理（コンパクト性）、一樣連続性の自動成立（コンパクト性）。第46章と第47章で扱う。

収束の一般論——ネットとフィルター（第12章）。第50章の関数列の収束は、各点収束なら積位相、一樣収束なら一樣構造の話である。

コンパクト性による存在定理——第95章のアスコリー-アルツェラ、第71章のバナッハ-アラオグル。**どちらもコンパクト性から存在を出す。**

一様構造が要るもの。完備性を使う定理はすべてここに属する。第27章のバールのカテゴリー定理、第29章の縮小写像の不動点定理、第61章のリース-フィッシャーの定理 (L^p の完備性)。

これらは距離がなくても一様構造があれば成り立つ。ただし可算性が要る場面が多い——たとえばバールの定理は可算個の稠密開集合を扱う。

距離が要るもの。数値そのものを使う定理である。

微分——差の商 $(f(x+h) - f(x))/h$ に h の大きさが現れる。第48章。

不等式——第60章のヘルダーとミンコフスキー、第64章のコーシー-シュワルツ。**ノルムの値を比較するので、数値が本質的である。**

積分の評価——第55章の収束定理、第85章のプランシュレルの定理。

まとめ。位相空間論は解析学の「存在と一意性」を支え、距離は「評価と見積もり」を担う。一様構造はそのあいだで「近似」を担う。

第97章でこの分担を図にする。**本書の前半と後半が出会う場所が、まさにこの分担の境目である。**

★★★ 大学院 距離を一般化する方向

距離の公理を緩めると、別の構造が出てくる。本書では扱わないが、どこへ通じているかを記しておく。

擬距離—— $\rho(x, y) = 0$ で $x \neq y$ を許す。第30章★★で見た。 L^p 空間を作るときに、ほとんど至るところ一致する関数を同一視する前の段階がこれである (第60章)。

準距離——対称性を落とす。 $d(x, y) \neq d(y, x)$ を許す。**情報の順序を表すのに使われ、領域理論 (計算機科学) で現れる。**第13章★★★の特殊化前順序と接続する。

超距離——三角不等式を $d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$ に強める。 p -
距離がこれである。超距離空間は全不連結であり（第28章）、球が入れ
子か交わらないかのどちらかになる。

距離を測度に置き換える——第53章のルベーク測度は「大きさ」を測る
が、「遠さ」は測らない。二つは独立な構造である。第27章★★★で見た
「第一類」と「測度零」の食い違いが、その帰結の一つである。

ハウスドルフ距離と、空間の空間——コンパクト集合の全体に距離を入
れると、それ自体が距離空間になる。**グロモフ-ハウスドルフ距離は、距
離空間の全体に距離を入れる。**幾何学的群論とリーマン幾何学で使われ
る。

距離のない微分——微分は差の商を使うので距離が要ると述べた。だが
方向微分だけなら、ベクトル空間の構造と位相で足りる。

第87章のシュワルツ空間では、距離化できない位相の上で微分を扱う。
**そこでは「微分が連続作用素である」という形で、位相と微分が両立す
る。**

圏論的な見方。距離空間は、区間 $[0, \infty]$ を値とする「豊穡圏」として理
解できる。対象が点、射が距離という見方である。この立場では、距離空
間と位相空間と順序集合が、値をとる対象を変えただけの同じ構造にな
る。

本書はこの方向に進まない。だが「距離・一様構造・位相」という三層
が、本質的に「どれだけ細かい情報を保つか」の違いだという見通しは、
この見方から来ている。

第V部への接続。次の第V部では、空間の「大きさ」を基数で測り、「太
さ」を次元で測る。**どちらも距離を使わない——位相だけで定義される量
である。**

ところが第41章の一致定理は、可分距離空間で三つの次元が一致するこ
とを主張する。距離があると量が潰れるという、本章の主題がそこでも現
れる。

演習**基本**

1. 距離空間が完全正規であることを示せ（第18章★★★の式を使ってよい）。
2. 距離空間で第二可算と可分が一致することを示せ。
3. p -進距離が超距離であることを確かめよ。
4. 有界性が位相的な性質でないことを、具体例で示せ。

証明

1. 定理34.1 の可算性の三つが同値であることを、経路を明示して示せ。
(25点)
2. 解析学の主要概念を三層（位相・一様・距離）に分類し、各々について理由を述べよ。(25点)
3. 超距離空間が全不連結であることを示せ。(25点)

発展

1. 定理34.3 の四つの条件が互いに同値であることを、第31章と第32章の結果を組み合わせで示せ。(35点)
2. コンパクト距離空間の全体にハウスドルフ距離を入れると、それが距離空間になることを示せ。(35点)

第 V 部

基数不変量と次元論

位相

空間の「大きさ」を基数で測り、空間の「太さ」を次元で測る。 $\text{ind} \cdot \text{Ind} \cdot \text{dim}$ という三つの次元が、距離空間では一致し、一般には一致しない——この定理群が本書の第一の山である。

基数不変量——重み・稠密度・指標

◆ この章の問い

- ・「はい／いいえ」の条件を、量に変えると何が見えるのか。
- ・基数不変量のあいだには、どんな不等式が成り立つのか。
- ・空間の濃度は、局所的な量で押さえられるのか。

条件を量に変える

第7章で可算公理を三つ導入した。「可算な基底があるか」「可算な近傍基があるか」「可算な稠密集合があるか」。どれも「はい／いいえ」の問いだった。

「可算」という語を「濃度 κ 以下」に置き換えると、条件が量になる。

定義35.1 四つの基数不変量

位相空間 X （無限とする）について、

重みweight $w(X)$ 基底の濃度の最小値。

稠密度density $d(X)$ 稠密部分集合の濃度の最小値。

指標character $\chi(X)$ 各点の近傍基の濃度の最小値の上限。

セル数cellularity $c(X)$ 互いに交わらない空でない開集合の族の濃度の上限。

いずれも慣例として $\aleph_0$ を下限とする（有限空間で 0 にならないように）。

注意

第7章の条件は、これらの値が $\aleph_0$ であることにあたる。 $w(X) = \aleph_0$ が第二可算、 $\chi(X) = \aleph_0$ が第一可算、 $d(X) = \aleph_0$ が可分。三つの「はい／いいえ」が、三つの基数の値になった。

定義35.2 もう三つ

Lindelöf 数 $L(X)$ どの開被覆も濃度 $L(X)$ 以下の部分被覆をもつような最小の基数。

散布度 $s(X)$ 離散部分空間の濃度の上限。

拡がり $e(X)$ 離散閉部分空間の濃度の上限。

基本的な不等式**定理35.3**

任意の位相空間 X について、

$$d(X) \leq w(X), \quad \chi(X) \leq w(X), \quad c(X) \leq d(X), \quad e(X) \leq s(X), \quad L(X) \leq w(X)$$

が成り立つ。ハウスドルフ空間ではさらに $|X| \leq 2^{w(X)}$ 。

証明 $d(X) \leq w(X)$ 。基底 $\mathcal{B}$ (濃度 $w(X)$) の各元から点の一つ選べば稠密集合になる (第7章 命題7.7 の議論)。

$\chi(X) \leq w(X)$ 。 x を含む基底元の全体が近傍基になる。

$c(X) \leq d(X)$ 。 D を稠密集合、 $\{U_i\}$ を互いに交わらない空でない開集合の族とすると、各 U_i が D の点を含み、交わらないので異なる点である。よって族の濃度は $|D|$ 以下。

$L(X) \leq w(X)$ 。基底から被覆を選び直す議論 (第25章 定理25.3 (4)) の一般化。

$|X| \leq 2^{w(X)}$ 。 T_0 ならば、各点 x に「 x を含む基底元の集合」を対応させる写像が単射である。値域は $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ なので濃度 $2^{w(X)}$ 。 □

例35.4 具体的な値

$\mathbb{R}$ 。 $w = d = \chi = c = L = \aleph_0$ 。すべて可算である。

ゾルゲンフライ直線 $\mathbb{R}_\ell$ 。 $d = \chi = c = L = \aleph_0$ だが $w = 2^{\aleph_0}$ 。第7章で第二可算でないことを見たのが、この不等式が真であることの内容である。

$\{0, 1\}^I$ ($|I| = \kappa \geq \aleph_0$)。 $w = \kappa$ 、 $\chi = \kappa$ 、 $c = \aleph_0$ (後述)、 $d = \log \kappa$ (第37章)。セル数が可算にとどまるのが積空間の際立った性質である。

非可算離散空間 D (濃度 κ)。 $w = d = c = s = e = \kappa$ 、 $\chi = \aleph_0$ 、 $L = \kappa$ 。




図35-1 基数不変量のあいだの不等式。重みがもっとも大きく、そこから稠密度・指標・Lindelöf 数が押さえられる。距離空間では重みと稠密度が一致する。

距離空間では潰れる

命題35.5

距離空間 X について $w(X) = d(X) = L(X) = c(X)$ であり、 $\chi(X) = \aleph_0$ である。

証明 $\chi = \aleph_0$ は第一可算性 ($\{B(x, 1/n)\}$)。

$d \leq w$ は一般の不等式。 $w \leq d$ を示す。 D を稠密集合 (濃度 $d(X)$) とすると、 $\{B(x, q) \mid x \in D, q \in \mathbb{Q}^+\}$ が基底になる——第7章の議論の一般化である。濃度は $d(X) \cdot \aleph_0 = d(X)$ 。**有理半径という可算な目盛りが、ここでも効いている。**

$c \leq d$ は一般。 $d \leq c$ は、 $c(X)$ 個以下の交わらない球で覆えることから従う (極大な族を取る)。 L についても同様。 $\square$

注意

この命題が第34章の主題を数量的に述べたものである。距離空間では四つの量が一つに潰れる。**一般の空間で四つを区別する意味は、距離化できない空間を扱うときに初めて生じる。**

★★ 学部後半 空間の濃度を押さえる定理

定理35.3 の最後は $|X| \leq 2^{w(X)}$ だった。重みは大域的な量なので、この評価は粗い。局所的な量で押さえられないか。

アルハンゲリスキーの定理。ハウスドルフ空間 X について

$$|X| \leq 2^{L(X) \cdot \chi(X)}$$

とくに、リンデレーフかつ第一可算なハウスドルフ空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である。

なぜ意外か。第一可算性は各点のまわりの条件、リンデレーフ性は被覆の条件である。どちらも空間の大きさを直接には制限しない。それなのに、二つを合わせると濃度の上限が出る。

一九六九年にアルハンゲリスキー Arhangel'skii が示すまで、この問題は二十年以上未解決だった。ハウスドルフ空間の濃度を第一可算性から押さえる問題は、アレクサンドロフとウリゾーンが一九二三年に提起している。

証明の道具。証明は閉包構成法と呼ばれる手法による。長さ ω_1 の増加列 $\{F_\alpha\}$ を作り、各段で

(1) F_α の各点の近傍基から被覆を選び、(2) その補集合に点を足し、(3) 閉包を取る。

各段の濃度が $2^{\aleph_0}$ を超えないように制御する。 $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ により、**極限段で閉包が閉じる。**

第4章で導入した共終数が、ここでも決定的に働いている。第17章のチコフ板、第25章の $[0, \omega_1)$ と同じ構造である。

系。コンパクトハウスドルフかつ第一可算な空間の濃度は $2^{\aleph_0}$ 以下である(コンパクトならリンデレーフ)。したがって、そのような空間は連続体の濃度を超えられない。

関連する不等式。同じ方向の結果が多数ある。

$$|X| \leq 2^{c(X) \cdot \chi(X)} \quad (\text{正規ハウスドルフ}), \quad |X| \leq d(X)^{\chi(X)} \quad (\text{ハウスドルフ})$$

後者はポスピシル Pospíšil の不等式である。**どれも「局所的な量と大域的な量から、空間全体の大きさが決まる」という形をしている。**

第37章で積空間について同じ問いを扱う。そこで独立性が現れる。

★★★ 大学院 基数不変量の全体像と、独立な不等式

基数不変量は十数個が標準的に使われる。それらのあいだの関係を尽くすのが、この分野の仕事である。

主要な不変量。本章で導入した七つに加えて、

緊密度tightness $t(X)$ —— $x \in \overline{A}$ なら濃度 $t(X)$ 以下の $B \subseteq A$ で $x \in \overline{B}$ 。第12章の点列の議論を量化したものである。

π 重み π -weight $\pi w(X)$ ——どの空でない開集合もある元を含むような開集合の族の、最小濃度。

網重みnetwork weight $nw(X)$ ——開とは限らない集合の族で「基底の役割」を果たすものの最小濃度。

擬指標pseudocharacter $\psi(X)$ ——一点が $\psi(X)$ 個の開集合の交叉になる。

不等式の網。これらのあいだには数十の不等式が知られている。例を挙げる。

$$nw(X) \leq w(X), \quad t(X) \leq \chi(X), \quad c(X) \leq \pi w(X) \leq w(X)$$

$$w(X) \leq 2^{d(X)} \text{ (ハウスドルフ)}, \quad \psi(X) \leq \chi(X)$$

一部は証明でき、**一部は公理系から独立である。**

独立な例。「 $c(X) = \aleph_0$ ならば $|X| \leq 2^{\aleph_0}$ か」——ハウスドルフ空間では偽だが、正規なら？ この種の問いに独立なものが多い。

もっとも有名なのが第36章のスーリン問題である。「 $c(X) = \aleph_0$ と $d(X) = \aleph_0$ は、順序位相をもつ連結な空間で一致するか」という形に書ける。

積での振る舞い。不変量が積でどうなるかも独立性の宝庫である。

$c(X \times Y) = \max(c(X), c(Y))$ は成り立つか。

成り立つかどうかは公理に依存する。第37章で扱う。

なぜ独立性が多いのか。基数不変量は「どれだけの個数で足りるか」を問う。そして個数の比較は、可算と非可算の境界で集合論に触れる。

第4章で共終数と連続体仮説を導入し、第17章と第26章で反例に使い、第32章で距離化問題の限界として見た。**第V部は、その構造を正面から測る部である。**

次元論との関係。第38章以降で扱う次元も、一種の不変量である。ただし値が自然数に限られる。

「大きさ」を測るのが基数不変量、「太さ」を測るのが次元——**どちらも位相だけで定義され、距離を使わない。**そして第41章の一致定理は、距離があると三つの次元が潰れることを述べる。本章の **命題35.5** と同じ構図である。

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ の四つの基数不変量を求めよ。
2. 濃度 κ の離散空間について、七つの不変量を求めよ。
3. $c(X) \leq d(X)$ を示せ。
4. ゴルゲンフライ直線で $w \neq d$ であることを述べよ。

証明

1. 定理35.3 の $|X| \leq 2^{w(X)}$ を、 T_0 をどこで使うか明示して示せ。(20点)
2. 命題35.5 の $w \leq d$ を示せ。(20点)
3. $L(X) \leq w(X)$ を示せ。(15点)

発展

1. アルハンゲリスキーの不等式 $|X| \leq 2^{L(X)\chi(X)}$ の主張を述べ、コンパクト第一可算ハウスドルフ空間について何が言えるかを説明せよ。(30点)
2. ハウスドルフ空間について $w(X) \leq 2^{d(X)}$ を示せ。(35点)

セル数とスーリン問題

◆ この章の問い

- ・実数直線の特徴づけるのに、可分性は外せないのか。
- ・「交わらない開集合は可算個しかない」という条件は、可分性より弱いのか。
- ・公理系から決まらない位相的な問いとは、どういうものか。

実数直線の特徴づけ

カントールの定理がある。実数直線は、順序の性質だけで特徴づけられる。

定理36.1 カントールによる実数直線の特徴づけ

全順序集合 L (順序位相を入れる) が次をすべて満たすなら、 L は $\mathbb{R}$ と順序同型である。

- (1) 稠密——任意の二点のあいだに点がある。
- (2) 端点をもたない。
- (3) 連結——すなわち順序について完備 (有界集合が上限をもつ)。
- (4) 可分——可算な稠密部分集合をもつ。

注意

(4) が $\mathbb{Q}$ の役割を果たしている。可算な稠密集合があれば、それが $\mathbb{Q}$ と順序同型になり (カントールの背進法)、その完備化として $L \cong \mathbb{R}$ が従う。

スーリン Souslin が一九二〇年に問うた。(4)を、より弱い条件に置き換えられないか。

定義36.2 可算鎖条件

位相空間 X が可算鎖条件 (ccc) を満たすとは、互いに交わらない空でない開集合の族がつねに可算であることをいう。第35章の記号では $c(X) = \aleph_0$ 。

命題36.3

可分ならば可算鎖条件を満たす。逆は一般には成り立たない。

証明 第35章の $c(X) \leq d(X)$ による。

逆の反例。 $\{0, 1\}^I$ ($|I| > 2^{\aleph_0}$) は可算鎖条件を満たすが (第37章で示す)、可分でない。ただしこれは順序位相をもつ空間ではない。 $\square$

スーリン問題

問題36.4 スーリン問題

定理36.1 の (4) を「可算鎖条件」に置き換えても、 $L \cong \mathbb{R}$ が従うか。

定義36.5

(1) (2) (3) と可算鎖条件を満たすが可分でない全順序集合を、スーリン直線という。スーリン問題は「スーリン直線が存在しないか」と同じである。

定理36.6

スーリン直線の存在は、集合論の公理系から証明も反証もできない。

(1) 構成可能性公理 $V = L$ のもとでは、スーリン直線が存在する (イェンセン)。

(2) マーティンの公理と連続体仮説の否定のもとでは、スーリン直線は存在しない (ソロヴェイ-テネンバウム)。

注意

この定理は、第4章★★★★で予告したことの実例である。「実数直線の特徴づけるのに可分性は外せるか」という素朴な問いが、公理系から決まらない。**未解決ではない——独立であることが決着している。**

スーリン木への翻訳

証明は直接には行われない。問題を木の言葉に翻訳する。

定義36.7 スーリン木

半順序集合 T が木であるとは、各元より下の元の全体が整列していることをいう。 T の高さが ω_1 で、**鎖も反鎖もすべて可算**であるとき、 T をスーリン木という。

定理36.8

スーリン直線が存在することと、スーリン木が存在することは同値である。

証明 骨子だけ述べる。**直線から木へ**。スーリン直線 L から、区間を細分していく過程を木として記録する。 ω_1 段まで細分できる (可分でないから) が、各段の区間の族は可算鎖条件より可算である——これが反鎖の可算性になる。

木から直線へ。スーリン木の枝の全体に辞書式順序を入れる。**反鎖が可算であることが可算鎖条件に、鎖が可算であることが可分でないことに翻訳される。**

細部には、木を正規化する（各段で分岐が二つ、各元の上に ω_1 個の元がある）操作が要る。□

スーリン木——高さ ω_1 で、鎖も反鎖も可算



図36-1 高さ ω_1 の木で、鎖も反鎖も可算なもの。この両立が可能かどうか、スーリン問題の核心である。存在するモデルと存在しないモデルの両方が作られている。

位相的な帰結

例36.9 スーリン直線が存在するとどうなるか

可算鎖条件が積で壊れる。 L をスーリン直線とすると、 $L \times L$ は可算鎖条件を満たさない。したがって「可算鎖条件は積で保たれるか」という問いも、公理に依存する（第37章）。

遺伝的リンデレーフと遺伝的可分が分かれる。スーリン直線は遺伝的リンデレーフだが遺伝的可分でない、あるいはその逆になる。**通常の空間ではこの二つが一致しがちだが、スーリン直線が分ける。**

第一可算で完全正規な非距離化空間。スーリン直線は第一可算・完全正規・連結・可算鎖条件を満たすが距離化できない。第31章で挙げた条件の組み合わせに、もう一つ反例が加わる。

★★ 学部後半 マーティンの公理

スーリン問題の解決に使われたマーティンの公理 MA は、それ自体が位相的な意味をもつ。内容を述べておく。

主張。 $\kappa < 2^{\aleph_0}$ とする。 MA_κ は次を主張する。可算鎖条件を満たす半順序集合 P と、 κ 個以下の稠密部分集合の族 $\{D_\alpha\}$ に対し、すべての D_α と交わるフィルターが存在する。

MA はすべての $\kappa < 2^{\aleph_0}$ についての主張である。

連続体仮説との関係。 $\text{MA}_{\aleph_0}$ は定理である（ラシオワ-シコルスキの補題）。連続体仮説を仮定すると MA は自動的に成り立つ（ $\kappa < 2^{\aleph_0} = \aleph_1$ なら $\kappa = \aleph_0$ ）。

したがって MA が面白いのは、連続体仮説を否定したときである。

ベールの定理の一般化。 $\text{MA}_{\aleph_0}$ は、実はベールのカテゴリー定理（第27章）の言い換えである。 MA は「可算個」を「連続体未満の個数」に強めたベールの定理である。

この見方をすると、位相的な内容が見えてくる。 MA のもとでは、可算鎖条件を満たす空間で「連続体未満個の稠密開集合の交叉が稠密」になる。

位相的な帰結。 MA + 連続体仮説の否定のもとで、次が成り立つ。

スーリン直線が存在しない（本章）。可算鎖条件が積で保たれる（第37章）。濃度 $\aleph_1$ の集合はルベグ測度零（第53章に關係）。第一類集合の $\aleph_1$ 個の合併は第一類。

MA は「 $\aleph_1$ が可算のように振る舞う」ことを保証する。

強制法の影。 MA の無矛盾性は、反復強制法で示される。強制法とは、集合論のモデルに新しい対象を「付け加える」手法である。

本書はこの技法に立ち入らない。だが第V部で扱う独立な命題は、どれもこの手法で扱われていることは記しておく。

★★★ 大学院 菱形原理と、スーリン木の構成

存在する側の証明を、骨格だけ見ておく。イェンセン Jensen の菱形原理 $\diamond$ から構成する。

菱形原理。 $\{A_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ ($A_\alpha \subseteq \alpha$) が存在して、どの $A \subseteq \omega_1$ についても $\{\alpha \mid A \cap \alpha = A_\alpha\}$ が定常集合になる、という主張である。

「 ω_1 のすべての部分集合を、可算段階で先読みできる」と読める。 $\diamond$ は連続体仮説を含意し、 $V = L$ のもとで成り立つ。

構成の骨子。 ω_1 段の木を超限帰納法で作る。各段 α で、後続段——各元の上に二つの元を置く。極限段——下の段の枝のうち、いくつかを延ばす。

問題は、極限段でどの枝を延ばすかである。すべて延ばすと反鎖が大きくなり、延ばさなすぎると木が途切れる。

菱形原理の使い方。極限段 α で、 A_α が「これまでに作った木の非可算反鎖の候補」を表しているとみなす。その候補を潰すように枝を選ぶ。

定常性により、どの非可算反鎖も、ある段で A_α として捉えられる。その段で潰されるので、最終的に非可算反鎖は存在しない。

鎖が可算であることは、各段の構成から従う（各元の上に ω_1 個の元があるようにすれば、一本の枝が ω_1 まで届かない）。

何が起きているのか。菱形原理は「未来を先読みする」能力を与える。超限帰納法の各段で、これから起こりうる「悪いこと」を一つずつ潰していく。

第4章で超限帰納法を導入したとき、「各段で条件を満たすものを選ぶ」と述べた。菱形原理は、その選択を賢く行うための道具である。

対照的に。マーティンの公理は逆向きに働く。「どんな悪い候補も、十分に一般的なフィルターで回避できる」と主張する。

菱形原理は病理を作り、マーティンの公理は病理を消す。**二つの公理が、位相空間論の同じ問いに反対の答えを与える。**

本書の方針。第4章で述べたとおり、独立な命題は「未解決」とは書かない。スーリン問題は決着している——独立であることが証明されている。

第42章で次元論の反例を扱うとき、同種の状況に再び出会う。**そこでは次元という素朴な概念が、公理に依存する場面が現れる。**

演習

基本

1. $\mathbb{R}$ が可算鎖条件を満たすことを示せ。
2. 可分ならば可算鎖条件を満たすことを示せ。
3. 非可算離散空間が可算鎖条件を満たさないことを示せ。
4. スーリン直線の定義を述べ、それが $\mathbb{R}$ と同型でない理由を述べよ。

証明

1. 定理36.1 の証明の骨子（背進法）を述べよ。（25点）
2. スーリン直線が存在すれば $L \times L$ が可算鎖条件を満たさないことを示せ。（30点）
3. スーリン木の定義から、鎖と反鎖の可算性が直線の側の何に対応するかを説明せよ。（25点）

発展

1. マーティンの公理 $\mathbf{MA}_{\aleph_0}$ がベールのカテゴリー定理と同値であることを説明せよ。（35点）
2. 定理36.8 の「直線から木へ」の方向を、区間の細分として構成せよ。（40点）

積空間の基数不変量

◆ この章の問い

- ・積を取ると、基数不変量はどう変わるのか。
- ・非可算個の可分空間の積が可分になることがあるのは、なぜか。
- ・可算鎖条件は積で保たれるのか。

素朴な予想が外れる

第19章で保存の表を作った。可分性は積で保たれると書いたが、条件がついていた。ここで正確に述べる。

定理37.1 ヒューイット-マルチェフスキ-ボンディチュェリの定理

$|I| \leq 2^{\aleph_0}$ のとき、可分空間の族 $\{X_i\}_{i \in I}$ の積 $\prod_{i \in I} X_i$ は可分である。

証明 $I = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (カントール集合の点全体) としてよい。各 X_i の可算稠密集合を $D_i = \{d_{i,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ とする。

稠密集合を作る。有限個の互いに交わらない基本開集合

$C_1, \dots, C_k \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (すなわち有限個の座標を固定して決まる集合)

と、自然数 $n_1, \dots, n_k$ の組に対し、点

$p = p(C_1, \dots, C_k; n_1, \dots, n_k) \in \prod_i X_i$ を

$$p_i = \begin{cases} d_{i,n_j} & (i \in C_j) \\ d_{i,0} & (\text{どの } C_j \text{ にも入らない}) \end{cases}$$

と定める。そのような組は可算個しかない——有限個の基本開集合の選び方も、自然数の組も可算だからである。**よってこれらの点の全体 D は可算。**

稠密性。 積の基本開集合 $\prod_i U_i$ (有限個 $i_1, \dots, i_k$ を除き $U_i = X_i$) を取る。 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ はハウスドルフなので、 $i_1, \dots, i_k$ を分離する互いに交わらない基本開集合 $C_1, \dots, C_k$ ($i_j \in C_j$) が取れる。

各 j について $d_{i_j, n_j} \in U_{i_j}$ なる n_j を選ぶ (D_{i_j} が稠密だから)。すると $p(C_1, \dots, C_k; n_1, \dots, n_k) \in \prod_i U_i$ 。□

注意

証明の鍵は、添字集合 I 自身に位相を入れて、有限個の添字を「分離」することである。 $|I| \leq 2^{\aleph_0}$ という条件は、 I がカントール集合に埋め込めることを意味している。カントール集合は可算個の基本開集合で任意の有限個の点を分離できる——これが可算な稠密集合を作る余地を与える。

反例37.2 濃度を超えると壊れる

$|I| > 2^{\aleph_0}$ のとき、 $\{0, 1\}^I$ は可分でない。

証明。 D を可算稠密集合とする。各 $i \in I$ に、 $\{d \in D \mid d_i = 0\}$ を対応させる。 $i \neq j$ なら、 $p_i^{-1}(0) \cap p_j^{-1}(1)$ が空でない開集合なので D と交わり、対応する集合は異なる。よって $|I| \leq |\mathcal{P}(D)| = 2^{\aleph_0}$ 。

この評価は 定理37.1 とちょうど噛み合う。可分性が保たれる限界が、正確に $2^{\aleph_0}$ である。

積の重みと指標

定理37.3

$\{X_i\}_{i \in I}$ を無限空間の族とする。

$$w\left(\prod_{i \in I} X_i\right) = |I| \cdot \sup_i w(X_i), \quad \chi\left(\prod_{i \in I} X_i\right) = |I| \cdot \sup_i \chi(X_i)$$

証明 $\leq$. 基本開集合は「有限個の座標を、各座標の基底元で制限する」形である。その個数は $|I|^{<\omega} \cdot (\sup_i w(X_i))^{<\omega} = |I| \cdot \sup_i w(X_i)$ で押さえられる（無限基数の有限冪はそれ自身）。

$\geq$. 各射影が開写像なので、 $w(X_i) \leq w(\Pi)$ 。また $|I| \leq w(\Pi)$ は、各座標で二つの開集合を区別する基底元が必要なことによる。

指標も同様。積では重みと指標がどちらも添字集合の濃度まで上がる。


□

注意

この定理が、 $\{0, 1\}^I$ (I 非可算) が第一可算でない理由である（第11章の演習）。 $\chi = |I|$ だから。

一方、稠密度とセル数は、この単純な式に従わない。積で「**上がりにくい**」不変量がある——それが次節の主題である。

積で上がるもの、上がらないもの



可算鎖条件が積で保たれる理由

△系補題（デルタシステム）

非可算個の有限集合の族からは、共通部分が同じ非可算な部分族が取れる

基本開集合は有限個の座標しか使わない

→ 非可算な反鎖があれば、根が同じ部分族が取れ、そこで矛盾が出る

一般の積では独立

「可算鎖条件は積で保たれるか」

スーリン直線があれば 偽

スーリン直線の平方が可算鎖条件を満たさない（第36章）

マーティンの公理のもとでは 真

公理+連続体仮説の否定のもとで保たれる

→ この間も公理系から決まらない

図37-1 二点集合を κ 個かけた空間では、重みと指標は κ まで上がるが、稠密度は κ の対数程度にとどまり、セル数はまったく上がらない。

可算鎖条件は積で保たれるか

定理37.4

可分空間の族の積は、添字集合の濃度によらず可算鎖条件を満たす。とくに $\{0, 1\}^I$ はどんな I についても可算鎖条件を満たす。

証明 定理37.1 により、添字集合を濃度 $2^{\aleph_0}$ 以下の部分に分けると各部分の積は可分である。

非可算な反鎖 $\{U_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ があったとする。各 U_α は基本開集合を含むとしてよく、その基本開集合が使う座標の有限集合を F_α とする。

Δ系補題。 非可算個の有限集合の族 $\{F_\alpha\}$ からは、非可算な部分族 $\{F_\beta\}_{\beta \in B}$ で「どの二つの共通部分も同じ集合 R (根) になる」ものが取れる。

この部分族について考える。 R は有限だから、 $\prod_{i \in R} X_i$ は可分(有限積)であり、 R 上での制限が同じになる β が非可算個ある。

ところが R の外では座標が互いに素だから、二つの基本開集合は交わってしまう。反鎖であることに反する。 $\square$

注意

Δ系補題(デルタシステム補題)が要である。「非可算個の有限集合を集めると、必ず同じ根をもつ非可算な部分族が取れる」——組合せ論の定理である。積位相の基本開集合が有限個の座標しか使わないという性質(第11章)が、この補題を使える形にしている。

反例37.5 一般には保たれない

可分でない可算鎖条件空間の積では、可算鎖条件が壊れることがある。スーリン直線 L がその例である（第36章）—— L は可算鎖条件を満たすが $L \times L$ は満たさない。

したがって「可算鎖条件は積で保たれるか」という問いは、公理系から決まらない。スーリン直線が存在すれば偽、マーティンの公理と連続体仮説の否定のもとでは真である。

★★ 学部後半 Δ系補題

前節で使った補題を、正確に述べて証明する。組合せ論的な議論の典型である。

主張。 $\{F_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$ を有限集合の族とする。非可算な $B \subseteq \omega_1$ と有限集合 R が存在して、 $\alpha \neq \beta \in B$ なら $F_\alpha \cap F_\beta = R$ 。

証明。まず、非可算個の F_α が同じ濃度 n をもつとしてよい（可算個の濃度しかないので、鳩の巣原理）。 n についての帰納法で示す。

$n = 1$ のとき。 $F_\alpha = \{x_\alpha\}$ 。もし非可算個が同じ点なら R はその点、そうでなければ互いに素なので $R = \emptyset$ 。

$n > 1$ のとき。二つの場合に分ける。

場合1——ある点 x が非可算個の F_α に属する。それらについて $F_\alpha \setminus \{x\}$ に帰納法の仮定を適用し、得られた根に x を足す。

場合2——どの点も可算個の F_α にしか属さない。このとき互いに素な非可算部分族が取れる。超限帰納法で α_ξ を選ぶ——すでに選んだ $\bigcup_{\eta < \xi} F_{\alpha_\eta}$ は ($\xi < \omega_1$ なら) 可算集合だから、その各点を含む F_α も可算個であり、まだ ω_1 個の候補が残っている。

共終数がどこで効くか。場合2で「可算個を除いてもまだ非可算個残る」と言った。これは $\text{cf}(\omega_1) > \omega$ による。

第4章の共終数が、ここでも働いている。第17章のチコノフ板、第25章の $[0, \omega_1)$ 、第35章★★のアルハンゲリスキーの定理、そしてこの補題——すべて同じ事実に立っている。

一般化。 ω_1 を正則な非可算基数 κ に、有限集合を濃度 $< \kappa$ の集合に置き換えても成り立つ (κ が適当な条件を満たせば)。

用途。 Δ 系補題は、積空間の議論のほとんどで使われる。「非可算個の基本開集合があれば、共通の座標集合をもつ非可算部分族が取れる」——この形で、座標の有限性を大域的な結論に変える。

第41章の次元の一致定理でも、被覆の議論で類似の手法が現れる。

★★★ 大学院 稠密度の対数的な振る舞い

定理37.1 は $|I| \leq 2^{\aleph_0}$ で可分性が保たれることを示した。その先はどうなるのか。

正確な値。ハウスドルフ空間の積について

$$d\left(\prod_{i \in I} X_i\right) \leq \log |I| \cdot \sup_i d(X_i)$$

ここで $\log \kappa$ は $2^\lambda \geq \kappa$ なる最小の基数 λ を表す。 $\{0, 1\}^I$ については等号が成り立つ。

定理37.1 は $\log(2^{\aleph_0}) = \aleph_0$ の場合にあたる。反例37.2 は $|I| > 2^{\aleph_0}$ なら $\log |I| > \aleph_0$ であることを述べている。

なぜ対数なのか。直観はこうである。稠密集合の点は、各座標について「どこにいるか」の情報をもつ。 $|D|$ 個の点で $|I|$ 個の座標を区別するには、 $2^{|D|} \geq |I|$ が必要になる。

反例37.2 の証明が、まさにこの数え上げである。稠密集合の濃度が、添字集合の濃度の対数として現れる。

連続体仮説との関係。 $\log$ の値は連続体仮説に依存する。 $\kappa = \aleph_1$ のとき、連続体仮説のもとでは $\log \aleph_1 = \aleph_0$ だが、 $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ なら $\log \aleph_1 = \aleph_0$ でもある ($2^{\aleph_0} \geq \aleph_1$ だから)。

より大きい κ では、 $\log \kappa$ の値が基数冪の振る舞いに依存する。**第4章で述べた「冪だけが難しい」という事実が、位相の量として現れている。**

セル数の不変性。対照的に、セル数は積でまったく上がらない（可分な成分の場合）。これは Δ 系補題という組合せ論的な事実による——集合論の公理には依存しない。

しかし一般の可算鎖条件空間の積では独立になる。「**可分**」と「**可算鎖条件**」の差が、**ここで効いている。**第36章のスーリン問題が、まさにその差を問うていた。

まとめ。三つの不変量が、積に対して三通りに振る舞う。

重みと指標——線型に上がる ($|I|$ まで)。

稠密度——対数的に上がる。値は基数冪に依存する。

セル数——上がらない。ただし成分が可分でないと独立命題になる。

第38章からは次元に移る。**次元も積で上がるが、その上がり方には不等式しか知られていない**——第42章で見る。

演習

基本

1. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ が可分であることを示せ。
2. $\{0, 1\}^I$ の重みと指標を求めよ。
3. 有限積で稠密度が最大値になることを示せ。
4. Δ 系補題の主張を述べ、 $n = 1$ の場合を示せ。

証明

1. 反例37.2 を、写像が単射である理由を明示して示せ。(25点)
2. 定理37.3 の $\leq$ の向きを示せ。(25点)
3. Δ 系補題を、場合分けと超限帰納法を明示して証明せよ。(35点)

発展

1. 定理37.1 を、添字集合をカントール集合と同一視する部分を明示して完全に示せ。(40点)
2. 定理37.4 を、 Δ 系補題をどこで使うか明示して示せ。(35点)

小さい帰納的次元 ind

◆ この章の問い

- ・「次元」を、開集合だけでどう定義するのか。
- ・なぜ境界の次元を使う再帰的な定義になるのか。
- ・この定義は、直線を1次元、平面を2次元と判定するか。

次元を位相で定義する

直線は1次元、平面は2次元、空間は3次元である。これを座標を使わずに言いたい。

手がかりは境界にある。直線上の点のまわりには、境界が二点（0次元）の近傍が取れる。平面上の点のまわりには、境界が円（1次元）の近傍が取れる。

したがって、次元を「境界の次元より1大きい」と再帰的に定義すればよい。出発点は空集合で、その次元を -1 と約束する。

定義38.1 小さい帰納的次元

正則空間 X について、小さい帰納的次元 $\text{ind } X$ を次のように定める。

- (1) $\text{ind } X = -1 \iff X = \emptyset$ 。
- (2) $\text{ind } X \leq n$ とは、各点 x と各近傍 $U \ni x$ に対し、開集合 V で

$$x \in V \subseteq U, \quad \text{ind } (\partial V) \leq n - 1$$

となるものが存在することをいう。

- (3) $\text{ind } X = n$ とは、 $\text{ind } X \leq n$ かつ $\text{ind } X \leq n - 1$ でないことをいう。どの n でも $\leq n$ でないとき $\text{ind } X = \infty$ 。

注意

この定義は局所的である。**各点のまわりで、境界の小さい近傍が取れるかを問う。**正則性を仮定するのは、近傍を縮める操作（命題14.2）が要るからである。

命題38.2

$\text{ind } X = 0$ であることと、開かつ閉な集合が基底をなすこと（零次元、第28章★★★）は同値である。

証明 $\text{ind } X \leq 0$ とは、各点の各近傍のなかに $\partial V = \emptyset$ なる開集合 V が取れることである。 $\partial V = \overline{V} \setminus V^\circ = \emptyset$ は V が開かつ閉であることと同値。□

基本的な値

例38.3 いくつかの空間の ind

$\text{ind} = 0$ 。 $\mathbb{Q}$ 、無理数全体、カントール集合、離散空間、 $\{0, 1\}^I$ 、 $\beta\mathbb{N}$ 。どれも全不連結である。

$\text{ind } \mathbb{R} = 1$ 。各点 x と近傍 $(a, b) \ni x$ に対し、 $V = (c, d)$ ($a < c < x < d < b$) を取れば $\partial V = \{c, d\}$ で、これは離散空間だから $\text{ind} = 0$ 。**よって $\text{ind } \mathbb{R} \leq 1$ 。**

$\text{ind } \mathbb{R} \neq 0$ は、 $\mathbb{R}$ が連結だから（開かつ閉な集合が自明なものしかない）。

$\text{ind } \mathbb{R}^n = n$ 。 $\leq n$ は開球を取れば従う（境界は S^{n-1} ）。 **$\geq n$ のほうが難しく、第41章で扱う。**

注意

$\text{ind } \mathbb{R}^n \geq n$ を示すのは、この分野の中心的な難所である。ブラウワーの領域不変性定理（ $\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は $n \neq m$ なら同相でない）と同値な内容

をもつ。位相の言葉だけでは出ず、代数的な道具か、綿密な組合せ論が必要になる。

基本的な性質

定理38.4


- (1) ind は位相的性質である（同相で保たれる）。
- (2) ind は遺伝的である。すなわち $A \subseteq X$ なら $\text{ind } A \leq \text{ind } X$ 。
- (3) $\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$ （可分距離空間で）。
- (4) 可分距離空間 X について、 $\text{ind } X \leq n$ ならば X は $n + 1$ 個の零次元集合の合併である（分解定理）。

証明 (1) 定義が開集合と境界だけを使うので明らか。

(2) n についての帰納法。 $x \in A$ 、 U を A での近傍とすると $U = U' \cap A$ (U' は X で開)。 X で $x \in V \subseteq U'$ 、 $\text{ind } \partial V \leq n - 1$ なる V を取る。 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ であり、帰納法の仮定より右辺の ind は $n - 1$ 以下。境界が制限で小さくなることが、遺伝性の鍵である。

(3) と (4) は第41章で扱う。 $\square$

境界の次元より一つ大きい——再帰的な定義



定義の構造

ind $\emptyset = -1$ これが再帰の底

ind $X \leq n$ 各点の各近傍のなかに、境界の ind が $n-1$ 以下の開集合が取れる

局所的な定義——各点のまわりだけを見る

大域的に定義した ind (第39章)、被覆で定義した dim (第40章) と比べることになる

図38-1 点のまわりに、境界がより低次元の近傍が取れるか。この再帰で次元を定義する。上からの評価は易しく、下からの評価が難所になる。

零次元空間

定理38.5

空でない可分距離空間 X について、次は同値である。

- (1) $\text{ind } X = 0$ 。
- (2) X は開かつ閉な可算基底をもつ。
- (3) X はカントール集合 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ の部分空間と同相。

さらに、これらが成り立つとき X は全不連結である。ただしその逆は成り立たない。

証明 (1) と (2)。命題38.2 により $\text{ind } X = 0$ は開かつ閉な基底の存在と同値である。可分距離空間は第二可算 (第34章) なので、その基底から可算部分族を選んで、なお基底であるようにできる。

(2) から (3)。開かつ閉な可算基底 $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を取り、 $e(x) = (\chi_{B_n}(x))_n \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ と定める。各 B_n が開かつ閉だから χ_{B_n} は

連続であり、 e は連続。 $x \neq y$ なら一方だけを含む B_n があるので単射。像の上での逆写像の連続性も、 $e(B_n)$ が像のなかで開であることから従う。

(3) から (1) 。カントール集合は開かつ閉な基底をもち、この性質は部分空間に遺伝する (**定理38.4** (1)) 。

全不連結性。開かつ閉な集合が基底なら、異なる二点を開かつ閉な集合で分離でき、連結成分は一点になる。□ □

反例38.6 全不連結でも零次元でない——エルデシュ空間

第28章★★★で見たエルデシュ Erdős 空間

$$E = \{x \in \ell^2 \mid \text{すべての座標 } x_n \text{ が有理数}\}$$

は可分距離空間であり、全不連結だが $\text{ind } E = 1$ である。つまり **定理38.5** の最後の含意は、逆向きには可分距離空間でも成り立たない。

「**連結成分が一点**」と「**開かつ閉な基底がある**」は、別の条件である。両者が一致するのはコンパクトハウスドルフ空間の場合であり (第28章の演習)、そこでは全分離性も加わって三つが同値になる。

例38.7 零次元空間の分類 (可分距離)

カントール集合。コンパクトで完全 (孤立点がない) な零次元空間は、すべてカントール集合と同相である (ブラウワーの定理) 。

$\mathbb{Q}$ 。可算で孤立点をもたない零次元距離空間は、すべて $\mathbb{Q}$ と同相である (シェルピンスキの定理) 。

無理数全体。完備距離化可能・零次元・孤立点なし・どのコンパクト部分集合も内部が空、という空間は $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ と同相である (アレクサンドロフ・ウリゾーンの定理) 。

零次元の世界は、驚くほど整理されている。1次元以上ではこの種の完全な分類はない。

★★ 学部後半 ind が加法的でない

次元には「和の公式」があってほしい。だが ind は素直に振る舞わない。

部分集合への分解。定理38.4 (4) の分解定理は、 $\text{ind } X \leq n$ なら $X = Z_0 \cup \cdots \cup Z_n$ (各 Z_k は零次元) と書けることを述べる。逆も成り立つ—— $n + 1$ 個の零次元集合の合併なら $\text{ind} \leq n$ 。

したがって $\text{ind } X$ は「零次元集合で何枚に分けられるか」を測っている。

和の公式。この分解から、 $X = A \cup B$ について

$$\text{ind}(A \cup B) \leq \text{ind } A + \text{ind } B + 1$$

が従う (可分距離空間で)。右辺の $+1$ は外せない。 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ がその例で、左辺が 1、右辺が $0 + 0 + 1 = 1$ である。

積の公式。定理38.4 (3) の不等式

$$\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$$

も等号とは限らない。ポントリャーギン Pontryagin が一九三〇年に、 $\text{ind } X = \text{ind } Y = 2$ なのに $\text{ind}(X \times Y) = 3$ という例を作った。

第42章でこの例を扱う。次元が「足し算で決まらない」のは、次元論のもっとも驚くべき事実の一つである。

なぜ素直でないのか。ind は局所的な定義である。各点のまわりの境界しか見ていない。

積を取ると、点のまわりの構造が座標ごとの情報の組合せになるが、境界の取り方に自由度が残り、最良の取り方が座標ごとに独立とは限らない。

この不便さが、第39章で Ind (大域的な定義) を導入する動機の一つである。

★★★ 大学院 次元を測る三つの流儀

本書では三つの次元を扱う。それぞれ何を測っているのかを先に述べておく。

ind (小さい帰納的次元) —— 本章。点と閉集合を、低次元の境界で分ける。局所的。ウリゾーンとメンガー Menger による (一九二二-二三)。

Ind (大きい帰納的次元) —— 第39章。閉集合と閉集合を、低次元の境界で分ける。大域的。チェック Čech による (一九三二)。

dim (被覆次元) —— 第40章。開被覆を、重なりが $n + 1$ 以下の細分に置き換えられるか。被覆的。ルベーク Lebesgue の着想をチェックが定式化した。

三つの関係。一般に

$$\text{ind } X \leq \text{Ind } X, \quad \text{dim } X \leq \text{Ind } X$$

が成り立つ (正規空間で)。**可分距離空間では三つすべてが一致する** —— これが第41章の一致定理である。

一般の空間では一致しない。第42章で反例を扱う。

第II部・第III部との対応。 三つの流儀は、分離公理と被覆性質の区別に対応している。

ind は「点と閉集合」を分ける —— 正則性 (第14章) の水準である。

Ind は「閉集合と閉集合」を分ける —— 正規性 (第15章) の水準である。

dim は被覆を扱う —— パラコンパクト性 (第24章) の水準である。

第II部と第III部で丁寧に区別した階層が、次元の三つの定義としてそのまま再現されている。

なぜ三つとも必要か。それぞれ得意な場面が違う。

ind は定義が直観的で、零次元の理論が美しい。Ind は和の公式が素直に成り立つ。dim は被覆の言葉なので、パラコンパクト性と相性がよく、写像による評価がしやすい。

そして三つが一致する場面（可分距離空間）では、どれを使ってもよい。第41章でその範囲を確定させる。

ハウスドルフ次元との違い。フラクタルで使われるハウスドルフ次元は、**位相的でない——距離に依存する。**カントール集合の位相次元は 0 だが、ハウスドルフ次元は $\log 2 / \log 3 \approx 0.63$ である。

第34章の三層で言えば、位相次元は位相の層、ハウスドルフ次元は距離の層に属する。本書は位相次元だけを扱う。

演習

基本

1. $\text{ind } \mathbb{Q} = 0$ を示せ。
2. $\text{ind } \mathbb{R} \leq 1$ を示せ。
3. 離散空間の ind を求めよ。
4. カントール集合の ind を求めよ。

証明

1. 命題38.2 を示せ。(15点)
2. 定理38.4 (2) を、 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ を確かめながら示せ。(25点)
3. 定理38.5 の (1) から (3) を示せ。(30点)
4. 反例38.6 について、 E が全不連結であることを示せ ($\text{ind } E = 1$ は難しい)。(30点)

発展

1. $\text{ind}(\mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) = 1$ が、和の公式 $\text{ind}(A \cup B) \leq \text{ind } A + \text{ind } B + 1$ の $+1$ が外せないことを示す例になっていることを説明せよ。(30点)
2. コンパクトで完全な零次元可分距離空間がカントール集合と同相であることを示せ。(40点)

大きい帰納的次元 Ind

◆ この章の問い

- ・点ではなく閉集合から始めると、何が変わるのか。
- ・大域的に定義した次元のほうが、なぜ扱いやすいのか。
- ・二つの帰納的次元は、いつ一致するのか。

点を閉集合に置き換える

第38章の ind は「点と近傍」を扱った。正則性の水準である。

点を閉集合に置き換えると、正規性の水準になる。第15章で正規性が正則性より強かったのと同じ構図である。

定義39.1 大きい帰納的次元

正規空間 X について、大きい帰納的次元 $\text{Ind } X$ を次のように定める。

- (1) $\text{Ind } X = -1 \iff X = \emptyset$ 。
- (2) $\text{Ind } X \leq n$ とは、各閉集合 A と各開集合 $U \supseteq A$ に対し、開集合 V で

$$A \subseteq V \subseteq U, \quad \text{Ind } (\partial V) \leq n - 1$$

となるものが存在することをいう。

命題39.2

T_1 正規空間について $\text{ind } X \leq \text{Ind } X$ 。また $\text{Ind } X = 0$ であることと $\text{ind } X = 0$ であることは同値である。

証明 前半。 T_1 より一点集合は閉だから、Ind の条件を $A = \{x\}$ に適用すれば ind の条件が得られる。

後半。 $\text{ind } X = 0$ なら開かつ閉な集合が基底をなす。閉集合 A と開集合 $U \supseteq A$ に対し、各 $x \in A$ のまわりに U に収まる開かつ閉な集合を取る。

一般にはこれを有限個にまとめられないが、**可分距離空間（リンデレーフ）なら可算個で足り、対角線的に削って開かつ閉な V が作れる。** 一般の正規空間では $\text{ind} = 0$ でも $\text{Ind} > 0$ でありうる（第42章）。 $\square$

Ind が素直な理由

定理39.3 和の公式

X を正規空間、 $X = A \cup B$ (A, B 閉) とすると

$$\text{Ind } X \leq \text{Ind } A + \text{Ind } B + 1$$

が成り立つ。とくに $\text{Ind } B = -1$ ($B = \emptyset$) なら $\text{Ind } X = \text{Ind } A$ 。

定理39.4

Ind は閉部分空間に遺伝する。すなわち $A \subseteq X$ が閉なら $\text{Ind } A \leq \text{Ind } X$ 。

証明 n についての帰納法。 $\text{Ind } X \leq n$ とし、 $B \subseteq A$ を A で閉 (A が X で閉だから X でも閉)、 U を A で開かつ $B \subseteq U$ とする。 $U = U' \cap A$ (U' は X で開) と書く。

$U'' = U' \cup (X \setminus A)$ とおくと X で開で、 $B \subseteq U''$ 。 $\text{Ind } X \leq n$ より、 $B \subseteq V \subseteq U''$ 、 $\text{Ind } (\partial V) \leq n - 1$ なる開集合 V が取れる。

$V \cap A$ は A で開で $B \subseteq V \cap A \subseteq U'' \cap A = U$ 。
 $\partial_A(V \cap A) \subseteq (\partial V) \cap A$ であり、右辺は ∂V の閉部分集合。帰納法の仮定を閉部分空間 $(\partial V) \cap A \subseteq \partial V$ に使えば $\text{Ind } \partial_A(V \cap A) \leq n - 1$ 。**よって $\text{Ind } A \leq n$ 。** $\square \quad \square$

注意

Ind は一般の部分空間には遺伝しない。**閉部分空間だけである。**対して ind は遺伝的だった (定理38.4 (2))。

これは第19章の表と同じ構図である——正則性は遺伝し、正規性は閉遺伝的だった。**次元の定義が、分離公理の振る舞いをそのまま引き継いでいる。**

ind と Ind——点から始めるか、閉集合から始めるか



第II部の階層をそのまま引き継いでいる

ind	点と閉集合を分ける	← 正則性 (第14章)	→ 遺伝的
Ind	閉集合と閉集合を分ける	← 正規性 (第15章)	→ 閉遺伝的
dim	被覆を細分する	← パラコンパクト性 (第24章)	→ 閉遺伝的

ind ≤ Ind つねに成り立つ。逆は一般には成り立たない (第42章)
可分距離空間では三つが一致する (第41章の一致定理)

図39-1 ind は点と近傍、Ind は閉集合と開集合を扱う。第II部で区別した正則性と正規性の差が、そのまま二つの次元の差になっている。

分離による特徴づけ

定義39.5

閉集合 A, B (交わらない) に対し、閉集合 S が A と B を分離するとは、 $X \setminus S = U \sqcup V$ (U, V 開、交わらない) で $A \subseteq U, B \subseteq V$ となることをいう。

定理39.6

正規空間 X について、 $\text{Ind } X \leq n$ であることと、**交わらないどの閉集合の対も $\text{Ind} \leq n - 1$ の閉集合で分離できることは同値である。**

証明 $\text{Ind } X \leq n$ とする。 A, B を交わらない閉集合とし、 $U = X \setminus B$ に条件を適用して $A \subseteq V \subseteq U$ 、 $\text{Ind } \partial V \leq n - 1$ なる V を得る。 $S = \partial V$ と置けば、 $X \setminus S = V^\circ \sqcup (X \setminus \overline{V})$ が分離を与える。

逆も同様に、 A と $X \setminus U$ を分離する S から V を作る。 $\square$

注意

この形が第40章の $\dim$ との比較に使われる。「低次元の壁で仕切れるか」というのが、帰納的次元の内容である。**直線は一点で仕切れ、平面は曲線で仕切れる——これが $\text{Ind } \mathbb{R} = 1$ 、 $\text{Ind } \mathbb{R}^2 = 2$ の直観的な意味である。**

★★ 学部後半 Ind の和の公式を証明する

定理39.3 を示す。 ind では一般の空間で成り立たなかった公式が、 Ind では正規空間で成り立つ。

主張の形。 $X = A \cup B$ (閉)、 $\text{Ind } A \leq p$ 、 $\text{Ind } B \leq q$ なら $\text{Ind } X \leq p + q + 1$ 。

証明の骨子。 $p + q$ についての帰納法。 C を閉集合、 $U \supseteq C$ を開集合とする。

まず A のなかで仕事をする。 $C \cap A$ は A で閉、 $U \cap A$ は A で開だから、 $\text{Ind } A \leq p$ より A のなかで $\text{Ind } \partial_A W \leq p - 1$ なる開集合 W が取れる。

次に、この W を X 全体へ延ばす。 $W = O \cap A$ (O は X で開) と書き、

$$V = (O \cup (X \setminus A)) \cap U \cap (X \setminus (A \setminus W))$$

とおく。 $A \setminus W$ は A で閉、 A は X で閉だから $A \setminus W$ は X で閉——ここで A が閉であることが効く。よって V は開で、 $V \cap A = W$ かつ $C \subseteq V \subseteq U$ 。

境界を評価する。 $\partial V \subseteq (\partial_A W) \cup (\partial V \cap B)$ が成り立つ。前者は $\text{Ind} \leq p-1$ 、後者は B の閉部分集合だから 定理39.4 より $\text{Ind} \leq q$ 。

帰納法の仮定 ($(p-1) + q$ の場合) より $\text{Ind } \partial V \leq (p-1) + q + 1 = p + q$ 。よって $\text{Ind } X \leq p + q + 1$ 。

どこが効いたか。二か所である。

第一に、閉遺伝性 (定理39.4)。境界を B に制限したとき、次元が上がらないことが要る。

第二に、 A が閉であること。 A のなかで作った開集合を、 A との交わりを変えずに X 全体へ延ばせる。 A が閉でないと $A \setminus W$ が X で閉にならず、この延長が作れない。正規性は、 Ind の定義そのもの (閉集合を開集合で囲む) に使われている。

ind で同じことができない理由。 ind は点についての条件なので、「 A のなかで作ったものを延ばす」という操作が定義に噛み合わない。

可分距離空間では、第41章の一致定理により $\text{ind} = \text{Ind}$ となるので、和の公式が ind についても成り立つ。だがそれは一致定理を経由した結果であって、 ind の定義から直接出るのではない。

★★★ 大学院 可算和定理と、その限界

和の公式を可算個に拡張したい。ここに次元論のもう一つの中心定理がある。

可算和定理。 X を全正規 (正規かつ可算パラコンパクト) な空間、 $X = \bigcup_n F_n$ (各 F_n は閉) とする。

$$\text{Ind } X = \sup_n \text{Ind } F_n$$

可算個の開集合に分けたとき、次元は上がらない。有限和の公式と違って +1 がつかない。

なぜ +1 が消えるのか。有限和の公式の +1 は、 A と B が「重なる」ところで余分な次元が出ることによる。可算和では、対角線的に削る操作で重なりを処理できる——第16章★★★や第18章で使った手法である。

ただし可算パラコンパクト性が要る。第24章★★★のドウカー空間では、この定理が破れる。

ドウカー空間での破れ。ドウカー空間 X （正規だが可算パラコンパクトでない）について、可算和定理が成り立たない例が知られている。可算個の開零次元集合の合併なのに、全体の次元が正になる。

第24章で「共終数 $\text{cf}(\aleph_\omega) = \omega$ が本質的」と述べたが、次元論でもその構造が効いている。

ind の可算和定理。可分距離空間では ind についても可算和定理が成り立つ。これは第41章の一致定理から従う。

一般の距離空間（可分でない）では、ind の可算和定理は成り立たない。ここに ind と Ind の実質的な差が現れる。

距離空間での関係。カトゥートフ Katětov とモリタ Morita の定理により、距離空間では $\text{Ind} = \text{dim}$ が成り立つ（可分でなくても）。

一方 ind は一般の距離空間では Ind と一致しない。ロクトノフ Roy が一九六二年に、完備距離空間で $\text{ind} = 0$ だが $\text{Ind} = 1$ という例を作った。

第42章でこの例に触れる。可分性がなければ、三つの次元は一致しない。

まとめ。一致定理の成立範囲は次のようになる。

可分距離空間	$\text{ind} = \text{Ind} = \dim$
一般の距離空間	$\text{Ind} = \dim \neq \text{ind}$ (一般に)
一般の正規空間	$\dim \leq \text{Ind}, \text{ind} \leq \text{Ind}$ のみ

第41章でこの表を確定させる。

演習

基本

1. $\text{Ind } \mathbb{R} = 1$ を示せ。
2. Ind が同相で保たれることを示せ。
3. 離散空間の Ind を求めよ。
4. $\text{ind} \leq \text{Ind}$ を、 T_1 をどこで使うか明示して示せ。

証明

1. 定理39.4 を、境界の包含関係を確認しながら示せ。(25点)
2. 定理39.6 の両方向を示せ。(25点)
3. 命題39.2 の後半(零次元の同値)を、可分距離空間の場合に示せ。(30点)

発展

1. 定理39.3 を、★★の骨子に従って完全に証明せよ。とくに V を延ばす部分を丁寧に書くこと。(40点)
2. 可算和定理を述べ、可算パラコンパクト性がどこで必要かを説明せよ。(35点)

被覆次元 dim

◆ この章の問い

- ・被覆の重なり方を数えると、なぜ次元が出るのか。
- ・ルベーグの被覆定理は、何を言っているのか。
- ・この定義は、なぜ扱いやすいのか。

重なりを数える

三つ目の次元は、まったく違う発想から来る。被覆の重なり方を数えるのである。

直線を短い区間で覆うと、どう工夫しても高々二つが重なるようにできる。平面を小さい円板で覆うと、高々三つが重なるようにできるが、二つに抑えることはできない。

この観察を定義にする。

定義40.1 被覆次元

被覆 $\mathcal{A}$ の位数とは、 $n + 1$ 個の元が共通点をもつような最大の n をいう（どの点も高々 $n + 1$ 個の元に属する、と言ってもよい）。

正規空間 X について、 $\dim X \leq n$ とは、どの有限開被覆も、位数 n 以下の有限開細分をもつことをいう。 $\dim \emptyset = -1$ と約束する。

注意

「位数 n 」とは「高々 $n + 1$ 個が重なる」ことである。添字のずれに注意してほしい。直線が $\dim = 1$ なのは、高々二つが重なるようにできるからである。

例40.2 基本的な値

$\dim \mathbb{R} = 1$ 。どの有限開被覆も、長さの十分小さい区間による細分をもつ。区間を互い違いに並べれば、重なるのは隣り合う二つだけである。

$\dim \mathbb{R}^n = n$ 。 $\leq n$ は、立方体をずらして並べる構成による。 $\geq n$ がルベーグの被覆定理である（次節）。

$\dim X = 0$ 。どの有限開被覆も、互いに交わらない開集合による細分をもつ。零次元空間（第38章）にあたる。

ルベーグの被覆定理**定理40.3 ルベーグの被覆定理**

n 次元立方体 $[0, 1]^n$ を、直径が十分小さい閉集合で覆うと、必ずどこかで $n + 1$ 個が重なる。すなわち $\dim[0, 1]^n \geq n$ 。

証明 骨子を述べる。証明はスペルナー Sperner の補題（組合せ論）を使う。

スペルナーの補題。 n 単体を小さい単体に分割し、各頂点に 0 から n のラベルを「面の条件」を守って付けると、すべてのラベルをもつ小単体が奇数個存在する。

被覆への翻訳。立方体の被覆 $\{F_0, \dots, F_k\}$ （直径が小さい閉集合）が与えられたとする。 $n + 1$ 個が重ならないと仮定する。

立方体を n 単体に分け、細かく分割する。各頂点に、それを含む F_i のうち「対応する面に整合する」ものの番号を付ける。直径が小さいので、この付け方は可能である。

スペルナーの補題より、すべてのラベルをもつ小単体がある。その頂点たちは近くにあるので、対応する F_i が $n + 1$ 個すべて交わる。仮定に反する。

分割を細かくする極限を取ることで、閉集合の被覆についての主張が得られる。□

注意

この定理がブラウワーの不動点定理と同値であることが知られている。
またブラウワーの領域不変性 ($\mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$) も、これから従う。**次元が「よく定義された」ことの証明が、組合せ論の補題に帰着する。**

被覆の重なりを数える

直線 高々二つが重なる (位数 1)

どこでも重なるのは隣り合う二つだけ $\rightarrow \dim \mathbb{R} = 1$

平面 高々三つが重なる (位数 2)



三つが一点で重なる
二つに抑えることはできない (ルベグの被覆定理)
 $\rightarrow \dim \mathbb{R}^2 = 2$

dim が扱いやすい理由

被覆の言葉なのでパラコンパクト性と相性がよい
写像による評価がしやすい
和の公式・可算和定理が素直
1 の分割 (第24章) や細分の議論が
そのまま使える

証明に使う道具

スベルナーの補題 (組合せ論)
単体分割の頂点にラベルを付けると、
全ラベルをもつ小単体が奇数個ある
ブラウワーの不動点定理と同値
領域不変性 ($\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は同相でない) もここから出る

図40-1 直線は二つ重なる被覆で済み、平面は三つ必要になる。重なりの個数が次元を与える。下からの評価にはスベルナーの補題が使われる。

dim の性質

定理40.4

正規空間 X について、

- (1) $\dim$ は閉部分空間に遺伝する。
- (2) $\dim X \leq \text{Ind } X$ 。
- (3) 全正規空間では可算和定理が成り立つ。
- (4) $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$ (コンパクトハウスドルフで)。
- (5) $\dim X \leq n$ であることと、どの有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_k\}$ も、位

数 n 以下の縮小被覆 $\{V_1, \dots, V_k\}$ ($\overline{V_i} \subseteq U_i$) をもつことは同値である。

証明 (5) が実用上の形である。細分ではなく「同じ添字の縮小」で述べられる。第15章★★の被覆を縮める議論（正規性）を使う。

(2) $\text{Ind } X \leq n$ とする。有限開被覆 $\{U_1, \dots, U_k\}$ を取り、各段で定理39.6 を使って境界の次元を下げながら縮小していく。**帰納法で位数を n に抑える。**

(1) 閉部分空間の被覆を、全体の被覆に延ばして細分し、制限する。正規性が延ばす操作を保証する。 $\square$

★★ 学部後半 写像による特徴づけ

$\dim$ のもっとも強力な性質は、球面への写像で言い換えられることである。

定理。 正規空間 X について、 $\dim X \leq n$ であることと

どの閉集合 $A \subseteq X$ とどの連続写像 $f: A \rightarrow S^n$ も、 X 全体への連続な拡張をもつ

ことは同値である。

なぜこの形が有用か。 第16章★★で述べたとおり、球面への写像は一般には延びない。「どこまで延びるか」が次元を測っている。

円周 S^1 への写像を考える。 $X = [0, 1]$ 、 $A = \{0, 1\}$ なら、 f は必ず延びる (S^1 は弧状連結)。 $X = \overline{D^2}$ 、 $A = S^1$ 、 $f = \text{id}$ なら延びない。 **$\dim \overline{D^2} = 2 > 1$ だから。**

次元を上げる例。 この特徴づけから、次元の下からの評価が得やすくなる。「延びない写像を一つ作れば、次元が下限を超える」と言えるからである。

第42章で反例を作るとき、この手法を使う。

本質的写像。関連する概念として、 $f: X \rightarrow [0, 1]^n$ が本質的であるとは、境界 $f^{-1}(\partial[0, 1]^n)$ 上で f と一致する写像で、値域が $\partial[0, 1]^n$ に収まるものが存在しないことをいう。

$\dim X \geq n$ であることと、 X から $[0, 1]^n$ への本質的写像が存在することは同値である。

ルベグの被覆定理は、恒等写像 $[0, 1]^n \rightarrow [0, 1]^n$ が本質的であるという主張として読める。

ホモトピー論との接続。これらの特徴づけは、代数的位相幾何学の道具（ホモトピー群、コホモロジー）と直接つながっている。

チェックコホモロジーを使うと、次元のさらに精密な理論（コホモロジー次元）が得られる。一般に $\dim_{\mathbb{Z}} X \leq \dim X$ であり、等号が成り立たない例がある——第42章で触れる。

★★★ 大学院 無限次元の分類

$\dim X = \infty$ の空間にも、区別がある。「無限次元」は一種類ではない。

強無限次元と弱無限次元。 X が強無限次元であるとは、閉集合の対の無限列 $\{(A_i, B_i)\}$ で、どのように分離集合 S_i を取っても $\bigcap_i S_i \neq \emptyset$ となるものが存在することをいう。そうでないとき弱無限次元という。

ヒルベルト立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ は強無限次元である。有限次元の空間はすべて弱無限次元である。

可算次元。 X が可算次元であるとは、可算個の有限次元部分集合の合併として書けることをいう。

可算次元ならば弱無限次元である。逆は成り立たない——ポール Pol が一九八一年に、弱無限次元だが可算次元でないコンパクト距離空間を構成した。

この問題は五十年近く未解決だった。**アレクサンドロフが一九五一年に提起している。**

超限次元。次元の定義を超限順序数まで延ばすこともできる。 ind の再帰を順序数で行い、 trind (超限小帰納的次元) を定める。

可算次元なコンパクト距離空間は、 $\text{trind} < \omega_1$ をもつ。**第4章で導入した順序数が、次元の値として現れる。**

無限次元位相幾何学。ヒルベルト立方体と ℓ^2 を扱う分野がある。驚くべき定理がいくつもある。

アンダーソン Anderson の定理—— ℓ^2 は $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ と同相である。**ノルムの入った空間と、単なる積空間が同相になる。**

ケラー Keller の定理—— ℓ^2 の無限次元コンパクト凸集合は、すべてヒルベルト立方体と同相である。

有限次元では、コンパクト凸集合は球体と同相になる (次元が決まる)。無限次元では次元による区別が消える。

本書での扱い。第42章で次元論の反例を扱うが、無限次元位相幾何学には立ち入らない。

ただし第VIII部以降で ℓ^2 と L^2 を扱うとき、**それらが位相空間としては区別できないという事実**を心に留めておくとよい。解析学がそこで見ているのは、位相ではなく内積構造である。

演習

基本

1. $\dim \mathbb{R} \leq 1$ を、区間による細分を具体的に作って示せ。
2. 位数 0 の被覆とは何か。それが $\dim = 0$ に対応することを述べよ。
3. 有限集合の $\dim$ を求めよ。
4. $\dim \mathbb{R}^2 \leq 2$ を、立方体をずらして並べる構成で示せ。

証明

1. 定理40.4 (5) を、第15章の被覆を縮める議論を使って示せ。(25点)
2. 定理40.4 (1) を示せ。(25点)
3. 定理40.4 (2) を、定理39.6 を使って示せ。(30点)

発展

1. スペルナーの補題を述べ、 $n = 1$ (区間の場合) と $n = 2$ (三角形の場合) について証明せよ。(35点)
2. $\dim X \leq n$ と「 S^n への写像が延びる」ことが同値であることの意味を説明し、 $\overline{D^2}$ について確かめよ。(35点)

次元の一致定理

◆ この章の問い

- 三つの次元は、どこまで一致するのか。
- 可分性は、なぜ一致の条件になるのか。
- 一致定理があると、何が言えるようになるのか。

一致定理

定理41.1 一致定理

可分距離空間 X について

$$\text{ind } X = \text{Ind } X = \dim X$$

が成り立つ。

これが第V部の中心にある定理である。三つのまったく違う定義——点と近傍、閉集合と開集合、被覆の重なり——が、同じ値を与える。

証明は三つの不等式の環である。 $\dim \leq \text{ind} \leq \text{Ind} \leq \dim$ を示す。

証明 $\text{ind} \leq \text{Ind}$ は一般の T_1 正規空間で成り立つ（命題39.2）。

$\text{Ind} \leq \dim$ を示す。 n についての帰納法。 $\dim X \leq n$ とし、交わらない閉集合 A, B を取る。

$\{X \setminus A, X \setminus B\}$ は開被覆だから、定理40.4 (5) より位数 n 以下の縮小被覆 $\{V_1, V_2\}$ がある。 $S = X \setminus (V_1 \cup V_2)$ と置くと S は A と B を分離する。

$\dim S \leq n - 1$ が示せれば、帰納法の仮定より $\text{Ind } S \leq n - 1$ 、定理39.6 より $\text{Ind } X \leq n$ となる。

$\dim S \leq n - 1$ は、 S の被覆を X の被覆に延ばして位数を数えることで出る。細部には $\dim$ の閉遺伝性と、位数の計算が要る。

$\dim \leq \text{ind}$ が可分性を使う部分である。 $\text{ind } X \leq n$ とする。

第二可算性より可算基底 $\{B_k\}$ が取れ、 $\text{ind } \partial B_k \leq n - 1$ となるように選べる（各点の各近傍のなかに境界の小さい基底元が取れるから）。

$S = \bigcup_k \partial B_k$ と置く。帰納法の仮定（ $\dim \leq \text{ind}$ が $n - 1$ で成立）と可算和定理（定理40.4 (3)）より $\dim S \leq n - 1$ 。

$X \setminus S$ は零次元である（開かつ閉な集合 $B_k \setminus S$ が基底をなす）。よって X は $\dim \leq n - 1$ の部分と $\dim = 0$ の部分に分かれ、和の公式より $\dim X \leq n$ 。 $\square$

注意

可分性が二か所で効いている。可算基底が取れることと、可算和定理が使えることである。非可算な基底しかない空間では、境界の合併が「可算個の閉集合の合併」にならず、この議論が通らない。

ただちに従うこと

系41.2

可分距離空間について、次が成り立つ。

- (1) $\dim \mathbb{R}^n = \text{ind } \mathbb{R}^n = \text{Ind } \mathbb{R}^n = n$ 。
- (2) $n \neq m$ なら $\mathbb{R}^n$ と $\mathbb{R}^m$ は同相でない（領域不変性）。
- (3) 分解定理—— $\dim X \leq n$ であることと、 X が $n + 1$ 個の零次元集合の合併であることは同値。
- (4) 和の公式 $\dim(A \cup B) \leq \dim A + \dim B + 1$ 。
- (5) 可算和定理 $\dim \bigcup_n F_n = \sup_n \dim F_n$ (F_n 閉)。
- (6) 積の不等式 $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$ 。

証明 (1) $\leq n$ は ind で (第38章)、 $\geq n$ は dim で (ルベークの被覆定理、第40章) 示した。一致定理が二つをつなぐ。

(2) 同相なら次元が等しいが、(1) より異なる。「次元が位相的に定まる」という事実が、領域不変性を与える。

(3) から (6) は、dim と Ind の性質 (第39章・第40章) を一致定理で移す。□

三つの不等式を環状に示す




図41-1 三つの不等式を環状に示す。dim $\leq$ ind の一歩でだけ可分性が要る。一致すると、三つの定義それぞれの長所が同時に使えるようになる。

一致の範囲

定理41.3 どこまで一致するか

- (1) 可分距離空間 $\text{ind} = \text{Ind} = \dim$ 。
- (2) 一般の距離空間 $\text{Ind} = \dim$ (カトウツーフ-モリタ)。 ind は一致しないことがある。
- (3) コンパクトハウスドルフ空間 $\dim \leq \text{Ind}$ のみ。三つとも異なり

うる。

(4) 一般の正規空間 $\dim \leq \text{Ind}$ 、 $\text{ind} \leq \text{Ind}$ のみ。

注意

可分性を外すと、まず ind が落ちる。ロクトノフの例（第42章）は、完備距離空間で $\text{ind} = 0$ 、 $\text{Ind} = \dim = 1$ 。

距離化可能性を外すと、 Ind と $\dim$ も分かれる。**コンパクトハウスドルフ空間で $\dim = 1$ 、 $\text{Ind} = 2$ という例がある（フィリポフ）。**

★★ 学部後半 分解定理を読む

系41.2 (3) の分解定理は、次元の意味をもっとも直接に述べている。丁寧にしておく。

主張。可分距離空間 X について、 $\dim X \leq n \iff X = Z_0 \cup \dots \cup Z_n$ (各 Z_k は零次元)。

例で確かめる。 $\mathbb{R}$ は $\mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ と書ける。どちらも零次元（第38章）。二枚なので $\dim \mathbb{R} \leq 1$ 。

$\mathbb{R}^2$ はどうか。座標が両方有理数、片方だけ有理数、両方無理数——という分け方では三枚必要に見える。実際には

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}\} \cup \{(x, y) : x \notin \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\} \cup \{(x, y) : x, y \notin \mathbb{Q}\}$$

で、各々が零次元であることを確かめれば $\dim \mathbb{R}^2 \leq 2$ になる。**ただし「三枚で済む」ことは、各片が本当に零次元であることを要する——単に定義から出るわけではない。**

証明の方向。 $\Leftarrow$ は和の公式の繰り返しで従う。 $\Rightarrow$ が実質である。

$\dim X \leq n$ とする。可算基底 $\{B_k\}$ を、境界の次元が $n - 1$ 以下になるように取る。 $S = \bigcup_k \partial B_k$ は $\dim \leq n - 1$ で、 $X \setminus S$ は零次元。

帰納法の仮定より $S = Z_0 \cup \cdots \cup Z_{n-1}$ と分解でき、 $Z_n = X \setminus S$ を足せば $n+1$ 枚になる。

何を意味するか。「 n 次元」とは「零次元のものを $n+1$ 枚重ねてできている」ということである。

零次元空間はカントール集合の部分空間だった(定理38.5)。したがって n 次元の可分距離空間は、カントール集合的なものを $n+1$ 枚重ねた構造をもつ。

埋め込み定理との関係。分解定理から、次の定理が出る。

$\dim X \leq n$ の可分距離空間は、 $\mathbb{R}^{2n+1}$ に埋め込める。

メンガー-ネーベリング Menger-Nöbeling の定理という。 $2n+1$ という数は最良である—— $\mathbb{R}^{2n}$ には埋め込めない n 次元空間がある。

第9章★★で述べた「どこに入るかを問う」方法が、次元論でも中心的である。普遍空間としてメンガーの普遍曲線 ($n=1$ の場合) が知られている。

★★★ 大学院 可分性を外すとどうなるか

定理41.3 (2) のカトゥートフ-モリタの定理を述べる。可分でない距離空間でも、二つは一致する。

主張。距離空間 X について $\text{Ind } X = \dim X$ 。

証明の道具。第32章の σ -離散な基底 (ピングの定理) が使われる。可算基底の代わりに、可算個の離散族からなる基底を使う。

各離散族について、境界の合併を取る。離散族の境界の合併は、可算和定理が使える形になる。可分な場合の証明が、ほぼそのまま通る。

なぜ ind だけが落ちるのか。 ind の議論では、点のまわりの境界を集めて可算和定理を使う必要があった。

可分でなければ、境界を可算個に集められない。 σ -離散な基底があっても、 ind の定義が点ごとなので、離散族の構造を活かせない。

ロクトノフの例。一九六二年、ロクトノフ Roy は完備距離空間 Δ で

$$\text{ind } \Delta = 0, \quad \text{Ind } \Delta = \dim \Delta = 1$$

となるものを構成した。零次元（開かつ閉な基底をもつ）なのに、閉集合の分離では次元が落ちない。

構成は複雑である。 $\{0, 1\}^{\omega_1}$ の部分空間として作られ、**非可算性が本質的に使われる。**

コンパクトでの破れ。フィリポフ Filippov は一九七〇年に、コンパクトハウスドルフ空間で $\dim = 1$ 、 $\text{Ind} = 2$ という例を作った。連続体仮説を仮定する。

ここでも集合論が入り込む。**第36章のスーリン問題、第32章の正規ムーア空間予想に続いて、次元論でも独立性が現れる。**

まとめ。一致定理の成立範囲は、可算性がどこまで効くかで決まる。

可分距離空間では、可算基底が三つの定義をつなぐ。距離空間では σ -離散基底が二つをつなぐ。それ以上の一般性では、つなぐ道具がない。

第32章の距離化定理と同じ構図である。**可算性が局所と大域を橋渡しする——第7章から繰り返し現れてきた主題が、次元論でも中心にある。**

演習

基本

1. $\dim \mathbb{R} = 1$ を、一致定理を使って述べよ。
2. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ が分解定理の例になっていることを確かめよ。
3. 領域不変性が一致定理から従う理由を述べよ。
4. $\dim S^n$ を求めよ。

証明

1. 定理41.1 の $\text{Ind} \leq \dim$ を、分離集合を作る部分を明示して示せ。(30点)
2. 定理41.1 の $\dim \leq \text{ind}$ で、可分性がどこで効いているかを二か所とも述べよ。(25点)
3. 分解定理の $\Leftarrow$ を、和の公式から示せ。(20点)

発展

1. $\mathbb{R}^2$ を三枚の零次元集合に分解し、各片が零次元であることを示せ。(35点)
2. メンガー-ネーベリングの埋め込み定理を述べ、 $2n + 1$ が最良である理由を説明せよ。(35点)

次元論の反例と、一致しない空間

◆ この章の問い

- ・次元は、積で足し算になるのか。
- ・一致定理が破れる空間は、どう作られるのか。
- ・次元という素朴な概念のどこに、集合論が入り込むのか。

積で足し算にならない

第38章で $\text{ind}(X \times Y) \leq \text{ind } X + \text{ind } Y$ を述べた。等号が成り立ちそうに見える。

反例42.1 ポントリャーギンの曲面

一九三〇年、ポントリャーギン Pontryagin は二次元のコンパクト距離空間 P_2, P_3 で

$$\dim P_2 = \dim P_3 = 2, \quad \dim(P_2 \times P_3) = 3$$

となるものを構成した。**積の次元が、和より真に小さい。**

構成の骨子。二次元単体複体から出発し、係数が $\mathbb{Z}/2$ と $\mathbb{Z}/3$ のコホモロジーで次元が違うように作る。

具体的には、 P_p (p は素数) を「 $\mathbb{Z}/p$ -係数のコホモロジー次元が 2、他の素数 q については 1」となるように構成する。積を取ると、係数が素であるところで次元が打ち消し合う。

次元が「足し算で決まらない」のは、位相的な次元が代数的な情報（コホモロジー）の最大値として振る舞うためである。

注意

この現象は、コホモロジー次元 $\dim_G$ (係数群 G) を導入すると説明がつく。 $\dim_G$ は素直に足し算になり、 $\dim X = \max_G \dim_G X$ のような関係がある。

したがって $\dim(X \times Y) \geq \dim X + \dim Y - 1$ は成り立つが、等号は保証されない。差は高々1である(有限次元コンパクト距離空間で)。

一致定理が破れる例**反例42.2 ロクトノフの空間**

完備距離空間 Δ で

$$\text{ind } \Delta = 0, \quad \text{Ind } \Delta = \dim \Delta = 1$$

となるものが存在する(ロクトノフ Roy、一九六二)。

何が起きているか。 $\text{ind } \Delta = 0$ は、開かつ閉な集合が基底をなすことを意味する。各点のまわりは、いくらでも細かく「切り離せる」。

ところが $\text{Ind } \Delta = 1$ は、ある交わらない閉集合の対が、空集合では分離できないことを意味する。

なぜ両立するのか。点ごとに切り離せても、閉集合全体を一度に切り離すには、無限個の切り口を「束ねる」必要がある。

可分ならば可算個で済み、対角線的に処理できる(第41章の証明)。 Δ は可分でない—— $\{0, 1\}^{\omega_1}$ の部分空間として作られる。非可算個の切り口は束ねられない。

第4章の共終数が、ここでも効いている。

反例42.3 フィリポフの空間

コンパクトハウスドルフ空間 F で $\dim F = 1$ かつ $\text{Ind } F = 2$ となるものが存在する（フィリポフ Filippov、一九七〇）。構成に連続体仮説を使う。

距離化できない空間では、被覆で測る次元と帰納的に測る次元が分かれる。第40章で「 $\dim$ はパラコンパクト性と相性がよい」と述べたが、距離化できないコンパクト空間ではその相性が効かない。

一致定理は、どこで破れるか

空間のクラス	成り立つ関係	破る例
可分距離空間	$\text{ind} = \text{Ind} = \dim$	なし（一致定理）
一般の距離空間	$\text{Ind} = \dim$ (カトウツーフ-モリタ)	ロクトノフの空間 $\text{ind} = 0, \text{Ind} = \dim = 1$
コンパクトハウスドルフ	$\dim \leq \text{Ind}$ のみ	フィリポフの空間 $\dim = 1, \text{Ind} = 2$ （連続体仮説を使う）
一般の正規空間	$\dim \leq \text{Ind}, \text{ind} \leq \text{Ind}$	三つとも異なりうる

可分性を外すと ind が落ち、距離化可能性を外すと Ind と $\dim$ も分かれる

積で足し算にならない

$\dim P_2 = \dim P_3 = 2$
 $\dim (P_2 \times P_3) = 3$ （ポントリヤーギン）

係数 $\mathbb{Z}/2$ と $\mathbb{Z}/3$ のコホモロジーで
次元が違うように作る

差は高々 1（有限次元コンパクト距離空間）

集合論が入り込む場所

ロクトノフ 非可算な切り口を束ねられない
フィリポフ 連続体仮説を使う

可算と非可算の境界で、共終数の構造が
次元の一致・不一致を決めている

第36章のスーリン問題と同じ構図

図42-1 一致定理は可分距離空間で成り立つ。可分性を外すと小さい帰納的次元が落ち、距離化可能性を外すと大きい帰納的次元と被覆次元も分かれる。次元は積で足し算にもならない。

その他の反例

例42.4 次元の奇妙な例

エルデシュ空間（第28章★★★★）。 $E = \{x \in \ell^2 \mid \text{各 } x_n \in \mathbb{Q}\}$ は全不連結だが $\dim E = 1$ 。零次元でない全不連結空間である。

メンガーの普遍曲線。dim = 1 のコンパクト距離空間で、**どの 1 次元可分距離空間もこれに埋め込める**。立方体から繰り返し穴を開けて作る。

ヌーベリングの普遍空間。dim $\leq n$ の可分距離空間の普遍空間が $\mathbb{R}^{2n+1}$ のなかに作れる (第41章★★)。

次元が上がる連続像。ペアノ曲線 $[0, 1]$ (dim = 1) から $[0, 1]^2$ (dim = 2) への連続全射がある。**次元は連続像で保たれない**。ただし単射なら保たれる (領域不変性)。

次元が下がる閉写像。零次元空間から n 次元空間への連続全射も作れる (カントール集合から $[0, 1]^n$ へ)。

注意

次元が連続像で保たれないのは、第19章の表でコンパクト性や連結性が連続像で保たれたのと対照的である。**次元は「細かさ」の量であり、像を取ると細かさが失われる**。第19章★★で述べた「細かさは制限で保たれ、粗さは像で保たれる」という構図に従っている。

★★ 学部後半 次元を上げる写像と下げる写像

写像で次元がどう変わるかを整理する。方向によってまったく違う。

単射で次元は上がらない。 $f: X \rightarrow Y$ が埋め込みなら $\dim X \leq \dim Y$ (dim は遺伝的だから)。

連続全射では上がりうる。ペアノ曲線が例である。 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ の連続全射。

より強く、**カントール集合からどのコンパクト距離空間へも連続全射がある** (第33章★★で触れた)。零次元から任意の次元へ上がる。

閉写像で下がることはない。 $f: X \rightarrow Y$ がコンパクト距離空間のあいだの連続全射なら、一般に $\dim Y$ と $\dim X$ の関係は決まらない。

だが条件を付けると評価が出る。ヒューレヴィッチ Hurewicz の公式――

$$\dim X \leq \dim Y + \sup_{y \in Y} \dim f^{-1}(y)$$

ファイバーの次元を足せば押さえられる。直観的には「底空間の次元＋繊維の次元」である。

逆向きの評価もある。 f が閉写像で、各ファイバーが高々 $k+1$ 点なら $\dim Y \leq \dim X + k$ 。

次元を上げない写像。 $\dim f^{-1}(y) = 0$ (各ファイバーが零次元) の閉写像では $\dim X \leq \dim Y$ 。とくに、有限個の点しか重ならない写像は次元を上げない。

ペアノ曲線を読み直す。 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ の連続全射では、ファイバーが有限 (多くの点で) なのに次元が上がる。これは f が閉写像だが単射でなく、しかもファイバーの構造が場所によって変わるためである。

ヒューレヴィッチの公式は $\dim X \leq \dim Y + \sup \dim f^{-1}(y)$ の形なので、 $1 \leq 2 + 0$ で矛盾しない。逆向きの評価が効かないだけである。

本書での意味。第VI部以降で「次元」という語はほとんど使わない。だが第88章のソボレフ空間の埋め込み定理では、次元が指数に現れる。

そこでの次元は $\mathbb{R}^n$ の n であり、本章で確立した「位相的に定まる量」である。領域不変性がなければ、その n は座標の取り方に依存してしまう。

★★★ 大学院 次元論の未解決問題と独立命題

第4章の方針に従い、未解決と独立を区別して残された問題を挙げる。

独立な命題。

フィリポフの例は連続体仮説を使う。連続体仮説なしで $\dim \neq \text{Ind}$ のコンパクトハウスドルフ空間が作れるかは、長く問題だった。現在は、公理系だけで構成できることが知られている。

可分距離空間の次元の振る舞いに関する一部の問いは、マーティンの公理などに依存する。

未解決の問題。

積の次元の正確な値。 $\dim(X \times Y)$ を $\dim X$ 、 $\dim Y$ と付加的な情報から決定する一般的な公式は知られていない。**コホモロジー次元を使うと部分的に説明できるが、完全ではない。**

コホモロジー次元と被覆次元の差。コンパクト距離空間で $\dim_{\mathbb{Z}} X = n$ なら $\dim X = n$ か。有限次元の場合は真である（ドラニシニコフ Dranishnikov の理論）。

ところがドラニシニコフは一九八八年に、 $\dim_{\mathbb{Z}} X = 3$ **だが $\dim X = \infty$ のコンパクト距離空間を構成した。**アレクサンドロフが一九三二年に提起した問題の解決である。

次元の定義を変える方向。非可算な状況で ind が落ちることを受けて、別の定義が試みられている。

基底次元、局所次元、超限次元など。**どれも可分距離空間では一致し、一般の空間で分かれる。**

第V部の総括。この部で見たことをまとめる。

第一に、「はい／いいえ」の条件を量に変えると、不等式の網が見えてくる（第35章）。

第二に、その網のなかに、公理系から決まらない関係がある（第36章・第37章）。

第三に、次元という素朴な概念も、三つの定義が一致するのは可分距離空間に限られる（第38～42章）。

第四に、**一致・不一致を決めているのは、つねに可算と非可算の境界である。**第4章で導入した共終数が、ここまでのすべての反例に現れた。

第VI部への移行。次の部から解析学に入る。そこでは可算な操作だけで閉じた世界を扱う。

実数を構成し（第43章）、極限を定義し（第45章）、測度を作る（第52章）——**どれも可算個の操作で完結する**。第V部で見た非可算性の複雑さは、表に出てこない。

それが解析学の強みであり、同時に限界でもある。第97章でこの対比を地図にする。

演習

基本

1. ペアノ曲線の存在から、次元が連続像で保たれないことを述べよ。
2. 次元が単射連続写像（埋め込み）で上がらないことを示せ。
3. エルデシュ空間が全不連結だが零次元でないことの意味を述べよ。
4. ロクトノフの空間で、 $\text{ind} = 0$ と $\text{Ind} = 1$ が両立する理由を述べよ。

証明

1. カントール集合から $[0, 1]$ への連続全射を構成せよ。（25点）
2. ヒューレヴィッチの公式を述べ、ペアノ曲線がそれと矛盾しないことを確かめよ。（25点）
3. 次元が閉部分空間に遺伝することを、 dim の定義から示せ。（25点）

発展

1. ポントリャーギンの例の構成の骨子を述べ、なぜ積で次元が落ちるのかをコホモロジー次元の言葉で説明せよ。（40点）
2. 第V部で見た「可算と非可算の境界」が、どの反例のどこに現れたかを、第36章・第37章・第41章・第42章について整理せよ。（35点）

第 VI 部

実数と極限

解析

ここから解析に移る。実数とは何かを構成から確定させ、 ε - δ による極限の定義がなぜその形でなければならないかを、一様収束が必要になる場面まで含めて見る。

実数の構成と完備性

(この章は執筆中です)

上限・下限と単調列

(この章は執筆中です)

極限—— ε - δ はなぜこの形か

(この章は執筆中です)

連続関数——中間値と最大値

(この章は執筆中です)

一様連続と一様収束

(この章は執筆中です)

微分と平均値の定理

(この章は執筆中です)

級数と収束判定

(この章は執筆中です)

関数列——何が保存され、何が壊れるか

（この章は執筆中です）

第VII部

測度と積分

解析

Riemann積分がどこで行き詰まるのかを見てから、測度を構成する。収束定理が自由に使えることが、Lebesgue積分の全体を支える。

Riemann積分の限界

（この章は執筆中です）

外測度とCarathéodoryの構成

(この章は執筆中です)

Lebesgue 測度と非可測集合

(この章は執筆中です)

可測関数

(この章は執筆中です)

Lebesgue積分と収束定理

（この章は執筆中です）

積測度とFubini-Tonelli

(この章は執筆中です)

符号付測度とHahn–Jordan分解

(この章は執筆中です)

Radon–Nikodymの定理

(この章は執筆中です)

Rieszの表現定理

（この章は執筆中です）

第VIII部

関数空間

解析

関数の集まりに距離とノルムを入れる。ここで位相の言葉が本格的に働きはじめ、完備性が定理を生む道具になる。

Lp空間とHölder・Minkowskiの不等式

(この章は執筆中です)

完備性——Riesz–Fischerの定理

（この章は執筆中です）

稠密性と近似

（この章は執筆中です）

Banach空間

(この章は執筆中です)

Hilbert空間と直交分解

(この章は執筆中です)

正規直交基底とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

双対空間

（この章は執筆中です）

第IX部

関数解析の基本定理

解析

四つの基本定理——Hahn-Banach、一様有界性、開写像、閉グラフ。前三者はBaireのカテゴリー定理から来る。位相が解析の証明を支えている場面である。

Hahn-Banachの定理

（この章は執筆中です）

一様有界性の原理

(この章は執筆中です)

開写像定理と閉グラフ定理

(この章は執筆中です)

弱位相と弱*位相

(この章は執筆中です)

Banach–Alaogluの定理

（この章は執筆中です）

凸性とKrein–Milmanの定理

(この章は執筆中です)

コンパクト作用素

（この章は執筆中です）

第 X 部

スペクトル理論

解析

行列の対角化を無限次元へ持ち上げる。固有値だけでは足りず、スペクトルという概念が必要になる理由から始める。

有界作用素とスペクトル

(この章は執筆中です)

自己共役作用素

(この章は執筆中です)

コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

(この章は執筆中です)

一般のスペクトル定理と作用素値測度

(この章は執筆中です)

非有界作用素と自己共役拡大

(この章は執筆中です)

Banach環とGelfand理論

(この章は執筆中です)

第 XI 部

フーリエ解析

解析

関数を波に分解する。どの意味で収束するのかを問い続けることが、この分野の歴史そのものである。超関数まで進むことで、収束しない対象も扱えるようになる。

Fourier級数——なぜ三角関数か

（この章は執筆中です）

各点収束の問題——DirichletとFejér

(この章は執筆中です)

L2理論とParsevalの等式

(この章は執筆中です)

発散する例と、Carlesonの定理

(この章は執筆中です)

Fourier変換——L1の理論

（この章は執筆中です）

L2への拡張とPlancherelの定理

(この章は執筆中です)

畳み込みと近似単位元

(この章は執筆中です)

Schwartz空間と超関数

(この章は執筆中です)

超関数のFourier変換とSobolev空間

(この章は執筆中です)

第XII部

複素解析

解析

一回微分できれば何回でも微分できる——実関数では起こらないこの剛性が、複素解析の全体を決めている。

複素微分とCauchy–Riemannの方程式

(この章は執筆中です)

Cauchyの積分定理と積分公式

(この章は執筆中です)

べき級数展開と解析接続

(この章は執筆中です)

留数定理とその応用

(この章は執筆中です)

等角写像とRiemannの写像定理

(この章は執筆中です)

調和関数とDirichlet問題

(この章は執筆中です)

第XIII部

位相と解析の交差

総合

本書の前半と後半が、どこで出会っていたのかを回収する。位相の定理が解析の道具になり、解析の必要が位相の概念を生んだ——その往復を最後に地図として描く。

関数空間の位相とAscoli-Arzelàの定理

(この章は執筆中です)

Stone–Weierstrassの定理

(この章は執筆中です)

何が何を支えているか——本書の地図

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 記号一覧

(執筆中)

付録B 定義集

(執筆中)

付録C 反例カタログ

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 演習の解答と方針

(執筆中)

付録F 読書案内

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

位相・解析大全 学部から大学院まで、三層で読む位相空間論と解析学

第1版 2026年発行

本文・図版・演習はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画した SVG であり、外部の画像素材を使用していない。数式は MathJax によって SVG へ変換し、本文に埋め込んでいる。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。