

# Chapter 6 - Transformation Matrices

## 5. Coordinate Transformations

origin p, basis {u, v, w}, coordinates (i, j, k) => point p + iu + jv + kw

$$\text{frame-to-canonical} \quad \mathbf{P}_{xy} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{e} \end{bmatrix} \mathbf{P}_{uv} \quad \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_e \\ 0 & 1 & y_e \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_u & x_v & 0 \\ y_u & y_v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_u & x_v & x_e \\ y_u & y_v & y_e \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{canonical-to-frame} \quad \mathbf{P}_{uv} = \begin{bmatrix} x_{uv} & y_{uv} & o_{uv} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{P}_{xy} \quad \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_u & y_u & 0 \\ x_v & y_v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_e \\ 0 & 1 & -y_e \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{frame-to-canonical} \quad \mathbf{P}_{xyz} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{e} \end{bmatrix} \mathbf{P}_{uvw} \quad \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_e \\ 0 & 1 & 0 & y_e \\ 0 & 0 & 1 & z_e \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_u & x_v & x_w & 0 \\ y_u & y_v & y_w & 0 \\ z_u & z_v & z_w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{canonical-to-frame} \quad \mathbf{P}_{uvw} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{e} \end{bmatrix}^{-1} \mathbf{P}_{xyz} \quad \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_u & y_u & z_u & 0 \\ x_v & y_v & z_v & 0 \\ x_w & y_w & z_w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_e \\ 0 & 1 & 0 & -y_e \\ 0 & 0 & 1 & -z_e \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Chapter 7 - Viewing

viewing transformation - 3D location to 2D view of the 3D world

## 1. Viewing Transformations

camera/eye transformation


- places camera/eye at the origin

projection transformation

- projects points from camera space

viewport/windowing transformation


- maps unit image to desired pixels



### 1.1. Viewport Transformation

$$\begin{bmatrix} x_{\text{screen}} \\ y_{\text{screen}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & \frac{n_x-1}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & \frac{n_y-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{\text{canonical}} \\ y_{\text{canonical}} \\ 1 \end{bmatrix} \quad M_{\text{vp}} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 & \frac{n_x-1}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 & \frac{n_y-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 1.2. Orthographic Projection Transformation



$$\begin{bmatrix} x_{\text{pixel}} \\ y_{\text{pixel}} \\ z_{\text{canonical}} \\ 1 \end{bmatrix} = (M_{\text{vp}} M_{\text{orth}}) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad M_{\text{orth}} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & -\frac{n+f}{n-f} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 1.3. Camera Transformation

e - eye position


g - gaze direction

t - view-point vector

w = -g / length(g)

u = -t x w / length(t x w)

v = w x u




$$\mathbf{M}_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{e} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} x_u & y_u & z_u & 0 \\ x_v & y_v & z_v & 0 \\ x_w & y_w & z_w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_e \\ 0 & 1 & 0 & -y_e \\ 0 & 0 & 1 & -z_e \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 2. Projective Transformation

$$y_s = d * y / z$$


$[x \ y \ z]^T$  vector - point  $(x/w, y/w, z/w)$



projective  
transformation/  
homography

$$\begin{aligned} x' &= \frac{a_1x + b_1y + c_1z + d_1}{ex + fy + gz + h} \\ y' &= \frac{a_2x + b_2y + c_2z + d_2}{ex + fy + gz + h} \\ z' &= \frac{a_3x + b_3y + c_3z + d_3}{ex + fy + gz + h} \end{aligned}$$


$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \\ \tilde{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ e & f & g & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



## 3. Perspective Projection

$$\begin{bmatrix} y_s \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n+f & -fn \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & fn \\ 0 & 0 & -1 & n+f \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} nx \\ ny \\ (n+f)z - fn \\ z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \frac{nx}{z} \\ \frac{ny}{z} \\ n+f - \frac{fn}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{M}_{\text{per}} = \mathbf{M}_{\text{orth}} \mathbf{P}$$

$$\mathbf{M}_{\text{per}} = \begin{bmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{l-r} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{b+t}{b-t} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{n-f} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{\text{vp}} \mathbf{M}_{\text{orth}} \mathbf{P} \mathbf{M}_{\text{cam}}$$