



南开大学 作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

1. 设 $f(x) = (2+|x|)(\sqrt{1+\sin x} - 1)$, 则

- A. $f'(0) = 0$. B. $f'(0) = 1$. C. $f'(0) = 2$. D. $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导.

2. 设 $f(x), g(x)$ 都是在 $[a, b]$ 上恒大于零的可导函数, 且

$$f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0, \quad x \in [a, b].$$

则当 $a < x < b$ 时, 有

A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$.

B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$.

C. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$.

D. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$.

3. 设 $f(x) = \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{\tan x}{|x|}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 () 间断点.

- A. 无穷. B. 跳跃. C. 可去. D. 都不是.

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{2-2\cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos x} - 1 + x^2}{(2^x - 1) \tan x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且: $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 0$.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3}$.



南开大学 作业纸

系别 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 第 _____ 页

7、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x) - \ln(1+x)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

8、证明

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, \quad -1 < x < 1.$$

9、 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续三阶导数, 且 $f(0)=0, f(1)=2, f'(1/2)=1$.

证: 在 $(0, 1)$ 内存在 ξ_1 和 ξ_2 , 使得 $f'''(\xi_1) \leq 24 \leq f'''(\xi_2)$

10、设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶导数的函数, 且满足:
(难度较大).

$$f(x) \leq f''(x), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} f(x) = 0.$$

证明: $f(x) \leq 0, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty)$.