

## 5.1 The Properties of Determinants

### ■ 행렬식의 성질

1. 단위행렬의 행렬식은 1임.  $\det I = 1$
  2. 행렬의 두개의 행을 교환하면 행렬식의 부호가 바뀐다
  3. 행렬식은 각각의 행의 1차결합의 형태를 따른다
- (a) 행렬내 한 행에  $t$ 값을 곱하면, 행렬식도  $t$ 만큼 증가함

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

- (b) 행렬내 1개의 행을 제외한 다른 행들이 모두 동일한 행렬  $A, B$ 가 주어진 경우, 두 행렬의 합( $A + B$ )의 행렬식은 개별 행렬들의 행렬식의 합과 같다.

$$\begin{vmatrix} a + a' & b + b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}$$

## 5.1 The Properties of Determinants

- (계속) 행렬식의 성질
  4. 행렬의 두개의 행이 같으면, 행렬식은 0이다.
  5.  $i \neq j$ 인 경우,  $i$ 행에  $t$ 를 곱한 후  $j$ 행에서 뺄 경우 행렬식은 변하지 않는다.
  6. 모든 값이 0인 행이 있는 행렬의 행렬식은 0이다.
  7. 삼각형 형태의 행렬의 행렬식은 대각 원소값들  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 의 곱이다.
  8. 행렬이 singular인 경우 행렬식의 값은 0이다.
  9.  $\det AB = (\det A)(\det B)$
  10.  $\det A^T = \det A$

## 5.1 The Properties of Determinants

### ■ (어제 수업) 행렬식의 성질

10.  $\det A^T = \det A$

□  $|A| = |LU| = |L||U| = |U^T| = |U^T||L^T| = |U^T L^T| = |(LU)^T| = |A^T|$

□  $PA = LU$  인 경우에도 증명

▪ 간단하게 우선  $P$ 가 2행과 3행만 치환하는 경우만 먼저 생각

▪  $|PA| = |LU| = |L||U| = |U^T| = |U^T||L^T| = |U^T L^T| = |(LU)^T| = |(PA)^T| = |A^T P^T| = |A^T||P^T|$

▪  $P$ 가 2행과 3행만 치환하는 경우:  $P_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 은 대칭행렬이므로  $P_{23}^T = P_{23} \rightarrow |P_{23}^T| = |P_{23}| \rightarrow |PA| = |P||A| = |A^T||P^T| \rightarrow |A| = |A^T|$

▪  $P$ 가 여러 permutation행렬들의 곱이라도  $|P| = |P_{ij} \cdots P_{kl}| = |P_{ij} \cdots P_{kl}| = |P_{ij}| \cdots |P_{kl}| = |P_{kl}^T| \cdots |P_{ij}^T| = |P_{kl}^T \cdots P_{ij}^T| = |(P_{ij} \cdots P_{kl})^T|$



## 4.2 Projections

- (어제 수업) 부분 공간에 projection하는 방법
  - ▣ 어제 수업에서  $P = A(A^T A)^{-1} A^T$  는 대칭행렬임을 증명시  
 $((A^T A)^{-1})^T = (A^T A)^{-1}$  임을 증명 못함
  - ▣ (증명) 만약 행렬  $B$ 가 가역행렬이면,  $B^{-1}B = I$  을 만족하는  $B^{-1}$ 가 존재함.
  - ▣  $B^{-1}B = I$  식 전체에 transpose를 가하면,  
$$(B^{-1}B)^T = I = B^T(B^{-1})^T$$
  - ▣ ➔ 위의 식은  $B^T$ 의 역행렬은  $(B^{-1})^T$ 임을 의미. 따라서  $(B^{-1})^T = (B^T)^{-1}$  이 성립함
  - ▣ 그런데, 어제 수업 시간에  $A$ 의 모든 열들이 독립인 경우에는  $A^T A$ 가 항상 역행렬을 가짐을 증명함. 따라서  $((A^T A)^{-1})^T = ((A^T A)^T)^{-1} = (A^T A)^{-1}$ 가 성립

## 5.2 Permutations and Cofactors

### ■ 행렬식의 계산

$$\begin{aligned} \square \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} - \\ \begin{vmatrix} c & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} &= ad - bc \end{aligned}$$

$$\square \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\square \quad \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{는 몇 개의 성분으로 분해되는가? 경우의 수는 } 3^2$$

## 5.2 Permutations and Cofactors

### ■ 행렬식의 계산

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 위의 행렬식을 계산하기 위해서 총 9개의 항으로 전개했다고 가정.
- 9개의 항 중 두번째 행을  $a_{21}$ 으로 채웠다면 세번째 행을 어느 곳을 선택하더라도 항상 전체가 0인 열이 발생하므로 행렬식의 값은 0이 됨.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ \square & \square & \square \end{vmatrix}$$

- 따라서 0이 아닌 항을 얻기 위해서는 두번째 행은 두번째 열 또는 세번째 열이 채워져야 함
- 마찬가지로 세번째 행은 위의 두개의 행과 다른 위치로 결정
- 따라서 첫번째 행의 위치가 결정된 경우 가능한 경우의 수는  $2 \times 1$

## 5.2 Permutations and Cofactors

- 행렬식의 계산

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 위의 행렬식의 0이 아닌 항은 아래와 같다.

- $$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & 0 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23})$$

- 위의 결과는  $a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 로도 표현 가능

## 5.2 Permutations and Cofactors

- 행렬식의 계산

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{12} & 0 & 0 \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 위의 행렬식의 0이 아닌 항은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} & - \left( \begin{vmatrix} a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{31} & 0 \end{vmatrix} \right) = - \left( a_{12}a_{21}a_{33} - \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{31} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \end{vmatrix} \right) \\ & = -(a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{31}a_{23}) = -a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) \end{aligned}$$

- 위의 결과는  $a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ 로도 표현 가능



## 5.2 Permutations and Cofactors

### ■ 행렬식의 계산

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & a_{13} & 0 \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

- 위의 행렬식의 0이 아닌 항은 아래와 같다.

$$\begin{vmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 \\ 0 & 0 & a_{32} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{22} \\ 0 & a_{31} & 0 \end{vmatrix} = a_{13}a_{21}a_{32} - \begin{vmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & a_{31} & 0 \\ 0 & 0 & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$= a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{31}a_{22} = a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$$

- 위의 결과는  $a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ 로도 표현 가능

## 5.2 Permutations and Cofactors

- $\det A = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$   
$$= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{vmatrix}$$
- Cofactor
  - ▣  $a_{ij}$ 의 cofactor  $C_{ij}$  는  $a_{ij}$ 와 같은 행 또는 같은 열에 있는 성분을 제외한 나머지 성분 들로만 이루어진 행렬의 행렬식에  $(-1)^{i+j}$ 를 곱한 값을 나타낸다.
  - ▣ 전체 행렬  $A$ 의 행렬식은 다음과 같다:
  - ▣  $\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$
  - ▣ 위의 합은 반드시 첫번째 행을 따라가면서 계산할 때 뿐만 아니라, 다른 행이나 다른 열을 따라가면서 계산해도 동일함

## 5.3 Inverses

- Cofactor 행렬
  - ▣ 행렬  $A$ 의 cofactor 행렬  $C$ 는 행렬의 그 자리에 해당하는 cofactor를 원소로 갖는 행렬임
  - ▣ Example: 행렬  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 의 cofactor를 구하시오.
  - ▣  $C = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \rightarrow$  연관된 행렬?
  - ▣ Cofactor와 역행렬의 관계는?  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} C^T$

## 5.3 Inverses

### ■ Cofactor 행렬

- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} C^T$  을 확인하기 위해서는  $AC^T = (\det A)I$  임을 보여야 함

$$\square AC^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

- 행렬 곱의 첫번째 행 첫번째 열의 원소는  $\sum_{j=1}^n a_{1j}C_{1j} = \det A$
- 마찬가지로 대각 원소들은  $\sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij} = \det A$
- 첫번째 행 두번째 열의 원소는  $\sum_{j=1}^n a_{1j}C_{2j}$  으로 나타남.
  - 만약 이 합에  $a_{1j}$  대신  $a_{2j}$  가 사용되었다면 이는  $\det A$  에 해당함

$$\square \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- 이것은 거꾸로 현재 형태의 합은 행렬  $A$  의 두번째 행을 행렬  $A$  의 첫번째 행으로 대체한 후 행렬식의 값을 계산한 것과 동일한 결과임
- 따라서 대각 원소를 제외한 모든 나머지 값들은 0임.  $\rightarrow AC^T = (\det A)I$

## 5.2 Permutations and Cofactors

■ Example:  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  의 역행렬 구하기

▣ 행렬식:  $1 \cdot 6 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 1 = 2$

▣ Cofactor 행렬:  $C = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

▣ 역행렬:  $\frac{1}{\det A} C^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

▣ 확인:  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

## 6.1 Eigenvalues and Eigenvectors

- Eigenvector와 Eigenvalue
  - 행렬  $A$ 가 주어졌을 때 eigenvector는 행렬에 곱했을 때, 자기 자신과 평행한 결과를 얻을 수 있는 벡터임
$$Ax = \lambda x$$
  - 위의 관계에서  $\lambda$ 는 eigenvalue라고 불린다.
  - Eigenvector와 Eigenvalue는 정사각 행렬에 대해서만 고려함
- Eigenvector와 eigenvalue를 구하는 방법
  - Eigenvector와 eigenvalue를 둘 다 모르므로, 불확실성을 줄이기 위해 eigenvalue를 먼저 구하고 이를 이용해서 eigenvector를 구함
  - $Ax = \lambda x \rightarrow (A - \lambda I)x = \mathbf{0}$ 를 만족하는  $\lambda$ 를 먼저 구함
  - 위의 식을 만족하는 0이 아닌 벡터가 존재하기 위해서는  $(A - \lambda I)$ 의 역행렬이 존재하면 안됨.  $\rightarrow$  행렬식이 0
  - $\det(A - \lambda I) = 0$ 을 만족하는  $\lambda$ 를 구함  $\rightarrow$  Characteristic equation

## 6.1 Eigenvalues and Eigenvectors

- $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 eigenvector와 eigenvalue를 구하시오.
  - $\det(A - \lambda I) = \det\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$
  - $\rightarrow$  Characteristic equation:  $(3 - \lambda)^2 - 1 = 0$
  - $\lambda = 3 \pm 1 = 4, 2$
  - $\lambda = 4$ 인 경우
    - $\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
    - $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow$  확인:  $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
  - $\lambda = 2$ 인 경우
    - $\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
    - $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow$  확인:  $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

## 6.1 Eigenvalues and Eigenvectors

### ■ 특징

- 주의: 소거법에 사용되는 하나의 행을 다른 행에 더하거나 치환하는 연산들은 eigenvalue값을 바꿈
- 행렬이  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 을 eigenvalue로 가질 때, 행렬의 행렬식 값은 모든 eigenvalue값들의 곱  $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 과 같다.
  - (증명)  $(A - \lambda I)$ 의 행렬식은 항상  $(\lambda_i - \lambda)$ 들의 곱으로 나타낼 수 있다.
  - $\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$
  - 위 식의  $\lambda$ 를 0으로 잡으면,
  - 왼쪽: 주어진 행렬의 행렬식
  - 오른쪽: 모든 eigenvalue값들의 곱  $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$
- 삼각 행렬의 대각성분들의 곱은 모든 eigenvalue값들의 곱과 같다.



## 6.1 Eigenvalues and Eigenvectors

- 복소수의 eigenvalues
  - $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 은 평면내에서 모든 벡터를 90도 회전시킴
  - Eigenvector가 존재할 수 있을까?
  - $\det(Q - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$
  - $\lambda = i \Rightarrow \begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -ix_1 - x_2 \\ x_1 - ix_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -ix_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$
  - $\lambda = -i \Rightarrow \begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ix_1 - x_2 \\ x_1 + ix_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ ix_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$
  - 일반적으로는 eigenvalue가 실수가 되는 것을 보장할 수 없지만, 대칭 행렬은 항상 실수의 eigenvalue를 가짐

## 6.1 Eigenvalues and Eigenvectors

- $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 의 eigenvector와 eigenvalue를 구하시오.
  - $\det(A - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix} = 0$
  - $\rightarrow$  Characteristic equation:  $(3 - \lambda)^2 = 0 \rightarrow \lambda = 3$
  - 일반적으로 2차방정식은 2개의 해를 가지지만 이와 같이 2개의 해가 같은 경우에는 eigenvector가 1개만 존재할 수도 있음
  - $\lambda = 3 \rightarrow \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow$  확인:  $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
  - 위와 같은 경우 다른 eigenvector가 존재할 방법이 없음

## 6.2 Diagonalizing a Matrix

### ■ 행렬의 대각화

- 행렬  $A$ 가  $n$ 개의 서로 독립인 eigenvector들을 갖는다면, 이 eigenvector들을 열로 가지는 정사각행렬  $S$ 를 다음과 같이 정의하면

$$S = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{x}_n]$$

- $S$ 와  $A$ 사이에는 다음의 관계가 존재한다.

- $AS = A[\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{x}_n] = [\lambda_1 \mathbf{x}_1 \quad \lambda_2 \mathbf{x}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n \mathbf{x}_n] =$

$$[\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{x}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = S\Lambda$$

- 행렬  $\Lambda$ 는 행렬  $A$ 의 모든 eigenvalue들을 대각 원소로 가지는 행렬임
- 행렬  $S$ 는 가역행렬. Why?
- $S^{-1}AS = \Lambda$  또는  $A = SAS^{-1}$ 임

## 6.2 Diagonalizing a Matrix

- $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의  $S$  행렬을 구하고, 이를 이용하여  $\Lambda$ 를 구하시오.
  - ▣ 앞의 문제 풀이에서  $\lambda = 4, 2$ 이고, 다음의 eigenvector들을 구할 수 있음을 보임.
  - ▣  $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
  - ▣  $S = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
  - ▣  $\Rightarrow S^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$
  - ▣  $S^{-1}AS = S^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = S^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$   
 $= \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \Lambda$

## 6.2 Diagonalizing a Matrix

- 행렬의 대각화는 왜 유용할까?

- $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 가 주어졌을 경우,  $A^3$ 을 구해야 한다면?

- $A^3 = AA^2 = A \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 28 \\ 28 & 36 \end{bmatrix}$

- $A = S\Lambda S^{-1}$ 임을 이용하면,

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- $A^3 = AA^2 = A(S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) = A(S\Lambda^2 S^{-1}) = (S\Lambda S^{-1})(S\Lambda^2 S^{-1}) = S\Lambda^3 S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 64 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} S^{-1} = \begin{bmatrix} 64 & 8 \\ 64 & -8 \end{bmatrix} S^{-1} = \begin{bmatrix} 64 & 8 \\ 64 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 28 \\ 28 & 36 \end{bmatrix}$

## 6.2 Diagonalizing a Matrix

- 행렬의 trace
  - ▣ 정사각 행렬의 대각 성분의 합을 trace라고 한다.
  - ▣ 행렬  $A$ 의 성분을  $a_{ij}$ 라고 하면,  $tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$
  - ▣  $tr(AB) = tr(BA)$  Why?
  - ▣  $A = S\Lambda S^{-1}$ 임을 이용하면,  $tr(A) = tr(\Lambda)$ . Why?
  - ▣ 일반적으로  $A$ 의 eigenvector가  $n$ 개 보다 작을 경우에도 행렬의 trace는 모든 eigenvalue의 합과 같다.

## 6.4 Symmetric Matrices

- 특수한 관계를 가진 벡터들( $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ )을 열로 가진 행렬  $A$ 의 응용  
  - $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$
  - $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 가 모두  $\mathbf{R}^n$ 공간에 속하고 서로 독립인 경우  $A$ 는 가역행렬
  - Projection 행렬:  $P = A(A^T A)^{-1}A^T$
  - 정규 직교 벡터( $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ )들을 열로 가지는 행렬  $Q = [\mathbf{q}_1 \ \cdots \ \mathbf{q}_n]$
  - 직교 행렬: 위의 행렬이 정사각행렬일 경우
  - Gram-Schmidt 직교화를 거친  $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ 를 이용  $\rightarrow$  QR 분해,  $A = QR$
  - 독립인 eigenvector로만 이루어진 행렬  $\rightarrow S = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n], S^{-1}AS = \Lambda$

## 6.4 Symmetric Matrices

- 대칭 행렬의 특징
  - ▣ 모든 성분이 실수(real number)인 대칭 행렬은 모든 eigenvalue 들이 실수이다.
    - (증명) 어떤 값  $\lambda$ 가 실수임으로 보이려면,  $\lambda$ 의 켤레 복소수 (complex conjugate)  $\lambda^* \equiv \bar{\lambda}$ 가 원래 값  $\lambda$ 와 같음을 보이면 됨:  $\lambda^* = \lambda$
    - $Ax = \lambda x \rightarrow A^*x^* = \lambda^*x^* = Ax^* \rightarrow Ax^* = \lambda^*x^*$
    - Transpose를 취하면,  $x^{*T}A^T = \lambda^*x^{*T} \rightarrow x^{*T}A = \lambda^*x^{*T}$  Why?
    - 양변의 오른쪽에 벡터  $x$ 를 곱하면,  $x^{*T}Ax = \lambda^*x^{*T}x$
    - 만약 원래  $Ax = \lambda x$ 식의 왼쪽에  $x^{*T}$ 를 곱하면,  $x^{*T}Ax = \lambda x^{*T}x$
    - 따라서  $\lambda^*x^{*T}x = \lambda x^{*T}x \rightarrow x$ 가 0이 아니면,  $\lambda^* = \lambda$



## 6.4 Symmetric Matrices

- 대칭 행렬의 특징
  - ▣ (증명 계속) 모든 성분이 실수(real number)인 대칭 행렬은 모든 eigenvalue들이 실수이다.
  - 벡터의 성분이 복소수일 경우에는 벡터의 크기의 제곱은  $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ 이 아니라  $\mathbf{x}^{*T} \mathbf{x}$ 로 계산해야 함
  - $\mathbf{x}^{*T} \mathbf{x} = [x_1^* \quad x_2^* \quad \cdots \quad x_n^*] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2$

## 6.4 Symmetric Matrices

- 대칭 행렬의 특징
  - 서로 다른 eigenvalue를 가진 모든 eigenvector들은 서로 직교한다.
    - eigenvector  $\mathbf{x}$ 는  $\lambda_1$ 을 eigenvalue로 가지고, eigenvector  $\mathbf{y}$ 는  $\lambda_2$ 을 eigenvalue로 가진다고 가정  $\lambda_1 \neq \lambda_2$
    - $A\mathbf{x} = \lambda_1\mathbf{x}$  ,  $A\mathbf{y} = \lambda_2\mathbf{y}$
    - 각각의 양변에  $\mathbf{y}^T$ 와  $\mathbf{x}^T$ 를 곱함.  $\rightarrow \mathbf{y}^T A\mathbf{x} = \mathbf{y}^T \lambda_1\mathbf{x}$  ,  $\mathbf{x}^T A\mathbf{y} = \mathbf{x}^T \lambda_2\mathbf{y}$
    - 첫번째 등식의 transpose를 구하면,  $\mathbf{x}^T A\mathbf{y} = \mathbf{x}^T \lambda_1\mathbf{y}$
    - 따라서  $\mathbf{x}^T \lambda_2\mathbf{y} = \mathbf{x}^T \lambda_1\mathbf{y}$
    - $\mathbf{x}^T \mathbf{y}(\lambda_2 - \lambda_1) = 0 \rightarrow$  누가 0일까?
  - 만약 eigenvalue들이 같다면?
    - Eigenvector들은 부분 공간을 이룸.
    - Gram-Schmidt 직교화를 통해 직교하는 eigenvector 공간의 기저를 구할 수 있음

## 6.4 Symmetric Matrices

- 대칭 행렬에  $S = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{x}_n]$ ,  $A = S\Lambda S^{-1}$  관계를 적용

- ▣  $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_n]$

- ▣  $A = Q\Lambda Q^{-1} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \mathbf{q}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^T \end{bmatrix} =$

$$\lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \lambda_2 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^T + \cdots + \lambda_n \mathbf{q}_n \mathbf{q}_n^T$$

- ▣  $\mathbf{q}_k \mathbf{q}_k^T$ 는  $\mathbf{q}_k$  벡터에 대한 projection이므로 projection을 한 후 그 성분을  $\lambda_k$  배 했다고 해석 가능