擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）

2026 年 10 月 12 日

概要

ϕ^3 理論と $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1, 2] に続き、フェルミオンを含む模型を $d = 4$ で調べる。模型は、実の擬スカラー場 ϕ と Dirac フェルミオン ψ が、湯川結合 $-iy\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ と自己相互作用 $\lambda\phi^4/4!$ を持つ理論である。パリティ（$\phi \to -\phi$）があるので ϕ の 1 次と 3 次の項は現れず、結合は y と λ の二つで閉じる。本ノートでは、まず Feynman 則、閉じたフェルミオンのループの符号、1 ループの 1PI 関数（ϕ と ψ の自己エネルギー、湯川の頂点、ϕ の 4 点関数）、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、繰り込み群の係数を手で求めた。$\beta_y = 5y^3/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda = (3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4)/(4\pi)^2$ で、フェルミオンのループが β_λ に負の項 $-48y^4$ を与える。フェルミオンの箱の図は、トレースを伝播関数の分母で書き直すと、B_0、C_0、D_0 だけの短い式になる。1 ループでは比 λ/y^2 の流れが解析的に解ける。その結果、$\lambda > r_+ y^2$（$r_+ = (1 + \sqrt{145})/3 \approx 4.35$）なら λ が、$\lambda < r_+ y^2$ なら λ が負になるのが、y の Landau 極より先に起こる。基準点 $y = \lambda = 1$（$\mu = m$）では、$\mu \approx 19.5\, m$ で $\lambda = 0$ となる。木のレベルでは、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ は $\psi\bar{\psi}$ の閾値で p 波から始まり、$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ のスピン和はフェルミオンの質量に陽によらない。$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの S 行列要素の μ 依存は、β_λ の三つの項をすべて含む。最後に検算の計画を定め、その十二の手順をすべて行った。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts と UFO の頂点、MadGraph の図の数は手計算と一致した。同種のフェルミオンの散乱 $\psi\psi \to \psi\psi$ を加えた四つの過程の木の振幅とスピン和は、FeynCalc でも、Dirac 行列とスピノルを陽に作った数値計算でも手計算と一致し、MadGraph の断面積は数値積分と統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。1 ループの 1PI 関数では、極と六つの対抗項が FeynCalc の結果と記号として一致し、有限部分は Package-X、LoopTools、COLLIER と相対 5×10^{-12} 以内で一致した（LoopTools が誤った C_0 を返す一点を除く）。γ^5 を BMHV の処方で扱うと、四つの 1PI 関数は NDR と有限の局所的な項だけ異なる。$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅も二つのスピノルの構造の係数として閉じた形に書け、FeynCalc と FormCalc の結果、COLLIER での数値、外線のスピンを固定したユニタリー性と一致した。極質量と留数で直した S 行列要素は、NLOCT で作った UFO の MadLoop の値と相対 2×10^{-11} 以内で一致し、NLOCT の R2 の項は NDR の処方のものであることを手で確かめた。$\phi\phi$ 散乱の全断面積を y^6 の次数（$\lambda \sim y^2$）まで求めると、1 ループの補正と $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ を合わせて、木の値より $\sqrt{s} = 2.5m$ で 8%、$20m$ で 23% 大きくなった。1 ループの部分は同じ分点の MadLoop と相対 2×10^{-10} 以内で一致した。$\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ の MadGraph の断面積は、行列要素は一致するのに、ビームの向きに出るフェルミオンの伝播関数の山を十分に積分できず、最大 2.4% 小さかった。S 行列要素と極質量の μ 依存から読み取った β_λ、β_y、γ_M、γ_m は、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量と極質量の二つの処方の四つのツールで手計算と相対 4×10^{-12} 以内で一致し、Machacek と Vaughn の一般の公式も六つの係数をすべて再現した。$\phi\phi$ と $\psi\bar{\psi}$ のヘリシティの部分波を合わせた木のユニタリー性は、結合を固定すると $y < \sqrt{8\pi/3}$、$|\lambda| < 16\pi$ を与え（一般の湯川理論の文献の値と一致）、結合の走りを入れて $10m$ まで使うことを求めると $y(m) \le 1.94$ になる。繰り込み群で改良した有効ポテンシャルは基準点で $\phi \approx 39m$ から負になり、$\lambda < 0$ の bounce の作用 $16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ は小さな R に向かって単調に減って極小を持たないので、真空の崩壊は理論の切断のスケールで決まる。Andreassen らの閉じた形のフェルミオンと ϕ の行列式を Gel'fand–Yaglom の方法と運動量積分で独立に確かめて 1 ループの前因子を求めると、フェルミオンの行列式は崩壊を速めるが、λ の零点の近くでは補正が木と同じ程度になる。そこで λ を $y^4/(4\pi)^2$ と同じ次数と数え直し、フェルミオンの行列式の大きな部分が局所的な有効ポテンシャルであること（微分展開、部分波の和と $|w| = 1000$ まで一致）を使って bounce の作用に足し上げた。大きさを固定した bounce を球面 S^4 の上で解くと、作用は $16\pi^2 f(\varepsilon)/|\lambda(\mu_R)|$（$f = 1 + \frac{13}{90}\varepsilon^2 + \cdots$）で、大きさ R の bounce は $1/R$ ではなく $\mu_R \approx 1.4y/(\sqrt{|\lambda|}R)$ の結合を見る。崩壊率は λ の零点の近くでも数 % の幅で決まり、ヒッグスに読み替えた宇宙論的な条件は、基準点で bounce の大きさの切断を $\Lambda_{\max} = 16.0m$（λ の零点の 0.82 倍、木の評価の 2.6 分の 1）に制限する。$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ の 1 ループの振幅は、頂点の補正が一つの擬スカラーの形状因子に、箱が二つの ϕ と二つの ψ の階数 2 のテンソル積分にまとまり、FeynCalc の射影、MadLoop、部分波のユニタリー性と一致した。これで $J = 0$ の部分波の行列が 1 ループで完成し、1 ループのユニタリー性は $\mu = m$、$\sqrt{s} \le 4m$ で $y \le 2.86$（$\mu = m/2$〜$2m$ で 2.77〜3.04）を与える。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 3

2 設定 3

3 結果 5

4 検算の計画 11

5 検算 12

6 繰り込み群 17

7 摂動論の限界と真空の安定性 20

8 議論と今後 30

付録 A Feynman 則と対称性因子の導出 30

付録 B 次元とべき数え上げ 31

付録 C γ^5、トレース、パリティ 31

付録 D 1PI 関数と対抗項の導出 32

付録 E 繰り込み群と有効ポテンシャルの導出 34

付録 F 木の振幅と断面積の導出 35

付録 G 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と S 行列要素の導出 37

付録 H 1 ループの $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の導出 38

付録 I 全断面積の式の導出 39

付録 J γ^5 の処方の違いの導出 41

付録 K 繰り込み群の検算の導出 42

付録 L 部分波のユニタリー性の導出 44

付録 M 有効ポテンシャルの改良と bounce の導出 45

付録 N 崩壊率の 1 ループの前因子の導出 46

付録 O $\lambda \approx 0$ の近くの足し上げの導出 47

付録 P $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ の 1 ループの振幅の導出 49

付録 Q 検算の細部 50

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、フェルミオンを含む最も簡単な繰り込み可能な模型で、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造はどうなるか。そして、その構造を ϕ^3 理論と同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の物理について何が言えるか。**とくに、摂動論が使える結合の範囲と、フェルミオンのループによる真空の不安定化を調べる。

第一の問いを立てる理由は、これまでの二つのノート [1, 2] がスカラー場だけを扱い、フェルミオンに固有の計算をツールで確かめる機会がなかったからである。フェルミオンを入れると、閉じたループの符号 -1 とスピンのトレース、γ^5 の扱い、自己エネルギーの Lorentz 構造（$\not{p}$ の項と質量の項）、外線のスピン和、フェルミオンの LSZ の留数が新たに現れる。場の繰り込み δ_ϕ も 1 ループで 0 でなくなる。擬スカラーの湯川結合を選ぶのは、パリティによって ϕ の 1 次と 3 次の項が禁じられ、繰り込みで閉じる結合が y と λ の二つだけになるからである。タドポールを打ち消す線形項も要らない。第二の問いを立てる理由は、この模型が、トップクォークのループが標準模型のヒッグスの 4 点結合を高エネルギーで負にする機構を、最も簡単な形で含むからである。$\phi^3 + \phi^4$ 理論で作った bounce と前因子の道具を、フェルミオンの寄与を加えて使える。

求める量は五つである。(i) Feynman 則と対称性因子、閉じたフェルミオンのループの符号。(ii) 1 ループの 1PI 関数（ϕ の 2 点・4 点関数、ψ の 2 点関数、湯川の頂点）の紫外発散部分と、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数と、繰り込み群の係数（β_y、β_λ、二つの質量の走り、二つの場の異常次元）。(iv) $\phi\phi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の木の振幅、$\phi\phi \to \phi\phi$ と $\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の 1 ループの振幅とその S 行列要素、フェルミオンの極質量と留数、$\phi\phi$ 散乱の木の次の次数の全断面積。(v) 応用として、部分波のユニタリー性の限界と、真空の安定性（繰り込み群で改良した有効ポテンシャル、$\lambda < 0$ の bounce、フェルミオンの行列式を含む崩壊率と、$\lambda \approx 0$ の近くでのその足し上げ）。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の出発点になる繰り込み群の流れと有効ポテンシャルを述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で手順 (1)〜(6) の検算の結果を示す。第 6 節で、繰り込み群の係数を S 行列要素からツールで読み取り、文献の公式と比べる（手順 (7)）。第 7 節で、部分波のユニタリー性と真空の安定性から結合の限界を調べる（手順 (8)〜(12)）。第 8 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 P に、検算の細部は付録 Q にある。

2　設定

模型は、質量 m の実の擬スカラー場 ϕ と、質量 M の Dirac フェルミオン ψ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & \bar\psi\,(i\not{\partial} - M)\,\psi + \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - iy\mu^\epsilon\,\phi\,\bar\psi\gamma^5\psi - \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4 \\ & + \delta_\psi\,\bar\psi\,i\not{\partial}\,\psi - \delta_M\bar\psi\psi + \frac{1}{2}\,\delta_\phi\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - i\delta_y\mu^\epsilon\,\phi\,\bar\psi\gamma^5\psi - \frac{\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4\end{aligned} \tag{1}$$

とする。1 行目が繰り込まれた量で書いた模型、2 行目が対抗項である。$\bar\psi i\gamma^5\psi$ はエルミートなので、湯川の項 $-y\phi\,\bar\psi i\gamma^5\psi$ は実の y でエルミートである（付録 C）。定数項（真空のエネルギー）とその対抗項は、有効ポテンシャルを扱うときにだけ加える。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。$\not{a} \equiv \gamma^\mu a_\mu$、$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$、$(\gamma^5)^2 = 1$ である。
2. 場は実スカラー ϕ と Dirac フェルミオン ψ がそれぞれ 1 つで、相互作用は擬スカラーの湯川結合と ϕ^4 だけとする。y は実数で、物理量は y^2 だけによる（$\phi \to -\phi$ で $y \to -y$）。$\lambda \geq 0$、$m^2 > 0$、$M > 0$ とする。ϕ が $\psi\bar\psi$ に崩れないように $m < 2M$ とする。
3. 模型はパリティ $\phi(t,\boldsymbol{x}) \to -\phi(t,-\boldsymbol{x})$、$\psi(t,\boldsymbol{x}) \to \gamma^0\psi(t,-\boldsymbol{x})$ で不変とする。これは ϕ、ϕ^3、$\phi\bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi$ の

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実の擬スカラー場と、その（繰り込まれた）質量（模型ファイル `Src/PsYukawa.fr` の `phi`、`mphi`）
ψ, M	Dirac フェルミオンと、その質量（`psi`、`Mpsi`）
y	擬スカラーの湯川結合（`yps`）。無次元
λ	4 点結合（`lamphi`）。無次元
D, ϵ	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$ と、その 4 からのずれ
μ	繰り込みスケール（$\overline{\mathrm{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	$1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_ϕ, δ_m, δ_ψ, δ_M, δ_y, δ_λ	ϕ の場・ϕ の質量・ψ の場・ψ の質量・湯川結合・4 点結合の対抗項（$\overline{\mathrm{MS}}$）
Z_ϕ, Z_ψ	場の繰り込み定数 $Z_\phi = 1 + \delta_\phi$、$Z_\psi = 1 + \delta_\psi$
$D_a(k)$, I_1^a, I_2^{ab}	伝播関数の分母 $k^2 - m_a^2 + i0$ と、1 点・2 点のスカラー積分（式 (3)）。添字 a, b は内線の質量 m または M
V_ϕ, V_ψ, V_y, V_4	1PI の ϕ の 2 点関数、ψ の 2 点関数、$\phi\bar\psi\psi$ の 3 点関数、ϕ の 4 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, B_1, C_0, C_i, D_0	1 ループ積分の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分。LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じ。$B_n^{ab}(p^2) \equiv B_n(p^2; m_a^2, m_b^2)$
$\mathcal{F}(x, x')$	フェルミオンの箱の図の和を B_0、C_0、D_0 で書いたもの（式 (7)）
s, t, u	Mandelstam 変数
$\mathcal{M}_A$, $\mathcal{M}_B$, $\mathcal{M}_C$	$\phi\phi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の振幅（式 (11)）。上付きの (0)、(1) は木と 1 ループ
$\mathcal{M}_3$	$\phi\phi \to \phi\psi\bar\psi$ の木の振幅（式 (22)）
$\mathcal{Y}_A$, $\mathcal{Y}_a$, $\mathcal{Y}_b$	物理量を「木の値 $+\,\mathcal{Y}(\mu)$」と書いたときの 1 ループの部分（$\phi\phi \to \phi\phi$ と $\psi\bar\psi \to \phi\phi$ の二つの構造、式 (24)）
σ_A, $\sigma_{\bar B}$, σ_3, σ_{tot}	$\phi\phi \to \phi\phi$、$\phi\phi \to \psi\bar\psi$、$\phi\phi \to \phi\psi\bar\psi$ の断面積と、$\phi\phi$ 散乱の全断面積（式 (21)）。上付きの (0)、(1) は y^4、y^6 の次数の項
$\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のフェルミオンのスピンについての和（平均ではない）
Σ_ϕ, Σ_ψ	自己エネルギー $\Sigma_\phi \equiv iV_\phi$、$\Sigma_\psi \equiv iV_\psi$。完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma_\phi)$、$i/(\not p - M - \Sigma_\psi)$
m_{p}, R_ϕ, M_{p}, R_ψ	ϕ と ψ の極質量と留数（式 (15)、(17)）
β_y, β_λ	$\beta_y \equiv \mathrm{d}y/\mathrm{d}\ln\mu$、$\beta_\lambda \equiv \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon \to 0$ の値）
γ_m, γ_M	質量の走り $\gamma_m \equiv \mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$、$\gamma_M \equiv \mu\,\mathrm{d}M/\mathrm{d}\mu$
γ_ϕ, γ_ψ	場の異常次元 $\gamma_\phi \equiv \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\ln Z_\phi/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_\psi \equiv \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\ln Z_\psi/\mathrm{d}\ln\mu$
r, $r_\pm$	比 $r \equiv \lambda/y^2$ と、その流れの固定点 $r_\pm = (1 \pm \sqrt{145})/3$（式 (9)）
V_{eff}, $m_\phi^2(\phi)$, $M_\psi^2(\phi)$	1 ループの有効ポテンシャルと、場に依存する質量の 2 乗（式 (10)）
E_ϕ, E_ψ, V_y, V_4, L	図の外の ϕ 線、外のフェルミオン線、湯川の頂点、4 点頂点、ループの数

項を禁じる（付録 C）。そのため、タドポールを打ち消す線形項も、3 点結合も置かない。

4. 時空次元は $d = 4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。D 次元では ϕ の質量次元は $1 - \epsilon$、ψ の質量次元は $3/2 - \epsilon$ なので、無次元の y と λ に μ^ϵ、$\mu^{2\epsilon}$ を掛けて書く（付録 B）。
5. γ^5 は D 次元のすべての γ^μ と反可換とし（NDR）、スピンのトレースは $\mathrm{tr}\,1 = 4$ とする。1 ループでは、この処方に曖昧さは生じない（付録 C）。
6. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。
7. 数値を比べるときの基準点は $m = \mu = 1$、$M = 0.7$、$y = \lambda = 1$ とする（M と μ は m を単位とする）。$M \neq m$ とするのは、二つの質量の取り違えをツールの検算で見つけられるようにするためである。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。積分の記号はこれまでのノートと同じで、質量の違う内線を区別する添字を加えた。




図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。破線は ϕ、矢印の付いた実線は ψ で、矢印はフェルミオン数の流れの向きである。上の段は左から ϕ と ψ の伝播関数、湯川の頂点、4 点頂点。下の段はそれぞれの対抗項で、$\otimes$ は対抗項の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。閉じたフェルミオンのループには -1 とトレースが付く。




図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。括弧は外線の付け方の数である。(a) と (f) は閉じたフェルミオンのループで、-1 とトレースが付く。(f) の 6 通りは、4 本の外線をループに付ける巡回の順序（向きを区別して $3! = 6$）である。(g) と (h) は γ^5 を奇数個含むトレースで 0 になり、パリティで禁じられた ϕ と ϕ^3 の項が生じないことを表す（付録 C）。

3　結果

■ Feynman 則と対称性因子。　式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。ϕ の伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$、ψ の伝播関数は $i(\not{p}+M)/(p^2-M^2+i0)$、湯川の頂点は $y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点頂点は $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。湯川の頂点に i が付かないのは、相互作用 $-iy\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ の $-i$ と、頂点の規則の i が打ち消すからである。対抗項は、ϕ の 2 点の挿入 $i(\delta_\phi p^2-\delta_m)$、$\psi$ の 2 点の挿入 $i(\delta_\psi\not{p}-\delta_M)$、湯川の挿入 $\delta_y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点の挿入 $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ になる。閉じたフェルミオンのループには、因子 -1 とスピンのトレースが付く。1 ループの 1PI 図は図 2 の (a)〜(f) である。対称性因子は、ϕ の線だけでできたループ（(b)、(e)）で 1/2、フェルミオンの線を含むループで 1 である。フェルミオンの線には向きがあるので、二つの内線が入れ替わる対称性がない。フェルミオンの箱 (f) は、4 本の外線をループに付ける順序が 6 通りあり、互いに向きが逆の 2 つずつは同じ値を持つ。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。

■ **べき数え上げ。** 外の ϕ 線 E_ϕ 本、外のフェルミオン線 E_ψ 本の図の表面的な発散次数は、$d=4$ で

$$\omega = 4 - E_\phi - \frac{3}{2}E_\psi \tag{2}$$

である（付録 B）。湯川の頂点と 4 点頂点はどちらも無次元の結合なので、ω は頂点の数によらない。$\omega \geq 0$ となるのは、$(E_\phi, E_\psi) = (1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(0,2),(1,2)$ の 6 種類である。このうち ϕ の 1 点関数と 3 点関数はパリティで 0 になる。残りの 4 種類が図 2 の V_ϕ（$\omega=2$）、V_4（$\omega=0$）、V_ψ（$\omega=1$）、V_y（$\omega=0$）で、式 (1) の対抗項がちょうどそれらに対応する。$\phi\phi\psi\bar{\psi}$ の 4 点関数（$\omega=-1$）と、フェルミオン 4 本の関数（$\omega=-2$）は有限である。

■ **パリティと消える図。** 1 ループで ϕ の 1 点関数を作る図は、フェルミオンのループ (g) だけである。そのトレース $\mathrm{tr}[\gamma^5(\not{k}+M)]$ は 0 である。ϕ の 3 点関数を作る図はフェルミオンの三角形 (h) で、そのトレースは γ^5 を 3 つ含み、γ^5 を 1 つにまとめると、残りの γ 行列は 3 個以下になる。γ^5 と 3 個以下の γ 行列のトレースは 0 なので、(h) も 0 である（付録 C）。これらが 0 になるのは、パリティが ϕ と ϕ^3 の項を禁じることの 1 ループでの現れである。したがって、本模型には線形項 $Y\phi$ も 3 点結合も要らない。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$（$m_a = m$ または M）と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$I_1^a \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)}, \qquad I_2^{ab}(p^2) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\,D_b(k+p)} \tag{3}$$

と定義する。図 2 の図を Feynman 則で書き、トレースと γ^5 を整理して対抗項を加えると

$$\begin{aligned}
V_\phi(p^2) &= 2y^2\mu^{2\epsilon}\big[p^2 I_2^{MM}(p^2) - 2I_1^M\big] + \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{2}\,I_1^m + i\big(\delta_\phi p^2 - \delta_m\big),\\
V_\psi(p) &= y^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\not{k} - M}{D_M(k)\,D_m(k-p)} + i\big(\delta_\psi \not{p} - \delta_M\big),\\
V_y &= -iy^3\mu^{3\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\big(M^2 - k^2 - M\not{q} - \not{q}\not{k}\big)\gamma^5}{D_M(k+q)\,D_M(k)\,D_m(k-p)} + \delta_y\mu^\epsilon\gamma^5,\\
V_4 &= \frac{\lambda^2\mu^{4\epsilon}}{2}\sum_{x=s,t,u} I_2^{mm}(x) - y^4\mu^{4\epsilon}\sum_{(6)}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{T}{D_M(k_1)D_M(k_2)D_M(k_3)D_M(k_4)} - i\,\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}
\end{aligned} \tag{4}$$

となる（付録 D）。V_ψ の p は入ってくるフェルミオンの運動量である。V_y では、入ってくるフェルミオンの運動量を p、入ってくる ϕ の運動量を q、出ていくフェルミオンの運動量を $p' = p+q$ とした。V_4 の $k_1,\ldots,k_4$ は箱の 4 本の伝播関数の運動量で、トレースは $T = \mathrm{tr}[(M-\not{k}_1)(M+\not{k}_2)(M-\not{k}_3)(M+\not{k}_4)]$ である。$\gamma^5(\not{\phi}+M)\gamma^5 = -\not{\phi}+M$ を使って γ^5 を消した。V_ϕ の第 1 項の符号は、閉じたフェルミオンのループの -1 から来る。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。** $d=4$ で発散するのは、I_1、I_2、ベクトルの 2 点積分、および V_y と V_4 の中で分子の運動量の 2 乗が分母の運動量の 2 乗を打ち消す項である。極を取り出すと（付録 D）、式 (4) の極を消す対抗項は

$$\begin{aligned}
\delta_\phi &= -\frac{2y^2}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_m = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{\lambda m^2}{2} - 4y^2M^2\Big)\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\psi = -\frac{y^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}},\\
\delta_M &= -\frac{y^2 M}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_y = \frac{y^3}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\lambda = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{3\lambda^2}{2} - 24y^4\Big)\Delta_{\mathrm{UV}}
\end{aligned} \tag{5}$$

である。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違って、ϕ の場の対抗項 δ_ϕ が 0 でなくなる。これはフェルミオンのループ (a) の極が p^2 に比例する部分を持つからで、閉じたループの -1 のために $\delta_\phi < 0$ である。δ_λ の $-24y^4$ はフェルミオンの箱 (f) の 6 つの図から来て、やはり -1 のために負である。δ_M の符号は、スカラーの湯川結合 $y\phi\bar{\psi}\psi$ の場合と逆になる。γ^5 がフェルミオンの伝播関数の質量の項の符号を反転させるからである。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (5) を式 (4) に入れて $\epsilon \to 0$ とすると

$$
\begin{aligned}
V_\phi(p^2) &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2 B_0^{MM}(p^2) - 2A_0(M^2)\big) + \frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big],\\
V_\psi(p) &= -\frac{iy^2}{(4\pi)^2}\Big[\not{p}\, B_1^{Mm}(p^2) + M\, B_0^{Mm}(p^2)\Big],\\
V_y &= -\frac{y^3}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{Mm}(p'^2) + M\not{q}\, C_0 + q^2 C_1 - \not{q}\not{p}\, C_2\Big]\gamma^5,\\
V_4 &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[\frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u} B_0^{mm}(x) - 2y^4 \sum_{(x,x')} \mathcal{F}(x,x')\Big]
\end{aligned}
\tag{6}
$$

となる（付録 D）。A_0、B_0、B_1、C_i は LoopTools の規約の $\overline{\rm MS}$ の有限部分で、B_1 は $\int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/(D_a(k)D_b(k+p))$ の p^μ の係数、$C_i \equiv C_i(q^2, p'^2, p^2; M^2, M^2, m^2)$ である。V_4 は外線の ϕ がすべて質量殻上（$p_i^2 = m^2$）のときの値で、和は $(x,x') = (s,t),(t,u),(u,s)$ についてとる。フェルミオンの箱の図の和は

$$
\mathcal{F}(x,x') = (2m^4 - xx')\, D_0^M(x,x') + 2\big[B_0^{MM}(x) + B_0^{MM}(x')\big] + 2(x - 2m^2)\, C_0^M(x) + 2(x' - 2m^2)\, C_0^M(x') \tag{7}
$$

となる。ここで $C_0^M(x) \equiv C_0(m^2, m^2, x; M^2, M^2, M^2)$、$D_0^M(x,x')$ は外線の質量の 2 乗がすべて m^2 で、二つのチャンネルの不変量が x、x' の箱の積分（内線の質量はすべて M）である。この短い形は、トレース T の中の内積 $k_i \cdot k_j$ を分母 $D_M(k_i)$、$D_M(k_j)$ と外線の不変量で書き直すと、T が分母の 2 次式になることから得られる（付録 D）。その際、T の定数項からフェルミオンの質量 M は消える。自己エネルギーは

$$
\Sigma_\phi = -\frac{1}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2 B_0^{MM}(p^2) - 2A_0(M^2)\big) + \frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big], \qquad \Sigma_\psi = \frac{y^2}{(4\pi)^2}\Big[\not{p}\, B_1^{Mm}(p^2) + M\, B_0^{Mm}(p^2)\Big]
$$

である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから

$$
\begin{gathered}
\beta_y = \frac{5y^3}{(4\pi)^2}, \qquad \beta_\lambda = \frac{3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_m = \frac{\lambda m^2 + 4y^2 m^2 - 8y^2 M^2}{(4\pi)^2},\\
\gamma_M = -\frac{y^2 M}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_\phi = \frac{2y^2}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_\psi = \frac{y^2}{2(4\pi)^2}
\end{gathered}
\tag{8}
$$

を得る（付録 E）。β_y の係数 5 は、頂点 (d) の 2 と、場の繰り込みからの $2\gamma_\psi + \gamma_\phi$ の 3 の和である。β_λ の三つの項は、ϕ の泡 (e)（$3\lambda^2$）、外線 4 本の場の繰り込み（$4\gamma_\phi\lambda = 8\lambda y^2$）、フェルミオンの箱 (f)（$-48y^4$）から来る。$\gamma_M$ が負であることも、スカラーの湯川結合（$+3y^2M/(4\pi)^2$）と違う点である。$M = 0$ では、カイラル回転 $\psi \to e^{i\pi\gamma^5/4}\psi$ で擬スカラーの湯川結合はスカラーの湯川結合に移るので、質量によらない β_y、β_λ、γ_ϕ、γ_ψ は両者で同じである（付録 C）。

1 ループでは、比 $r \equiv \lambda/y^2$ の流れが解析的に解ける（付録 E）。$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\ln\mu = y^2(3r^2 - 2r - 48)/(4\pi)^2$ で、その零点は $r_\pm = (1 \pm \sqrt{145})/3$（$r_+ = 4.3472$、$r_- = -3.6805$）である。$\mu = \mu_0$ での値を r_0、y_0 とすると

$$
\frac{r - r_+}{r - r_-} = \frac{r_0 - r_+}{r_0 - r_-}\Big(\frac{y^2}{y_0^2}\Big)^{\sqrt{145}/5}, \qquad \frac{y^2}{y_0^2} = \frac{1}{1 - 10y_0^2\ln(\mu/\mu_0)/(4\pi)^2} \tag{9}
$$

となる。y^2 は μ とともに増え、$\ln(\mu_{\rm L}/\mu_0) = (4\pi)^2/(10y_0^2)$ で Landau 極に達する。$r_0 < r_+$ なら r は減り続けて 0 を横切り、Landau 極で r_- に近づく。すなわち、λ は y の Landau 極より先に負になる。$r_0 > r_+$ なら r は増え続け、λ のほうが先に発散する。$r = r_+$ は低エネルギーで引きつける固定点である。基準点 $y_0 = \lambda_0 = 1$、$\mu_0 = m$ では、λ は $\mu = 19.49\, m$ で 0 になり、y の Landau 極は $\mu_{\rm L} = 7.2 \times 10^6\, m$ にある。λ が負になることは、次の有効ポテンシャルが大きな場で下に有界でなくなることを意味し、手順 (9)、(10) で調べる真空の不安定性の出発点になる。

■ **有効ポテンシャル。** $\overline{\rm MS}$ の 1 ループの有効ポテンシャルは

$$
\begin{gathered}
V_{\rm eff}(\phi) = \Lambda + \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{24}\phi^4 + \frac{1}{64\pi^2}\Big[m_\phi^4\Big(\ln\frac{m_\phi^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big) - 4M_\psi^4\Big(\ln\frac{M_\psi^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big)\Big],\\
m_\phi^2(\phi) = m^2 + \frac{\lambda}{2}\phi^2, \qquad M_\psi^2(\phi) = M^2 + y^2\phi^2
\end{gathered}
\tag{10}
$$




図 3: 木の図。(A) $\phi\phi \to \phi\phi$ の接触項。(B) $\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ の t、u チャンネルのフェルミオンの交換。(C) $\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の s、t チャンネルの ϕ の交換（相対符号 -1）。時間は左から右に流れる。

である（Coleman と Weinberg [4]、導出は付録 E）。Λ は真空のエネルギーである。フェルミオンの項の係数 -4 は、Dirac フェルミオンの自由度 4 と、Grassmann 数の積分の符号から来る。擬スカラーの湯川結合では、場に依存する質量は $M_\psi^2 = M^2 + y^2\phi^2$ で、ϕ の 1 次の項を持たない（スカラーの湯川結合では $(M + y\phi)^2$）。$V_{\rm eff}$ の μ 依存が、係数の走りと場の異常次元で打ち消される条件から、式 (8) の β_λ と γ_m が再び得られ、真空のエネルギーの走り $\mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}\ln\mu = (m^4 - 4M^4)/(2(4\pi)^2)$ も決まる。木のポテンシャルの極小は $\phi = 0$ だけだが、大きな ϕ ではフェルミオンの項 $-4y^4\phi^4\ln(y^2\phi^2/\mu^2)/(64\pi^2)$ が効き、$\mu \sim \phi$ での λ が負なら $V_{\rm eff}$ は下に有界でなくなる。

■ **木の散乱振幅。** 三つの過程を考える（図 3、付録 F）。$\phi(p_1)\phi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ は、3 点結合がないので接触項だけである。$\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ は t と u チャンネルのフェルミオンの交換で、s チャンネルの図はない。$\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \psi(p_3)\bar\psi(p_4)$ は s と t チャンネルの ϕ の交換で、二つの図の相対符号は -1 である。振幅とスピン和は

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M}_A^{(0)} = -\lambda,\\
&\mathcal{M}_B^{(0)} = y^2\,\bar v(p_2)\Big[\frac{\not k_1}{t-M^2} + \frac{\not k_2}{u-M^2}\Big]u(p_1), \qquad \sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2 = \frac{2y^4\big[(t-M^2)(u-M^2)-m^4\big](t-u)^2}{(t-M^2)^2(u-M^2)^2},\\
&\sum|\mathcal{M}_C^{(0)}|^2 = 4y^4\Big[\frac{s^2}{(s-m^2)^2} + \frac{t^2}{(t-m^2)^2} + \frac{st}{(s-m^2)(t-m^2)}\Big]
\end{aligned} \tag{11}$$

である（付録 F）。$\mathcal{M}_B$ では、質量殻上の $\bar v(p_2)$ と $u(p_1)$ に挟まれて、交換されるフェルミオンの運動量 $\not p_1$ と質量 M の項が消えた。重心系で ψ と ϕ の運動量の大きさを p、k、散乱角を θ とすると、$t - u = 4pk\cos\theta$、$(t-M^2)(u-M^2) - m^4 = k^2(s - 4p^2\cos^2\theta)$ なので

$$\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2 = \frac{32y^4p^2k^4\cos^2\theta\,(s - 4p^2\cos^2\theta)}{(t-M^2)^2(u-M^2)^2}$$

となる（付録 F）。p^2 に比例するので、$\psi\bar\psi$ の閾値（$p \to 0$）の近くでは、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$ は p 波から始まり、$\sigma v \propto v^2$ である。これは、S 波の $\psi\bar\psi$（${}^1S_0$ と ${}^3S_1$）のパリティがどちらも負で、同種の擬スカラー 2 つの状態（軌道角運動量が偶数なのでパリティが正）に移れないことの現れである。ただし、$\psi\bar\psi$ の閾値で $\phi\phi$ を作れるのは $m < M$ のときだけである。基準点のように $m > M$ では、断面積は $\phi\phi$ の閾値（$k \to 0$）から始まり、$\sum|\mathcal{M}_B|^2 \propto k^4$、すなわち $\sigma_B \propto k^5$ と、終状態が D 波であるようにふるまう。$\sum|\mathcal{M}_C|^2$ には M が陽に現れない。$\bar\psi\gamma^5\psi$ の型の双一次形式の 2 乗のスピン和が、$2s$、$-2t$、$-2st$ のように質量によらない形になるからで、M は運動学（$s+t+u = 4M^2$）を通してだけ入る。

全断面積は、重心系の始状態と終状態の運動量の大きさを p、k として

$$\sigma_A = \frac{\lambda^2}{32\pi s}, \qquad \sigma_B = \frac{1}{2}\,\frac{k}{64\pi^2 sp}\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2, \qquad \sigma_C = \frac{1}{64\pi^2 s}\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}_C^{(0)}|^2 \tag{12}$$

である（付録 F）。$\frac14$ は始状態のスピンの平均、σ_A と σ_B の $\frac12$ は終状態の同種の ϕ の因子である。$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の終状態の ψ と $\bar\psi$ は区別できるので、$\frac12$ は付かない。

■ **1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と S 行列要素。** 3 点結合がないので、$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅（外線の補正を除く）は 1PI の 4 点関数だけで、$i\mathcal{M}_A^{(1)} = V_4$ である。式 (6) から

$$(4\pi)^2\,\mathcal{M}_A^{(1)} = \frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u}B_0^{mm}(x) - 2y^4\sum_{(x,x')}\mathcal{F}(x,x') \tag{13}$$

を得る。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}_A^{(1)}(s,t)=\frac{\lambda^2 p}{16\pi\sqrt{s}}+\frac{1}{2}\,\frac{p_\psi}{16\pi^2\sqrt{s}}\int\mathrm{d}\Omega_q\sum_{\text{spins}}\mathcal{M}(\phi_1\phi_2\to\psi\bar\psi)\,\mathcal{M}^*(\phi_3\phi_4\to\psi\bar\psi)\tag{14}$$

を満たす（付録 G）。第 1 項は $\phi\phi$ の中間状態（同種粒子の $\frac{1}{2}$ を含む）、第 2 項は $\psi\bar\psi$ の中間状態で、$p_\psi=\sqrt{s/4-M^2}$、$\phi_3\phi_4$ は終状態の $\phi(k_1)\phi(k_2)$ である。$m<2M$ でも $s\geq 4m^2>4M^2$ なので、物理的な領域では $\psi\bar\psi$ の中間状態がいつも開いている。前方 $t=0$ では、これは光学定理 $\operatorname{Im}\mathcal{M}_A^{(1)}(s,0)=2p\sqrt{s}\,[\sigma_A+\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)]$ になる。$\sum|\mathcal{M}(\phi\phi\to\psi\bar\psi)|^2$ は式 (11) の $\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2$ と同じ関数である。

$\overline{\text{MS}}$ の質量 m は伝播関数の極ではなく、外線の留数も 1 ではない。ϕ の極質量と留数は

$$m_{\text{p}}^2=m^2-\frac{1}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(m^2B_0^{MM}(m^2)-2A_0(M^2)\big)+\frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big],\qquad R_\phi=1-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{MM}(m^2)+m^2B_0^{MM\prime}(m^2)\Big]\tag{15}$$

である（付録 G）。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違い、フェルミオンのループのために R_ϕ は y^2 の次数で 1 からずれ、μ にも依存する（$\mu\,\mathrm{d}R_\phi/\mathrm{d}\mu=-2\gamma_\phi$）。木の振幅 $-\lambda$ は質量によらないので、S 行列要素 $R_\phi^2(\mathcal{M}_A^{(0)}+\mathcal{M}_A^{(1)})$ は

$$\mathcal{M}_{A,\text{phys}}=-\lambda+\frac{4\lambda y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{MM}(m_{\text{p}}^2)+m_{\text{p}}^2B_0^{MM\prime}(m_{\text{p}}^2)\Big]+\mathcal{M}_A^{(1)}\big|_{m\to m_{\text{p}}}\tag{16}$$

となる。結合を固定して μ を変えると $\mu\partial\mathcal{M}_{A,\text{phys}}/\partial\mu=(3\lambda^2+8\lambda y^2-48y^4)/(4\pi)^2=\beta_\lambda$ で、これは木の振幅の $-\lambda(\mu)$ の走りとちょうど打ち消し合う（付録 G）。$3\lambda^2$ は ϕ の泡、$-48y^4$ はフェルミオンの箱、$8\lambda y^2$ は外線の留数から来るので、$\phi\phi\to\phi\phi$ の S 行列要素の μ 依存だけで β_λ の三つの項がすべて読み取れる。

フェルミオンの極質量と留数は、$\Sigma_\psi=\not{p}\,\Sigma_V(p^2)+M\Sigma_S(p^2)$（$\Sigma_V=y^2B_1^{Mm}/(4\pi)^2$、$\Sigma_S=y^2B_0^{Mm}/(4\pi)^2$）から

$$M_{\text{p}}=M\Big[1+\frac{y^2}{(4\pi)^2}\big(B_0^{Mm}+B_1^{Mm}\big)\Big],\qquad R_\psi=1+\frac{y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_1^{Mm}+2M^2\big(B_0^{Mm\prime}+B_1^{Mm\prime}\big)\Big]\tag{17}$$

である（付録 G）。B はすべて $p^2=M^2$ での値である。M_{p} は μ によらず（$\mu\,\partial(B_0+B_1)/\partial\mu=1$ と γ_M が打ち消す）、外線のフェルミオン 1 本ごとに S 行列要素に $R_\psi^{1/2}$ が掛かる。これらは $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の 1 ループの S 行列要素（手順 (5)）で使う。

■ **1 ループの $\psi\bar\psi\to\phi\phi$。** 外線にフェルミオンを持つ過程の 1 ループの振幅も、手で閉じた形に書ける。外線の補正を除いた 1 ループの図は、内線のフェルミオンの自己エネルギー（t、u チャンネルに 1 つずつ）、頂点の補正（4 つ）、箱（2 つ）、ϕ の 2 本の内線が 4 点頂点で終わる三角形（λ の三角形、1 つ）、s チャンネルの ϕ にフェルミオンの三角形が付いた図（2 つ）の 11 個である。最後の 2 つはトレースが γ^5 と 3 個以下の γ 行列しか含まないので 0 になる。Dirac 方程式と $k_2=p_1+p_2-k_1$ を使うと、どの図も二つのスピノルの構造 $\bar v(p_2)u(p_1)$ と $\bar v(p_2)\not{k}_1u(p_1)$ だけで書ける（$\bar v(p_2)(\not{p}_1+\not{p}_2)u(p_1)=0$ なので $\bar v\not{k}_2u=-\bar v\not{k}_1u$）。木の振幅は $b^{(0)}\bar v\not{k}_1u$、$b^{(0)}=y^2[1/(t-M^2)-1/(u-M^2)]$ である。$\overline{\text{MS}}$ で繰り込んだ 1 ループの振幅は

$$\begin{aligned}
(4\pi)^2\mathcal{M}_B^{(1)}&=a\,\bar v(p_2)u(p_1)+b\,\bar v(p_2)\not{k}_1u(p_1),\\
a&=\lambda y^2M\,C_1^\lambda+y^4M\sum_{x=t,u}\Big\{\frac{B_0(x)+B_1(x)}{x-M^2}-\big[C_0^{(1)}+C_2^{(1)}+C_0^{(2)}+C_2^{(2)}\big](x)\\
&\qquad-(x-M^2)\big[D_1+D_2+D_3\big](x)+C_1^s+C_2^s\Big\},\\
b&=y^4\sum_{x=t,u}\sigma_x\Big\{\frac{(x+M^2)B_1(x)+2M^2B_0(x)}{(x-M^2)^2}-\frac{B_0(x)+m^2C_1^{(1)}(x)+2M^2\big[C_0^{(1)}+C_2^{(1)}\big](x)}{x-M^2}\\
&\qquad-\frac{B_0(M^2)+m^2C_1^{(2)}(x)+2M^2C_0^{(2)}(x)+(x+M^2)C_2^{(2)}(x)}{x-M^2}\\
&\qquad+m^2D_0(x)+C_0^M(s)+(x-M^2)D_2(x)\Big\}
\end{aligned}\tag{18}$$

である（付録 H）。$\sigma_t=1$、$\sigma_u=-1$ で、積分は LoopTools の規約の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分である。$B_n(x)\equiv B_n(x;M^2,m^2)$、頂点の積分は $C_n^{(1)}(x)\equiv C_n(m^2,x,M^2;M^2,M^2,m^2)$（$\psi(p_1)$ の側）と $C_n^{(2)}(x)\equiv C_n(m^2,M^2,x;M^2,M^2,m^2)$（$\bar\psi(p_2)$

の側)、箱は $D_n(x) \equiv D_n(M^2, m^2, m^2, M^2, x, s; m^2, M^2, M^2, M^2)$、箱から ϕ 以外の内線を 1 本除いた三角形は $C_n^s \equiv C_n(M^2, s, M^2; m^2, M^2, M^2)$ と $C_0^M(s)$、λ の三角形は $C_1^\lambda \equiv C_1(M^2, M^2, s; m^2, M^2, m^2)$ である。a の各項は順に、λ の三角形、自己エネルギー、二つの頂点の補正、箱から来る。λ の三角形は $\bar v u$ の構造だけを持つ。箱は、分子の $\not\ell$ を Dirac 方程式と伝播関数の分母で消すと、テンソル積分を経ずに D_0、$D_{1,2,3}$、三角形の積分で書ける(付録 H)。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{Im}\, a\, \bar v u + \mathrm{Im}\, b\, \bar v \not k_1 u}{(4\pi)^2} &= \frac{1}{2}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_q \sum_{\text{spins}} \mathcal{M}_C(\psi\bar\psi \to \psi_q\bar\psi_q)\, \mathcal{M}^*(\phi\phi \to \psi_q\bar\psi_q) \\ &\quad + \frac{1}{4}\frac{k}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_q\, \mathcal{M}_B^{(0)}(\psi\bar\psi \to \phi_q\phi_q)\,(-\lambda)\end{aligned} \tag{19}$$

を満たす(付録 H)。右辺の第 1 項は $\psi\bar\psi$ の中間状態($|\boldsymbol{q}| = p$)、第 2 項は $\phi\phi$ の中間状態($|\boldsymbol{q}| = k$、同種粒子の $\frac{1}{2}$)で、外線のスピンを固定した等式である。

S 行列要素は、外線の運動量とスピノルを極質量で定め、LSZ の簡約公式で外線ごとに留数の平方根 $R_\psi^{1/2}$、$R_\phi^{1/2}$ を掛けて得る。$\phi\phi \to \phi\phi$ では木の振幅が質量によらないので式 (16) になったが、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$ では木の振幅の中のフェルミオンの質量が二か所で効く。交換されるフェルミオンの伝播関数の分母と、Dirac 方程式で消した項 $(M - \not p_1)u$ である。後者は外線のスピノルが極質量 M_p を持つので $(M - M_\mathrm{p})u$ として残り、新しい構造 $\bar v u$ を作る。式 (17) を使ってまとめると(付録 H)

$$\begin{aligned}(4\pi)^2\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}} &= (4\pi)^2 b^{(0)}\big|_{M\to M_\mathrm{p}}\, \bar v \not k_1 u + a_\mathrm{phys}\, \bar v u + b_\mathrm{phys}\, \bar v \not k_1 u, \\ a_\mathrm{phys} &= a - y^4 M\big[B_0 + B_1\big](M^2)\Big[\frac{1}{t - M^2} + \frac{1}{u - M^2}\Big], \\ b_\mathrm{phys} &= b + y^2\Big\{\big[B_1 + 2M^2(B_0' + B_1')\big](M^2) - 2\big[B_0^{MM} + m^2 B_0^{MM\prime}\big](m^2)\Big\} b^{(0)} \\ &\quad - 2M^2 y^4\big[B_0 + B_1\big](M^2)\Big[\frac{1}{(t - M^2)^2} - \frac{1}{(u - M^2)^2}\Big]\end{aligned} \tag{20}$$

となる。$B_n(M^2) \equiv B_n(M^2; M^2, m^2)$ で、1 ループの項の中の質量は極質量としてよい。a_phys の補正はフェルミオンの質量のずれ(Dirac 方程式の項)、b_phys の第 2 項は二つの留数、第 3 項は伝播関数の分母の質量のずれから来る。ϕ の質量は木の伝播関数に現れないので、運動学を通してしか入らない。結合を固定して μ を変えると $\partial a_\mathrm{phys}/\partial \ln\mu = 0$、$\partial b_\mathrm{phys}/\partial \ln\mu = -10y^2 b^{(0)}$ で、木の振幅 $b^{(0)} \propto y^2$ の $y(\mu)$ の走り($\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}\ln\mu = 10y^4/(4\pi)^2$)とちょうど打ち消し合う。

■ **全断面積。** $\phi\phi$ 散乱の全断面積を、木の次の次数まで求める。λ を y^2 と同じ次数と数えると、木の断面積は y^4 の次数である。y^6 の次数には、1 ループの S 行列要素と木の振幅の干渉と、新しく開く $\phi\phi \to \phi\psi\bar\psi$ が寄与する。$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の木の図はない。ϕ だけを外線に持つ木の図は 4 点頂点だけでできていて、外線の数が偶数になるからである(付録 I)。$\phi\phi \to \psi\bar\psi$ を $\bar B$ と書くと

$$\begin{aligned}\sigma_\mathrm{tot} &= \sigma_A^{(0)} + \sigma_{\bar B}^{(0)} + \sigma_A^{(1)} + \sigma_{\bar B}^{(1)} + \sigma_3, \\ \sigma_A^{(1)} &= -\frac{\lambda}{64\pi^2 s}\int \mathrm{d}\Omega\, \mathrm{Re}\,\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}}^{(1)}, \qquad \sigma_3 = \frac{1}{4p\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Phi_3 \sum |\mathcal{M}_3|^2, \\ \sigma_{\bar B}^{(0)} + \sigma_{\bar B}^{(1)} &= \frac{p_\psi}{64\pi^2 s\, p}\int \mathrm{d}\Omega\, \Big[\sum |\mathcal{M}_B^{(0)}|^2 + \sum 2\,\mathrm{Re}\big(\mathcal{M}_B^{(0)*}\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}}^{(1)}\big)\Big]\end{aligned} \tag{21}$$

である(付録 I)。$p = \sqrt{s/4 - m^2}$ と $p_\psi = \sqrt{s/4 - M^2}$ は重心系の ϕ と ψ の運動量の大きさ、$\sigma_A^{(0)} = \lambda^2/(32\pi s)$ と $\sigma_{\bar B}^{(0)}$ は木の断面積、$\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}}^{(1)}$ は式 (16) の 1 ループの部分($\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}} + \lambda$)、$\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}}^{(1)}$ は式 (20) の 1 ループの部分である。$\sigma_A^{(1)}$ では、同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ と $2\,\mathrm{Re}$ の 2 が打ち消し合い、$\mathcal{M}_A^{(0)} = -\lambda$ が掛かっている。$\phi\phi \to \psi\bar\psi$ のスピン和は、時間反転の不変性から、同じ運動量の $\psi\bar\psi \to \phi\phi$ のスピン和に等しい(t は ψ と 1 番目の ϕ の運動量の差の 2 乗)。$\phi(p_1)\phi(p_2) \to \phi(k)\psi(q_1)\bar\psi(q_2)$ の木の図は、フェルミオンの線に三つの ϕ が付く 6 個(付く順番の数 3!)と、4 点頂点から出た ϕ が $\psi\bar\psi$ になる 1 個で、振幅は

$$i\mathcal{M}_3 = -\bar u(q_1)\Big[y^3 \sum_{\sigma\in S_3} \frac{(M - \not r_1')(\not r_2' + M)}{(r_1^2 - M^2)(r_2^2 - M^2)} - \frac{\lambda y}{(q_1 + q_2)^2 - m^2}\Big]\gamma^5 v(q_2) \tag{22}$$

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	書き出した FeynArts 模型の係数と、図の対称性因子	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン和 (11)	付録 F	記号として一致	—	—	断面積
1PI 関数の極と対抗項 (5)	付録 D	PaVe 関数に簡約し、極を抽出。γ^5 の処方（NDR と BMHV）の比較	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (6)、(7)	付録 D	対抗項を加える	解析式	数値	—
1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (13)、S 行列要素 (16)、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$	付録 G、後で	記号として比べる（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
全断面積（$2 \to 3$ を含む）(21)	付録 I	—	—	COLLIER	MadLoop、$2 \to 3$
繰り込み群 (8)、(9)	付録 E、付録 K	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R
部分波とユニタリー性の限界 (25)	付録 L	—	—	COLLIER	—
有効ポテンシャル (10)、(26) と $\lambda < 0$ の bounce (27)	付録 E、付録 M	—	—	—	—
フェルミオンの行列式を含む崩壊率 (28)	付録 N	—	—	—	—
$\lambda \approx 0$ の近くの足し上げ (30)、(31)	付録 O	—	—	—	—
1 ループの $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ (32) と $J = 0$ の行列	付録 P	4 つのスピノルの構造への射影	—	COLLIER	MadLoop

である（付録 I）。$(a_1, a_2, a_3) = (k, -p_1, -p_2)$ は三つの ϕ の出ていく運動量、σ は ϕ がフェルミオンの線に付く順番の置換で、$r_1 = q_1 + a_{\sigma(1)}$、$r_2 = r_1 + a_{\sigma(2)}$ は伝播関数の運動量である。スピン和は $\sum |\mathcal{M}_3|^2 = \mathrm{tr}[(\not{q}_1 + M)\Gamma(\not{q}_2 - M)\bar{\Gamma}]$（$\Gamma$ は $\bar{u}(q_1)$ と $v(q_2)$ に挟まれた行列、$\bar{\Gamma} = \gamma^0\Gamma^\dagger\gamma^0$）である。粒子はすべて質量を持ち、$m < 2M$ なので伝播関数の分母は物理的な領域で 0 にならない。よって各項は別々に有限である。ただし、ψ または $\bar{\psi}$ がビームの向きに出るところで $\sum |\mathcal{M}_3|^2$ はフェルミオンの伝播関数による高い山を持ち、その幅はエネルギーとともに狭くなる。基準点では、全断面積は木の値より $\sqrt{s} = 2.5m$ で 8%、$20m$ で 23% 大きい（手順 (6)）。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [3] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (4) のトレースと γ^5 の整理、式 (5) の極、式 (6) の V_y の形、式 (7) のもとになるトレースの書き直し、式 (11) のスピン和は、FeynCalc で予備的に確かめた。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\mathrm{MS}}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれるので、これまでのノートと同じく本ノートの V に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

表 3: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。

過程	図の数	内訳
$\phi\phi \to \phi\phi$	1	接触項（ϕ^3 がないので交換の図はない）
$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$	2	t、u チャンネルのフェルミオンの交換
$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$	2	s、t チャンネルの ϕ の交換
$\psi\psi \to \psi\psi$	2	t、u チャンネルの ϕ の交換
$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi\phi$	7	フェルミオンの線から 3 つの ϕ を出す順序 $3! = 6$、$\psi\bar{\psi} \to \phi^* \to \phi\phi\phi$（$\lambda$）1
$\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$	7	上の過程の交差（フェルミオンの線に 3 つの ϕ を付ける順序 6、λ を通る図 1）

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `PsYukawa.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 三つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で、断面積を MadGraph で確かめる。(3) 1 ループの 1PI 関数 V_ϕ、V_ψ、V_y、V_4 の極と対抗項を FeynCalc・Package-X で確かめ、有限部分を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。γ^5 を BMHV の処方で扱ったときの違いも調べる。(4) 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、数値をツールどうしで比べ、虚部をフェルミオンの中間状態を含むユニタリー性で確かめる。(5) ϕ と ψ の極質量と留数で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 全断面積を、1 ループの補正と $2 \to 3$ の過程を含めて求める。(7) S 行列要素の μ 依存から β_y、β_λ、γ_m、γ_M を読み取り、式 (8) と文献の値と比べ、比 λ/y^2 の流れ（式 (9)）を描く。(8) $\phi\phi$ と $\psi\bar{\psi}$ のヘリシティの状態を合わせた部分波のユニタリー性から、(y, λ) の限界を出す。(9) 繰り込み群で改良した有効ポテンシャルで λ が負になる尺度を求め、$\lambda < 0$ の bounce（大きさを決めない instanton）の作用を求める。(10) フェルミオンの揺らぎの行列式を含む崩壊率の 1 ループの前因子を求め、(y, λ) の真空の準安定性の限界を出す。(11) $\lambda \approx 0$ の近くで大きくなるフェルミオンの寄与 y^4/λ^2 を bounce の作用に足し上げ、真空の準安定性の限界を精密にする。(12) $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ の 1 ループの振幅を求め、$J = 0$ の部分波の行列を 1 ループで完成させて、(C) の限界を y の向きに完成させる。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で、手順 (2) は `run_tree_check.sh` で、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh` で、手順 (4) は `run_scat_check.sh` で、手順 (5) は `generate_PsYukawa_NLO.sh` と `run_madloop_check.sh` で、手順 (6) は `run_xsec_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/PsYukawa.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項を除いた部分である。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 Q に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は二つで、$\bar{\psi}\psi\phi$ の頂点は $\texttt{yps}\,\gamma^5$、4 点頂点は $-i\,\texttt{lamphi}$ となり、図 1 の $y\gamma^5$、$-i\lambda$ と一致した。パリティで禁じられた ϕ^3 の頂点やスカラーの湯川の頂点は現れない。FeynArts の模型では、湯川の頂点はカイラルな射影 $\omega_\pm = (1 \pm \gamma^5)/2$ の係数の組 $\{c_L, c_R\} = \{-\texttt{yps}, \texttt{yps}\}$ として書かれ、$c_L\omega_- + c_R\omega_+ = \texttt{yps}\,\gamma^5$ である。UFO では、頂点の Lorentz 構造が `Gamma5`、結合が `yps` である。FeynArts の模型と UFO は `Src/generated/` に書き出した。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 3 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_PsYukawa.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅とスピン和。** `Src/generated/PsYukawa_FA` の FeynArts 模型から木の図を作り、FeynCalc で振幅を組み立ててスピンについて和をとった。図の数は表 3 と同じだった。(A) の振幅は $-\lambda$ と記号として一致した。(B) では振幅そのものも比べた。FeynCalc の振幅と式 (11) の $\mathcal{M}_B^{(0)}$ の差の絶対値の 2 乗をスピンについて和をとると、記号として 0 になった。これは、すべてのスピンの組で二つの振幅が全体の符号まで一致することを意味する。(B) と (C) のスピン和も、式 (11) と記号として一致した。(C) の干渉項は二つの図の相対符号で決まるので、

表 4: 木の全断面積（$m=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2}=0.3893794\times10^{9}$ pb）。「解析式」は式 (12)（(D) は式 (23) と因子 $\frac{1}{2}$）の数値積分（相対精度 10^{-12}）、「誤差」は MadGraph のモンテカルロ積分の統計誤差、「実効誤差」はそれと MadGraph の出力の最後の桁の半分の大きい方である。

過程	$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	誤差 [pb]	実効誤差 [pb]	差／実効誤差
(A) $\phi\phi\to\phi\phi$	2.5	6.19717×10^{5}	6.197×10^{5}	1.4×10^{-3}	50	−0.33
	5.0	1.54929×10^{5}	1.549×10^{5}	3.1×10^{-4}	50	−0.58
	10.0	3.87323×10^{4}	3.873×10^{4}	1.1×10^{-5}	5	−0.46
(B) $\psi\bar\psi\to\phi\phi$	2.5	1.58555×10^{5}	1.585×10^{5}	290	290	−0.19
	5.0	2.81465×10^{5}	2.814×10^{5}	685	685	−0.09
	10.0	1.27316×10^{5}	1.276×10^{5}	207	207	+1.37
(C) $\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$	2.5	3.17031×10^{6}	3.171×10^{6}	1360	1360	+0.50
	5.0	8.51663×10^{5}	8.522×10^{5}	654	654	+0.82
	10.0	2.24601×10^{5}	2.246×10^{5}	172	172	−0.01
(D) $\psi\psi\to\psi\psi$	2.5	7.26136×10^{5}	7.261×10^{5}	857	857	−0.04
	5.0	3.51095×10^{5}	3.510×10^{5}	472	472	−0.20
	10.0	1.06122×10^{5}	1.062×10^{5}	110	110	+0.71

FeynArts のフェルミオンの符号の規則が手計算の -1 と一致したことになる。

同種のフェルミオンの符号も確かめるため、四つ目の過程として (D) $\psi(p_1)\psi(p_2)\to\psi(p_3)\psi(p_4)$ を加えた。これは t と u チャンネルの ϕ の交換で、二つの図の相対符号は -1 である。スピン和は

$$\sum|\mathcal{M}_D^{(0)}|^2=4y^4\Big[\frac{t^2}{(t-m^2)^2}+\frac{u^2}{(u-m^2)^2}+\frac{tu}{(t-m^2)(u-m^2)}\Big] \tag{23}$$

である（付録 F）。これは (C) の式で s と u を入れ替えたもので、交差の関係と合う。FeynCalc のスピン和はこれとも記号として一致した。

これとは独立に、Python で Dirac 行列とスピノルを陽に作り（Dirac 表示）、トレースを使わずに、Feynman 則のままの振幅の 2 乗をすべてのスピンの組について足した。(B) では、Dirac 方程式で項を消す前の振幅を使った。式 (11)、(23) と第 3 節の重心系の式は、$\sqrt{s}=2.1$〜10、$\cos\theta=-0.9$〜0.77 の 20 点で、相対 3×10^{-15} 以内で一致した。$\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ での値は (B) 0.711692751300461、(C) 11.21332568891513、(D) 10.01693737249565 で、FeynCalc で評価した値と表示した桁まで一致した。

断面積は、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませて求め、式 (12) の数値積分と比べた（(D) は終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を付け、σ_C と同じ式で求めた）。表 4 に示すように、四つの過程と三つのエネルギーの 12 点すべてで、差は誤差の 1.4 倍以内だった。(A) は $|\mathcal{M}|^2$ が定数なので MadGraph の積分の誤差がほぼ 0 で、比べられるのは MadGraph が出力する桁までである（付録 Q）。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`tree_mg5.mg5`（MadGraph）、`tree_sigma.py`（陽なスピノルの計算、数値積分、比較）である。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** FeynArts の模型から 1 ループの 1PI 図を作ると、ϕ の 1 点関数が 1 個、ϕ の 3 点関数が 2 個（向きが逆のフェルミオンの三角形）、V_ϕ が 2 個、V_ψ が 1 個、V_y が 1 個、V_4 が 9 個（ϕ の泡 3 個とフェルミオンの箱 6 個）で、図 2 と一致した。FeynCalc でトレースと γ^5 を NDR で整理し、TID でテンソル積分をスカラー積分 A_0、B_0、C_0、D_0 に簡約した。ϕ の 1 点関数と 3 点関数はトレースで 0 になった。V_ϕ、V_ψ、V_y、V_4 は、式 (4) を $(2\pi)^D$ 倍したものと記号として一致した。比べるときは、手計算の式の B_1、C_1、C_2 も同じくスカラー積分に簡約した。V_4 は外線を質量殻上に置いて比べ、式 (7) の $\mathcal{F}$ で書いた形と一致した。式 (7) のもとになるトレースの書き直し（付録 D）も、外線の運動量が質量殻上にない一般の場合に、記号として確かめた。Package-X で極を取り出すと、六つの対抗項はすべて式 (5) と一致した。V_y の γ^5 以外の三つの Dirac 構造は紫外有限だった。

有限部分は、基準点の 48 個の値で比べた（表 5）。Package-X と LoopTools は FeynCalc の振幅を評価し、COLLIER はノートの式 (6)、(7) を評価した。2 点関数だけでできた V_ϕ と V_ψ は、Feynman パラメータの積分 $B_0^{ab}=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln(\Delta_x-i0)$、$B_1^{ab}=\int_0^1\mathrm{d}x\,x\ln(\Delta_x-i0)$ を mpmath で 30 桁で数値積分した値とも比べた。これはどのツールにもよらない基準である。表 5 に示すように、一点を除いて、すべての値が相対 5×10^{-12} 以内で一致

表 5: 1 ループの 1PI 関数の有限部分の比較（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$）。値は式 (6) の括弧（$b=(4\pi)^2V/i$、V_y は $(4\pi)^2V_y$ の各 Dirac 構造の係数）で、差は同じ点の括弧の絶対値の最大で割った。「基準」は比べる相手で、V_ϕ、V_ψ では mpmath の Feynman パラメータの積分、V_y、V_4 では COLLIER（ノートの式）である。V_y の LoopTools の値は、誤った C_0 を返す一点を除く。

関数	点	基準	Package-X	LoopTools	COLLIER
V_ϕ	$p^2=-5$〜10 の 6 点	mpmath	$<10^{-16}$	2.6×10^{-14}	1.2×10^{-14}
V_ψ（$\not{p}$、1）	$p^2=-5$〜10 の 6 点	mpmath	$<10^{-16}$	1.2×10^{-15}	1.1×10^{-15}
V_y（4 構造）	(p^2,k^2,p'^2) の 6 点	COLLIER	2.6×10^{-12}	3.6×10^{-15}	—
V_4	$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$	COLLIER	5.4×10^{-12}	3.1×10^{-15}	—

した。Package-X の C_0、D_0 を含む値の差 10^{-12} の程度は、$\phi^3+\phi^4$ のノートと同じく Package-X の数値の精度の限界である。除いた一点は V_y の $(p^2,k^2,p'^2)=(M^2,m^2,M^2)$ で、LoopTools の $C_0(m^2,M^2,M^2;M^2,M^2,m^2)$ が $-21.747+9.691i$ を返した（正しい値は Package-X と COLLIER の -1.10566）。これは ϕ^3 のノートで見つけた LoopTools の C_0 の誤りと同じ種類で、LoopTools は自分で “Discrepancy in C0” と表示し、内部の別の実装（版 a）では正しい値を出しながら、誤った値を返す（付録 Q）。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`oneloop_collier.f90`（COLLIER）、`oneloop_numeric.py`（mpmath と比較）である。

■ **手順 (3) の続き：γ^5 の処方。** 本ノートは γ^5 を D 次元で反可換とする NDR の処方をとる（前提 5）。比べるため、同じ図を Breitenlohner–Maison–’t Hooft–Veltman（BMHV）の処方でも計算した。BMHV では、γ^5 は 4 次元の γ 行列とだけ反可換で、$D-4$ 次元の部分とは可換である。ループ運動量を 4 次元の部分と $D-4$ 次元の部分に $q=\bar q+\hat q$ と分けると、$\gamma^5(\not q+M)\gamma^5=-\not{\bar q}+\not{\hat q}+M$ となる。したがって NDR との違いは、γ^5 に挟まれた伝播関数の中の $\hat q$ の符号だけである。外線の運動量は 4 次元とした。結果は次の通りである。四つの 1PI 関数のどれでも、極は二つの処方で同じで、差は有限だった。差は外線の運動量と質量の多項式（局所的な項）で、括弧の単位で

$$\Delta b_\phi=y^2\Big(\frac{4}{3}p^2-8M^2\Big),\qquad \Delta b_\psi=0,\qquad \Delta b_y=-y^3\ (\gamma^5\text{ の係数}),\qquad \Delta b_4=-64y^4$$

である（$\Delta b\equiv b_{\rm BMHV}-b_{\rm NDR}$）。これらは、差が $\hat q^2$ の項から $(D-4)\times$ 極として生じることを使って、手でも導ける（付録 J）。V_ϕ、V_ψ、V_y は FeynCalc の BMHV の処方でそのまま計算し、手で導いた値と一致した。V_4 では、γ^5 を 4 個含むトレースで FeynCalc の BMHV の計算が止まり、$\hat q$ を含む箱のテンソル積分の簡約も 10 分で終わらなかった。そこで、BMHV の規則 $\gamma^5(\not k+M)\gamma^5=-\not{\bar k}+\not{\hat k}+M$ で γ^5 を除いたトレースを FeynCalc で計算し、差のうち紫外で効く q の 4 次の項だけを積分した。これは付録 J の議論を FeynCalc で行ったもので、V_y に使うと FeynCalc の BMHV の計算と同じ値を与え、V_4 では $-64y^4$ を与えた。差が局所的なので、BMHV で NDR と同じ繰り込まれた 1PI 関数を得るには、有限の対抗項 $\delta'_\phi=-\frac{4y^2}{3(4\pi)^2}$、$\delta'_m=-\frac{8y^2M^2}{(4\pi)^2}$、$\delta'_y=\frac{y^3}{(4\pi)^2}$、$\delta'_\lambda=-\frac{64y^4}{(4\pi)^2}$ を加えればよい。極が同じなので 1 ループの β 関数は処方によらず、物理量は、パラメータを物理的な入力で決めれば一致する。ただし、二つの処方の $\overline{\rm MS}$ のパラメータは有限の量だけ異なる。スクリプトは `oneloop_bmhv.wl` である。

■ **手順 (4)：1 ループの散乱振幅。** 二つの過程の 1 ループの振幅（外線の補正を除き、$\overline{\rm MS}$ で繰り込んだもの）を、FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求めた。$\phi\phi\to\phi\phi$ の FeynArts の図は 9 個（ϕ の泡 3 個とフェルミオンの箱 6 個）で、3 点結合がないので可約な図はない。振幅は FeynCalc でも FormCalc でも式 (13) と記号として一致した。$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の図は 11 個で、内訳は第 3 節で述べた通りである。FeynCalc で各図を基底 $\bar v u$、$\bar v\not k_1 u$ に分け、自己エネルギー、頂点の補正、箱、λ の三角形、フェルミオンの三角形の五つの組ごとに式 (18) の対応する項と比べると、すべて記号として一致した。フェルミオンの三角形は 0 だった。紫外の極は、式 (5) から作った対抗項の図（頂点の δ_y と、内線の δ_ψ、δ_M）とちょうど打ち消し合った。FormCalc の経路では、FeynCalc の手を加えない FeynArts と、FormCalc 自身のテンソル積分の簡約を使った。振幅は二つのスピノルの鎖 $\langle1|1|2\rangle$、$\langle1|\not k_1|2\rangle$ だけで書かれ、γ^5 を含む鎖は現れなかった。FormCalc の鎖はフェルミオンの線の向きが逆なので、ベクトルの鎖の符号だけが変わる。木の振幅で全体の位相を合わせると、二つの係数はそれぞれ $-a$、b にあたる（付録 Q）。Δ を変えたときの FormCalc の振幅の変化は、対抗項から予想される量と倍精度で一致した。

数値は、基準点の 6 点（$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$）で、FeynCalc と Package-X、FeynCalc と LoopTools、

表 6: 1 ループの散乱振幅の比較（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$、$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$ の 6 点の最大）。左の 3 列は、COLLIER で評価したノートの式（式 (13)、(18)）からの相対的なずれで、$\phi\phi\to\phi\phi$ は $|\mathcal{M}^{(1)}|$、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ は $|a|+|b|$ で割った。右の列は、虚部とユニタリー性の積分（式 (14)、(19)）の相対的なずれで、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ は 4 つのスピンの組の最大である。

過程	量	FeynCalc+Package-X	FeynCalc+LoopTools	FormCalc+LoopTools	ユニタリー性
$\phi\phi\to\phi\phi$	$(4\pi)^2\mathcal{M}^{(1)}$	5.4×10^{-12}	3.8×10^{-15}	1.6×10^{-13}	2.4×10^{-14}
$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$	a、b	8.4×10^{-10}	1.7×10^{-14}	2.8×10^{-13}	9.4×10^{-14}




図 4: $\sqrt{s}=5m$ での 1 ループの振幅の角度依存性（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$）。左は $\phi\phi\to\phi\phi$ の $(4\pi)^2\mathcal{M}^{(1)}$、中と右は $\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ の係数 a、b（式 (18)）。線は COLLIER で評価したノートの式（実線が実部、破線が虚部）、丸は FeynCalc と Package-X、バツは FormCalc と LoopTools、左の四角はユニタリー性の積分（式 (14)）による虚部である。a は $\cos\theta$ について偶、b は奇で、$t\leftrightarrow u$ の対称性を表す。

FormCalc と LoopTools の値を、式 (13)、(18) を COLLIER で評価した値と比べた（表 6）。すべて相対 10^{-9} 以内で、Package-X 以外は 3×10^{-13} 以内で一致した。Package-X の差がほかより大きいのは、質量の違う内線を持つ箱の D_0 の数値の精度による。虚部は、式 (14)、(19) のユニタリー性と比べた。右辺の木の振幅は Dirac 表示の行列で作り、中間状態のスピンの和は完全性の関係でとり、中間状態の向きについて 240×240 点の求積で積分した。$\phi\phi\to\phi\phi$ では $\psi\bar{\psi}$ の中間状態を含む虚部が、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ では外線の 4 つのスピンの組のそれぞれで、相対 10^{-13} 以内で一致した。$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ の虚部では、$\psi\bar{\psi}$ の中間状態と $\phi\phi$ の中間状態の寄与が同じ程度の大きさで逆の符号を持つ（例えば $\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ のあるスピンの組で 9.895×10^{-3} と -5.256×10^{-3}、和が 4.639×10^{-3}）。図 4 に、$\sqrt{s}=5m$ での角度依存性を示す。スクリプトは `scat_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`scat_formcalc.wl`（FormCalc、LoopTools）、`scat_collier.f90`（COLLIER）、`scat_numeric.py`（比較、ユニタリー性、図）である。

■ 手順 (5)：S 行列要素と MadLoop。 FeynRules と NLOCT で、場と質量を on-shell で、結合を $\overline{\text{MS}}$ で繰り込む対抗項と、R2 の頂点を求めた。NLOCT の on-shell の対抗項 δZ_ϕ、$2m\,\delta m$、δZ_ψ、δM と、湯川の頂点と 4 点頂点の対抗項は、付録 G、付録 H の自己エネルギーから作った手計算の値と、$1/\epsilon$ の係数も有限部分も数値で 30 桁一致した。δZ_ψ と δM は $\Sigma_\psi=\not{p}\Sigma_V+M\Sigma_S$ から $\delta Z_\psi=\Sigma_V+2M^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')$、$\delta M=-M(\Sigma_V+\Sigma_S)$ $(p^2=M^2)$ で、フェルミオンの対抗項に γ^5 の項は現れなかった。R2 の頂点は $\phi\phi$、$\phi\bar{\psi}\psi$、ϕ^4 の 3 つで、値は $iy^2(6M^2-p^2)/(24\pi^2)$、$y^3\gamma^5/(32\pi^2)$、$\frac{5}{4}iy^4/\pi^2$ だった。これは、NDR の D 次元の分子と 4 次元の分子の差として手で導いた値と一致する（付録 J）。したがって、NLOCT の R2 はノートと同じ NDR の処方に対応する。

続いて、on-shell の対抗項を持つ UFO と、対抗項の極だけを持つ $\overline{\text{MS}}$ の UFO を書き出し、MadLoop で二つの過程の 1 ループの振幅を計算した。on-shell の UFO の値は S 行列要素（式 (16)、(20)）と、$\overline{\text{MS}}$ の UFO の値は外線の補正を除いた振幅（式 (13)、(18)）と比べた。比べる量は、始状態のスピンの平均と終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む MadLoop の Born と、1 ループの有限部分 $2\,\text{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})$ である。$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ では、木の振幅との干渉のスピン和が $\sum(\bar{v}\not{k}_1u)^*\bar{v}u=2M(t-u)$、$\sum|\bar{v}\not{k}_1u|^2=2[(t-M^2)(u-M^2)-m^4]$ で決まり、a と b の両方が効く。表 7 に示すように、手順 (4) の 6 点と、$\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ で $\mu_R=m/2,\,2m,\,5m$ とした 3 点で、

表 7: MadLoop と予想の比較（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$、各 9 点の最大）。「図」は MadGraph が生成した Born、ループ、R2、UV の対抗項の図の数である。UV の図の数は、MadGraph が対抗項の結合を $1/\epsilon$ の部分と有限部分、ループの中の粒子ごとに別々に数えたもので、on-shell の対抗項は有限部分を持つので多くなる。対抗項を入れる場所（$\phi\phi\to\phi\phi$ では 4 点頂点 1 か所、$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ では内線のフェルミオン 2 か所と湯川の頂点 4 か所）は二つの処方で同じである。有限部分のずれは予想に対する相対値、$1/\epsilon$ は有限部分に対する比である。

過程	対抗項	図（Born、ループ、R2、UV）	Born	有限部分	$1/\epsilon$
$\phi\phi\to\phi\phi$	on-shell	1, 9, 1, 3	$<10^{-15}$	1.5×10^{-12}	3.7×10^{-15}
	$\overline{\text{MS}}$	1, 9, 1, 2	$<10^{-15}$	1.2×10^{-12}	3.3×10^{-15}
$\psi\bar\psi\to\phi\phi$	on-shell	2, 11, 4, 20	1.1×10^{-15}	2.1×10^{-11}	1.3×10^{-12}
	$\overline{\text{MS}}$	2, 11, 4, 10	1.1×10^{-15}	1.9×10^{-11}	3.0×10^{-12}

Born は丸め誤差の範囲で、有限部分は相対 2×10^{-11} 以内で一致し、$1/\epsilon$ と $1/\epsilon^2$ の係数は 0 だった。相対的なずれが最も大きい点は有限部分が打ち消し合って小さい点で、差そのものは 3×10^{-13} 以下である。μ_R を変えたときの on-shell の値の変化は、$\phi\phi\to\phi\phi$ では β_λ の三つの項、$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ では $-10y^2b^{(0)}$ で、どちらも予想と一致した。これで、式 (20) の質量のずれと留数の扱いと、手順 (4) の振幅が、MadLoop とも確かめられた。スクリプトは `generate_PsYukawa_NLO.sh`（`nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_ufo.wl`）、`run_madloop_check.sh`、`madloop_numeric.py` である。

■ **手順 (6)：全断面積。** 式 (21) の各項を、極質量 $m_{\rm p}=1$、$M_{\rm p}=0.7$ と $\overline{\text{MS}}$ の $y=\lambda=1$（$\mu=m$）で求めた（単位は GeV）。$\mathcal{M}_A^{(1)}$ と a、b は手順 (4) と同じく COLLIER で求め、式 (16)、(20) の変換の項を足して $\cos\theta$ について積分した。$\phi\phi\to\psi\bar\psi$ の被積分関数は、高いエネルギーで $\cos\theta=\pm1$ の近くに t、u チャンネルの伝播関数の山を持つ。そこで $\cos\theta$ の区間の半分ずつで山を平らにする変数を使い（付録 I）、Gauss–Legendre の 24 点ずつで積分した。分点を倍にした値との差は相対 3×10^{-14} 以下だった。同じ分点で MadLoop（on-shell の対抗項、$\mu_R=m$）を走らせて積分すると、表 8 の 5 つのエネルギーで、$\sigma_B^{(0)}$ は相対 10^{-15}、$\sigma_A^{(1)}$ は 6×10^{-11}、$\sigma_B^{(1)}$ は 2×10^{-10} 以内で一致した。$\sigma_A^{(1)}$ のずれが最も大きいのは、$\sigma_A^{(1)}$ が符号を変える $\sqrt{s}\approx8m$ に近い $10m$ の点である。$\phi\phi\to\psi\bar\psi$ の MadLoop はこの過程の図をそのまま計算するので、時間反転の段階も確かめられた。

σ_3 のスピン和は、Dirac 表示の行列で式 (22) の Γ を作り、トレースをとって求めた。これは MadGraph の standalone の出力の行列要素と、求積の分点から選んだ 69 点で相対 6×10^{-14} 以内で一致した。位相空間の積分では、$\sum|\mathcal{M}_3|^2$ を ψ の山と $\bar\psi$ の山に応じて二つに分けた。それぞれ、そのフェルミオンを単独の粒子とし、その角度の山を平らにする変数で、4 変数の Gauss–Legendre の求積を行った（付録 I）。各変数 32 点の値と 24 点の値の差は、$\sqrt{s}\le5m$ で相対 2×10^{-9} 以下、$10m$ で 5×10^{-6}、$20m$ で 1.4×10^{-4} だった。山を平らにしない求積（ϕ を単独の粒子とする）は、$\sqrt{s}\le5m$ では 5×10^{-7} 以内で一致したが、$20m$ では 1.9% ずれた。独立な検算として、Dalitz の変数と終状態の向きの一様な回転によるモンテカルロ積分（200 万点）を行うと、5 つのエネルギーで統計誤差の 0.7 倍以内で一致した。

MadGraph の木の断面積は、$\phi\phi\to\psi\bar\psi$ では $\sqrt{s}=3m,\,5m,\,10m$ で統計誤差の 1.1 倍以内で一致した。$\phi\phi\to\phi\psi\bar\psi$ では、MadGraph の値が 0.4%、0.9%、2.4% 小さかった（統計誤差の 2.1 倍、4.7 倍、12 倍）。スピン和は一致しているので、ずれは MadGraph の位相空間の積分から来る。$\sqrt{s}=10m$ で図を分けると、λy の図だけの断面積は 0.02%（誤差の 0.4 倍）で一致し、y^3 の図 6 個だけの断面積は 10 万事象で 1.8% 小さかった。ψ の向きの分布をモンテカルロ積分（600 万点）と比べると、ずれの約 4 分の 1 は $|\cos\theta_\psi|>0.999$ の 2 つのビン（断面積の 1.9%）にあり、そこで MadGraph の値は自前の値の 65% と 84% だった。残りのずれは他のビンに広く分かれている（どのビンも誤差の 2.5 倍以内）。ϕ^3、$\phi^3+\phi^4$ のノートの $\phi\phi\to\phi\phi\phi$ で見た MadGraph のずれ（$\sqrt{s}=10m$ で 0.8%、0.3%）と同じ向きで、ここでは前方の狭い山のために大きく出たと考えられる。MadGraph の積分の設定を変えても、ずれは残った（付録 Q）。

結果を表 8 と図 5 に示す。全断面積の補正 $\sigma_{\rm tot}/\sigma_{\rm tot}^{(0)}-1$ は $\sqrt{s}\approx2.5m$ で最小の +7.8% になり、そこから高いエネルギーでは σ_3 のために増えて、$20m$ で +22.6% に達する。$\sigma_3/\sigma_{\rm tot}^{(0)}$ は $\sqrt{s}=3m$ で 8%、$20m$ で 27% である。$\sqrt{s}=10m$ から $20m$ で、$s\sigma_3$ は 1.87 倍になり、$s\sigma_{\rm tot}^{(0)}$（1.39 倍）より速く増える。1 ループの干渉は、$\phi\phi\to\psi\bar\psi$ では

表 8: $\phi\phi$ 散乱の全断面積の内訳（$m_{\rm p}=1$、$M_{\rm p}=0.7$、$\overline{\rm MS}$ の $y=\lambda=1$（$\mu=m$）、単位は GeV、断面積は pb）。$\sigma^{(0)}_{\rm tot}=\sigma^{(0)}_A+\sigma^{(0)}_{\bar B}$ は木の全断面積で、最後の列は $\sigma_{\rm tot}/\sigma^{(0)}_{\rm tot}-1$ である。$2\to2$ は Gauss–Legendre の 2×24 点（相対精度 10^{-13}）、σ_3 は各変数 32 点の求積（相対精度 10^{-4} より良い）による。$\phi\phi\to\phi\psi\bar\psi$ は $\sqrt{s}>m+2M=2.4m$ で開く。

$\sqrt{s}/m$	$\sigma^{(0)}_A$	$\sigma^{(0)}_{\bar B}$	$\sigma^{(1)}_A$	$\sigma^{(1)}_{\bar B}$	σ_3	$\sigma^{(0)}_{\rm tot}$	$\sigma_{\rm tot}$	補正
2.5	6.197×10^{5}	2.418×10^{6}	4.040×10^{5}	-2.091×10^{5}	4.303×10^{4}	3.038×10^{6}	3.276×10^{6}	+7.8%
3	4.304×10^{5}	3.162×10^{6}	2.434×10^{5}	-2.316×10^{5}	3.020×10^{5}	3.592×10^{6}	3.906×10^{6}	+8.7%
5	1.549×10^{5}	2.470×10^{6}	4.621×10^{4}	-1.448×10^{5}	3.666×10^{5}	2.625×10^{6}	2.893×10^{6}	+10.2%
10	3.873×10^{4}	1.040×10^{6}	-4.578×10^{3}	-4.575×10^{4}	2.149×10^{5}	1.079×10^{6}	1.243×10^{6}	+15.3%
20	9.683×10^{3}	3.657×10^{5}	-5.326×10^{3}	-1.042×10^{4}	1.006×10^{5}	3.754×10^{5}	4.603×10^{5}	+22.6%




図 5: $\phi\phi$ 散乱の全断面積（パラメータは表 8 と同じ）。左は木の全断面積 $\sigma^{(0)}_{\rm tot}$（破線）、y^6 の次数までの $\sigma_{\rm tot}$（実線）、木の $\sigma^{(0)}_A$、$\sigma^{(0)}_{\bar B}$（点線）と σ_3（一点鎖線）。右は y^6 の次数の各項とその和の $\sigma^{(0)}_{\rm tot}$ に対する比で、丸は同じ分点で積分した MadLoop の $\sigma^{(1)}_A$、$\sigma^{(1)}_{\bar B}$、バツは MadGraph の σ_3 である。閾値の近くの立ち上がりは $\sigma^{(1)}_A$ から来る。

$\sigma^{(0)}_{\bar B}$ の -8.6%（$\sqrt{s}=2.5m$）から -2.8%（$20m$）である。$\phi\phi\to\phi\phi$ では $\sigma^{(0)}_A$ の $+65\%$（$2.5m$）から -55%（$20m$）まで変わり、$\sqrt{s}\approx8m$ で符号を変える。$\phi\phi$ の閾値の近くでは σ_A が全断面積の大部分を占め（$\sqrt{s}=2.05m$ で 82%）、その 1 ループの補正（$\sigma^{(0)}_A$ の $+75\%$）のために、全断面積の補正は $+56\%$ になる。$y=\lambda=1$ では、閾値の近くと高いエネルギーで、y^6 の次数の補正は小さくない。スクリプトは `xsec_collier.f90`（COLLIER）、`xsec_mg5.mg5`（MadGraph）、`run_xsec_check.sh`（MadLoop と MadGraph の standalone の出力の準備）、`xsec_numeric.py`（積分、MadLoop、比較、図）である。

6　繰り込み群

この節では、S 行列要素と極質量の μ 依存から β_λ、β_y、γ_M、γ_m をツールの数値で読み取り、式 (8) と比べる（手順 (7)）。さらに、一般の理論の 1 ループの公式（文献の値）と比べ、確かめた係数で比 λ/y^2 の流れを描く。結論を先に述べると、四つの係数は、二つの処方（$\overline{\rm MS}$ の質量と極質量）の四つのツールすべてで、手計算と相対 4×10^{-12} 以内で一致した。Machacek と Vaughn の一般の公式は、式 (8) の六つの係数を記号として再現した。スクリプトは `run_rg_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (7)：繰り込み群。** 物理量は、それをどのパラメータで書いても μ によらない。質量のパラメータ（$\overline{\rm MS}$ の $m(\mu)$、$M(\mu)$、または極質量）と $\overline{\rm MS}$ の結合 $y(\mu)$、$\lambda(\mu)$ で書いた物理量を「木の値（パラメータの関数）$+\mathcal{Y}(\mu)$」とする。$\mathcal{Y}$ は、パラメータを固定したときの 1 ループの部分である。木の値をパラメータで微分すると、μ によらない条件は

$$\mu\frac{\partial\mathcal{Y}_A}{\partial\mu}=\beta_\lambda,\qquad \mu\frac{\partial\mathcal{Y}_a}{\partial\mu}=0,\qquad \mu\frac{\partial\mathcal{Y}_b}{\partial\mu}=-(4\pi)^2\Big[\frac{2b^{(0)}}{y}\,\beta_y+2My^2\Big(\frac{1}{(t-M^2)^2}-\frac{1}{(u-M^2)^2}\Big)\gamma_M\Big]\qquad(24)$$

となる（付録 K）。$\mathcal{Y}_A$ は $\phi\phi \to \phi\phi$（木の値 $-\lambda$）の、$\mathcal{Y}_a$、$\mathcal{Y}_b$ は $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の二つのスピノルの構造（式 (18) と同じく $(4\pi)^2$ を掛けたもの）の 1 ループの部分である。$\mathcal{Y}_b$ の右辺の二つの関数は角度依存が違うので、6 点から β_y と γ_M が別々に決まる。二つの場合を調べた。(i) $\overline{\text{MS}}$ の質量。$\mathcal{Y}_A = \mathcal{M}_A^{(1)} + 4\lambda y^2[B_0^{MM} + m^2 B_0^{MM\prime}](m^2)/(4\pi)^2$、$\mathcal{Y}_a = a_{\text{phys}}$、$\mathcal{Y}_b = b + (4\pi)^2(\delta R_\psi + \delta R_\phi)b^{(0)}$ で、式 (20) の質量のずれの項は木の値 $b^{(0)}(M)$ に移る。予想は式 (8) の三つの係数である。(ii) 極質量。$\mathcal{Y}_A$ は (i) と同じ、$(\mathcal{Y}_a, \mathcal{Y}_b) = (a_{\text{phys}}, b_{\text{phys}})$（式 (20)）で、$M_{\text{p}}$ は走らないので予想は $\gamma_M = 0$ である。ϕ の質量は、どちらの過程でも木の値に運動学を通してしか入らないので、これらの S 行列要素からは γ_m が読めない。そこで γ_m は、物理量である ϕ の極質量 $m_{\text{p}}^2 = m^2 + \Sigma_\phi(m^2)$ が μ によらないことから $\gamma_m = -\mu\,\partial\Sigma_\phi/\partial\mu$ として読む。同じく $M_{\text{p}} = M[1 + \Sigma_V(M^2) + \Sigma_S(M^2)]$ から、γ_M をもう一度読む（式 (15)、(17)）。

数値は、手順 (4) の 6 点で $\mu = m/2,\ m,\ 2m$ として求めた。Package-X と LoopTools は手順 (4) と同じ FeynCalc の振幅と、手順 (3) と同じ自己エネルギーを評価し、COLLIER は式 (13)、(18) と極質量の積分を組み立てた。MadLoop は、(i) では極だけの $\overline{\text{MS}}$ の対抗項、(ii) では NLOCT の on-shell の対抗項を使い、$\mu_R = \mu$ として走らせた。$\overline{\text{MS}}$ の MadLoop と FeynCalc、COLLIER の値には、留数と質量のずれの項を Feynman のパラメータの積分から足した。on-shell の MadLoop はそれらを NLOCT の対抗項として含むので、対抗項の μ 依存の検算にもなる。$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ は、MadLoop の有限部分と同じ木の振幅との干渉 $\frac{1}{4}\text{Re}\sum \mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}$ で当てはめた（付録 K）。18 点の値の COLLIER との相対的なずれは、LoopTools で 1.9×10^{-13}、MadLoop で 1.1×10^{-10}、Package-X で 9.2×10^{-10} 以内で、on-shell の MadLoop は式 (16)、(20) と 3.4×10^{-11} 以内で一致した。虚部は μ によらず全桁が同じだった。パラメータを固定すると $\mathcal{Y}$ は $\ln\mu$ の 1 次式なので、傾きは $\mu = 2m$ と $m/2$ の値の差を $2\ln 2$ で割って求め、$\mu = m$ の値が両端の平均と一致することを確かめた。FeynCalc の振幅と自己エネルギーの μ 依存は、Package-X の記号的なスケールで、付録 K の式と記号としても一致した。

結果を表 9 に示す。二つの場合の四つのツールすべてで、β_λ は相対 1.2×10^{-15}、β_y は 2.6×10^{-13}、γ_M は 3.8×10^{-12} 以内で予想と一致し、(ii) の γ_M は $(4\pi)^{-2}$ を単位として 3×10^{-12} 以下だった。$\mathcal{Y}_a$ の傾きは 5×10^{-15} 以下で 0 だった。極質量からの γ_m、γ_M は、三つのツールで相対 9×10^{-16} 以内で一致した。さらに、β_λ の三つの項を別々に確かめた。COLLIER の ϕ の泡の部分の傾きは $3\lambda^2$、フェルミオンの箱の部分は $-48y^4$、on-shell と $\overline{\text{MS}}$ の MadLoop の差（ϕ の留数）は $8\lambda y^2$ で、いずれも相対 10^{-15} で一致した。$\phi^3 + \phi^4$ のノートと同じく、この一致は数値の精度というより、対抗項、振幅、S 行列要素への変換、各ツールの μ の約束が整合していることの検算である。ここでは、フェルミオンの質量の走り γ_M と、外線のフェルミオンの留数がこの整合に加わる。

■ **一般の公式との比較。** 実のスカラー場と 2 成分のフェルミオンからなる一般の理論の 1 ループの β 関数と異常次元は、Machacek と Vaughn の公式 [6, 7, 8] で与えられる。質量は、伝播しない「ダミー」のスカラー場との結合とみなして同じ公式から得る [9]。Dirac 場を $\psi = (\chi, \eta^\dagger)$ と 2 成分に分けると、質量は $m_{ij} = M\sigma_1$、擬スカラーの湯川結合は $Y_{ij} = -iy\sigma_1$ と、湯川の行列の位相 $-i$ として現れる。この位相は $Y^\dagger Y$ の形の項には効かず、$Ym^\dagger Y$ とトレースの項の符号だけを変える（付録 K）。公式に入れると、式 (8) の β_y、β_λ、γ_m、γ_M、γ_ϕ、γ_ψ の六つがすべて記号として再現された（`rg_general.py`）。同じ公式でスカラーの湯川結合（$Y = y\sigma_1$）を調べると、γ_M は $5y^2M/(4\pi)^2$ になる。このうち $2y^2M/(4\pi)^2$ はフェルミオンのループのタドポールの項で、それを除いた $3y^2M/(4\pi)^2$ が第 3 節で述べたスカラーの湯川結合の値である。擬スカラーではタドポールの項はトレースが 0 で消え、$Ym^\dagger Y$ の項が符号を変えて $\gamma_M = -y^2M/(4\pi)^2$ になる。質量によらない $\beta_y = 5y^3/(4\pi)^2$ と $\beta_\lambda = (3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4)/(4\pi)^2$ は、スカラーの湯川結合の教科書の値 [10] と同じで、第 3 節のカイラル回転の議論と合う。

図 6 は、$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ で、(i) のパラメータで書いた $\mathcal{M}_A$ と $\sum|\mathcal{M}_B|^2$ の μ を $m/4$ から $4m$ まで変えたものである。パラメータを固定すると、$\mu = m$ からのずれは最大 30% と 19% になる。y、λ、M を 1 ループの解（式 (9) と $M \propto y^{-1/5}$）で走らせると、ずれは 5.5% と 2.8% に縮む。この残りは、木の値を $\ln\mu$ について 2 次まで展開した項 $\frac{1}{2}\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}\ln^2(\mu/m)$ である（付録 K）。その予想値 -4.98×10^{-2}、$+2.51 \times 10^{-2}$ は、両端の平均 -5.01×10^{-2}、$+2.54 \times 10^{-2}$ と $\ln^4$ の項の範囲で一致する。残りが $\phi^3 + \phi^4$ 理論（5×10^{-4}）より大きいのは、β_λ がフェルミオンの箱の $-48y^4$ のために大きく、その走りの 2 次の項も大きいからである。

図 7 は、確かめた係数による (y^2, λ) の流れである。式 (9) の閉じた形は、数値積分と 10^{-12} で一致した。半直線 $\lambda = r_\pm y^2$ は流れで保たれる。赤外（$y^2 \to 0$）では、すべての軌道が $\lambda = r_+ y^2$ に沿って原点に向かう。紫外で

表 9: S 行列要素と極質量の μ 依存から式 (24) で読み取った係数（$m = 1$、$M = 0.7$、$y = \lambda = 1$、$\mu = m$）。ツールは Package-X、LoopTools、COLLIER、MadLoop（(i) は極だけの $\overline{\text{MS}}$ の対抗項、(ii) は on-shell の対抗項。(ii) は $\overline{\text{MS}}$ の MadLoop に変換の項を足したものも含む）。極質量は MadLoop を除く三つ。「ずれ」はツールの間の最大値で、予想が 0 でないものは相対的なずれ、(ii) の γ_M は $(4\pi)^2|\gamma_M|$ である。

場合	量	予想	予想の値	ずれ
(i) $\overline{\text{MS}}$ の質量	β_λ	$(3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4)/(4\pi)^2$	$-2.3430523717 \times 10^{-1}$	1.2×10^{-15}
	β_y	$5y^3/(4\pi)^2$	$3.1662869888 \times 10^{-2}$	2.6×10^{-13}
	γ_M	$-y^2M/(4\pi)^2$	$-4.4328017844 \times 10^{-3}$	3.8×10^{-12}
(ii) 極質量	β_λ	同上	$-2.3430523717 \times 10^{-1}$	1.2×10^{-15}
	β_y	同上	$3.1662869888 \times 10^{-2}$	2.6×10^{-13}
	γ_M	0	0	2.7×10^{-12}
極質量	γ_m	$(\lambda m^2 + 4y^2m^2 - 8y^2M^2)/(4\pi)^2$	$6.8391798959 \times 10^{-3}$	8.9×10^{-16}
	γ_M	$-y^2M/(4\pi)^2$	$-4.4328017844 \times 10^{-3}$	2.0×10^{-16}




図 6: $\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ での、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータで書いた $\phi\phi \to \phi\phi$ の S 行列要素（左）と $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ のスピン和 $\sum|\mathcal{M}_B|^2$（右、木と 1 ループの干渉まで）の μ 依存（$\mu = m$ からの相対的な変化、$\mu = m$ で $m = 1$、$M = 0.7$、$y = \lambda = 1$）。破線はパラメータを固定したもの、実線は y、λ、M を 1 ループの解で走らせたもの、点線は残りの予想 $\frac{1}{2}\ddot{\mathcal{M}}^{(0)}\ln^2(\mu/m)$ である。1 ループの部分は COLLIER の値である。

は、$r < r_+$ の軌道は $\lambda = 0$ を横切って $\lambda = r_- y^2$ に近づき、$r > r_+$ の軌道は y より先に λ の Landau 極に達する。基準点（$\mu = m$ で $y = \lambda = 1$）の軌道は、$\mu = 19.49m$（$y^2 = 1.232$）で $\lambda = 0$ を横切る。y の Landau 極は $\mu = 7.2 \times 10^6 m$ にある。λ が 0 を横切ること自体は物理的な出来事ではない。$\lambda(\mu)$ は $\overline{\text{MS}}$ の結合で、0 になるスケールは処方を変えれば $O(1)$ の因子で変わり、S 行列要素は μ によらない。意味を持つのは、大きな場 $\phi \gg m, M$ での有効ポテンシャルである。繰り込み群で改良すると $V \approx \lambda(\mu \approx \phi)\phi^4/4!$ で、$\lambda < 0$ ではこれが負になり、$\phi = 0$ は最低エネルギーの状態ではなくなる（偽の真空）。V が負になる場の値そのものは、1 ループの補正を含めた結合で決まるので、$19.49m$ とは $O(1)$ の因子で違う。それが問題になるかどうかは真空の崩壊率で決まり、手順 (9)、(10) で調べる。目安として、質量のない理論の bounce の作用 $16\pi^2/|\lambda|$（付録 K）に走る λ を入れると、$\mu = 30m$、$100m$、$10^3 m$ で 757、175、56 である。λ は 0 を過ぎても下がり続けるので、小さい bounce ほど作用が小さい。




図 7: (y^2, λ) の繰り込み群の流れ（1 ループ、$\overline{\text{MS}}$）。矢印は紫外（μ が大きくなる向き）を向く。灰色の線は式 (9) の軌道、黒の実線と破線は流れで保たれる半直線 $\lambda = r_+ y^2$ と $\lambda = r_- y^2$、橙の線は基準点（星印、$\mu = m$ で $y = \lambda = 1$）を通る軌道（点線は $\mu < m$）、丸は $\lambda = 0$ になる点（$\mu = 19.49m$）である。

7　摂動論の限界と真空の安定性

この節では、この模型の物理の二つの限界を調べる。一つは、結合が大きくなると摂動論とユニタリー性が破れることである。もう一つは、第 6 節で見た $\lambda < 0$ による真空の不安定性である。手順は次の三つである。(8) $\phi\phi$ と $\psi\bar{\psi}$ のヘリシティの状態を合わせた部分波のユニタリー性から、(y, λ) の限界を出す。(9) 繰り込み群で改良した有効ポテンシャルで $\lambda < 0$ の bounce の作用を求める。(10) フェルミオンの行列式を含む崩壊率の前因子を求め、真空の準安定性の限界を出す。(11) $\lambda \approx 0$ の近くでフェルミオンの寄与を足し上げ、限界を精密にする。(12) $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ の 1 ループを加えて、1 ループのユニタリー性の限界を完成させる。五つの手順はすべて終わった。結論を先に述べると、木のユニタリー性は、結合を固定すると $y < \sqrt{8\pi/3} = 2.89$ と $|\lambda| < 16\pi$ を与え、許される領域はほぼこの長方形である。結合の走りを入れて理論を $\sqrt{s} = E$ まで使うことを求めると、$E = 10m$ で $y(m) \leq 1.94$、$E = 100m$ で $y(m) \leq 1.56$ になる。$J = 0$ の部分波の行列を 1 ループで完成させると、1 ループのユニタリー性は $\mu = m$ で $y \leq 2.86$ を与え、木の限界に近い。基準点はこれらを $10^6 m$ まで満たすので、基準点を制限するのはユニタリー性ではなく、真空の安定性である。繰り込み群で改良した有効ポテンシャルは $\phi \approx 39m$ で負になり、bounce の作用 $16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ は $1/R = 30m$ の 757 から $10^5 m$ の 13 まで単調に減る。λ に極小がないので、崩壊は理論を使う最も短いスケールの bounce で決まる。フェルミオンの行列式を含む 1 ループの前因子は崩壊を速めるが、λ の零点の近くでは $12y^2/|\lambda|$ が大きく、1 ループの展開は制御できない。その大きな部分は局所的な有効ポテンシャルで、bounce の作用に足し上げると展開は制御でき、bounce は $1/R$ より高いスケール μ_R の結合を見る。宇宙論的な条件（ヒッグスへの読み替え）は、基準点で bounce の大きさの切断を $\Lambda_{\max} = 16.0m = 0.82\mu_0$ に制限する（木の評価では $41.8m$）。スクリプトは `run_pw_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (8)：部分波のユニタリー性。** 外線にフェルミオンがあるので、部分波はヘリシティの状態で定義する [11]。重心系で z 軸に沿う 2 体の状態 $|\lambda_1 \lambda_2\rangle$（$\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$）とその回転を使い、

$$a^J_{fi}(s) = \frac{\sqrt{\beta_i \beta_f}\, S_i S_f}{32\pi} \int_{-1}^{1} \mathrm{d}c\, d^J_{\lambda_i \lambda_f}(\theta)\, \mathcal{M}_{fi}(s, \theta), \qquad \mathrm{Abs}\, a^J = a^J a^{J\dagger}, \qquad |\mathrm{Re}\, a^J_{(k)}| \leq \frac{1}{2} \tag{25}$$

と定義する（付録 L）。$\beta = 2|\boldsymbol{p}|/\sqrt{s}$、$S = 1/\sqrt{2}$（$\phi\phi$）または 1、$a^J_{(k)}$ は行列 a^J の固有値である。$\phi\phi$ の部分波 a_ℓ は $\phi^3 + \phi^4$ のノートと同じ規約になる。$J = 0$ では、$\phi\phi$ と、$\lambda_1 = \lambda_2$ の $\psi\bar{\psi}(++)$、$\psi\bar{\psi}(--)$ の三つの状態が混ざる。パリティから、$\phi\phi$（0^+）は $\psi\bar{\psi}$ の一つの組み合わせ（$^3P_0$）とだけ混ざり、もう一つの組み合わせ（$^1S_0$、0^-）

は s チャンネルの ϕ と結合する。$J=1/2$、$3/2$ では $\psi\phi$ の状態が、$J=1$、2 では $\psi\bar\psi$ の 4 つのヘリシティの状態（$J=2$ では $\phi\phi$ も）が混ざる。木の振幅は Dirac 表示ではなくカイラル表示の行列とヘリシティのスピノルで陽に作り、$\psi\bar\psi\to\phi\phi$、$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ のスピン和は手順 (2) の値を全桁で再現した。行列 a^J はエルミートで（10^{-18}）、角度の求積は分点を倍にしても 10^{-16} しか変わらなかった。

高エネルギーでは、木の部分波は閉じた形になる（付録 L）。質量を無視すると、$\psi\bar\psi(\lambda\lambda)\to\phi\phi$ はカイラリティのために 0 になり、$\phi\phi$ と $\psi\bar\psi(\lambda\lambda)$ の混合は $|a^0|=\sqrt{2}\,\frac{y^2}{16\pi}\frac{M}{\sqrt{s}}[\ln(s/M^2)-2]$ のように消える。$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ は、s チャンネルが $(++)$、$(--)$ のどの組でも $-y^2$、t チャンネルがヘリシティを反転させる組でだけ $-y^2$ を与え、

$$a^0\to\mathrm{diag}\Big(-\frac{\lambda}{32\pi}\Big)\oplus\frac{y^2}{16\pi}\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&-1\end{pmatrix},\qquad a^0_{(k)}\to-\frac{\lambda}{32\pi},\ -\frac{3y^2}{16\pi}\ (^1S_0),\ +\frac{y^2}{16\pi}\ (^3P_0)$$

となる。$\sqrt{s}=10^4m$ で、数値の行列の要素はこれらと 2×10^{-7} で、5 つの角度のヘリシティの振幅は質量なしの形（付録 L）と 4×10^{-7} で一致し、混合は上の式と 4×10^{-9} で一致した（$\ln s$ の係数は $\sqrt{s}=10^5$〜10^6m で 1.41421）。$J=1/2$ では二つのヘリシティがともに $-3y^2/(32\pi)$ に近づく。$y=1$ の木の固有値の最大は、16π を単位として、$J=0$ が 3（$s\to\infty$）、$J=1/2$ が 1.89（$\sqrt{s}=4.4m$）、$J=1$ が 0.50、$J=3/2$ が 0.67、$J=2$ が 0.91 で、$J=0$ が最も強い。

限界は三つの基準で求めた（表 10、図 8 上）。

- (A) 木のユニタリー性：結合を固定して、すべての s（$2M<\sqrt{s}\le10^4m$）と $J\le2$ で $|\mathrm{Re}\,a^J_{(k)}|\le\frac12$。
- (B) 走る結合での木のユニタリー性：$m\le\mu\le E$ で $y(\mu)$、$\lambda(\mu)$ が (A) の高エネルギーの限界を満たす。
- (C) 1 ループのユニタリー性：$\phi\phi$ を含む要素について、$2m<\sqrt{s}\le4m$ で $|\mathrm{Re}\,a^0_{\phi\phi,\phi\phi}|\le\frac12$、$|a^0_{\phi\phi,\psi\bar\psi}|\le\frac12$。

$a^J=y^2P_J(s)+\lambda Q_J(s)$ は (y^2,λ) の 1 次式なので、(A) の領域は凸で、(y^2,λ) の平面の半直線に沿って求まる。(A) は高エネルギーの極限で決まり、$\lambda=0$ では $y^2\le8\pi/3$（$^1S_0$）、$y=0$ では $|\lambda|\le16\pi$（$\phi\phi$）である。上限は $s\to\infty$ でだけ達し、質量はこれを強めない。領域はほぼ長方形 $y^2\le8\pi/3$、$|\lambda|\le16\pi$ で、角（$|\lambda|\approx16\pi$、$y^2\gtrsim5$）でだけ、$\phi\phi$ と $^3P_0$ の混合のために最大 1.2% 内側に入る（$\sqrt{s}=14$〜$33m$ で決まる）。$\lambda<0$ の角で縮みが大きいのは、二つの正の固有値 $-\lambda/(32\pi)$ と $y^2/(16\pi)$ が近づき、混合で押し広げられるからである。y の限界は Allwicher らの一般の湯川理論の限界 [12] の、実のスカラーと Dirac フェルミオン 1 つの場合（$N=1$）の $y^2<8\pi/(2N+1)$ と一致する。彼らの $J=0$ の行列 $\frac{y^2}{16\pi}\left(\begin{smallmatrix}-1&2\\2&-1\end{smallmatrix}\right)$ とは非対角の符号が違うが、これは $(--)$ の状態の位相の取り方（$|--\rangle\to-|--\rangle$）の違いで、固有値は同じである。$J=1/2$ の高エネルギーの極限の $y^2<16\pi/3$ も一致する。$J=1/2$ では質量の効果で $\sqrt{s}=4.4m$ の固有値が極限より大きく、結合を固定した限界は $y\le3.65$ になるが、$J=0$ より弱い。質量のない極限では、擬スカラーの結合はカイラル回転でスカラーの結合に移るので（第 3 節）、高エネルギーの限界は両者で同じである。λ の限界は $\phi^3+\phi^4$ のノートの 16π と同じである。

(B) では、結合が走るので、限界は理論を使うエネルギー E に依存する。y の条件は閉じた形で $y(m)^2\le(8\pi/3)/[1+\frac{5}{3\pi}\ln(E/m)]$ になり（付録 L）、$E=10m$、$100m$ でそれぞれ $y(m)\le1.94$、1.56 である。λ の上限は、$y=0$ で $\lambda(m)\le16\pi/[1+\frac{3}{\pi}\ln(E/m)]$、すなわち 15.7、9.3 で、$y$ が大きいと $-48y^4$ が λ の増加を抑えるので少し緩む。$\lambda(m)<0$ の側は、y が小さいと λ が 0 に向かって走るので、-16π 近くまで許される。基準点（$\mu=m$ で $y=\lambda=1$）は $E=1.1\times10^6m$ まで (B) を満たす。

(C) では、手順 (4)〜(6) の COLLIER の 1 ループの振幅を結合の構造（λ^2、y^4、λy^2）に分けて S 行列要素（式 (16)、(20)）を作り、射影した。$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ の 1 ループはここではまだ計算していないので、$\phi\phi$ を含む要素だけを使う（手順 (12) で完成させる）。射影は、部分波のユニタリー性 $\mathrm{Abs}\,a^{0(1)}_{\phi\phi,i}=(a^{0(0)}a^{0(0)})_{\phi\phi,i}$（$i=\phi\phi$、$\psi\bar\psi(\pm\pm)$）で確かめた。$\phi$ の運動量 $p\ge0.1m$ では相対 3×10^{-10}、閾値のすぐ近く（$p=0.04m$）では両辺がともに小さく 1×10^{-8} で成り立った（図 8 下）。$\mu=m$ では、$\lambda=0$ で $y\le3.79$、$y=1$ で $-71\le\lambda\le48.6$ である。μ を $m/2$ から $2m$ まで変えると（結合は 1 ループの解で走らせる）、y の限界は 4.91 から 2.78 まで、λ の上限は 69.9 から 43.5 まで動く。木の限界の近くでは y^4 のフェルミオンの箱が大きく、1 ループの限界は μ の選び方に強く依存する。木のユニタリー性の限界は、摂動論が破れ始めるところとほぼ重なり、(C) は (A) より確かな限界にはならない。スクリプトは `pw_collier.f90`（COLLIER）と `pw_numeric.py`（部分波と限界）である。

表 10: 部分波のユニタリー性から求めた限界（$m = 1$、$M = 0.7$ は極質量、y、λ は $\overline{\text{MS}}$ の値で、(A) は結合を固定した値、(B)、(C) は $\mu = m$ の値）。(C) の括弧は、μ を $m/2$ から $2m$ まで変えたときの範囲である。

基準	条件	y の上限	λ の範囲
(A) 木、$J = 0$	$\lvert\mathrm{Re}\, a^0_{(k)}\rvert \le \frac{1}{2}$（$s \to \infty$）	$\sqrt{8\pi/3} = 2.894$	$\lvert\lambda\rvert \le 16\pi = 50.27$
(A) 木、$J = 1/2$	同上（$\sqrt{s} = 4.4m$ で最大）	3.65（$s \to \infty$ では $\sqrt{16\pi/3} = 4.09$）	—
(B) $E = 10m$ まで	走る結合で (A)	1.94（$\lambda(m) = 1$）	$\lambda(m) \le 15.7$（$y = 0$）
(B) $E = 100m$ まで	同上	1.56（$\lambda(m) = 1$）	$\lambda(m) \le 9.3$（$y = 0$）
(C) 1 ループ、$\mu = m$	$\phi\phi$ を含む要素	3.79（2.78〜4.91）	$-71 \le \lambda \le 48.6$（$y = 1$）




図 8: 部分波のユニタリー性による限界。上：(y, λ) の平面（$\mu = m$ の値）。黒の実線は (A) の長方形（角の 1.2% 以下の縮みは見えない）、青の破線と点線は (B) で $E = 10m$、$100m$ まで求めたもの、橙の一点鎖線は (C)（太線が $\mu = m$、細線が $\mu = m/2$ と $2m$）の境界で、それぞれ境界の内側（y が小さい側）が許される。星印は基準点である。下：部分波ごとのユニタリー性（$y = \lambda = 1$、$\mu = m$）。線は $\phi\phi$ を含む要素の $\mathrm{Abs}\, a^{0(1)}$、白丸は木の積 $(a^{0(0)} a^{0(0)})_{\phi\phi,i\circ}$。横軸は ϕ の運動量 p（$\sqrt{s} = 2\sqrt{m^2 + p^2}$）。

表 11: 繰り込み群で改良した bounce の作用 $S(R)=16\pi^2/|\lambda(\kappa/R)|$（$\mu=m$ で $y=\lambda=1$、$M=0.7$、1 ループの走り）。S は $\kappa=1$ の値、幅は $\kappa=1/2$ から 2 までの範囲である。$1/R=30m$ の $\kappa=1/2$ では $\lambda(15m)>0$ で bounce がない。

$1/(mR)$	$\lambda(1/R)$	$y^2(1/R)$	$\lvert\lambda\rvert/(4\pi)^2$	S	幅（$\kappa=\frac{1}{2}$〜2）
30	−0.208	1.275	0.0013	757	269〜∞
10^2	−0.904	1.412	0.0057	175	113〜328
10^3	−2.844	1.778	0.0180	55.5	43.4〜73.2
10^4	−6.034	2.400	0.0382	26.2	21.4〜32.3
10^5	−11.90	3.691	0.0754	13.3	10.6〜16.3
10^6	−28.82	7.992	0.1825	5.5	3.5〜7.6

■ **手順 (9)：有効ポテンシャルと bounce。** 式 (10) の有効ポテンシャルは、大きな場で $\ln(y^2\phi^2/\mu^2)$ が大きくなるので、$\mu=m$ に固定した値は信頼できない。V は $[\mu\partial_\mu+\sum_i\beta_i\partial_{g_i}-\gamma_\phi\phi\partial_\phi]V=0$ を満たすので（付録 E）、任意の t について

$$V(\phi;g_i,m)=V_{\rm CW}\big(\xi(t)\phi;\,g_i(t),\,me^t\big),\qquad \xi(t)=\exp\Big(-\int_0^t\gamma_\phi\,{\rm d}t'\Big)=\Big(\frac{y^2(t)}{y^2(0)}\Big)^{-1/5} \tag{26}$$

が成り立つ（付録 M）。$V_{\rm CW}$ は式 (10)、$g_i(t)$ は 1 ループで走る y^2、λ、m^2、M である。$me^t\approx\phi$ にとると対数が小さくなる（繰り込み群で改良した有効ポテンシャル [13]）。真空のエネルギーと定数を除くため、$\Delta V(\phi)\equiv V(\phi)-V(0)$ を同じ t で作り、$\lambda_{\rm eff}(\phi)\equiv 24\Delta V/\phi^4$ と置く。$\lambda_{\rm eff}$ は $\mu=m$ で規格化した場に対する値で、大きな場では ξ^4 のために $\lambda(\mu=\phi)$ より絶対値が小さい（$\phi=10^4m$ で $\xi^4=0.50$）。

結果を図 9 左に示す。走る結合は閉じた形（式 (9)、$M\propto y^{-1/5}$）と 9×10^{-12} で一致した。ΔV は、$me^t=\phi$ では $\phi_I=39.4m$ で負になる。$me^t=\phi/2$、2ϕ、$M_\psi(\phi)$ としても $\phi_I=39.4$〜$40.7m$ で、$\lambda_{\rm eff}$ の選び方による違いは $\phi=5$〜$3000m$ で 0.03 以下である。これは 1 ループの項の大きさ（0.19〜0.63）より 1 桁以上小さく、2 ループの次数の違いである。ϕ_I は $\lambda(\mu)=0$ のスケール $19.49m$ の約 2 倍である。差は 1 ループの項から来る。$\mu=\phi$ ではフェルミオンの項 $-4y^4(\ln(y^2\xi^2)-\frac{3}{2})$ の定数 $-\frac{3}{2}$ が $\lambda_{\rm eff}$ を正に押し上げ、$\lambda(\mu)$ が少し負になるまで V は負にならない。手順 (7) で述べたとおり、$\lambda(\mu)=0$ のスケールそのものは処方に依存するが、V が負になる場の値は選び方によらず決まる。$\mu=m$ の固定した次数の V は $\phi\gtrsim 30m$ でずれ始め、$\phi=300m$ で $\lambda_{\rm eff}=-0.42$（改良したものは -0.91）である。

$\lambda<0$ の質量のない理論の bounce は Fubini の解 $\phi=\sqrt{48/|\lambda|}\,R/(r^2+R^2)$ で [14]、作用 $16\pi^2/|\lambda|$ は大きさ R によらない（付録 K）。動径方向の方程式を $r=0$ から積分した解はこれと 9×10^{-11} で、作用の数値積分は 2×10^{-16} で一致した。質量の項があると、$d=4$ では有限の大きさの bounce は存在しない（Derrick のスケーリングの議論 [15]、付録 M）。Fubini の形の配位では、質量の項が作用を $\delta S\simeq(24\pi^2m^2R^2/|\lambda|)[\ln(1/(m^2R^2))-1]$ だけ増やすので（$mR=0.01$ で $16\pi^2/|\lambda|$ の 0.12〜0.16%）、作用は $R\to0$ で小さくなる。量子補正は大きさの縮退を解き、作用の μ 依存が 1 ループの行列式と打ち消すことから

$$S(R)\simeq\frac{16\pi^2}{|\lambda(\mu\approx1/R)|} \tag{27}$$

となる（Isidori らの標準模型の $8\pi^2/(3|\lambda(1/R)|)$ [16] と同じ形で、係数の違いは λ の規格化 $\lambda\phi^4/4!$ と $\lambda|H|^4$ による）。場の規格化の因子 ξ は、運動項とポテンシャルで打ち消し合うので現れない（付録 M）。表 11 と図 9 右に示すように、$S(R)$ は $1/R=30m$ の 757 から、10^3m で 56、10^5m で 13 まで、y の Landau 極に向かって単調に減る。標準模型では β_λ が高いスケールで 0 になり λ に極小があるので、その大きさの bounce が崩壊を決める。この模型では λ は Landau 極まで下がり続け（$\lambda\to r_-y^2$）、極小がない。質量の効果も $R\to0$ を好むので、崩壊は理論を使う最も短いスケール（切断 Λ）の bounce で決まり、$\Gamma/V\sim\Lambda^4e^{-16\pi^2/|\lambda(\Lambda)|}$ は Λ に強く依存する。$\mu=1/(2R)$ から $2/R$ の選び方による S の幅（表 11）は、手順 (10) で前因子と 1 ループの補正を求めて詰める。スクリプトは `bounce_numeric.py` で、`run_bounce_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (10)：崩壊率の 1 ループの前因子。** 手順 (9) の bounce のまわりで、崩壊率を 1 ループで求めた [17]。MR、$mR\ll1$ では質量を無視でき、$M=0$ では擬スカラーの湯川結合はカイラル回転でスカラーの結合に移る。する




図 9: 左：繰り込み群で改良した有効ポテンシャルの $\lambda_{\rm eff}(\phi) = 24\Delta V/\phi^4$（$me^t = \phi/2$、$\phi$、$2\phi$、$M_\psi(\phi)$ の 4 つの選び方はほぼ重なる）、$\mu = m$ の固定した次数のもの（灰色）、走る結合 $\lambda(\mu)$（黒、横軸は μ）。ϕ が小さいところの立ち上がりは質量の項 $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ による。右：bounce の作用 $S(R) = 16\pi^2/|\lambda(1/R)|$（帯は $\mu = 1/(2R)$ から $2/R$）。

と、スケール不変な bounce のまわりの ϕ と Dirac フェルミオンの汎関数行列式は、Andreassen、Frost、Schwartz（AFS）[18] が閉じた形で与えている。彼らの規約（$V = \lambda_A\phi^4/4$、湯川 $(y_A/\sqrt{2})\phi\bar\psi\psi$）に $\lambda_A = \lambda/6$、$y_A = \sqrt{2}y$ と読み替えると、

$$\begin{aligned}
&\frac{\Gamma}{V} = \int \frac{\mathrm{d}R}{R^5}\, e^{E(R)}, \qquad S = \frac{16\pi^2}{|\lambda(\mu)|}, \qquad w \equiv \frac{12y^2(\mu)}{\lambda(\mu)}, \\
&E = -S + \frac{5}{2}\ln\frac{S}{\pi} - \frac{5}{4} + 6\zeta'(-1) + 3\ln\frac{R\mu}{2} + \frac{1}{2}S^{\psi}_{\rm fin}(w) \\
&\qquad + w\Big(\frac{13}{18} + \frac{2\gamma_E}{3} + \frac{2}{3}\ln\frac{R\mu}{2}\Big) - w^2\Big(\frac{5}{18} + \frac{\gamma_E}{3} + \frac{1}{3}\ln\frac{R\mu}{2}\Big)
\end{aligned} \tag{28}$$

である（付録 N）。$(S/\pi)^{5/2}$ は並進の 4 つと大きさの 1 つの零モードの Jacobian、$-\frac{5}{4} + 6\zeta'(-1) + 3\ln(R\mu/2)$ は ϕ の行列式、残りはフェルミオンの行列式で、$S^{\psi}_{\rm fin}$ は部分波の和の有限部分である。ϕ の負のモードは Im をとって $|\cdot|$ にした。陽な μ 依存 $3 + \frac{2}{3}w - \frac{1}{3}w^2$ は $(4\pi)^2\beta_\lambda/\lambda^2$ にちょうど等しく（2×10^{-16}）、E は 1 ループで μ によらない。AFS の閉じた形は、本ノートで独立に確かめた。ϕ の部分波の行列式の比を Gel'fand–Yaglom の方法（動径方向の方程式）で数値的に求めると、AFS の Γ 関数の比と 6×10^{-11} で一致した。フェルミオンの 2×2 の動径方向の方程式でも 1×10^{-9} で一致した（比は Γ 関数の比の 2 乗である）。ϕ の有限部分の和は厳密な固有値の直接の和と、$\overline{\rm MS}$ のループの項は Bessel 関数の運動量積分と 8×10^{-12} で一致した。$S^{\psi}_{\rm fin}$ は確かめた部分波を引き算して足し上げて求めた（$j \le 300$、10^{-7}）。

w は $\lambda \to 0^-$ で $-\infty$ になり、フェルミオンの項は $w^2 \sim 144y^4/\lambda^2$ のように大きくなる。$\mu = 1/R$ では対数も大きい。bounce の中心のフェルミオンの質量は $y\phi_b(0) = 2\sqrt{|w|}/R$ と $1/R$ より大きいからである。そこで、E を μ について停留させる μ^*（E の極小）を中心の値とし、$\mu^*/2$ と $2\mu^*$ の値を幅とした。表 12 と図 10 左に基準点の結果を示す。$\mu^* \approx (1.6\text{〜}2.4)/R$ で、そこではループの項の和も小さい。1 ループの指数は木の評価 $-16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ より大きく（崩壊が速く）、その差は $1/R = 10^4 m$ では 0.3% だが、$10^3 m$ で 10%、$10^2 m$ で 28% になる。主にフェルミオンの行列式の寄与である。幅の $|E|$ に対する比は、$1/R = 10^4 m$ で 0.02、$10^3 m$ で 0.06、$300m$ で 0.11 だが、$100m$ で 0.26、$40m$ で 0.85 と大きくなる。λ の零点 $\mu_0 = 19.49m$ に近づくと、1 ループの展開は制御できなくなる。

宇宙論的な条件として、$\phi^3 + \phi^4$ のノートと同じくヒッグスに読み替え（$m = m_h$）、$\Gamma/V < H_0^4$、すなわち $\ln(\Gamma/(Vm^4)) < -4\ln(m_h/H_0) = -404.7$ を求めた。崩壊は理論の切断 Λ の近くの bounce で決まるので（手順 (9)）、条件は Λ の上限 $\Lambda_{\max}$ を与える。木の評価では基準点で $\Lambda_{\max} = 41.8m = 2.14\mu_0$ で、そこでは $S = 413$、$w = -41$ である。結合を変えると、$\Lambda_{\max}/\mu_0$ は 1.2〜32 で、y が小さく λ が小さいほど大きい（表 13、図 10 右）。$\lambda(m)/y(m)^2 > r_+$ の点では λ は負にならず、この限界はない。どの点でも $\Lambda_{\max}$ での $|w|$ は 20 以上で、1 ループの補正はそこで木と同じ程度になる。フェルミオンの行列式は崩壊を速めるので、$\Lambda_{\max}$ を下げる向きに働くが、そ

表 12: 基準点（$\mu = m$ で $y = \lambda = 1$）の崩壊率の指数 $E(R)$（式 (28)）。μ^* は E を μ について停留させる値、幅は $\mu^*/2$ と $2\mu^*$ での値、「スカラー」と「フェルミオン」は μ^* での 1 ループの部分、最後の列は木の評価 $-16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ である。

$1/(mR)$	$\mu^* R$	$E(\mu^*)$	幅	$S(\mu^*)$	スカラー	フェルミオン	$w(\mu^*)$	木
40	2.38	-209.2	-30.9, -184.0	181.0	8.4	-36.7	-19.3	-440.2
60	2.19	-163.8	-88.0, -148.3	145.4	7.6	-26.1	-16.0	-269.0
10^2	2.00	-125.1	-92.7, -116.1	113.5	6.7	-18.3	-13.0	-174.7
300	1.73	-77.2	-68.9, -73.8	72.0	5.2	-10.4	-9.05	-92.2
10^3	1.59	-50.3	-47.4, -48.8	46.9	3.8	-7.2	-6.69	-55.5
10^4	1.70	-26.1	-25.5, -25.8	22.4	2.2	-5.9	-4.44	-26.2

表 13: $\Gamma/V < H_0^4$（$m = m_h$ の読み替え）から求めた切断の上限 $\Lambda_{\max}$（木の評価）。μ_0 は $\lambda(\mu) = 0$ のスケール、w は $\Lambda_{\max}$ での $12y^2/\lambda$ で、1 ループの補正の大きさの目安である。$y = 0.7$、$\lambda = 3$ では $\lambda/y^2 > r_+$ で λ は負にならない。

$y(m)$	$\lambda(m)$	μ_0/m	$\Lambda_{\max}/m$	$\Lambda_{\max}/\mu_0$	$w(\Lambda_{\max})$
0.7	0.25	25.4	811	31.9	-20.1
1.0	0.25	2.22	6.32	2.84	-34.9
1.4	0.25	1.24	1.67	1.36	-63.6
0.7	1	1.10×10^5	6.23×10^5	5.69	-28.8
1.0	1	19.5	41.8	2.14	-41.1
1.4	1	2.24	2.91	1.30	-69.0
0.7	2	6.0×10^{10}	7.5×10^{10}	1.25	-83.0
1.0	2	266	430	1.62	-52.1
1.0	3	3.68×10^3	4.80×10^3	1.30	-70.7




図 10: 左：基準点の崩壊率の指数 $-E(R)$。破線は木の評価、実線は $\mu = \mu^*$ の 1 ループ、帯は $\mu^*/2$ から $2\mu^*$、点線は宇宙論的な条件の境界 $404.7 + 4\ln(1/mR)$、縦線は木の $\Lambda_{\max} = 41.8m$ である。1 ループは $1/R \geq 60m$ だけ示した（それより低いところでは μ^* が μ_0 に近づき、1 ループの指数は意味を持たない）。右：木の評価の $\Lambda_{\max}/\mu_0$ の結合への依存（表 13）。

の大きさはこの次数では決まらない。したがって、確かな結論は、真空を保つには新しい物理が λ の零点の数倍以内に現れなければならない、ということである。$\Lambda_{\max}$ の精密な値には、$\lambda \approx 0$ の近くでフェルミオンの寄与 y^4/λ^2 を足し上げる必要がある（手順 (11)）。スクリプトは `prefactor_numeric.py` で、`run_prefactor_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (11)：$\lambda \approx 0$ の近くの足し上げ。** 手順 (10) で 1 ループの展開が破れたのは、w^2 の項が S と同じ大きさになるからである。λ の零点の近くでは、λ を $y^4/(4\pi)^2$ と同じ次数と数えるのが自然である（Andreassen らが標準模型の有効ポテンシャルに用いた数え方 [19]）。このとき $S \sim (4\pi)^2/|\lambda|$ と $w^2 \sim y^4/\lambda^2$ の項は同じ主要な次数になり、

w の 1 次の項と ϕ の行列式はその次の次数になる（付録 O）。w^2 の項は、bounce を決める作用の中に入れなければならない。

その形は、フェルミオンが bounce の中で重いことから分かる。中心のフェルミオンの質量 $y\phi_b(0) = 2\sqrt{|w|}/R$ は $1/R$ の $\sqrt{|w|}$ 倍なので、フェルミオンの行列式は場の微分で展開でき、

$$\begin{aligned} -\ln\frac{\det(\partial\!\!\!/ + y\phi)}{\det\partial\!\!\!/} &= \int \mathrm{d}^4x\Big[V_\psi(\phi) + \frac{1}{2}Z_\psi(\phi)(\partial\phi)^2 + \cdots\Big], \\ V_\psi = -\frac{y^4\phi^4}{(4\pi)^2}\Big(\ln\frac{y^2\phi^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big), &\qquad Z_\psi = -\frac{2y^2}{(4\pi)^2}\Big(\ln\frac{y^2\phi^2}{\mu^2} + \frac{2}{3}\Big) \end{aligned} \tag{29}$$

となる（付録 O）。V_ψ は式 (10) の有効ポテンシャルのフェルミオンの項 [4] である。Fubini の解の上で積分すると、式 (28) のフェルミオンの部分について

$$\frac{1}{2}S^\psi_{\rm fin}(w) = \frac{w^2}{6}\ln|w| + \Big(\frac{\gamma_E}{3} - \frac{1}{4}\Big)w^2 - \frac{w}{3}\ln|w| + \Big(\frac{5}{18} - \frac{2\gamma_E}{3}\Big)w + O(\ln|w|)$$

を与え、式 (28) の $\ln\mu$ の係数 $-\frac{1}{3}w^2$、$\frac{2}{3}w$ も再現する。部分波の和から求めた $\frac{1}{2}S^\psi_{\rm fin}$ との差は、$w = -10$ から -1000 で 0.37 から 0.65（$\approx 0.1\ln|w|$）で、w^2 の項（10^2〜10^6）に比べて無視できる。フェルミオンの行列式の大きな部分は、局所的な有効ポテンシャルである。

主要な次数の作用は、$V_0 = \lambda\phi^4/4! + V_\psi$ の bounce の作用である。対数がスケール不変性を破るので厳密な bounce はなく（Derrick の議論）、大きさ R を固定した拘束つきの bounce [20] を作る。Euclid 空間を半径 1 の球面 S^4 に写し（$\phi = \Omega\chi$、$\Omega = 2R/(r^2+R^2)$）、χ から大きさを変えるモード（$\cos\theta$ に比例する成分）を除いて作用を停留させた（付録 O）。結果は

$$S_{\rm LO}(R) = \frac{16\pi^2}{|\lambda(\mu_R)|}f(\varepsilon), \qquad \mu_R R = 4\sqrt{3}\,e^{-19/12}\,\frac{y(\mu_R)}{\sqrt{|\lambda(\mu_R)|}}, \qquad \varepsilon = \frac{24y^4(\mu_R)}{(4\pi)^2|\lambda(\mu_R)|} \tag{30}$$

である（$4\sqrt{3}e^{-19/12} = 1.42$）。$\mu_R$ は、bounce の典型的な場の値でフェルミオンの対数 $\ln(y^2\phi^2/\mu^2) - \frac{3}{2}$ が 0 になるスケールで、そこでは V_ψ の 1 次の寄与が消える。f は bounce の形の変形を表す普遍的な関数で、$f = 1 + \frac{13}{90}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$（2 次の係数は Fubini の解のゆらぎのスペクトルから閉じた形で求まる）、数値的に $f(1) = 1.061$、$f(2) = 1.138$、$f(4) = 1.263$ である。足し上げの主な効果は形の変形ではなく、bounce が見る結合のスケールが $1/R$ から μ_R に移ることである。$\lambda \to 0^-$ では $\mu_R R \propto 1/\sqrt{|\lambda|}$ が大きくなる。次の次数は、式 (28) の残りの部分を $\lambda(\mu_R)$ の Fubini の解のまわりで評価したもので、

$$\begin{aligned} E &= -S_{\rm LO} + \frac{5}{2}\ln\frac{S_{\rm LO}}{\pi} - \frac{5}{4} + 6\zeta'(-1) + 3\ln\frac{R\mu_R}{2} + \Delta_\psi, \qquad w_R \equiv \frac{12y^2(\mu_R)}{\lambda(\mu_R)}, \\ \Delta_\psi &= \frac{1}{2}S^\psi_{\rm fin}(w_R) - \frac{w_R^2}{6}\ln|w_R| - \Big(\frac{\gamma_E}{3} - \frac{1}{4}\Big)w_R^2 + w_R\Big(\frac{13}{18} + \frac{2\gamma_E}{3} + \frac{2}{3}\ln\frac{R\mu_R}{2}\Big) \end{aligned} \tag{31}$$

である。Δ_ψ はフェルミオンの部分から局所的なポテンシャルの部分を引いた残りで、式 (29) の Z_ψ の項と $O(\ln|w|)$ からなる。μ_R を一般の μ に換えた形（付録 O）では、E の $\ln\mu$ 微分は、主要な次数だけの 13.4 から次の次数を加えて 1.6 に減る（$1/R = 40m$）。

表 14 と図 11 左に基準点の結果を示す。足し上げた指数は λ の零点の近くでも安定で、μ を $\mu_R/2$ から $2\mu_R$ まで変えた幅は $1/R = 20m$ で 2.5%、$40m$ で 2.2% である（手順 (10) の 1 ループでは $40m$ で 85%）。次の次数の補正は $+1$〜$+15$ で、ほとんどが ϕ の行列式である（Δ_ψ は 0.6〜3.4）。$1/R \gtrsim 300m$ では手順 (10) の 1 ループの値と幅の中で一致する。手順 (10) の停留値 $E(\mu^*)$ が足し上げた値に近いのは、μ^* が μ_R に近く、そこでは w^2 の項がほぼ消えるからである。手順 (10) の幅が大きかったのは、μ を動かすと w^2 の項が戻り、$16\pi^2/|\lambda(\mu)|$ の曲がりを 1 ループの項が打ち消せないからである。bounce の中での y の走りを主要な対数で入れ、スケールを $\mu = \kappa y\phi$ として、κ 依存が停留する $\kappa_c = e^{-3/4}$ の 1/2 から 2 倍まで変えても、$S_{\rm LO}$ は基準点の $\Lambda_{\max}$ の近くで -1%〜$+2\%$ しか変わらない。

宇宙論的な条件（手順 (10) と同じく、bounce の大きさの切断 $R \geq 1/\Lambda$）は、基準点で $\Lambda_{\max} = 16.0m = 0.82\mu_0$ を与える（主要な次数だけでは $16.6m$）。μ の幅は $+2\%$〜$+3\%$、κ の幅は -1%〜$+3\%$ である。木の評価の $41.8m$ よ

表 14: 基準点（$\mu = m$ で $y = \lambda = 1$）の足し上げた崩壊率の指数（式 (30)、(31)）。$E_{\rm LO} = -S_{\rm LO}$ と $E_{\rm NLO}$ は $\mu = \mu_R$ の値、幅は $\mu = \mu_R/2$ と $2\mu_R$ での $E_{\rm NLO}$、「手順 (10)」は式 (28) の μ^* での値、最後の列は木の評価 $-16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ である（$1/R < \mu_0$ では $\lambda(1/R) > 0$）。

$1/(mR)$	$\mu_R R$	$\lambda(\mu_R)$	ε	$E_{\rm LO}$	$E_{\rm NLO}$	幅	手順 (10)	木
12	2.97	−0.297	0.86	−558.3	−543.0	−558.6, −555.7	−564.0	—
15	2.69	−0.364	0.71	−450.3	−436.4	−448.1, −445.6	−449.7	—
20	2.41	−0.461	0.58	−351.9	−339.4	−347.9, −345.9	−347.5	−13240
30	2.11	−0.618	0.45	−260.5	−249.7	−255.4, −253.8	−254.1	−757.5
40	1.94	−0.742	0.39	−216.0	−206.1	−210.6, −209.3	−209.2	−440.2
60	1.75	−0.936	0.33	−170.6	−161.8	−165.2, −164.1	−163.8	−269.0
10^2	1.57	−1.212	0.27	−131.3	−123.8	−126.3, −125.4	−125.1	−174.7
300	1.30	−1.934	0.20	−82.1	−76.5	−78.2, −77.4	−77.2	−92.2
10^3	1.11	−2.955	0.17	−53.6	−49.8	−51.0, −50.4	−50.3	−55.5
10^4	0.90	−5.855	0.15	−27.0	−25.7	−26.6, −26.0	−26.1	−26.2

表 15: 足し上げた切断の上限 $\Lambda_{\rm max}$（$\Gamma/V < H_0^4$、$m = m_h$ の読み替え、bounce の大きさの切断 $R \geq 1/\Lambda$）。「木」は手順 (10) の値（表 13）、NLO と LO は式 (31) と式 (30) から求めた値である。幅は NLO の $\Lambda_{\rm max}$ の相対的な変化（%）で、μ は $\mu_R/2$ と $2\mu_R$、κ は bounce の中の走りのスケールを $\kappa_c/2$ から $2\kappa_c$ まで変えたものである。μ_R、$\lambda(\mu_R)$、ε は NLO の $\Lambda_{\rm max}$ の bounce での値である。

		$\Lambda_{\rm max}/\mu_0$			幅（%）				
$y(m)$	$\lambda(m)$	木	NLO	LO	μ	κ	μ_R/μ_0	$\lambda(\mu_R)$	ε
0.7	0.25	31.9	16.4	17.9	+1.0, +1.7	−0.7, +1.0	30.3	−0.364	0.16
1.0	0.25	2.84	1.17	1.22	+1.9, +2.6	−1.1, +2.2	2.84	−0.388	0.50
1.4	0.25	1.36	0.437	0.449	+3.8, +4.2	−1.5, +4.6	1.38	−0.424	1.58
0.7	0.5	16.3	7.99	8.60	+1.1, +1.8	−0.7, +1.2	15.7	−0.357	0.20
1.0	0.5	2.56	1.03	1.07	+2.0, +2.7	−1.1, +2.3	2.57	−0.387	0.55
1.4	0.5	1.33	0.426	0.437	+3.9, +4.3	−1.5, +4.8	1.36	−0.426	1.66
0.7	1	5.69	2.53	2.66	+1.4, +2.0	−0.9, +1.5	5.59	−0.345	0.31
1.0	1	2.14	0.823	0.853	+2.3, +2.9	−1.1, +2.6	2.16	−0.386	0.68
1.4	1	1.30	0.405	0.415	+4.1, +4.5	−1.5, +5.1	1.32	−0.429	1.82
0.7	2	1.25	0.359	0.367	+3.9, +4.4	−1.5, +5.0	1.28	−0.353	2.09
1.0	2	1.62	0.564	0.581	+2.9, +3.4	−1.3, +3.4	1.64	−0.387	1.04
1.4	2	1.23	0.369	0.378	+4.5, +5.0	−1.6, +5.7	1.26	−0.436	2.20
1.0	3	1.30	0.402	0.412	+3.9, +4.3	−1.5, +4.8	1.33	−0.399	1.79
1.4	3	1.18	0.339	0.347	+5.0, +5.5	−1.7, +6.4	1.21	−0.445	2.68

り 2.6 倍低く、λ が $\overline{\rm MS}$ で負になる μ_0 より下にある。この bounce が見る結合は $\lambda(\mu_R) = -0.386$（$\mu_R = 42.0m$）で、$S_{\rm LO} = 424$、$\varepsilon = 0.68$ である。木の評価は bounce の大きさと結合のスケールを $\mu = 1/R$ で同一視していたが、足し上げると、両者は bounce の中のフェルミオンの質量で決まる比 $\mu_R R = 2.6$ だけ離れる。場の値で言うと、この bounce の典型的な場は $\phi \approx e^{3/4}\mu_R/y \approx 78m$ で、有効ポテンシャルが負になる $\phi_I \approx 40m$（手順 (9)）を越えている。結合を変えても同じで（表 15、図 11 右）、$\Lambda_{\rm max}/\mu_0$ は 0.34〜16、木の評価の 0.29〜0.51 倍になる。$\Lambda_{\rm max}$ の bounce が見る μ_R は木の $\Lambda_{\rm max}$ と 5% 以内で一致し、$\lambda(\mu_R)$ はどの点でも -0.35〜-0.45 である。すなわち、条件は「bounce が見るスケールで $\lambda \gtrsim -0.4$」とほぼ普遍的に書け、それを bounce の大きさに直す因子 $\mu_R R = 1.42y/\sqrt{|\lambda|}$ が足し上げの結果である。μ と κ の幅は、どの点でも $\Lambda_{\rm max}$ を上に 6.5% 以下、下に 2% 以下しか動かさない。残る不確かさは、m から μ_R までの 2 ループの走りである。$\lambda(\mu_R)$ が 0.01 ずれると $\Lambda_{\rm max}$ は約 3% 動く（$\mathrm{d}S/\mathrm{d}\lambda = 16\pi^2/\lambda^2 \approx 1100$、$\mathrm{d}E/\mathrm{d}\ln(1/R) = 371$）。スクリプトは `resum_numeric.py` で、`run_resum_check.sh` で再実行できる。




図 11: 左：基準点の崩壊率の指数 $-E(R)$。黒の破線は木の評価、橙の帯は手順 (10) の 1 ループ（μ^* から $\mu^*/2$、$2\mu^*$ まで）、青の実線は足し上げた次の次数（帯は $\mu_R/2$ から $2\mu_R$）、青の破線は主要な次数、一点鎖線は宇宙論的な条件の境界 $404.7+4\ln(1/mR)$、縦線は μ_0 と足し上げた $\Lambda_{\max}=16.0m$ である。右：$\Lambda_{\max}/\mu_0$ の結合への依存（表 15）。青の塗りつぶした丸が足し上げた値（帯は μ と κ の幅）、灰色の白丸が木の評価（手順 (10)）で、線の種類が $y(m)$ を表す。

■ **手順 (12)：$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ の 1 ループと (C) の完成。** 手順 (8) の (C) は、$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ の 1 ループを持たなかったので、$\phi\phi$ を含む要素だけを使った。木の y の限界は $\psi\bar\psi$ の ${}^1S_0$ の固有値で決まるので、(C) はその向きで完成していなかった。$\psi(p_1)\bar\psi(p_2)\to\psi(p_3)\bar\psi(p_4)$ の 1 ループの図は、s、t チャンネルの ϕ の自己エネルギー（フェルミオンのループと 4 点結合のループ、4 つ）、頂点の補正（4 つ）、箱（4 つ）の 12 個で、MadGraph の数と一致する。極質量と留数で作った S 行列要素は

$$\mathcal{M}_C = y^2\sum_{x=s,t}\sigma_x\frac{X_x}{x-m^2}\left[1+2\delta R_\psi-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}G(x)+\frac{\hat\Sigma_\phi(x)}{x-m^2}\right]+\mathcal{M}_{\rm box},$$
$$(4\pi)^2\mathcal{M}_{\rm box} = -y^4\,[\bar u_3\gamma_\mu u_1][\bar v_2\gamma_\nu v_4]\,(D_{td}-D_{tx})^{\mu\nu}+y^4\,[\bar v_2\gamma_\mu u_1][\bar u_3\gamma_\nu v_4]\,(D_{sd}-D_{sx})^{\mu\nu} \tag{32}$$

である（付録 P）。$(\sigma_s,X_s)=(+1,S)$、$(\sigma_t,X_t)=(-1,T)$、$S=(\bar v_2\gamma^5u_1)(\bar u_3\gamma^5v_4)$、$T=(\bar u_3\gamma^5u_1)(\bar v_2\gamma^5v_4)$ で、木は $y^2[S/(s-m^2)-T/(t-m^2)]$ である。$G(x)=B_0^{Mm}(M^2)+2M^2[C_0+C_2](x)+xC_1(x)$（$C_i(x)\equiv C_i(x,M^2,M^2;M^2,M^2,m^2)$）は式 (6) の V_y を質量殻上のスピノルで挟んだ擬スカラーの形状因子で、4 つの頂点で同じ形になる。$\hat\Sigma_\phi(x)=-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}[xB_0^{MM}(x)-m^2B_0^{MM}(m^2)]$ は極で引いた ϕ の自己エネルギーで、4 点結合のループは ϕ の質量の対抗項と打ち消す。$\delta R_\psi=R_\psi-1$（式 (17)）は外線 4 本で $2\delta R_\psi$ になる。したがって、極質量の処方では 1 ループの $\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ は λ によらない。箱では、Dirac 方程式で分子のループ運動量 ℓ 以外が消え、二つのフェルミオンの線はそれぞれ $\pm\bar w\not\ell w'$ になる。$D^{\mu\nu}$ は二つの ϕ と二つの ψ の伝播関数の階数 2 のテンソル積分で、t 型（$\bar u_3\cdots u_1$）と s 型（$\bar v_2\cdots u_1$）に直接と交差の二つずつある。交差した箱では一方の線の符号が反転する。D_{00} は有限なので、箱に有理項はない。

式 (32) は、ヘリシティのスピノルと COLLIER のテンソル係数で数値的に評価した。頂点をその被積分関数から作ると（C のテンソルと 4 次元の γ 行列で）、$G(x)$ との差は木の振幅の $-1/(4\pi)^2$ 倍になる。これは紫外発散する C_{00}（極 $\Delta/4$）と $\gamma_\mu\gamma^\mu=D$ の積から頂点 1 つあたり $\frac12y^3\gamma^5/(4\pi)^2$ 出る有理項で、MadLoop の R2 の頂点と同じである。これを加えると $G(x)$ と 2×10^{-15} で一致した。結合を固定した μ 依存 $\partial\mathcal{M}_C^{(1)}/\partial\ln\mu=-10y^2\mathcal{M}_C^{(0)}/(4\pi)^2$ は、木の y^2 の走りと打ち消し、2×10^{-14} で成り立った。FeynArts と FeynCalc で 12 個の図を作り、各クラス（自己エネルギー、頂点、t 型と s 型の箱）を 4 つのスピノルの構造（S、T と γ^5 を 1 に換えたもの）に射影したスピン和（トレース）を LoopTools で評価すると、手計算と 1×10^{-12} で一致した。木のスピン和は式 (11) と、頂点の極は対抗項 δ_y と一致し、箱は有限である。MadLoop（手順 (5) の UFO、極質量と $\overline{\rm MS}$ の二つの処方、5 点と $\mu_R=m/2$、$2m$）とは、木は 10^{-12}、1 ループの有限部分は相対 1.4×10^{-7} で一致した。残る差（絶対値 3×10^{-9} 以下、木の 10^{-9} 程度）は μ_R と処方によらず、MadLoop 自身の倍精度と 4 倍精度の計算の差（相対 2×10^{-8}）と

表 16: 1 ループのユニタリー性の限界（手順 (12)、y、λ は $\overline{\text{MS}}$）。「行列全体」は $J=0$ の 3×3 の行列（$\phi\phi$、$\psi\bar\psi(\pm\pm)$）の $\mathrm{Re}\,a^0$ の固有値が $|\cdot|\le\frac12$、「$\phi\phi$ の要素」は手順 (8) の条件である。エネルギーの範囲は、断りがなければ $2M<\sqrt{s}\le4m$ である。

基準	$\lambda=0$ での y の上限	$y=1$ での λ の範囲
(A) 木、$s\to\infty$（手順 (8)）	$\sqrt{8\pi/3}=2.894$	$\lvert\lambda\rvert\le50.3$
木、行列全体	3.021	$\lvert\lambda\rvert\le58.0$
(C) 1 ループ、$\phi\phi$ の要素（手順 (8)）、$\mu=m$	3.792	$-71.1\le\lambda\le48.6$
(C) 1 ループ、行列全体、$\mu=m$	2.856	$-71.1\le\lambda\le48.6$
同、$\mu=m/2$	3.044	$-42.5\le\lambda\le69.8$
同、$\mu=2m$	2.767	$-101.2\le\lambda\le43.5$
同、$\mu=m$、$\sqrt{s}\le10m$	2.48（木 2.92）	—




図 12: 左：$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ の $J=0$ の部分波のユニタリー性（$y=1$、$\mu=m$）。線は 1 ループの $\mathrm{Abs}\,a^{0(1)}$、白丸は木の積 $(a^{(0)}a^{(0)\dagger})$（$\psi\bar\psi(\pm\pm)$ と $\phi\phi$ の中間状態）、縦線は $\phi\phi$ の閾値である。横軸は ψ の運動量 p（$\sqrt{s}=2\sqrt{M^2+p^2}$）。右：(y,λ) の平面（$\mu=m$ の値）の限界。黒は (A) の長方形、灰色は同じエネルギーの範囲の木、橙の一点鎖線は手順 (8) の (C)、青の実線は行列全体の (C)（破線は $\mu=m/2$、$2m$）で、それぞれ内側が許される。星印は基準点である。

同じ程度で、FeynCalc とは図のクラスごとに 10^{-12} で一致しているので、MadLoop の数値精度によるものと考えられる。部分波のユニタリー性 $\mathrm{Abs}\,a^{(1)}=a^{(0)}a^{(0)\dagger}$ は、$J=0$ の $\psi\bar\psi$ の要素（$\phi\phi$ の中間状態を含む）で 1×10^{-11}、ヘリシティを反転させる状態を含む $J=1$ で 4×10^{-8}（$p\ge0.1M$）成り立ち、手順 (8) の $\phi\phi$ の要素と合わせた $J=0$ の 3×3 の行列全体でも 4×10^{-12} で成り立った（図 12 左）。

(C) を、$J=0$ の行列全体（$\phi\phi$、$\psi\bar\psi(++)$、$\psi\bar\psi(--)$）の $\mathrm{Re}\,a^0=\mathrm{Re}(a^{(0)}+a^{(1)})$ の固有値が $|\cdot|\le\frac12$ という条件に置き換え、$2M<\sqrt{s}\le4m$ で求めた（$\sqrt{s}<2m$ では $\psi\bar\psi$ の二つの状態だけ。表 16、図 12 右）。$\mu=m$、$\lambda=0$ では $y\le2.856$ である。同じ範囲の木では 3.021、手順 (8) の $\phi\phi$ の要素だけでは 3.79 だった。限界は $\sqrt{s}=4m$ で、${}^1S_0$ の組み合わせ $(|{+}{+}\rangle+|{-}{-}\rangle)/\sqrt2$ の固有値 $-\frac12$ で決まる。1 ループの補正は、同じ範囲の木の限界を 5.5% 強める。μ を $m/2$ から $2m$ まで変えると（結合は 1 ループで走らせる）3.044 から 2.767 で、手順 (8) の幅 2.78〜4.91 より狭い。y の向きでも、(C) は (A) の $\sqrt{8\pi/3}=2.894$ に近い意味のある限界になった。範囲を $\sqrt{s}\le10m$ に広げると $y\le2.48$（木は 2.92）で、$\mu=m$ に固定すると高いエネルギーで $\ln(s/m^2)$ の項が効く。λ の向きの限界（$y=1$ で $-71.1\le\lambda\le48.6$）は $\phi\phi$ の要素で決まり、手順 (8) と変わらない。スクリプトは `scatC_collier.f90`、`scatC_feyncalc.wl`、`scatC_numeric.py` で、`run_scatC_check.sh` で再実行できる。

8　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** フェルミオンを入れたことで、スカラー理論にはなかった三つの特徴が現れた。一つ目は、閉じたフェルミオンのループの符号 -1 で、これが $\delta_\phi < 0$ と β_λ の $-48y^4$ を与える。二つ目は、γ^5 がフェルミオンの伝播関数の質量の項の符号を変えることで、δ_M と γ_M の符号がスカラーの湯川結合と逆になる。三つ目は、フェルミオンの箱の図の簡単さで、トレースを分母で書き直すと、テンソル積分を経ずに B_0、C_0、D_0 だけで書ける。物理としては、比 λ/y^2 の流れが 1 ループで解析的に解け、λ が負になる尺度か、λ が発散する尺度のどちらかが、y の Landau 極より手前に必ず現れる。

■ **物理として分かったこと。** 全断面積の 1 ループの補正は、高いエネルギーで $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ が主になって $20m$ で 23% に達する。繰り込み群の係数は、S 行列要素の μ 依存からも、一般の理論の公式からも確かめられた。結合を固定した木のユニタリー性は $y < \sqrt{8\pi/3}$、$|\lambda| < 16\pi$ を与え、$J = 0$ の行列を 1 ループで完成させた限界（$\mu = m$ で $y \le 2.86$）もこれに近いが、基準点でより強いのは真空の安定性である。λ は $19.5m$ で負になり、有効ポテンシャルは $\phi \approx 39m$ から負になる。λ に極小がないので崩壊は切断のスケールで決まり、フェルミオンの行列式はそれを速める。フェルミオンの行列式の大きな部分は局所的な有効ポテンシャルで、これを足し上げると、大きさ R の bounce は $\mu_R \approx 1.4y/(\sqrt{|\lambda|}R)$ の結合を見る。宇宙論的な条件は「bounce が見るスケールで $\lambda \gtrsim -0.4$」とほぼ普遍的に書け、bounce の大きさの切断は木の評価の 0.3〜0.5 倍になる。

■ **今後。** 第 4 節の手順 (1)〜(12) はすべて終わった。残っている課題は、2 ループの走りと $M \neq 0$ の質量の効果である。2 ループの走りは $\Lambda_{\max}$ の残る主な不確かさで、$\lambda(\mu_R)$ の 0.01 のずれが $\Lambda_{\max}$ を約 3% 動かす。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数。** ϕ の伝播関数 $i/(p^2-m^2+i0)$ の導出は ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じである。ψ の運動項 $\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - M)\psi$ は、運動量空間 ($\psi \propto e^{-ip\cdot x}$) で $\bar{\psi}(p\!\!\!/ - M)\psi$ となる。伝播関数はその逆行列の i 倍で、$(p\!\!\!/ - M)(p\!\!\!/ + M) = p\!\!\!/\,p\!\!\!/ - M^2 = p^2 - M^2$ から $i(p\!\!\!/ - M)^{-1} = i(p\!\!\!/ + M)/(p^2 - M^2 + i0)$ である。

■ **頂点と対抗項。** 頂点の因子は「$i \times$ ($\mathcal{L}_{\rm int}$ の係数) $\times$ (同種の場の付け方の数)」である。湯川の項 $-iy\mu^\epsilon\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ では、ϕ、$\bar{\psi}$、ψ はどれも 1 つずつで付け方は 1 通りなので、頂点は $i\cdot(-iy\mu^\epsilon\gamma^5) = y\mu^\epsilon\gamma^5$ である。γ^5 はスピンの添字を持つ行列で、フェルミオンの線に沿って伝播関数と並べて掛ける。4 点頂点 $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ の導出は $\phi^3 + \phi^4$ のノート [2] の付録 A と同じである。対抗項も同じ規則に従う。$\frac{1}{2}\delta_\phi(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}\delta_m\phi^2$ は、2 本の線の付け方 2 通りが $\frac{1}{2}$ を打ち消して $i(\delta_\phi p^2 - \delta_m)$ になる。$\delta_\psi\bar{\psi}i\partial\!\!\!/\psi - \delta_M\bar{\psi}\psi$ は運動量空間で $\bar{\psi}(\delta_\psi p\!\!\!/ - \delta_M)\psi$ なので $i(\delta_\psi p\!\!\!/ - \delta_M)$、湯川の対抗項は $i\cdot(-i\delta_y\mu^\epsilon\gamma^5) = \delta_y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点の対抗項は $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。

■ **閉じたフェルミオンのループ。** 湯川の頂点 2 つを結ぶループを例にとる。$\langle(\bar{\psi}\Gamma\psi)_x(\bar{\psi}\Gamma\psi)_y\rangle$（$\Gamma = \gamma^5$）を成分で書くと $\bar{\psi}_a(x)\Gamma_{ab}\psi_b(x)\,\bar{\psi}_c(y)\Gamma_{cd}\psi_d(y)$ で、縮約 $\psi_b(x)\bar{\psi}_c(y) = S_{bc}(x-y)$ と $\psi_d(y)\bar{\psi}_a(x) = S_{da}(y-x)$ をとる。後者を作るには、$\psi_d(y)$ を $\bar{\psi}_a(x)$ の左まで動かす必要がある。ψ_d は Grassmann 数の $\bar{\psi}_c$、ψ_b、$\bar{\psi}_a$ の 3 つを通り抜けるので、符号 $(-1)^3 = -1$ が付く。こうして $-\Gamma_{ab}S_{bc}\Gamma_{cd}S_{da} = -\mathrm{tr}[\Gamma S(x-y)\Gamma S(y-x)]$ となる。頂点が n 個のループでも、最後の ψ を最初の $\bar{\psi}$ の左に動かすとき、奇数個（$2n-1$ 個）の Grassmann 数を通り抜けるので、符号はいつも -1 で、添字はトレースになる。

■ **対称性因子の数え方。** 図の値は、$\langle\cdots\frac{1}{n!}(i\int\mathcal{L}_{\rm int})^n\rangle$ の Wick の縮約のうち、その図を与えるものの数を、頂点の係数とともに数えて決める。同じ種類の頂点が n 個あると $1/n!$ が付くが、どの頂点をどこに置くかの入れ替え $n!$ と打ち消す。湯川の頂点の係数（i と μ の因子を除く）は $-iy\gamma^5$ で、組み合わせの因子を持たない。

(a) ϕ の自己エネルギーのフェルミオンのループ。湯川の頂点 2 つの $1/2!$ は、頂点の入れ替えの 2 と打ち消す。外の ϕ を頂点 x と y の ϕ に付ける方法は 1 通り、$\psi(x)\bar{\psi}(y)$ と $\psi(y)\bar{\psi}(x)$ の縮約も 1 通りである。よって対称性因子は 1 である。スカラーの泡（ϕ^3 理論の $1/2$）と違うのは、二つのフェルミオンの内線が、フェルミオン数の流れの向

き（$x \to y$ と $y \to x$）で区別されるからである。(b) 4 点頂点のタドポール型の図は $\phi^3+\phi^4$ のノートの (c) と同じで 1/2 である。

(c) ψ の自己エネルギー。湯川の頂点 2 つの 1/2! は入れ替えと打ち消す。入ってくる ψ を一方の頂点の $\bar\psi$ に、出ていく $\bar\psi$ を他方の頂点の ψ に付ける方法は 1 通りで、残りの $\psi\bar\psi$ と $\phi\phi$ の縮約もそれぞれ 1 通りである。よって 1 である。(d) 湯川の頂点の補正も同様に、頂点 3 つの 1/3! が入れ替えの 3! と打ち消し、残りの縮約は 1 通りなので 1 である。(e) λ^2 の泡は $\phi^3+\phi^4$ のノートの (f) と同じで 1/2 である。

(f) フェルミオンの箱。湯川の頂点 4 つの 1/4! は、4 本の外の ϕ を 4 つの頂点に割り当てる方法 4! 通りと打ち消す。4 つの頂点を 1 本の向きのあるフェルミオンのループで結ぶ縮約は、頂点 1 から出発して残り 3 つを訪れる順序の数 $3!=6$ 通りある。それぞれが一つの図で、対称性因子は 1 である。6 つは、ループの向きだけが逆の 2 つずつ、すなわち外線の巡回の順序が同じ 3 組に分かれる。向きが逆の二つの図の値が等しいことは付録 C で示す。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** D 次元の作用は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項から ϕ の質量次元は $(D-2)/2=1-\epsilon$、ψ の質量次元は $(D-1)/2=\frac{3}{2}-\epsilon$ である。湯川の項の係数の質量次元は $D-(1-\epsilon)-2(\frac{3}{2}-\epsilon)=(4-2\epsilon)-4+3\epsilon=\epsilon$、$\phi^4$ の係数の質量次元は $D-4(1-\epsilon)=2\epsilon$ である。そこで、無次元の y と λ を使って、係数を $y\mu^\epsilon$、$\lambda\mu^{2\epsilon}$ と書く。

■ **発散次数。** ループ L 個、ϕ の内線 I_ϕ 本、フェルミオンの内線 I_ψ 本の図では、ループ運動量の積分が $4L$、ϕ の伝播関数が -2、フェルミオンの伝播関数が -1（分子の $\not k$ のため）の次数を与えるので、$\omega=4L-2I_\phi-I_\psi$ である。湯川の頂点 V_y 個、4 点頂点 V_4 個とすると $L=I_\phi+I_\psi-V_y-V_4+1$ である。線の端の数を場ごとに数えると、ϕ では $V_y+4V_4=E_\phi+2I_\phi$、フェルミオンでは $2V_y=E_\psi+2I_\psi$ である。よって

$$\begin{aligned}\omega &= 4(I_\phi+I_\psi-V_y-V_4+1)-2I_\phi-I_\psi = 2I_\phi+3I_\psi-4V_y-4V_4+4\\ &= (V_y+4V_4-E_\phi)+\Big(3V_y-\frac{3}{2}E_\psi\Big)-4V_y-4V_4+4 = 4-E_\phi-\frac{3}{2}E_\psi\end{aligned}$$

となり、式 (2) を得る。E_ψ は偶数なので、$\omega\ge 0$ となるのは $E_\psi=0$ で $E_\phi\le 4$、$E_\psi=2$ で $E_\phi\le 1$ の場合だけである。

付録 C　γ^5、トレース、パリティ

■ **γ^5 の処方。** NDR では、D 次元で $\{\gamma^5,\gamma^\mu\}=0$、$(\gamma^5)^2=1$ とする。これから、任意のベクトル a と数 M について $\gamma^5(\not a+M)\gamma^5=-\not a\gamma^5\gamma^5+M=-\not a+M$ である。トレースは $\mathrm{tr}\,1=4$、奇数個の γ^μ のトレースは 0、$\mathrm{tr}[\not a\not b]=4a\cdot b$、$\mathrm{tr}[\not a\not b\not c\not d]=4[(a\cdot b)(c\cdot d)-(a\cdot c)(b\cdot d)+(a\cdot d)(b\cdot c)]$ である。γ^5 を偶数個含むトレースは、反可換性で γ^5 を隣り合わせて $(\gamma^5)^2=1$ で消せるので、γ^5 を含まないトレースに帰着し、曖昧さはない。図 (a)、(c)、(d)、(f) はすべてこの型である（(c) と (d) はトレースではなく開いたフェルミオンの線だが、同じく反可換性だけで整理できる）。

■ **奇数個の γ^5 を含むトレース。** 図 (g) のトレースは $-\mathrm{tr}[\gamma^5\, i(\not k+M)]$ で、$\mathrm{tr}[\gamma^5]=0$ と $\mathrm{tr}[\gamma^5\gamma^\mu]=0$ から 0 である。図 (h) では、γ^5 を 3 つ含むトレースを反可換性で $\pm\mathrm{tr}[\gamma^5(\not a+M)(\not b+M)(\not c+M)]$ の形にでき、展開すると γ^5 と 3 個以下の γ^μ のトレースだけが残る。4 次元ではそれらはすべて 0 である（0 でない最小のものは $\mathrm{tr}[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma]\propto\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$）。$D$ 次元の NDR では γ^5 を含むトレースの値は一般に曖昧だが、ループ積分の後に残る独立なベクトルは外線の運動量 2 つだけで、$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ を 4 つの独立なベクトルで縮約した量は作れない。したがって (h) はどの処方でも 0 である。

■ **エルミート性。** $(\bar\psi i\gamma^5\psi)^\dagger=-i\psi^\dagger\gamma^{5\dagger}\gamma^{0\dagger}\psi=-i\psi^\dagger\gamma^5\gamma^0\psi=i\psi^\dagger\gamma^0\gamma^5\psi=\bar\psi i\gamma^5\psi$ である（$\gamma^{5\dagger}=\gamma^5$、$\gamma^{0\dagger}=\gamma^0$、$\gamma^5\gamma^0=-\gamma^0\gamma^5$ を使った）。

■ **パリティ。** $\psi\to\gamma^0\psi$ のとき $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0\to\psi^\dagger\gamma^0\gamma^0=\bar\psi\gamma^0$ なので、$\bar\psi\psi\to\bar\psi\gamma^0\gamma^0\psi=\bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi\to\bar\psi\gamma^0 i\gamma^5\gamma^0\psi=-\bar\psi i\gamma^5\psi$ である。運動項は $\boldsymbol{x}\to-\boldsymbol{x}$ とあわせて不変である。したがって、$\phi\to-\phi$ とあわせると $\phi\bar\psi i\gamma^5\psi$ と ϕ^2、ϕ^4

は不変で、ϕ、ϕ^3、$\phi\bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi$ は符号を変える。正則化（次元正則化と、1 ループの NDR）がこの対称性を保つので、後者の項は対抗項としても要らない。

■ **ループの向きと荷電共役。** 荷電共役の行列 C は $C^{-1}\gamma^\mu C=-(\gamma^\mu)^T$、$C^{-1}\gamma^5 C=(\gamma^5)^T$ を満たす。よって $(\not k+M)^T=C^{-1}(-\not k+M)C$ である。n 個の湯川の頂点を持つループのトレースを転置すると

$$\mathrm{tr}[\gamma^5(\not k_1+M)\gamma^5(\not k_2+M)\cdots\gamma^5(\not k_n+M)]=\mathrm{tr}[(-\not k_n+M)\gamma^5\cdots(-\not k_2+M)\gamma^5(-\not k_1+M)\gamma^5]$$

となる（$\mathrm{tr}X^T=\mathrm{tr}X$、$C$ と C^{-1} はトレースの中で打ち消す）。右辺は、頂点を逆の順に回り、各伝播関数の運動量の符号を変えたもの、すなわち向きが逆のループのトレースである。分母 $D_M(k_i)$ は $k_i\to-k_i$ で不変なので、向きが逆の二つの図は等しい。ベクトルの頂点 γ^μ なら頂点ごとに -1 が付いて Furry の定理になるが、γ^5 には付かない。

■ **カイラル回転。** $\psi\to e^{i\theta\gamma^5}\psi$ のとき $\bar\psi\to\psi^\dagger e^{-i\theta\gamma^5}\gamma^0=\bar\psi e^{i\theta\gamma^5}$ である。運動項は $\bar\psi e^{i\theta\gamma^5}\gamma^\mu e^{i\theta\gamma^5}\psi=\bar\psi\gamma^\mu e^{-i\theta\gamma^5}e^{i\theta\gamma^5}\psi=\bar\psi\gamma^\mu\psi$ で不変で、$\bar\psi\psi\to\bar\psi e^{2i\theta\gamma^5}\psi=\cos2\theta\,\bar\psi\psi+\sin2\theta\,\bar\psi i\gamma^5\psi$ である。$\theta=\pi/4$ とすると $\bar\psi\psi\to\bar\psi i\gamma^5\psi$ となり、$M=0$ のスカラーの湯川理論 $-y\phi\bar\psi\psi$ は本模型の $M=0$ の場合に移る。したがって、質量によらない量（β_y、β_λ、γ_ϕ、γ_ψ）は両者で等しい。質量の項 $-M\bar\psi\psi$ は回転で $-M\bar\psi i\gamma^5\psi$ に移るので、γ_M と γ_m の M^2 の項は両者で異なりうる。

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出

■ **積分の規約。** ϕ^3 のノートの付録 C と同じく、$\overline{\mathrm{MS}}$ では

$$\mu^{2\epsilon}I_1^a=\frac{i}{(4\pi)^2}\big[m_a^2\Delta_{\mathrm{UV}}+A_0(m_a^2)\big],\qquad \mu^{2\epsilon}I_2^{ab}(p^2)=\frac{i}{(4\pi)^2}\big[\Delta_{\mathrm{UV}}+B_0^{ab}(p^2)\big]$$

で、$A_0(m^2)=m^2(1-\ln(m^2/\mu^2))$、$B_0^{ab}(p^2)=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln[\Delta_x/\mu^2]$、$\Delta_x=xm_b^2+(1-x)m_a^2-x(1-x)p^2-i0$ である。ベクトルの 2 点積分は、Feynman のパラメータで分母を $[(k+xp)^2-\Delta_x]^2$ とまとめ、$k=\ell-xp$ とずらすと、ℓ^μ の奇関数の項が消えて

$$\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{k^\mu}{D_a(k)D_b(k+p)}=-p^\mu\int_0^1\mathrm{d}x\,x\,\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2-\Delta_x)^2}=\frac{i}{(4\pi)^2}\,p^\mu\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}+B_1^{ab}(p^2)\Big]$$

となる。$B_1^{ab}(p^2)=\int_0^1\mathrm{d}x\,x\ln[\Delta_x/\mu^2]$ で、LoopTools の $B_1(p^2,m_a^2,m_b^2)$ の $\Delta=0$ の値である。3 点と 4 点の積分は、LoopTools の規約で $\int\mathrm{d}^Dk\,\{1,k^\mu\}/(D_a(k)D_b(k+r_1)D_c(k+r_2))=\frac{i}{(4\pi)^2}\{C_0,\ r_1^\mu C_1+r_2^\mu C_2\}$（$\mu^{2\epsilon}$ を含む、引数は $(r_1^2,(r_2-r_1)^2,r_2^2;m_a^2,m_b^2,m_c^2)$）と、同様の D_0 で表す。C_0、C_i、D_0 は有限である。

■ V_ϕ。 図 (a) は、ループの -1、頂点 2 つ、伝播関数 2 本から

$$-\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\mathrm{tr}\Big[y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+M)}{D_M(k)}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+\not p+M)}{D_M(k+p)}\Big]=y^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{tr}[(-\not k+M)(\not k+\not p+M)]}{D_M(k)D_M(k+p)}$$

である（$-i^2=1$ と $\gamma^5(\not k+M)\gamma^5=-\not k+M$）。トレースは $-4k\cdot(k+p)+4M^2$ で、$k\cdot(k+p)=\frac{1}{2}[D_M(k)+D_M(k+p)+2M^2-p^2]$ を使うと $2p^2-2D_M(k)-2D_M(k+p)$ になる。$D_M(k)$ と $D_M(k+p)$ はそれぞれ一方の伝播関数を消し、積分変数をずらすとどちらも I_1^M を与える。よって $\mathrm{(a)}=2y^2\mu^{2\epsilon}[p^2I_2^{MM}(p^2)-2I_1^M]$ である。図 (b) は $\phi^3+\phi^4$ のノートと同じく $\frac{\lambda}{2}\mu^{2\epsilon}I_1^m$ である。上の積分の展開を入れると

$$V_\phi=\frac{i}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2(\Delta_{\mathrm{UV}}+B_0^{MM})-2(M^2\Delta_{\mathrm{UV}}+A_0(M^2))\big)+\frac{\lambda}{2}\big(m^2\Delta_{\mathrm{UV}}+A_0(m^2)\big)\Big]+i(\delta_\phi p^2-\delta_m)$$

で、Δ_{UV} の係数が p^2 によらず 0 になる条件は $2y^2/(4\pi)^2+\delta_\phi/\Delta_{\mathrm{UV}}=0$ と $(-4y^2M^2+\frac{\lambda}{2}m^2)/(4\pi)^2-\delta_m/\Delta_{\mathrm{UV}}=0$ である。これが式 (5) の δ_ϕ、δ_m で、残りが式 (6) の V_ϕ である。

■ V_ψ。 入ってくるフェルミオンの運動量を p、ループのフェルミオンの運動量を k とすると、ϕ の内線の運動量は $p-k$ で、

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+M)}{D_M(k)}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i}{D_m(k-p)}=-y^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{-\not k+M}{D_M(k)D_m(k-p)}$$

となり、式 (4) の V_ψ を得る。$k \to -k$ とすると分母は $D_M(k)D_m(k+p)$ になり、上のベクトルの積分の規約（$a=M$、$b=m$）が使えて、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/(D_M(k)D_m(k-p)) = -\frac{i}{(4\pi)^2}p^\mu[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+B_1^{Mm}]$ である。よって

$$V_\psi = \frac{iy^2}{(4\pi)^2}\Big[-\not{p}\Big(-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+B_1^{Mm}\Big) - M\big(\Delta_{\rm UV}+B_0^{Mm}\big)\Big] + i(\delta_\psi\not{p}-\delta_M)$$

で、極が消える条件 $y^2/(2(4\pi)^2)+\delta_\psi/\Delta_{\rm UV}=0$、$-y^2M/(4\pi)^2-\delta_M/\Delta_{\rm UV}=0$ から式 (5) の δ_ψ、δ_M を得る。

■ V_y。 フェルミオンの線に沿って、出ていく側から書く。入ってくるフェルミオン（運動量 p）が ϕ の内線（運動量 $p-k$）を出して運動量 k になり、外の ϕ（運動量 q）を吸って $k+q$ になり、ϕ の内線を吸って $p'=p+q$ で出ていく。値は

$$\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,y\gamma^5\frac{i(\not{k}+\not{q}+M)}{D_M(k+q)}\,y\gamma^5\frac{i(\not{k}+M)}{D_M(k)}\,y\gamma^5\,\frac{i}{D_m(k-p)}\,\mu^{3\epsilon}$$

で、$i^3=-i$ と $\gamma^5(\not{k}+\not{q}+M)\gamma^5 = M-\not{k}-\not{q}$ から、分子は $-iy^3(M-\not{k}-\not{q})(M+\not{k})\gamma^5$ になる。積を展開すると $M^2+M\not{k}-M\not{k}-\not{k}\not{k}-M\not{q}-\not{q}\not{k} = M^2-k^2-M\not{q}-\not{q}\not{k}$ で、式 (4) の V_y を得る。$M^2-k^2=-D_M(k)$ は伝播関数 $D_M(k)$ を消し、残る $\int 1/(D_M(k+q)D_m(k-p))$ は運動量の差 $(k+q)-(k-p)=p'$ の 2 点積分 $I_2^{Mm}(p'^2)$ である。残りの 2 項は 3 点積分で、上の規約で $r_1=q$、$r_2=-p$、$(a,b,c)=(M,M,m)$ とすると、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/(\cdots) = \frac{i}{(4\pi)^2}(q^\mu C_1 - p^\mu C_2)$ なので、$\not{q}\not{k} \to \frac{i}{(4\pi)^2}(q^2C_1 - \not{q}\not{p}C_2)$ である。まとめると

$$V_y = -iy^3\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\Big[-\big(\Delta_{\rm UV}+B_0^{Mm}(p'^2)\big) - M\not{q}C_0 - q^2C_1 + \not{q}\not{p}C_2\Big]\gamma^5 + \delta_y\gamma^5$$

で、$\Delta_{\rm UV}$ の項は $-y^3\Delta_{\rm UV}\gamma^5/(4\pi)^2$ である。これを打ち消す $\delta_y = y^3\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ が式 (5) で、残りが式 (6) の V_y である。M^2-k^2 の代わりに $M^2-(k+q)^2$ を作るように整理すると、$B_0^{Mm}(p^2)$ を含む別の形になる。二つは PaVe 関数の恒等式で移り合う。

■ V_4 の泡。 λ^2 の泡は $\phi^3+\phi^4$ のノートと同じで $\frac{\lambda^2}{2}\sum_x I_2^{mm}(x)$、極は $\frac{3\lambda^2}{2}\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}$ である。

■ フェルミオンの箱。 一つの図は、ループの -1、頂点 4 つ、伝播関数 4 本の $i^4=1$ から $-y^4\mu^{4\epsilon}\int{\rm tr}[\gamma^5(\not{k}_1+M)\gamma^5(\not{k}_2+M)\gamma^5(\not{k}_3+M)\gamma^5(\not{k}_4+M)]/(D_1D_2D_3D_4)$ である（$D_i\equiv D_M(k_i)$）。1 番目と 3 番目の伝播関数の γ^5 を挟む組を $\gamma^5(\not{k}+M)\gamma^5 = M-\not{k}$ で整理すると、トレースは $T={\rm tr}[(M-\not{k}_1)(M+\not{k}_2)(M-\not{k}_3)(M+\not{k}_4)]$ になる。展開すると、γ 行列 0 個の項 $4M^4$、2 個の項 $4M^2\sum_{i<j}\sigma_{ij}\,k_i\cdot k_j$（$\sigma_{ij}$ は k_i、k_j の前の符号の積で、$\sigma_{12}=\sigma_{14}=\sigma_{23}=\sigma_{34}=-1$、$\sigma_{13}=\sigma_{24}=+1$）、4 個の項 $4[(k_1\cdot k_2)(k_3\cdot k_4)-(k_1\cdot k_3)(k_2\cdot k_4)+(k_1\cdot k_4)(k_2\cdot k_3)]$ である。

$s_{ij}\equiv(k_i-k_j)^2$ と置く。s_{ij} は外線の運動量の和の 2 乗で、$k_i\cdot k_j=\frac{1}{2}(D_i+D_j)+a_{ij}$、$a_{ij}\equiv M^2-\frac{1}{2}s_{ij}$ である。これを入れて D_i について整理する。2 次の項は、4 個の項から $\frac{1}{4}[(D_1+D_2)(D_3+D_4)-(D_1+D_3)(D_2+D_4)+(D_1+D_4)(D_2+D_3)] = \frac{1}{2}(D_1D_3+D_2D_4)$ だけが残る。1 次の項は、2 個の項から $M^2\sum\sigma_{ij}\frac{1}{2}(D_i+D_j) = -\frac{1}{2}M^2\sum_i D_i$、4 個の項から D_1 の係数 $\frac{1}{2}(a_{34}-a_{24}+a_{23})$（$D_2$、$D_3$、$D_4$ も同様）が来て、合わせると D_1 の係数は $\frac{1}{2}(a_{34}-a_{24}+a_{23}-M^2)=\frac{1}{4}(s_{24}-s_{23}-s_{34})$ となる。定数項は

$$M^4+M^2\sum_{i<j}\sigma_{ij}a_{ij}+(a_{12}a_{34}-a_{13}a_{24}+a_{14}a_{23})$$

で、$\sum\sigma_{ij}a_{ij} = -2M^2+\frac{1}{2}(s_{12}+s_{23}+s_{34}+s_{14}-s_{13}-s_{24})$、$a_{12}a_{34}-a_{13}a_{24}+a_{14}a_{23} = M^4-\frac{1}{2}M^2(s_{12}+s_{34}+s_{14}+s_{23}-s_{13}-s_{24})+\frac{1}{4}(s_{12}s_{34}-s_{13}s_{24}+s_{14}s_{23})$ を入れると、M^4 と M^2 の項はすべて打ち消し、$\frac{1}{4}(s_{12}s_{34}+s_{23}s_{14}-s_{13}s_{24})$ だけが残る。4 倍して

$$\begin{aligned}T = {}&(s_{12}s_{34}+s_{23}s_{14}-s_{13}s_{24})+2(D_1D_3+D_2D_4)\\&+(s_{24}-s_{23}-s_{34})D_1+(s_{13}-s_{34}-s_{14})D_2+(s_{24}-s_{14}-s_{12})D_3+(s_{13}-s_{12}-s_{23})D_4\end{aligned}$$

を得る。$D_1D_3/(D_1D_2D_3D_4) = 1/(D_2D_4)$ は運動量の差 k_4-k_2 の 2 点積分で $I_2^{MM}(s_{24})$ を、D_2D_4 の項は $I_2^{MM}(s_{13})$ を与える。D_i の 1 次の項はその伝播関数を消して 3 点積分を、定数項は 4 点積分を与える。外線が質量殻上（$s_{12}=s_{23}=s_{34}=s_{14}=m^2$）のとき、定数項は $2m^4-s_{13}s_{24}$、D_1 と D_3 の係数は $s_{24}-2m^2$、D_2 と D_4

の係数は $s_{13}-2m^2$ である。D_1 を消した三角形の外線の不変量は $(s_{23},s_{34},s_{24})=(m^2,m^2,s_{24})$ で $C_0^M(s_{24})$、D_3 を消したものも (s_{12},s_{14},s_{24}) で $C_0^M(s_{24})$、D_2 と D_4 を消したものは $C_0^M(s_{13})$ である。よって一つの図は

$$-\frac{iy^4}{(4\pi)^2}\Big[(2m^4-s_{13}s_{24})D_0^M+2\big(B_0^{MM}(s_{13})+B_0^{MM}(s_{24})+2\Delta_{\rm UV}\big)+2(s_{24}-2m^2)C_0^M(s_{24})+2(s_{13}-2m^2)C_0^M(s_{13})\Big]$$

で、$\Delta_{\rm UV}$ を除いた括弧が式 (7) の $\mathcal{F}(s_{13},s_{24})$ である。(s_{13},s_{24}) は、ループで隣り合う外線の対の二通りの和の 2 乗で、外線の巡回の順序が同じ二つの図（向きが逆）は同じ組を与える。3 組の順序は (s,t)、(t,u)、(u,s) を与えるので、6 つの図の和は $-\frac{2iy^4}{(4\pi)^2}\sum_{(x,x')}[\mathcal{F}(x,x')+4\Delta_{\rm UV}]$ である。極は $-\frac{24iy^4}{(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}$ で、泡の極と合わせて $-i\delta_\lambda$ が打ち消す条件から、式 (5) の $\delta_\lambda=(\frac{3}{2}\lambda^2-24y^4)\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ を得る。

付録 E　繰り込み群と有効ポテンシャルの導出

■ **裸の量。** 裸の場を $\phi_0=Z_\phi^{1/2}\phi$、$\psi_0=Z_\psi^{1/2}\psi$ とし、式 (1) が裸のラグランジアン $\bar\psi_0(i\partial\!\!\!/-M_0)\psi_0+\frac12(\partial\phi_0)^2-\frac12 m_0^2\phi_0^2-iy_0\phi_0\bar\psi_0\gamma^5\psi_0-\frac{\lambda_0}{4!}\phi_0^4$ に等しいとする。各項の係数を比べると

$$M_0=\frac{M+\delta_M}{Z_\psi},\qquad m_0^2=\frac{m^2+\delta_m}{Z_\phi},\qquad y_0=\frac{\mu^\epsilon(y+\delta_y)}{Z_\psi Z_\phi^{1/2}},\qquad \lambda_0=\frac{\mu^{2\epsilon}(\lambda+\delta_\lambda)}{Z_\phi^2}$$

である。例えば湯川の項では $\mu^\epsilon(y+\delta_y)\phi\bar\psi\psi=y_0Z_\phi^{1/2}Z_\psi\,\phi\bar\psi\psi$ である。以下、$\Delta_{\rm UV}$ を $1/\epsilon$ と書く（定数部分は β 関数に効かない）。式 (5) を入れて 1 ループの次数まで展開すると

$$\begin{aligned}
\mu^{-\epsilon}y_0&=y+\frac{a_y}{\epsilon},\quad a_y=\frac{1}{(4\pi)^2}\Big(y^3+\frac{y^3}{2}+y^3\Big)=\frac{5y^3}{2(4\pi)^2},\\
\mu^{-2\epsilon}\lambda_0&=\lambda+\frac{a_\lambda}{\epsilon},\quad a_\lambda=\frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac32\lambda^2-24y^4+4\lambda y^2\Big),\\
m_0^2&=m^2+\frac{a_m}{\epsilon},\quad a_m=\frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{\lambda m^2}{2}-4y^2M^2+2y^2m^2\Big),\\
M_0&=M+\frac{a_M}{\epsilon},\quad a_M=\frac{1}{(4\pi)^2}\Big(-y^2M+\frac{y^2M}{2}\Big)=-\frac{y^2M}{2(4\pi)^2}
\end{aligned}$$

である。a_y の三つの項は δ_y、$-y\delta_\psi$、$-\frac12 y\delta_\phi$ から、a_λ の最後の項は $-2\lambda\delta_\phi$ から、a_m の最後の項は $-m^2\delta_\phi$ から、a_M の第 2 項は $-M\delta_\psi$ から来る。

■ **β 関数と質量の走り。** 結合 g_i の裸の量を $g_{i,0}=\mu^{\rho_i\epsilon}[g_i+a_i(g)/\epsilon]$（$y$ は $\rho=1$、λ は $\rho=2$、質量は $\rho=0$）と書く。$\ln\mu$ で微分して 0 と置くと $0=\rho_i\epsilon(g_i+a_i/\epsilon)+\beta_i+\sum_j(\partial_j a_i)\beta_j/\epsilon$ である。$\beta_j=-\rho_j\epsilon g_j+b_j$ と置いて ϵ^0 の項を比べると、1 ループの次数で

$$b_i=\Big(\sum_j\rho_j g_j\frac{\partial}{\partial g_j}-\rho_i\Big)a_i$$

を得る（$\rho_i\epsilon g_i$ と $-\rho_i\epsilon g_i$ は打ち消す）。a_y は y の 3 次なので $b_y=(3-1)a_y=5y^3/(4\pi)^2$ である。a_λ の各項に $2\lambda\partial_\lambda+y\partial_y-2$ を掛けると、λ^2 の項は $4-2=2$ 倍、λy^2 の項は $2+2-2=2$ 倍、y^4 の項は $4-2=2$ 倍になり、$b_\lambda=2a_\lambda=(3\lambda^2+8\lambda y^2-48y^4)/(4\pi)^2$ である。質量では $\rho=0$ なので、$\gamma_m=(2\lambda\partial_\lambda+y\partial_y)a_m=(\lambda m^2+4y^2m^2-8y^2M^2)/(4\pi)^2$、$\gamma_M=y\partial_y a_M=-y^2M/(4\pi)^2$ である（質量自身の走りは a/ϵ の中では高次）。これが式 (8) である。

■ **場の異常次元。** $\ln Z_\phi=-2y^2/((4\pi)^2\epsilon)$ を $\ln\mu$ で微分し、$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}\ln\mu=2y\beta_y=-2\epsilon y^2+O(y^4)$ を使うと $\mathrm{d}\ln Z_\phi/\mathrm{d}\ln\mu=4y^2/(4\pi)^2$、すなわち $\gamma_\phi=2y^2/(4\pi)^2$ である。同様に $\ln Z_\psi=-y^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$ から $\gamma_\psi=y^2/(2(4\pi)^2)$ である。b_y は $2\cdot\frac{y^3}{(4\pi)^2}$（$\delta_y$ の寄与の 2 倍）$+(2\gamma_\psi+\gamma_\phi)y$ とも書け、本文の分解を得る。

■ **有効ポテンシャル。** 定数の背景場 ϕ のまわりの 1 ループの有効ポテンシャルは、各場の揺らぎの演算子の行列式から決まる。ϕ の揺らぎの質量の 2 乗は $V_0''=m^2+\frac{\lambda}{2}\phi^2=m_\phi^2$ である。フェルミオンの演算子は運動量空間で $\not p-M-iy\phi\gamma^5$ である。$X\equiv\not p-iy\phi\gamma^5$ と置くと、$\not p$ と γ^5 の反可換性から $X^2=p^2-y^2\phi^2$ で、

$\mathrm{tr}X=0$ なので X の固有値は $\pm\sqrt{p^2-y^2\phi^2}$（それぞれ 2 重）である。よって 4×4 の行列式は $\det(X-M)=[(\sqrt{p^2-y^2\phi^2}-M)(-\sqrt{p^2-y^2\phi^2}-M)]^2=(p^2-M_\psi^2)^2$、$M_\psi^2=M^2+y^2\phi^2$ である。Euclid の運動量で書くと、スカラーの寄与は $+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^Dp_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2+m_\phi^2)$、フェルミオンの寄与は Grassmann 数の積分が行列式を分母でなく分子に与えるので符号が逆で、$-\int\frac{\mathrm{d}^Dp_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2+M_\psi^2)^2=-4\cdot\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^Dp_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2+M_\psi^2)$ である。$\frac{1}{2}\int\ln(p_E^2+X)$ を X で微分すると $\frac{1}{2}\int(p_E^2+X)^{-1}=-\frac{X}{2(4\pi)^2}(\Delta_{\mathrm{UV}}+1-\ln\frac{X}{\mu^2})$ で、極を $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項で除いてから X で積分すると $\frac{X^2}{64\pi^2}(\ln\frac{X}{\mu^2}-\frac{3}{2})$ を得る（積分定数は Λ に含める）。これで式 (10) を得る。

■ **有効ポテンシャルからの確認。** V_{eff} は繰り込まれた場 $\phi=Z_\phi^{-1/2}\phi_0$ の関数で、裸の場を固定して μ を変えると $\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\ln\mu=-\gamma_\phi\phi$ である。よって $[\mu\partial_\mu+\sum_i\beta_i\partial_{g_i}-\gamma_\phi\phi\partial_\phi]V_{\mathrm{eff}}=0$ が成り立つ。1 ループの部分の陽な μ 依存は $\mu\partial_\mu V_1=-\frac{1}{32\pi^2}(m_\phi^4-4M_\psi^4)$ で、$m_\phi^4=m^4+\lambda m^2\phi^2+\frac{\lambda^2}{4}\phi^4$、$4M_\psi^4=4M^4+8y^2M^2\phi^2+4y^4\phi^4$ である。木の部分には

$$\Big(\sum_i\beta_i\partial_{g_i}-\gamma_\phi\phi\partial_\phi\Big)V_0=\frac{\mathrm{d}\Lambda}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{1}{2}(\gamma_m-2\gamma_\phi m^2)\phi^2+\frac{1}{24}(\beta_\lambda-4\gamma_\phi\lambda)\phi^4$$

が働く。ϕ の各次数で和を 0 とすると、$\mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}\ln\mu=(m^4-4M^4)/(32\pi^2)$、$\gamma_m=2\gamma_\phi m^2+(\lambda m^2-8y^2M^2)/(16\pi^2)$、$\beta_\lambda=4\gamma_\phi\lambda+\frac{24}{32\pi^2}(\frac{\lambda^2}{4}-4y^4)$ を得る。$\gamma_\phi=2y^2/(16\pi^2)$ と $16\pi^2=(4\pi)^2$ を入れると、式 (8) の γ_m と β_λ に一致する。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違い、ここでは場の異常次元の項 $-\gamma_\phi\phi\partial_\phi$ がないと一致しない。β_y は 1 ループの有効ポテンシャルには γ_ϕ を通してしか現れず、この方法では確かめられない。

■ **比 λ/y^2 の流れ。** $t\equiv\ln(\mu/\mu_0)$ とする。$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t=2y\beta_y=10y^4/(4\pi)^2$ を解くと $y^2=y_0^2/(1-10y_0^2t/(4\pi)^2)$ で、式 (9) の第 2 式を得る。$r=\lambda/y^2$ について $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=\frac{1}{y^2}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}-\frac{\lambda}{y^4}\frac{\mathrm{d}y^2}{\mathrm{d}t}=\frac{y^2}{(4\pi)^2}(3r^2+8r-48-10r)=\frac{y^2}{(4\pi)^2}(3r^2-2r-48)$ である。$3r^2-2r-48=0$ の解は $r_\pm=(2\pm\sqrt{4+576})/6=(1\pm\sqrt{145})/3$ である。新しい変数 $\sigma\equiv\int_0^t y^2\,\mathrm{d}t'/(4\pi)^2$ をとると、$\mathrm{d}\ln y^2/\mathrm{d}t=10y^2/(4\pi)^2$ から $\sigma=\frac{1}{10}\ln(y^2/y_0^2)$ で、$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\sigma=3(r-r_+)(r-r_-)$ となる。部分分数で

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\ln\frac{r-r_+}{r-r_-}=\Big(\frac{1}{r-r_+}-\frac{1}{r-r_-}\Big)3(r-r_+)(r-r_-)=3(r_+-r_-)=2\sqrt{145}$$

なので、$\ln\frac{r-r_+}{r-r_-}=\ln\frac{r_0-r_+}{r_0-r_-}+2\sqrt{145}\,\sigma=\ln\frac{r_0-r_+}{r_0-r_-}+\frac{\sqrt{145}}{5}\ln\frac{y^2}{y_0^2}$ となり、式 (9) の第 1 式を得る。$r_-<r_0<r_+$ では左辺の比は負で、y^2 とともに絶対値が増え、$y^2\to\infty$（Landau 極）で $r\to r_-$ となる。$r=0$ での比は r_+/r_- なので、$\lambda=0$ となるのは $(y^2/y_0^2)^{\sqrt{145}/5}=(r_+/r_-)(r_0-r_-)/(r_0-r_+)$ のときである。$r_0=y_0=1$ ではこれは $y^2/y_0^2=1.23164$、$t=(4\pi)^2(1-y_0^2/y^2)/(10y_0^2)=2.96994$、すなわち $\mu=19.4907\,\mu_0$ である（λ と y の方程式を数値で積分しても同じ値になる）。$r_0>r_+$ では比は正で増え、1 に達する（$r\to\infty$）のは $(y^2/y_0^2)^{\sqrt{145}/5}=(r_0-r_-)/(r_0-r_+)$ のとき、すなわち y の Landau 極より手前である。$y^2\to0$（低エネルギー）では比は 0 に近づき、$r\to r_+$ となる。

付録 F　木の振幅と断面積の導出

■ $\phi\phi\to\phi\phi$。 4 点頂点 1 つで $i\mathcal{M}_A=-i\lambda$、すなわち $\mathcal{M}_A^{(0)}=-\lambda$ である。

■ $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ **の振幅。** 入ってくる $\psi(p_1)$ は $u(p_1)$、入ってくる $\bar\psi(p_2)$ は $\bar v(p_2)$ を与え、フェルミオンの線は $\bar v(p_2)\cdots u(p_1)$ である。t チャンネルでは ψ が $\phi(k_1)$ を出して運動量 p_1-k_1 になり、$\bar\psi$ と消えて $\phi(k_2)$ を出す。u チャンネルは $k_1\leftrightarrow k_2$ である。よって

$$i\mathcal{M}_B=\bar v(p_2)\Big[y\gamma^5\frac{i(\not p_1-\not k_1+M)}{t-M^2}y\gamma^5+y\gamma^5\frac{i(\not p_1-\not k_2+M)}{u-M^2}y\gamma^5\Big]u(p_1)$$

で、$\gamma^5(\not a+M)\gamma^5=-\not a+M$ から $\mathcal{M}_B=y^2\bar v(p_2)[(M-\not p_1+\not k_1)/(t-M^2)+(M-\not p_1+\not k_2)/(u-M^2)]u(p_1)$ である。Dirac 方程式 $\not p_1u(p_1)=Mu(p_1)$ から $(M-\not p_1)u(p_1)=0$ なので、式 (11) の $\mathcal{M}_B^{(0)}$ を得る。各図の対称性因子は 1 である。

■ $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ **のスピン和。** $A\equiv a\not k_1+b\not k_2$（$a=1/(t-M^2)$、$b=1/(u-M^2)$）と置くと、$\bar A\equiv\gamma^0A^\dagger\gamma^0=A$ なので、$\sum_{\mathrm{spins}}|\mathcal{M}_B|^2=y^4\,\mathrm{tr}[(\not p_2-M)A(\not p_1+M)A]=y^4\{\mathrm{tr}[\not p_2A\not p_1A]-M^2\mathrm{tr}[AA]\}$ である（$\sum u\bar u=\not p+M$、

$\sum v\bar{v} = \not{p} - M$、$\gamma$ 行列が奇数個の項は 0)。運動学は $s+t+u = 2M^2+2m^2$、$p_1\cdot p_2 = \frac{s}{2} - M^2$、$k_1\cdot k_2 = \frac{s}{2} - m^2$、$p_1\cdot k_1 = p_2\cdot k_2 = \frac{1}{2}(M^2+m^2-t) \equiv \tau$、$p_1\cdot k_2 = p_2\cdot k_1 = \frac{1}{2}(M^2+m^2-u) \equiv \upsilon$ である。トレースの公式から

$$\begin{aligned}
&\mathrm{tr}[\not{p}_2 A \not{p}_1 A] = 4(a^2+b^2)\Big[2\tau\upsilon - m^2\Big(\frac{s}{2} - M^2\Big)\Big] + 8ab\Big[\tau^2 + \upsilon^2 - \Big(\frac{s}{2} - M^2\Big)\Big(\frac{s}{2} - m^2\Big)\Big],\\
&M^2\,\mathrm{tr}[AA] = 4M^2\big[(a^2+b^2)m^2 + 2ab\,k_1\cdot k_2\big]
\end{aligned}$$

である。$X \equiv t - M^2$、$W \equiv u - M^2$ とすると、$M^2+m^2-t = m^2 - X$、$M^2+m^2-u = m^2 - W$、$s = 2m^2 - X - W$ である。a^2+b^2 の係数は $2\tau\upsilon - \frac{m^2 s}{2} = \frac{1}{2}[(m^2-X)(m^2-W) - m^2(2m^2-X-W)] = \frac{1}{2}(XW - m^4)$、$2ab$ の係数は $\tau^2 + \upsilon^2 - \frac{s}{2}\big(\frac{s}{2} - m^2\big) = \frac{1}{4}[(m^2-X)^2 + (m^2-W)^2 - (X+W)^2 + 2m^2(X+W)] = \frac{1}{2}(m^4 - XW)$ になる。よって

$$\sum |\mathcal{M}_B|^2 = 4y^4(XW - m^4)\Big[\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{X^2} + \frac{1}{W^2}\Big) - \frac{1}{XW}\Big] = 2y^4(XW - m^4)\frac{(W-X)^2}{X^2W^2}$$

で、$W - X = u - t$ から式 (11) を得る。重心系では $p_1 = (E, \boldsymbol{p})$、$p_2 = (E, -\boldsymbol{p})$、$k_1 = (E, \boldsymbol{k})$、$k_2 = (E, -\boldsymbol{k})$ ($E = \sqrt{s}/2$、$p = |\boldsymbol{p}|$、$k = |\boldsymbol{k}|$、$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{k} = pk\cos\theta$) で、$t - u = -2p_1\cdot k_1 + 2p_1\cdot k_2 = 4\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{k} = 4pk\cos\theta$ である。また $t = M^2 + m^2 - 2(E^2 - pk\cos\theta)$ から $X = m^2 - \frac{s}{2} + 2pk\cos\theta$、$W = m^2 - \frac{s}{2} - 2pk\cos\theta$ で、$XW - m^4 = (\frac{s}{2} - m^2)^2 - 4p^2k^2\cos^2\theta - m^4 = \frac{s}{2}(\frac{s}{2} - 2m^2) - 4p^2k^2\cos^2\theta = k^2(s - 4p^2\cos^2\theta)$ である ($k^2 = \frac{s}{4} - m^2$)。よって $\sum|\mathcal{M}_B|^2 = 2y^4\cdot k^2(s-4p^2\cos^2\theta)\cdot 16p^2k^2\cos^2\theta/(X^2W^2)$ で、第 3 節の重心系の式を得る。$s > 4p^2$ なので、これは物理的な領域で負にならない。$p \to 0$ ($s \to 4M^2$) は $k^2 = M^2 - m^2 > 0$、すなわち $m < M$ のときだけ物理的な領域にある。

■ $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$。 s チャンネルでは始状態の対が消えて ϕ になり、終状態の対を作る。t チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_3)$ と $\bar{\psi}(p_2) \to \bar{\psi}(p_4)$ の線が ϕ を交換する。フェルミオンの演算子の並べ替えから二つの図の相対符号は -1 で、

$$\mathcal{M}_C = \frac{y^2}{s-m^2}[\bar{v}_2\gamma^5 u_1][\bar{u}_3\gamma^5 v_4] - \frac{y^2}{t-m^2}[\bar{u}_3\gamma^5 u_1][\bar{v}_2\gamma^5 v_4]$$

である ($u_1 = u(p_1)$ など。$i\mathcal{M}$ は頂点 2 つの y^2 と伝播関数の i の積)。複素共役は $(\bar{a}\gamma^5 b)^* = \bar{b}\,\gamma^0\gamma^{5\dagger}\gamma^0 a = -\bar{b}\gamma^5 a$ である。$|s|^2$ の項では $\sum|\bar{v}_2\gamma^5 u_1|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5] = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(M - \not{p}_1)] = 4(p_1\cdot p_2 + M^2) = 2s$、同様に $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 v_4|^2 = 2s$ で、$4y^4s^2/(s-m^2)^2$ となる。$|t|^2$ の項では $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 u_1|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_3 + M)(M - \not{p}_1)] = 4(p_1\cdot p_3 - M^2) = -2t$、$\sum|\bar{v}_2\gamma^5 v_4|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(-M - \not{p}_4)] = 4(p_2\cdot p_4 - M^2) = -2t$ で、$4y^4t^2/(t-m^2)^2$ となる ($p_1\cdot p_3 = p_2\cdot p_4 = M^2 - t/2$)。干渉項は

$$2\,\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}_s\mathcal{M}_t^* = -\frac{2y^4}{(s-m^2)(t-m^2)}\,\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5(\not{p}_3 + M)\gamma^5(\not{p}_4 - M)\gamma^5]$$

で (二つの複素共役の -1 は打ち消す)、トレースは $\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(\not{p}_1 - M)(\not{p}_3 + M)(\not{p}_4 + M)]$ に等しい。4 個の項は $(s-2M^2)^2 - (2M^2-u)^2 + (2M^2-t)^2$、2 個の項は $4M^2[(p_1\cdot p_2) + (p_3\cdot p_4) - (p_1\cdot p_3) - (p_1\cdot p_4) - (p_2\cdot p_3) - (p_2\cdot p_4)] = 4M^2(s+t+u-6M^2) = -8M^4$、0 個の項は $4M^4$ である ($p_1\cdot p_4 = p_2\cdot p_3 = M^2 - u/2$)。$u = 4M^2 - s - t$ を入れると、和は $-t(2s+t-4M^2) + t^2 - 4M^2t = -2st$ になる。よって干渉項は $4y^4st/((s-m^2)(t-m^2))$ で、式 (11) を得る。

■ $\psi\psi \to \psi\psi$。 t チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_3)$ と $\psi(p_2) \to \psi(p_4)$ の線が、u チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_4)$ と $\psi(p_2) \to \psi(p_3)$ の線が ϕ を交換する。二つの図は終状態のフェルミオンの入れ替えで移り合うので、相対符号は -1 で、

$$\mathcal{M}_D = \frac{y^2}{t-m^2}[\bar{u}_3\gamma^5 u_1][\bar{u}_4\gamma^5 u_2] - \frac{y^2}{u-m^2}[\bar{u}_4\gamma^5 u_1][\bar{u}_3\gamma^5 u_2]$$

である。運動学は $p_1\cdot p_2 = p_3\cdot p_4 = \frac{s}{2} - M^2$、$p_1\cdot p_3 = p_2\cdot p_4 = M^2 - \frac{t}{2}$、$p_1\cdot p_4 = p_2\cdot p_3 = M^2 - \frac{u}{2}$ である。$|t|^2$ の項では、(C) と同じ計算で $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 u_1|^2 = \sum|\bar{u}_4\gamma^5 u_2|^2 = -2t$ となり、$4y^4t^2/(t-m^2)^2$ を与える。$|u|^2$ の項も同様に $4y^4u^2/(u-m^2)^2$ である。干渉項は、二つの複素共役の -1 が打ち消して

$$2\,\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^* = -\frac{2y^4}{(t-m^2)(u-m^2)}\,\mathrm{tr}[(\not{p}_3 + M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5(\not{p}_4 + M)\gamma^5(\not{p}_2 + M)\gamma^5]$$

で、トレースは $\mathrm{tr}[(\not p_3+M)(\not p_1-M)(\not p_4+M)(\not p_2-M)]$ に等しい。4 個の項は $(2M^2-t)^2-(s-2M^2)^2+(2M^2-u)^2$、2 個の項は $4M^2[(p_3\cdot p_4)+(p_1\cdot p_2)-(p_1\cdot p_3)-(p_2\cdot p_3)-(p_1\cdot p_4)-(p_2\cdot p_4)]=4M^2(s+t+u-6M^2)=-8M^4$、0 個の項は $4M^4$ である。$a\equiv 2M^2-t$、$b\equiv 2M^2-u$ と置くと $s-2M^2=a+b-2M^2$ で、和は $a^2+b^2-(a+b-2M^2)^2-4M^4=-2ab+4M^2(a+b)-8M^4=-2(a-2M^2)(b-2M^2)=-2tu$ になる。よって干渉項は $4y^4tu/((t-m^2)(u-m^2))$ で、式 (23) を得る。

■ **断面積。** 重心系で、流束の因子は $4E_1E_2|v_1-v_2|=4p\sqrt{s}$、2 体の位相空間は $\mathrm{d}\Phi_2=\frac{k}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega$ なので、$\sigma=\frac{k}{64\pi^2 sp}\int\mathrm{d}\Omega\,\overline{|\mathcal{M}|^2}\times S$（$S$ は終状態の同種粒子の因子）である。$\overline{|\mathcal{M}|^2}$ は始状態のスピンの平均で、フェルミオン 2 つでは $\frac{1}{4}\sum$ である。$\phi\phi\to\phi\phi$ は $k=p$、$\overline{|\mathcal{M}|^2}=\lambda^2$、$S=\frac{1}{2}$ で、$\sigma_A=\frac{1}{64\pi^2 s}\cdot 4\pi\lambda^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{\lambda^2}{32\pi s}$ である。$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ は $p=\sqrt{s/4-M^2}$、$k=\sqrt{s/4-m^2}$、$S=\frac{1}{2}$、$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ は $k=p$、$S=1$ で、式 (12) を得る。

付録 G　1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ と S 行列要素の導出

■ **図の分類。** $\phi\phi\to\phi\phi$ の 1 ループの図で外線の補正を除いたものは、1PI の 4 点関数 V_4 と、木の図の内線や頂点に補正を付けた図である。3 点結合がないので、木の図は接触項だけで内線を持たず、頂点の補正は V_4 そのものである。よって $i\mathcal{M}_A^{(1)}=V_4$ で、式 (6) から式 (13) を得る。

■ **ユニタリー性。** ϕ^3 のノートの付録 I と同じく、S 行列のユニタリー性から $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i\to f)=\sum_n\int\mathrm{d}\Phi_n\,\mathcal{M}(i\to n)\mathcal{M}^*(f\to n)$ を得る（n に同種粒子があればその因子を含める）。λ^2、y^4 の次数では中間状態は 2 粒子だけで、右辺の振幅は木の振幅である。$\phi\phi$ の中間状態は同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を持ち、$\mathcal{M}^{(0)}=-\lambda$ なので $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\cdot 4\pi\lambda^2=\frac{\lambda^2 p}{16\pi\sqrt{s}}$ を与える。これは $\frac{\lambda^2}{2(4\pi)^2}\mathrm{Im}B_0^{mm}(s)=\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\pi\beta$（$\beta=2p/\sqrt{s}$）に等しい。$\psi\bar\psi$ の中間状態では ψ と $\bar\psi$ が区別できるので因子 $\frac{1}{2}$ はなく、スピンについて和をとる。$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{p_\psi}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega_q$ なので、式 (14) を得る。前方（$k_1=p_1$、$k_2=p_2$）では右辺は $|\mathcal{M}|^2$ の積分になり、$\phi\phi$ の項は $2p\sqrt{s}\,\sigma_A$、$\psi\bar\psi$ の項は $2p\sqrt{s}\,\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)$（$\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)=\frac{p_\psi}{64\pi^2 sp}\int\mathrm{d}\Omega\sum|\mathcal{M}|^2$）になる。

$\phi(k_1)\phi(k_2)\to\psi(q_1)\bar\psi(q_2)$ の振幅は、付録 F と同じ手順で $y^2\bar u(q_1)[\not k_1/(t-M^2)+\not k_2/(u-M^2)]v(q_2)$（$t=(q_1-k_1)^2$、$u=(q_1-k_2)^2$）である。ここでは $\bar u(q_1)(M-\not q_1)=0$ を使った。スピン和は $y^4\,\mathrm{tr}[(\not q_1+M)A(\not q_2-M)A]$ で、トレースの巡回性から $\mathrm{tr}[(\not q_2-M)A(\not q_1+M)A]$ と同じ形なので、$\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2$ と同じ関数である。

■ **ϕ の極質量と留数。** 完全な伝播関数 $i/(p^2-m^2-\Sigma_\phi(p^2))$ の極は $m_\mathrm{p}^2=m^2+\Sigma_\phi(m_\mathrm{p}^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ_ϕ を m^2 で評価してよい。式 (6) の後の Σ_ϕ から式 (15) の m_p^2 を得る。極のまわりで $p^2-m^2-\Sigma_\phi\simeq(p^2-m_\mathrm{p}^2)(1-\Sigma'_\phi)$ なので、留数は $R_\phi\simeq 1+\Sigma'_\phi(m^2)$ で、$\Sigma'_\phi=-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}(B_0^{MM}+p^2B_0^{MM\prime})$ から式 (15) の R_ϕ を得る。$\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$、$\mu\,\partial A_0(M^2)/\partial\mu=2M^2$、$\mu\,\partial B'_0/\partial\mu=0$ と式 (8) の γ_m から、$\mu\,\mathrm{d}m_\mathrm{p}^2/\mathrm{d}\mu=\gamma_m-\frac{1}{(4\pi)^2}[2y^2(2m^2-4M^2)+\lambda m^2]=0$ である。一方 $\mu\,\mathrm{d}R_\phi/\mathrm{d}\mu=-4y^2/(4\pi)^2=-2\gamma_\phi$ で、留数は $\overline{\mathrm{MS}}$ の場の規格化に依存する。

■ **S 行列要素。** LSZ の簡約公式から、S 行列要素は、外線を切り落とした振幅に外線の数だけ $R_\phi^{1/2}$ を掛けたものである。$\mathcal{M}_A^{(0)}=-\lambda$ は質量によらないので、1 ループの次数で $R_\phi^2(\mathcal{M}_A^{(0)}+\mathcal{M}_A^{(1)})=-\lambda-2\lambda\Sigma'_\phi(m^2)+\mathcal{M}_A^{(1)}$ となる。1 ループの項の中の m を m_p に替えても違いは高次なので、式 (16) を得る。結合を固定して μ で微分すると、式 (13) の B_0 の各項が 2 を与え、$\frac{\lambda^2}{2}\cdot 3\cdot 2-2y^4\cdot(4\cdot 3)\cdot 2=3\lambda^2-48y^4$（$\mathcal{F}$ の和は B_0^{MM} を各チャンネルにつき 4 つ含む）、留数の項が $4\lambda y^2\cdot 2=8\lambda y^2$ を与える。和は $(4\pi)^2\beta_\lambda$ で、$\mathrm{d}(-\lambda)/\mathrm{d}\ln\mu=-\beta_\lambda$ と打ち消し合い、$\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}}$ は μ によらない。

■ **フェルミオンの極質量と留数。** 完全な伝播関数は $i/(\not p-M-\Sigma_\psi)$ で、$\Sigma_\psi=\not p\,\Sigma_V(p^2)+M\Sigma_S(p^2)$ は $\not p$ と可換なので、$\not p$ を数のように扱える。$p^2=\not p^2$ と見て Σ_ψ を $\not p$ の関数とみなし、極 $\not p=M_\mathrm{p}$ のまわりで展開すると $\not p-M-\Sigma_\psi(\not p)\simeq(\not p-M_\mathrm{p})(1-\Sigma'_\psi(M))$ で、$M_\mathrm{p}=M+\Sigma_\psi(M)=M[1+\Sigma_V(M^2)+\Sigma_S(M^2)]$、$\Sigma'_\psi\equiv\mathrm{d}\Sigma_\psi/\mathrm{d}\not p|_{\not p=M}=\Sigma_V+2M^2(\Sigma'_V+\Sigma'_S)$ である（$\mathrm{d}f(\not p^2)/\mathrm{d}\not p=2\not p f'$）。留数は $R_\psi=1/(1-\Sigma'_\psi)\simeq 1+\Sigma'_\psi$ である。式 (6) の後の Σ_ψ から $\Sigma_V=y^2B_1^{Mm}/(4\pi)^2$、$\Sigma_S=y^2B_0^{Mm}/(4\pi)^2$ で、式 (17) を得る。$\mu\,\partial B_1/\partial\mu=-1$（$B_1=\int x\ln(\Delta_x/\mu^2)$ から $-2\int x\,\mathrm{d}x$）と $\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$ から、$\mu\,\mathrm{d}M_\mathrm{p}/\mathrm{d}\mu=\gamma_M+My^2/(4\pi)^2=0$ である。

付録 H　1 ループの $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の導出

■ **規約。** $i\mathcal{M}$ は図の和で、$(4\pi)^2\mathcal{M} = a\,\bar{v}u + b\,\bar{v}\not{k}_1 u$（$\bar{v} \equiv \bar{v}(p_2)$、$u \equiv u(p_1)$）と書く。使う関係は、Dirac 方程式 $\not{p}_1 u = Mu$、$\bar{v}\not{p}_2 = -M\bar{v}$、運動量の保存 $k_2 = p_1 + p_2 - k_1$、$p_1 \cdot k_1 = \frac{1}{2}(M^2 + m^2 - t)$、それに $\gamma^5(\not{a} + M)\gamma^5 = M - \not{a}$ である。$P \equiv p_1 - k_1$（$P^2 = t$）とすると $\bar{v}\not{P}u = M\bar{v}u - \bar{v}\not{k}_1 u$、$(M - \not{P})u = \not{k}_1 u$ である。u チャンネルの図は $k_1 \leftrightarrow k_2$、$t \leftrightarrow u$ で得られ、$\bar{v}\not{k}_2 u = -\bar{v}\not{k}_1 u$ なので b の寄与の符号が変わる（$\sigma_u = -1$）。

■ **自己エネルギー。** $i\mathcal{M} = \bar{v}(y\gamma^5)\frac{i(\not{P}+M)}{t-M^2}V_\psi(P)\frac{i(\not{P}+M)}{t-M^2}(y\gamma^5)u$ に式 (6) の $V_\psi = -\frac{iy^2}{(4\pi)^2}(\not{P}B_1 + MB_0)$ を入れると、$(4\pi)^2\mathcal{M} = y^4\bar{v}\gamma^5(\not{P} + M)(\not{P}B_1 + MB_0)(\not{P} + M)\gamma^5 u/(t - M^2)^2$ である。$\not{P}B_1 + MB_0$ は $\not{P}$ と可換なので、$(\not{P}+M)^2 = t + M^2 + 2M\not{P}$ を使って $(\not{P}+M)(\not{P}B_1 + MB_0)(\not{P}+M) = \not{P}\,X + M\,Z$、$X = (t+M^2)B_1 + 2M^2 B_0$、$Z = (t + M^2)B_0 + 2tB_1$ となる。γ^5 で挟むと $-\not{P}X + MZ$ で、$\bar{v}(-\not{P}X + MZ)u = M(Z - X)\bar{v}u + X\bar{v}\not{k}_1 u$、$Z - X = (t - M^2)(B_0 + B_1)$ である。よって $a = y^4 M(B_0 + B_1)/(t - M^2)$、$b = y^4 X/(t - M^2)^2$ を得る。

■ **$\psi(p_1)$ の側の頂点の補正。** $i\mathcal{M} = \bar{v}(y\gamma^5)\frac{i(\not{P}+M)}{t-M^2}V_y\,u$ で、V_y は式 (6) で入ってくるフェルミオンを p_1、入ってくる ϕ を $-k_1$、出ていくフェルミオンを P としたもの、$V_y = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}[B_0(t) + m^2 C_1 - M\not{k}_1 C_0 + \not{k}_1\not{p}_1 C_2]\gamma^5$（$C_n = C_n^{(1)}(t)$）である。$u$ に作用させると $\not{k}_1\not{p}_1\gamma^5 u = -\not{k}_1\gamma^5\not{p}_1 u = -M\not{k}_1\gamma^5 u$ なので、$V_y u = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}(\alpha - \beta\not{k}_1)\gamma^5 u$、$\alpha = B_0(t) + m^2 C_1$、$\beta = M(C_0 + C_2)$ である。$\gamma^5(\not{P} + M)(\alpha - \beta\not{k}_1)\gamma^5 = (M - \not{P})(\alpha + \beta\not{k}_1)$ から、$(4\pi)^2\mathcal{M} = -\frac{y^4}{t-M^2}\bar{v}(M - \not{P})(\alpha + \beta\not{k}_1)u$ である。$\bar{v}(M - \not{P})u = \bar{v}\not{k}_1 u$（$(M - \not{p}_1)u = 0$）と、$\bar{v}(M - \not{p}_1 + \not{k}_1)\not{k}_1 u = M\bar{v}\not{k}_1 u - \bar{v}\not{p}_1\not{k}_1 u + m^2\bar{v}u = 2M\bar{v}\not{k}_1 u + (t - M^2)\bar{v}u$（$\not{p}_1\not{k}_1 = 2p_1 \cdot k_1 - \not{k}_1\not{p}_1$）から、$a = -y^4\beta$、$b = -y^4(\alpha + 2M\beta)/(t - M^2)$ を得る。

■ **$\bar{\psi}(p_2)$ の側の頂点の補正。** $i\mathcal{M} = \bar{v}V_y\frac{i(\not{P}+M)}{t-M^2}(y\gamma^5)u$ で、V_y は入ってくるフェルミオンを P、入ってくる ϕ を $-k_2$、出ていくフェルミオンを $-p_2$ としたもの、$V_y = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}[B_0(M^2) + m^2 C_1 - M\not{k}_2 C_0 + \not{k}_2\not{P}C_2]\gamma^5$（$C_n = C_n^{(2)}(t)$）である。$\gamma^5(\not{P}+M)\gamma^5 u = (M - \not{P})u = \not{k}_1 u$ なので、$(4\pi)^2\mathcal{M} = -\frac{y^4}{t-M^2}\bar{v}[\alpha' - M\not{k}_2 C_0 + \not{k}_2\not{P}C_2]\not{k}_1 u$、$\alpha' = B_0(M^2) + m^2 C_1$ である。$\not{k}_2 = \not{p}_1 + \not{p}_2 - \not{k}_1$ と Dirac 方程式から $\bar{v}\not{k}_2\not{k}_1 u = (M^2 - t)\bar{v}u - 2M\bar{v}\not{k}_1 u$、$\bar{v}\not{k}_2\not{P}\not{k}_1 u = (t + M^2)\bar{v}\not{k}_1 u + M(t - M^2)\bar{v}u$ である（後者は $\not{P}\not{k}_1 = \not{p}_1\not{k}_1 - m^2$ と前者を使う）。よって $a = -y^4 M(C_0 + C_2)$、$b = -y^4[\alpha' + 2M^2 C_0 + (t + M^2)C_2]/(t - M^2)$ を得る。

■ **箱。** フェルミオンの線に沿って $u(p_1)$ から、ϕ の内線（運動量 ℓ）を出し、$\phi(k_1)$、$\phi(k_2)$ を出し、ϕ の内線を吸う図では、伝播関数は $D_0 = \ell^2 - m^2$、$D_1 = (\ell - p_1)^2 - M^2$、$D_3 = (\ell - P)^2 - M^2$、$D_4 = (\ell + p_2)^2 - M^2$ で、i の因子は $i^4 = 1$ である。γ^5 を整理すると、分子は $\bar{v}(M + \not{p}_2 + \not{\ell})(M + \not{P} - \not{\ell})(M - \not{p}_1 + \not{\ell})u = \bar{v}\not{\ell}(M + \not{P} - \not{\ell})\not{\ell}u$ となる（両端は Dirac 方程式）。$\not{\ell}\not{P}\not{\ell} = 2(\ell \cdot P)\not{\ell} - \ell^2\not{P}$、$\ell^2 = D_0 + m^2$、$2\ell \cdot P = D_0 + m^2 + t - M^2 - D_3$ を使うと、

$$\bar{v}\not{\ell}(M + \not{P} - \not{\ell})\not{\ell}u = M(D_0 + m^2)\bar{v}u + (t - M^2 - D_3)\bar{v}\not{\ell}u - (D_0 + m^2)\bar{v}\not{P}u = (D_0 + m^2)\bar{v}\not{k}_1 u + (t - M^2 - D_3)\bar{v}\not{\ell}u$$

となる（$(D_0 + m^2)\not{\ell}$ の項は打ち消す）。よって $i\mathcal{M} = y^4\{\bar{v}\not{k}_1 u[m^2 I_4 + I_3^{(134)}] + (t - M^2)\bar{v}\gamma_\mu u I_4^\mu - \bar{v}\gamma_\mu u I_3^{(014)\mu}\}$ で、I_4、I_4^μ は 4 本の伝播関数の積分、$I_3^{(134)}$ は D_0 を除いた（フェルミオンだけの）三角形、$I_3^{(014)\mu}$ は D_3 を除いた三角形である。LoopTools の規約で $(r_0, \ldots, r_3) = (0, -p_1, -P, p_2)$ とすると、$I_4^\mu = \frac{i}{(4\pi)^2}(-p_1^\mu D_1 - P^\mu D_2 + p_2^\mu D_3)$（$-P = k_1 - p_1$）なので $\bar{v}\gamma_\mu u I_4^\mu = \frac{i}{(4\pi)^2}[-M(D_1 + D_2 + D_3)\bar{v}u + D_2\bar{v}\not{k}_1 u]$、$I_3^{(014)\mu} = \frac{i}{(4\pi)^2}(-p_1^\mu C_1^s + p_2^\mu C_2^s)$ なので $\bar{v}\gamma_\mu u I_3^{(014)\mu} = -\frac{i}{(4\pi)^2}M(C_1^s + C_2^s)\bar{v}u$、$I_3^{(134)} = \frac{i}{(4\pi)^2}C_0^M(s)$（$\ell \to \ell + p_1$ と移すと外線の不変量は k_1^2、k_2^2、s）である。まとめて $a = -y^4 M[(t - M^2)(D_1 + D_2 + D_3) - (C_1^s + C_2^s)]$、$b = y^4[m^2 D_0 + C_0^M(s) + (t - M^2)D_2]$ を得る。箱は紫外有限で、対抗項を持たない。

■ **λ の三角形。** $u(p_1)$ が $\phi(\ell)$ を、続いて $\phi(p_1 + p_2 - \ell)$ を出し、二つの ϕ が 4 点頂点で $\phi(k_1)\phi(k_2)$ になる。i の因子は $(-i\lambda)i^3 = -\lambda$ で、対称性因子は 1 である（4 点頂点の 4 本の線の付け方 4! と 1/4!、二つの湯川の頂点の入れ替え 2 と 1/2! が打ち消す）。分子は $\bar{v}\gamma^5(\not{p}_1 - \not{\ell} + M)\gamma^5 u = \bar{v}\not{\ell}u$ で、$\int \ell^\mu/(D_m(\ell)D_M(\ell - p_1)D_m(\ell - p_1 - p_2)) = -\frac{i}{(4\pi)^2}[p_1^\mu C_1^\lambda + (p_1 + p_2)^\mu C_2^\lambda]$、$\bar{v}(\not{p}_1 + \not{p}_2)u = 0$ から $i\mathcal{M} = -\lambda y^2 \cdot (-\frac{i}{(4\pi)^2})MC_1^\lambda \bar{v}u$、すなわち $a = \lambda y^2 M C_1^\lambda$、$b = 0$ である。

■ **対抗項。** 内線の自己エネルギーの対抗項 $i(\delta_\psi \not{p} - \delta_M)$ は、上の自己エネルギーの計算で V_ψ を置き換えたもの、すなわち $B_1 \to -\frac{(4\pi)^2}{y^2}\delta_\psi = \frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0 \to \frac{(4\pi)^2}{y^2 M}\delta_M = -\Delta_{\rm UV}$ で、自己エネルギーの極（B_1 の $-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0$ の $\Delta_{\rm UV}$）をちょうど打ち消す。頂点の対抗項は二つの頂点で木の振幅の $2\delta_y/y = 2y^2\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ 倍で、頂点の補正の極を打ち消す。こうして、式 (18) の積分を $\overline{\rm MS}$ の有限部分とした式が、繰り込まれた振幅になる。

■ **S 行列要素。** LSZ の簡約公式から、S 行列要素は、外線の運動量とスピノルを極質量で定めた振幅に $R_\psi^{1/2}$（外線のフェルミオン 1 本ごと）と $R_\phi^{1/2}$（外線の ϕ 1 本ごと）を掛けたものである。木の振幅を Dirac 方程式で整理する前の形 $\mathcal{M}_B^{(0)} = y^2\bar v[(M - \not{p}_1 + \not{k}_1)/(t - M^2) + (M - \not{p}_1 + \not{k}_2)/(u - M^2)]u$ に戻ると、$\overline{\rm MS}$ の質量 M は伝播関数と分子に現れ、外線のスピノルは $\not{p}_1 u = M_{\rm p} u$ を満たす。よって $(M - \not{p}_1)u = (M - M_{\rm p})u$ で、$\bar v \not{k}_2 u = -\bar v \not{k}_1 u$（$\bar v(\not{p}_1 + \not{p}_2)u = 0$ は極質量でも成り立つ）を使うと

$$\mathcal{M}_B^{(0)} = y^2(M - M_{\rm p})\Big[\frac{1}{t - M^2} + \frac{1}{u - M^2}\Big]\bar v u + y^2\Big[\frac{1}{t - M^2} - \frac{1}{u - M^2}\Big]\bar v \not{k}_1 u$$

である。伝播関数を $\frac{1}{t-M^2} = \frac{1}{t-M_{\rm p}^2} + \frac{M^2 - M_{\rm p}^2}{(t-M_{\rm p}^2)^2} + \cdots$ と展開し、式 (17) の $M_{\rm p} - M = My^2(B_0 + B_1)/(4\pi)^2$、$M^2 - M_{\rm p}^2 = -2M^2 y^2(B_0 + B_1)/(4\pi)^2$ を入れる。留数は $R_\psi R_\phi \mathcal{M}^{(0)} = \mathcal{M}^{(0)} + (\delta R_\psi + \delta R_\phi)\mathcal{M}^{(0)}$（$\delta R = R - 1$、式 (15)、(17)）で、$(4\pi)^2\delta R_\psi = y^2[B_1 + 2M^2(B_0' + B_1')](M^2)$、$(4\pi)^2\delta R_\phi = -2y^2[B_0^{MM} + m^2 B_0^{MM\prime}](m^2)$ である。これらを 1 ループの次数で集めると式 (20) を得る。μ 依存は、$\mu\,\partial(B_0 + B_1)/\partial\mu = 1$、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu = 2$、$\mu\,\partial B_1/\partial\mu = -1$ と式 (18) から、$\partial a/\partial \ln\mu = y^4 M[\frac{1}{t-M^2} + \frac{1}{u-M^2}]$、$\partial b/\partial\ln\mu = y^4\sum_x \sigma_x[\frac{2M^2}{(x-M^2)^2} - \frac{5}{x-M^2}]$ である。これに式 (20) の補正の μ 依存 $-y^4 M[\cdots]$、$(-y^2 - 4y^2)b^{(0)}$、$-2M^2y^4[\frac{1}{(t-M^2)^2} - \frac{1}{(u-M^2)^2}]$ を足すと、$\partial a_{\rm phys}/\partial\ln\mu = 0$、$\partial b_{\rm phys}/\partial\ln\mu = -10y^4\sum_x \sigma_x/(x - M^2) = -10y^2 b^{(0)}$ となる。

■ **ユニタリー性。** 付録 G と同じく $2\,{\rm Abs}\,\mathcal{M}(i \to f) = \sum_n \int {\rm d}\Phi_n\, \mathcal{M}(i \to n)\mathcal{M}^*(f \to n)$ で、y^4、$y^2\lambda$ の次数では中間状態は $\psi\bar\psi$ と $\phi\phi$ である（Abs は係数の関数 a、b の虚部をとったもの）。$\psi\bar\psi$ の中間状態は区別できる粒子なので因子 $\frac{1}{2}$ を持たず、中間状態のスピンについて和をとる。$\mathcal{M}_C$ は付録 F と同じ符号の規約（s チャンネルが $+$、t チャンネルが $-$）で、$\mathcal{M}(\phi\phi \to \psi_q\bar\psi_q) = y^2\bar u(q_1)[\not{k}_1/((q_1 - k_1)^2 - M^2) + \not{k}_2/((q_1 - k_2)^2 - M^2)]v(q_2)$ である。二つの振幅の状態の規約はそろえてある（Wick の縮約で $\bar v(p_2)\cdots u(p_1)$、$\bar u(q_1)\cdots v(q_2)$ が正の符号になる）。s チャンネルの項はトレース ${\rm tr}[(\not{q}_1 + M)\gamma^5(\not{q}_2 - M)\Gamma]$（$\Gamma$ はベクトル 2 つの線形結合）が 0 なので寄与しない。$\phi\phi$ の中間状態は $\mathcal{M}^*(\phi\phi \to \phi\phi) = -\lambda$ と同種粒子の $\frac{1}{2}$ を持つ。${\rm d}\Phi_2 = \frac{|\boldsymbol{q}|}{16\pi^2\sqrt{s}}{\rm d}\Omega_q$ を入れると式 (19) を得る。

付録 I　全断面積の式の導出

■ **次数の数え方。** λ を y^2 と同じ次数と数える。湯川の頂点（線 3 本）を V_3 個、4 点頂点を V_4 個、ループを L 個持つ図は、内線を $I = V_3 + V_4 - 1 + L$ 本持つので、外線の数は $E = 3V_3 + 4V_4 - 2I = V_3 + 2V_4 + 2 - 2L$ である。振幅の次数は $y^{V_3}\lambda^{V_4} \sim y^{V_3 + 2V_4} = y^{E - 2 + 2L}$ である。よって $2 \to 2$ の木の振幅は y^2、1 ループの振幅は y^4 の次数で、$|\mathcal{M}^{(0)}|^2$ は y^4、$2\,{\rm Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})$ は y^6 の次数である。木の振幅の 2 乗が y^6 の次数になるのは $E = 5$、すなわち $2 \to 3$ の過程だけである。始状態が $\phi\phi$ なので、フェルミオン数の保存から終状態は $\phi\phi\phi$ か $\phi\psi\bar\psi$ である。$\phi\phi\phi$ の図はフェルミオンの線を持たないので、木の図では $V_3 = 0$ で $E = 2V_4 + 2$ は偶数になり、5 にならない。よって木の図はなく、最初の寄与はフェルミオンの 5 角形のループ（$L = 1$、$V_3 = 5$、振幅は y^5）である。そのトレースは γ^5 を 5 個含み、${\rm tr}[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma] \propto \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ を通して 0 でなくなりうるが、断面積は y^{10} の次数である。$\phi\psi\bar\psi$ の木の図はフェルミオンの線を 1 本持ち、$(V_3, V_4) = (3, 0)$ または $(1, 1)$ である。以上から、y^6 の次数の全断面積は式 (21) の 5 項である。粒子はすべて質量を持つので赤外発散はなく、σ_3 は実放射の補正として 1 ループの項と打ち消し合うものではなく、それ自体で有限な新しい過程である。

■ **$2 \to 2$ の断面積。** 付録 F の流束 $4p\sqrt{s}$ と ${\rm d}\Phi_2 = \frac{p_f}{16\pi^2\sqrt{s}}{\rm d}\Omega$ から、${\rm d}\sigma/{\rm d}\Omega = \frac{S}{64\pi^2 s}\frac{p_f}{p}\sum|\mathcal{M}|^2$ である（p と p_f は始状態と終状態の運動量の大きさ、S は同種粒子の因子）。$\phi\phi \to \phi\phi$ では $S = \frac{1}{2}$、$p_f = p$ で、$|\mathcal{M}_{A,{\rm phys}}|^2 = \lambda^2 - 2\lambda\,{\rm Re}\,\mathcal{M}_{A,{\rm phys}}^{(1)} + O(y^8)$ を入れると、$\sigma_A^{(0)} = \lambda^2/(32\pi s)$ と式 (21) の $\sigma_A^{(1)}$ を得る。$\phi\phi \to \psi\bar\psi$ では、始状態の ϕ はスピンを持たず、終状態の ψ と $\bar\psi$ は区別できるので、平均の因子も S も付かず、$p_f = p_\psi$ である。

■ **時間反転。** ϕ を擬スカラーとして $\phi(t,\boldsymbol{x}) \to -\phi(t,-\boldsymbol{x})$（パリティ）、$\phi(t,\boldsymbol{x}) \to -\phi(-t,\boldsymbol{x})$（時間反転）と変換すると、$\bar\psi i\gamma^5\psi$ はパリティと時間反転のどちらでも符号を変える [5] ので、y と λ が実のとき式 (1) は両方の変換で不変である。積 PT は反ユニタリーで、運動量を変えずにスピンだけを反転させ、始状態と終状態を入れ替える。よって $\mathcal{M}(i\to f)$ と、スピンを反転させた $\mathcal{M}(f\to i)$ の絶対値は等しい。これは振幅全体についての関係で、結合の各次数で成り立つので、木の振幅どうし、1 ループの振幅どうしの関係としても成り立つ。スピンについて和をとると、同じ運動量で $\sum|\mathcal{M}^{(0)}(\phi\phi\to\psi\bar\psi)|^2 = \sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2$、$\sum 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})(\phi\phi\to\psi\bar\psi) = \sum 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_B^{(0)*}\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}}^{(1)})$ である。和の中の振幅の積は $\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}$ の形なので、全体の位相の取り方によらない。(s,t,u) は両方の過程で同じ運動量から作るので、t は ψ と 1 番目の ϕ の運動量の差の 2 乗である。$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ のスピン和は、$(4\pi)^2\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}}^{(1)} = a_{\mathrm{phys}}\bar v u + b_{\mathrm{phys}}\bar v \not{k}_1 u$（式 (20)）と、手順 (5) のスピン和 $\sum(\bar v\not{k}_1 u)^*\bar v u = 2M(t-u)$、$\sum|\bar v\not{k}_1 u|^2 = 2[(t-M^2)(u-M^2)-m^4]$ から

$$\sum 2\,\mathrm{Re}\big(\mathcal{M}_B^{(0)*}\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}}^{(1)}\big) = \frac{2b^{(0)}}{(4\pi)^2}\Big\{2M(t-u)\,\mathrm{Re}\,a_{\mathrm{phys}} + 2\big[(t-M^2)(u-M^2)-m^4\big]\mathrm{Re}\,b_{\mathrm{phys}}\Big\}$$

である。$b^{(0)}$ は実である。

■ **$2\to3$ の振幅。** フェルミオンの線を $\bar u(q_1)$ から $v(q_2)$ に向かって書く。三つの ϕ がこの順に $\sigma(1)$、$\sigma(2)$、$\sigma(3)$ 番目として付くとき、$\bar u(q_1)$ に最も近い伝播関数の運動量は、頂点での運動量の保存から $r_1 = q_1 + a_{\sigma(1)}$、次の伝播関数の運動量は $r_2 = r_1 + a_{\sigma(2)}$ である（入ってくる ϕ の運動量 p_i は、出ていく運動量 $-p_i$ として数える）。頂点の因子 $y\gamma^5$ と伝播関数 $i(\not{r}+M)/(r^2-M^2)$ から、図の値は

$$\bar u(q_1)\,y\gamma^5\frac{i(\not{r}_1+M)}{r_1^2-M^2}\,y\gamma^5\frac{i(\not{r}_2+M)}{r_2^2-M^2}\,y\gamma^5 v(q_2) = -y^3\,\bar u(q_1)\frac{(M-\not{r}_1)(\not{r}_2+M)}{(r_1^2-M^2)(r_2^2-M^2)}\gamma^5 v(q_2)$$

である。$\gamma^5\not{r}_1 = -\not{r}_1\gamma^5$ と $(\gamma^5)^2=1$ から $\gamma^5(\not{r}_1+M)\gamma^5 = M-\not{r}_1$ とした。付く順番は $3!=6$ 通りある。フェルミオンの線は 1 本なので、図どうしの間にフェルミオンの入れ替えの符号はない。4 点頂点の図では、$\phi(p_1)$、$\phi(p_2)$、$\phi(k)$ と内線の ϕ が 4 点頂点に付き、内線の ϕ（運動量 q_1+q_2）がフェルミオンの線に付く。図の値は $\bar u(q_1)\,y\gamma^5 v(q_2)\cdot\frac{i}{(q_1+q_2)^2-m^2}\cdot(-i\lambda) = \lambda y\,\bar u(q_1)\gamma^5 v(q_2)/((q_1+q_2)^2-m^2)$ である。4 本の線はすべて区別できるので、4 点頂点の 4! 通りの付け方が 1/4! と打ち消し合い、対称性因子はどの図も 1 である。和をとると式 (22) を得る。外線のスピンの和は $\sum u\bar u = \not{q}_1 + M$、$\sum v\bar v = \not{q}_2 - M$ と $(\bar u\Gamma v)^* = \bar v\bar\Gamma u$ から $\sum|\bar u\Gamma v|^2 = \mathrm{tr}[(\not{q}_1+M)\Gamma(\not{q}_2-M)\bar\Gamma]$ である。

■ **伝播関数の分母。** 質量 M、m の未来向きの時間的な運動量 q、p では、p の静止系で $q\cdot p = mE_q \ge mM$ である。よって、外の ϕ の運動量を k、入ってくる ϕ の運動量を p_i とすると、$(q_1+k)^2 = M^2+m^2+2q_1\cdot k \ge (M+m)^2$、$(q_1-p_i)^2 = M^2+m^2-2q_1\cdot p_i \le (M-m)^2$ で、$r_1^2-M^2$ は $\ge m^2+2mM>0$ か $\le m^2-2mM<0$ である。後者は $m<2M$、すなわち ϕ が $\psi\bar\psi$ に崩壊できないことを使った。$r_2 = q_1+a_{\sigma(1)}+a_{\sigma(2)} = -(q_2+a_{\sigma(3)})$ なので、$r_2^2-M^2$ も同じ評価を満たす。ϕ の伝播関数の分母は $(q_1+q_2)^2-m^2 \ge 4M^2-m^2>0$ である。したがって、物理的な領域で分母は 0 にならない。ただし、ψ または $\bar\psi$ が始状態の ϕ の向きに出ると $|(q_1-p_i)^2-M^2|$ は小さくなり、高いエネルギーでは $\sum|\mathcal{M}_3|^2$ はそこで高い山を持つ。

■ **位相空間。** 終状態の 3 粒子は区別できるので、$\sigma_3 = \frac{1}{4p\sqrt{s}}\int\mathrm{d}\Phi_3\sum|\mathcal{M}_3|^2$ である。$\mathrm{d}\Phi_3 = (2\pi)^4\delta^4(P-k_s-a-b)\prod\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3 2E}$（$k_s$ を「単独の粒子」、a、b を「対」と呼ぶ）に $1 = \int\mathrm{d}^4Q\,\delta^4(Q-a-b)$ を入れ、$\mathrm{d}^4Q = \mathrm{d}^3Q\,\mathrm{d}Q^2/(2Q^0)$ と書くと

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \mathrm{d}\Phi_2(P;k_s,Q)\,\frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;a,b),\qquad \mathrm{d}\Phi_2(P;k_s,Q) = \frac{|\boldsymbol{k}_s|}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega,\qquad \mathrm{d}\Phi_2(Q;a,b) = \frac{p^*}{16\pi^2\sqrt{Q^2}}\mathrm{d}\Omega^*$$

である（$(2\pi)^4\cdot\frac{1}{(2\pi)^3}\cdot\frac{1}{2\pi}=1$ で因子がそろう）。$\mathrm{d}\Omega$ は重心系の k_s の向き、$\mathrm{d}\Omega^*$ は対の静止系での a の向き、p^* はそこでの a の運動量の大きさで、$\mathrm{d}\Phi_2$ は Lorentz 不変なので a、b はそれぞれの静止系で作って重心系へ boost してよい。$\mathrm{d}\Omega^*$ の軸を重心系の軸と平行にとると、終状態全体をビームの軸のまわりに回すことは k_s の方位角と a の方位角を同じだけずらすことなので、$\sum|\mathcal{M}_3|^2$ が不変であることから k_s の方位角の積分は 2π を与え、$\frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}$ の 2π と打ち消し合う。Q^2 は $[(m_a+m_b)^2,(\sqrt{s}-m_s)^2]$ を動き、両端で p^* と $|\boldsymbol{k}_s|$ がそれぞれ平方根で 0 になるので、

$Q^2 = Q^2_{\min} + (Q^2_{\max} - Q^2_{\min})(1-\cos v)/2$（$0 \le v \le \pi$）と置く。$Q^2 - Q^2_{\min} \propto \sin^2(v/2)$、$Q^2_{\max} - Q^2 \propto \cos^2(v/2)$、$\mathrm{d}Q^2 \propto \sin v\,\mathrm{d}v$ なので、被積分関数は v について滑らかになる。

■ **前方の山の変換。** 単独の粒子がフェルミオン（エネルギー E_q、運動量の大きさ q）のとき、$E = \sqrt{s}/2$ として $(q-p_1)^2 - M^2 = m^2 - 2(EE_q - pqc) = -2pq(A-c)$、$A = (2EE_q - m^2)/(2pq)$ である（$c = \cos\theta$）。前の段落の評価から $A > 1$ である。$c \in [0,1]$ で $c = A - e^u$ と置くと $\mathrm{d}c = -e^u\mathrm{d}u = -(A-c)\mathrm{d}u$ なので、$1/(A-c)$ の山は u について平らになる。$c \in [-1,0]$ では、p_2 の向きの山について $c = -(A-e^u)$ とする。$2 \to 2$ の $\phi\phi \to \psi\bar\psi$ でも、$t - M^2 = m^2 - 2(E^2 - pp_\psi c) = -2pp_\psi(A-c)$、$A = (2E^2 - m^2)/(2pp_\psi)$、$u - M^2 = -2pp_\psi(A+c)$ で、同じ変換が使える。$\sum|\mathcal{M}_3|^2$ には ψ の山と $\bar\psi$ の山があり、一つの変数の取り方では両方を平らにできない。そこで $g(q) \equiv \sum_{i=1,2} 1/|(q-p_i)^2 - M^2|$ として、恒等式

$$\sum|\mathcal{M}_3|^2 = \sum|\mathcal{M}_3|^2\,\frac{g(q_1)}{g(q_1)+g(q_2)} + \sum|\mathcal{M}_3|^2\,\frac{g(q_2)}{g(q_1)+g(q_2)}$$

で二つに分け、第 1 項は ψ を、第 2 項は $\bar\psi$ を単独の粒子として積分する。第 1 項は $\bar\psi$ の山では $g(q_2)$ が大きいので重みで抑えられ、主に ψ の山だけを持つ（第 2 項も同様）。

■ **モンテカルロの検算の位相空間。** ϕ を単独の粒子、$\psi\bar\psi$ を対とし、$m_{12}^2 = Q^2 = (q_1+q_2)^2$、$m_{23}^2 = (q_2+k)^2$ と置く。対の静止系で m_{23}^2 は $\cos\theta^*$（q_2 と k のなす角）の 1 次式で、$|\mathrm{d}m_{23}^2/\mathrm{d}\cos\theta^*| = 2p^*|\boldsymbol{k}^*|$ である（$|\boldsymbol{k}^*|$ はそこでの k の運動量の大きさ）。$|\boldsymbol{k}^*|m_{12} = |\boldsymbol{k}|\sqrt{s}$（どちらも $\lambda^{1/2}(s, m_{12}^2, m^2)/2$）を使うと

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{\mathrm{d}m_{12}^2}{2\pi}\,\frac{|\boldsymbol{k}|\,\mathrm{d}\Omega}{16\pi^2\sqrt{s}}\,\frac{p^*\,\mathrm{d}\phi^*\,\mathrm{d}m_{23}^2}{16\pi^2 m_{12}\cdot 2p^*|\boldsymbol{k}^*|} = \frac{\mathrm{d}m_{12}^2\,\mathrm{d}m_{23}^2}{1024\pi^5 s}\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\phi^*$$

である。(m_{12}^2, m_{23}^2) を固定すると終状態の 3 つの運動量は重心系で形の決まった三角形になり、$\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\phi^*$（体積 $8\pi^2$）はその向きを一様に回す回転の積分である。よって、Dalitz の領域で (m_{12}^2, m_{23}^2) を一様に、向きを一様な回転で選ぶと、$\mathrm{d}\Phi_3 = \mathrm{d}m_{12}^2\,\mathrm{d}m_{23}^2/(128\pi^3 s) \times$ (向きの平均) である。

付録 J　γ^5 の処方の違いの導出

■ **BMHV の処方。** D 次元の γ^μ を 4 次元の部分と $D-4$ 次元の部分に $\gamma^\mu = \bar\gamma^\mu + \hat\gamma^\mu$ と分ける。BMHV の処方では、γ^5 は $\bar\gamma^\mu$ と反可換、$\hat\gamma^\mu$ と可換である。ループ運動量 $q = \bar q + \hat q$ について $\gamma^5\not{q}\gamma^5 = -\not{\bar q}\gamma^5\gamma^5 + \not{\hat q}\gamma^5\gamma^5 = -\not{\bar q} + \not{\hat q}$ なので、$\gamma^5(\not{q}+M)\gamma^5 = -\not{q} + M + 2\not{\hat q}$（$a = q+$ 外線の運動量、外線の運動量は 4 次元）となる。NDR の $-\not{q}+M$ との違いは $2\not{\hat q}$ である。

■ **積分の規則。** 外線の運動量が 4 次元なので、$\hat q$ を含む積分は $\hat g^{\mu\nu}$（$D-4$ 次元の計量、$\hat g^\mu{}_\mu = D-4$）でしか表せない。よって $\int \hat q^\mu f = 0$、$\int \hat q^\mu \bar q^\nu f = 0$ で、$\int \hat q^2 f$ はテンソル積分 $\int q^\mu q^\nu f$ の $g^{\mu\nu}$ の係数の $(D-4)$ 倍になる。この係数が紫外の極 c/ϵ を持つと、$(D-4)c/\epsilon = -2c$ が有限に残る。極を持たなければ、$\epsilon \to 0$ で 0 になる。したがって、差は紫外で最も発散の強い項だけから決まり、運動量と質量の多項式になる。以下、$(4\pi)^2$ と i の因子は括弧の単位に含める。必要な極は、Feynman のパラメータで分母を $(\ell^2 - \Delta)^n$ にまとめて

$$\int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{\ell^\mu\ell^\nu}{(\ell^2-\Delta)^2}\Big|_{\rm pole} = \frac{i}{(4\pi)^2}\frac{g^{\mu\nu}\Delta}{2\epsilon}, \qquad \int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{\ell^\mu\ell^\nu}{(\ell^2-\Delta)^3}\Big|_{\rm pole} = \frac{i}{(4\pi)^2}\frac{g^{\mu\nu}}{4\epsilon}$$

である。2 点積分では $\Delta = M^2 - x(1-x)p^2$ を x で積分して、$g^{\mu\nu}$ の係数 B_{00} の極は $\frac{1}{2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta = \frac{6M^2-p^2}{12\epsilon}$、3 点積分では Feynman のパラメータの因子 $2\int \mathrm{d}F = 1$ から C_{00} の極は $\frac{1}{4\epsilon}$ である。

■ **V_ϕ。** FeynArts の運動量のとり方で、トレースは NDR で $\mathrm{tr}[(M-\not{q})(M-\not{p}+\not{q})] = 4(M^2 + p\cdot q - q^2)$、BMHV で $\mathrm{tr}[(M-\not{q})(M-\not{p}+\not{\bar q}-\not{\hat q})] = 4(M^2 + p\cdot q - \bar q^2 + \hat q^2)$ である（$q\cdot\bar q = \bar q^2$、$q\cdot\hat q = \hat q^2$）。差は $8\hat q^2$ で、$\Delta V_\phi = y^2\int 8\hat q^2/(D_M(q)D_M(q-p)) = 8y^2\frac{i}{(4\pi)^2}(D-4)B_{00} \to 8y^2\frac{i}{(4\pi)^2}(-2)\frac{6M^2-p^2}{12}$、すなわち $\Delta b_\phi = \frac{4}{3}y^2(p^2-6M^2)$ である。

■ **V_ψ。** $\gamma^5(\not{q}+M)\gamma^5$ の違いは $2\not{\hat q}$ で、$\hat q$ の 1 次なので積分すると 0 になる。$\Delta b_\psi = 0$ である。

■ V_y。 分子 $\gamma^5(\not{k}+\not{q}+M)\gamma^5(\not{q}+M)\gamma^5$ の違いは $2\hat{q}(M+\not{q})\gamma^5$ である。$\hat{q}$ の 1 次の項 $2M\hat{q}\gamma^5$ と $2\hat{q}\bar{q}\gamma^5$ は積分で 0 になり、$2\hat{q}\hat{q}\gamma^5 = 2\hat{q}^2\gamma^5$ だけが残る。その積分は $2(D-4)C_{00} \to 2(-2)\frac{1}{4} = -1$（$\frac{i}{(4\pi)^2}$ を単位として）である。$V_y = -iy^3\int(\cdots)$ なので $\Delta V_y = -iy^3\frac{i}{(4\pi)^2}(-1)\gamma^5 = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}\gamma^5$、すなわち $\Delta b_y = -y^3$ である。

■ V_4。 箱のトレースの 1 番目と 3 番目の伝播関数が γ^5 に挟まれるので、BMHV のトレースは $\mathrm{tr}[(A_1+\delta)B_2(A_3+\delta)B_4]$ と書ける（$A_i = M-\not{k}_i$、$B_i = M+\not{k}_i$、$\delta = 2\hat{q}$）。NDR との差は $\mathrm{tr}[\delta B_2 A_3 B_4]+\mathrm{tr}[A_1 B_2 \delta B_4]+\mathrm{tr}[\delta B_2 \delta B_4]$ で、紫外で効くのは q の 4 次の項だけである（$k_i \to q$ としてよい）。それぞれ $-2\,\mathrm{tr}[\hat{q}\not{q}\not{q}\not{q}] = -8q^2\hat{q}^2$、$-2\,\mathrm{tr}[\not{q}\not{q}\hat{q}\not{q}] = -8q^2\hat{q}^2$、$4\,\mathrm{tr}[\hat{q}\not{q}\hat{q}\not{q}] = 16(2\hat{q}^4 - q^2\hat{q}^2)$ で、和は $-32q^2\hat{q}^2 + 32\hat{q}^4$ である。対称な積分で $\hat{q}^2 \to \frac{D-4}{D}q^2$、$\hat{q}^4 \to \frac{(D-4)(D-2)}{D(D+2)}q^4$（$\int q^\mu q^\nu q^\rho q^\sigma \propto g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} + g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}$ を $\hat{g}_{\mu\nu}\hat{g}_{\rho\sigma}$ で縮約）なので、差は $(D-4)\big[-\frac{32}{D} + \frac{32(D-2)}{D(D+2)}\big]q^4 \to (D-4)(-\frac{16}{3})q^4$ である。$\int q^4/(q^2-M^2)^4$ の極は $\frac{i}{(4\pi)^2}\frac{1}{\epsilon}$ なので、一つの図の差は $-y^4\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}(-2)(-\frac{16}{3}) = -\frac{32}{3}\frac{iy^4}{(4\pi)^2}$、6 つの図で $-64\frac{iy^4}{(4\pi)^2}$、すなわち $\Delta b_4 = -64y^4$ である。ϕ の泡の 3 つの図は γ^5 を含まないので差がない。

■ R2 の項。 同じ方法で、MadLoop が使う R2 の項も手で求められる。MadLoop はループの分子を 4 次元で作るので、D 次元の分子（NDR）との差 $\hat{q}$ の項を R2 の頂点として加える必要がある。V_ϕ では、NDR のトレース $4(M^2+p\cdot q-q^2)$ と 4 次元のトレース $4(M^2+p\cdot\bar{q}-\bar{q}^2)$ の差は $-4\hat{q}^2$ で（$p\cdot q = p\cdot\bar{q}$）、$y^2\int(-4\hat{q}^2)/(D_M D_M) = -4y^2\frac{i}{(4\pi)^2}(D-4)B_{00} \to \frac{i}{(4\pi)^2}\frac{2}{3}y^2(6M^2-p^2)$、すなわち R2 の頂点は $iy^2(6M^2-p^2)/(24\pi^2)$ である。V_y では、分子 $M^2 - M\not{k} - \not{k}\not{q} - q^2$ の 4 次元版との差は $-\not{k}\hat{q} - \hat{q}^2$ で、$-\hat{q}^2$ だけが残り、$-iy^3\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}(-(D-4)C_{00})\gamma^5 \to \frac{y^3}{2(4\pi)^2}\gamma^5 = \frac{y^3}{32\pi^2}\gamma^5$ である。V_4 では、箱のトレースの q^4 の項が NDR で $4q^4 = 4(\bar{q}^2+\hat{q}^2)^2$、4 次元で $4\bar{q}^4$ で、差 $8\bar{q}^2\hat{q}^2 + 4\hat{q}^4 = 8q^2\hat{q}^2 - 4\hat{q}^4 \to (D-4)[\frac{8}{D} - \frac{4(D-2)}{D(D+2)}]q^4 \to (D-4)\frac{5}{3}q^4$ から、一つの図は $-y^4\frac{i}{(4\pi)^2}(-2)\frac{5}{3}$、6 つの図で $\frac{20iy^4}{(4\pi)^2} = \frac{5}{4}\frac{iy^4}{\pi^2}$ である。

付録 K　繰り込み群の検算の導出

■ 条件。 物理量 P を、パラメータ $g_i(\mu)$（質量と結合）と μ の関数として $P = P^{(0)}(g) + \mathcal{Y}(g,\mu)$ と書く。$\mathcal{Y}$ は 1 ループの部分で、μ には $\ln\mu$ を通してのみ依存する。$\mathrm{d}g_i/\mathrm{d}\ln\mu \equiv \beta_i$（質量では $\gamma_m = \mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_M = \mathrm{d}M/\mathrm{d}\ln\mu$）として

$$0 = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\ln\mu} = \sum_i \frac{\partial P^{(0)}}{\partial g_i}\beta_i + \frac{\partial\mathcal{Y}}{\partial\ln\mu} + \sum_i \frac{\partial\mathcal{Y}}{\partial g_i}\beta_i$$

である。最後の項は $\mathcal{Y}$ と β_i がどちらも 1 ループの次数なので 2 ループの次数で、1 ループの次数では $\partial\mathcal{Y}/\partial\ln\mu = -\sum_i(\partial P^{(0)}/\partial g_i)\beta_i$ となる。

■ $\phi\phi \to \phi\phi$。 $P^{(0)} = -\lambda$ なので $\partial\mathcal{Y}_A/\partial\ln\mu = \beta_\lambda$ である。$\mathcal{Y}_A = \mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}} + \lambda$（式 (16)）で、1 ループの項の中の m と m_p の違いは高次である。パラメータを固定すると μ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の A_0、B_0、B_1 の $\ln\mu^2$ を通してのみ入り、$\partial A_0(x)/\partial\ln\mu = 2x$、$\partial B_0/\partial\ln\mu = 2$、$\partial B_1/\partial\ln\mu = -1$ である（C_0、D_0 は紫外で有限で、μ によらない）。式 (13) では、泡が $\frac{\lambda^2}{2}\cdot 3\cdot 2 = 3\lambda^2$ を、各 $\mathcal{F}(x,x')$ が $2(2+2) = 8$ を与えて箱が $-2y^4\cdot 3\cdot 8 = -48y^4$ を、留数の項 $4\lambda y^2 B_0^{MM}$ が $8\lambda y^2$ を与える。和は $(4\pi)^2\beta_\lambda$ である。

■ $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$。 (i) $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量で書く。式 (20) の木の値 $b^{(0)}(M_\mathrm{p})$ を $b^{(0)}(M_\mathrm{p}) = b^{(0)}(M) + (\partial b^{(0)}/\partial M)(M_\mathrm{p} - M) + O(y^6)$ と展開する。$X = t - M^2$、$W = u - M^2$（t、u は外線の運動学で決まる）として $\partial b^{(0)}/\partial M = 2My^2(1/X^2 - 1/W^2)$ なので、$(4\pi)^2(\partial b^{(0)}/\partial M)(M_\mathrm{p} - M) = 2M^2y^4[B_0 + B_1](M^2)(1/X^2 - 1/W^2)$ で、これは b_phys の第 3 項とちょうど打ち消し合う。よって

$$(4\pi)^2\mathcal{M}_{B,\mathrm{phys}} = (4\pi)^2 b^{(0)}(M)\,\bar{v}\not{k}_1 u + a_\mathrm{phys}\,\bar{v}u + \big[b + (4\pi)^2(\delta R_\psi + \delta R_\phi)b^{(0)}\big]\bar{v}\not{k}_1 u$$

で、$\bar{v}\not{k}_1 u$ の木の値は $(4\pi)^2 b^{(0)}(M,y)$、$\bar{v}u$ の木の値は 0 である。$\partial b^{(0)}/\partial y = 2b^{(0)}/y$ と上の $\partial b^{(0)}/\partial M$ から式 (24) を得る。式 (8) を入れた右辺は $-10y^2 b^{(0)} + 2M^2y^4(1/X^2 - 1/W^2)$ である。左辺は、付録 H の $\partial b/\partial\ln\mu = y^4\sum_x \sigma_x[2M^2/(x-M^2)^2 - 5/(x-M^2)] = 2M^2y^4(1/X^2 - 1/W^2) - 5y^2b^{(0)}$ と、$(4\pi)^2\partial(\delta R_\psi + \delta R_\phi)/\partial\ln\mu = -y^2 - 4y^2$（$B'$ は μ によらない）の和で、右辺と一致する。$\partial a_\mathrm{phys}/\partial\ln\mu = 0$ は付録 H で示した。(ii) 極質量で書

くと、$\mathcal{Y}_b = b_{\rm phys}$ の傾きは $-10y^2 b^{(0)} = -(4\pi)^2(2b^{(0)}/y)\beta_y$ で、γ_M の項はない。

■ **干渉での当てはめ。** MadLoop の有限部分は、手順 (5) と同じく $F = \frac{1}{4}\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)} = \frac{b^{(0)}}{4(4\pi)^2}[2M(t-u)\,\mathrm{Re}\,\mathcal{Y}_a + 2(XW-m^4)\,\mathrm{Re}\,\mathcal{Y}_b]$ である（$\frac{1}{4} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2$ は始状態のスピンの平均、同種粒子の因子、2 Re）。$\mathcal{Y}_a$ の傾きは 0 なので、F の傾きは $\frac{b^{(0)}(XW-m^4)}{2(4\pi)^2}$ に $\mathcal{Y}_b$ の傾きを掛けたもので、(β_y, γ_M) の 1 次式である。6 点の傾きから最小二乗で二つを決めた。a、b を別々に持つツール（FeynCalc、COLLIER）では、$\mathcal{Y}_a$ の傾きが 0 であることも確かめた。

■ **極質量。** $m_{\rm p}^2 = m^2 + \Sigma_\phi(m_{\rm p}^2) = m^2 + \Sigma_\phi(m^2) + O(y^4)$ が μ によらないことから、1 ループの次数で $\gamma_m + \partial\Sigma_\phi(m^2)/\partial\ln\mu = 0$ である。式 (15) の $(4\pi)^2\Sigma_\phi(m^2) = -[2y^2(m^2 B_0^{MM}(m^2) - 2A_0(M^2)) + \frac{\lambda}{2}A_0(m^2)]$ に上の微分を入れると $-[2y^2(2m^2-4M^2)+\lambda m^2] = -(4\pi)^2\gamma_m$ で、式 (8) と一致する。$M_{\rm p} = M[1+\Sigma_V(M^2)+\Sigma_S(M^2)]$、$(4\pi)^2(\Sigma_V+\Sigma_S) = y^2[B_1+B_0](M^2)$ からは、$\gamma_M + My^2(-1+2)/(4\pi)^2 = 0$ を得る。

■ **傾きの求め方。** パラメータを固定すると、$\mathcal{Y}$ の μ 依存は $\ln\mu^2$ の 1 次の項だけなので、$\mathcal{Y}(\mu) = \mathcal{Y}(m) + c\ln(\mu/m)$ が厳密に成り立つ。よって傾きは $[\mathcal{Y}(2m) - \mathcal{Y}(m/2)]/(2\ln 2)$ で、$\mathcal{Y}(m)$ は両端の平均に等しい。

■ **1 ループの解と残り。** $t \equiv \ln(\mu/m)$ とする。$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t = 10y^4/(4\pi)^2$ から $y^2(t) = y^2/(1-10y^2t/(4\pi)^2)$、$\lambda(t)$ は式 (9)、$\mathrm{d}M/\mathrm{d}t = -y^2M/(4\pi)^2$ と $\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t$ の比 $\mathrm{d}\ln M/\mathrm{d}y^2 = -1/(10y^2)$ から $M(t) = M\,(y^2(t)/y^2)^{-1/10}$ である。木の値を走るパラメータで、$\mathcal{Y}$ を固定したパラメータで評価すると、$P(t) - P(0) = [P^{(0)}(t) - P^{(0)}(0)] + \mathcal{Y}'t$ で、$\mathcal{Y}' = -\dot{P}^{(0)}(0)$ なので 1 次の項は消え、$P(t) - P(0) = \frac{1}{2}\ddot{P}^{(0)}t^2 + O(t^3)$ が残る。t と $-t$ の平均では奇数次が消え、$\frac{1}{2}\ddot{P}^{(0)}t^2 + O(t^4)$ になる。$\phi\phi \to \phi\phi$ では $P^{(0)} = -\lambda$、$\ddot{\lambda} = (\partial\beta_\lambda/\partial\lambda)\beta_\lambda + (\partial\beta_\lambda/\partial y)\beta_y$ で、基準点では $(4\pi)^4\ddot{\lambda} = (6\lambda+8y^2)(3\lambda^2+8\lambda y^2-48y^4) + (16\lambda y - 192y^3)\cdot 5y^3 = -1398$ である。$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の $\ddot{P}^{(0)}$ は、走るパラメータで書いた木のスピン和 $b^{(0)2}\sum|\bar{v}\not{k}_1 u|^2$ を差分で 2 回微分して求めた。

■ **bounce の作用の目安。** 質量を無視し、$\lambda < 0$ を定数とすると、Euclid の運動方程式 $\phi'' + 3\phi'/r = V'(\phi) = -(|\lambda|/6)\phi^3$ は $\phi = \sqrt{48/|\lambda|}\,R/(r^2+R^2)$ を解に持つ（大きさ R は任意）。$A^2 \equiv 48/|\lambda|$、$\phi' = -2ARr/(r^2+R^2)^2$ と $\int_0^\infty u^2(u+R^2)^{-4}\mathrm{d}u = 1/(3R^2)$、$\int_0^\infty u(u+R^2)^{-4}\mathrm{d}u = 1/(6R^4)$（$u = r^2$）から、運動項は $2\pi^2\int r^3\frac{1}{2}\phi'^2\mathrm{d}r = \frac{2}{3}\pi^2A^2 = 32\pi^2/|\lambda|$、ポテンシャルの項は $-\frac{|\lambda|}{24}2\pi^2\int r^3\phi^4\mathrm{d}r = -|\lambda|\pi^2A^4/144 = -16\pi^2/|\lambda|$ で、作用は $S = 16\pi^2/|\lambda|$ である。これは $V = -g\phi^4/4$ の規約の $8\pi^2/(3g)$ で $g = |\lambda|/6$ としたものである。R によらないのは質量のない理論のスケール不変性のためで、λ が走ると、$\lambda(1/R)$ が最も負になる R の bounce が崩壊率を決める。質量、λ の走り、前因子を入れた崩壊率は手順 (9)、(10) で求める。

■ **一般の公式。** 実のスカラー場 ϕ_a と 2 成分のフェルミオン ψ_i の理論を

$$\mathcal{L} \supset -\tfrac{1}{2}\big(Y^a_{ij}\phi_a\psi_i\psi_j + m_{ij}\psi_i\psi_j + \mathrm{h.c.}\big) - \tfrac{1}{2}m^2_{ab}\phi_a\phi_b - \tfrac{1}{4!}\lambda_{abcd}\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d$$

と書く。2 成分のフェルミオンでは $\kappa = \frac{1}{2}$ である。Machacek と Vaughn [6, 7, 8] の 1 ループの公式は、$(4\pi)^2$ を掛けて、$Y_2(F) = Y^{b\dagger}Y^b$、$Y_2(S)_{ab} = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(Y^{a\dagger}Y^b + Y^{b\dagger}Y^a)$ として

$$\gamma^S_{ab} = 2\kappa\,Y_2(S)_{ab}, \qquad \gamma^F = \tfrac{1}{2}Y_2(F),$$
$$\beta_{Y^a} = \tfrac{1}{2}\big[Y_2(F)^T Y^a + Y^a Y_2(F)\big] + 2Y^bY^{a\dagger}Y^b + 2\kappa\,Y^b\,\tfrac{1}{2}\mathrm{tr}(Y^{b\dagger}Y^a + Y^{a\dagger}Y^b),$$
$$\beta_{\lambda_{abcd}} = \Lambda^2_{abcd} - 8\kappa H_{abcd} + 2\kappa\Lambda^Y_{abcd},$$
$$\Lambda^2_{abcd} = \tfrac{1}{8}\sum_{\rm perm}\lambda_{abef}\lambda_{efcd}, \qquad H_{abcd} = \tfrac{1}{4}\sum_{\rm perm}\mathrm{tr}(Y^aY^{b\dagger}Y^cY^{d\dagger}),$$
$$\Lambda^Y_{abcd} = \sum_i Y_2(S)_{ai}\lambda_{ibcd} + (b,c,d)$$

である（和 $\sum_{\rm perm}$ は $abcd$ の 4! 通りの並べ替え）。質量は、伝播しないダミーのスカラー場 d を $\phi_d = 1$ と置いて結合とみなす [9]。フェルミオンの質量は d の湯川結合 $Y^d = m$ で、β_m は β_{Y^a} の外のスカラーの位置に m を入れたものである。スカラーの質量は λ_{abdd} で、4! 通りの並べ替えのうち二つの d の位置の選び方 $\binom{4}{2} = 6$ 通りから $\frac{6}{4!}\lambda_{\phi\phi dd}\phi^2 = \frac{1}{2}m^2\phi^2$、すなわち $\lambda_{\phi\phi dd} = 2m^2$、$\beta_{m^2} = \frac{1}{2}\beta_{\lambda_{\phi\phi dd}}$ である。どちらでも、内線のスカラーの和は伝播する ϕ だけでとり、ダミーの外線には異常次元を付けない。

カイラル表示 ($\gamma^5=\mathrm{diag}(-1,1)$) で $\psi=(\chi,\eta^\dagger)$ とすると $\bar\psi=(\eta,\chi^\dagger)$、$\bar\psi\psi=\eta\chi+\chi^\dagger\eta^\dagger$、$\bar\psi\gamma^5\psi=-\eta\chi+\chi^\dagger\eta^\dagger$ なので、$-M\bar\psi\psi-iy\phi\bar\psi\gamma^5\psi$ は基底 (χ,η) で $m=M\sigma_1$、$Y=-iy\sigma_1$ を与える ($-iy\phi\cdot(-\eta\chi)=-\frac12(-iy)\phi(\chi\eta+\eta\chi)$、エルミート共役の項は $Y^*=iy$)。これを入れる。$Y^\dagger Y=y^2\mathbf{1}$ から $Y_2(F)=y^2\mathbf{1}$、$Y_2(S)=2y^2$ で、$\gamma_\phi=2y^2$、$\gamma_\psi=y^2/2$ である。β_Y は $y^2Y+2y^2Y+2y^2Y=5y^2Y$ で $\beta_y=5y^3$ である。β_m は、$\frac12(y^2m+my^2)=y^2m$、$2Ym^\dagger Y=2(-iy)^2M\sigma_1=-2y^2m$、トレースの項 $Y\cdot\frac12\mathrm{tr}(Y^\dagger m+m^\dagger Y)=Y\cdot\frac12(2iyM-2iyM)=0$ の和 $-y^2m$ で、$\gamma_M=-y^2M$ である。β_λ は $\Lambda^2=\frac18\cdot24\lambda^2=3\lambda^2$、$H=\frac14\cdot24\cdot\mathrm{tr}(YY^\dagger YY^\dagger)=12y^4$、$\Lambda^Y=4\cdot2y^2\lambda$ から $3\lambda^2-48y^4+8\lambda y^2$ である。$\beta_{\lambda_{\phi\phi dd}}$ では、Λ^2 のうち $(\phi\phi)(dd)$ の組の項が $\lambda\cdot2m^2$ を与え、$(\phi d)(\phi d)$ の組の項は 3 点結合 $\lambda_{\phi d\phi\phi}$ を含むので 0 である。$H_{\phi\phi dd}$ は、$\mathrm{tr}(AB^\dagger CD^\dagger)$ の四つの位置への (ϕ,ϕ,d,d) の 24 通りの並べ方のうち、二つの ϕ がともに奇数番目（4 通り）なら $\mathrm{tr}(YmYm)=-2y^2M^2$、ともに偶数番目（4 通り）なら $\mathrm{tr}(mY^\dagger mY^\dagger)=-2y^2M^2$、奇数番目と偶数番目に一つずつ（16 通り）なら $\mathrm{tr}(YY^\dagger mm^\dagger)$ と同じ巡回で $2y^2M^2$ で、$H_{\phi\phi dd}=\frac14\cdot16y^2M^2=4y^2M^2$ である。Λ^Y は ϕ の 2 本の外線だけから $2\cdot2y^2\cdot2m^2$ である。和 $2\lambda m^2-16y^2M^2+8y^2m^2$ の半分が $\gamma_m=\lambda m^2+4y^2m^2-8y^2M^2$ である。スカラーの湯川結合 $Y=y\sigma_1$ では、$2Ym^\dagger Y=+2y^2m$ で、トレースの項は $Y\cdot2yM=2y^2m$ になる。後者は、質量を一つ挿入したフェルミオンのループが ϕ を通してフェルミオンの線に付く図（タドポール）で、擬スカラーではトレース $\mathrm{tr}[\gamma^5\cdots]$ が 0 なので消える。

付録 L　部分波のユニタリー性の導出

■ **規格化。** $S=1+iT$、$\langle f|T|i\rangle=(2\pi)^4\delta^4(P_f-P_i)\mathcal{M}_{fi}$ とする。重心系で z 軸に沿う 2 体の状態 $|\lambda_1\lambda_2\rangle$ を回転 $R(\phi,\theta,0)$ で動かした状態を終状態にとると、角運動量の保存から $\mathcal{M}_{fi}(s,\theta,\phi)=\frac{16\pi}{\sqrt{\beta_i\beta_f}S_iS_f}\sum_J(2J+1)\,a^J_{fi}(s)\,e^{i(\lambda_i-\lambda_f)\phi}d^J_{\lambda_i\lambda_f}(\theta)$ と展開できる [11]。$\int_{-1}^1\mathrm{d}c\,d^J_{\lambda\lambda'}d^{J'}_{\lambda\lambda'}=2\delta_{JJ'}/(2J+1)$ から、式 (25) の逆の関係を得る。S は同種粒子の状態の規格化の因子で、$\phi\phi$ の状態 $|\boldsymbol{k},-\boldsymbol{k}\rangle$ は $\boldsymbol{k}$ と $-\boldsymbol{k}$ で同じ状態なので、位相空間を半分にする $\frac12$ を振幅の側に $1/\sqrt2$ ずつ振り分けた。2 体の中間状態の和は $\sum_n S_n^2\int\mathrm{d}\Phi_2$、$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{\beta_n}{32\pi^2}\mathrm{d}\Omega_n$ で、ユニタリー性 $-i(T-T^\dagger)=T^\dagger T$ は $2\,\mathrm{Abs}\,\mathcal{M}_{fi}=\sum_n S_n^2\int\mathrm{d}\Phi_2\,\mathcal{M}_{fn}\mathcal{M}^*_{in}$ になる。展開を入れ、回転の合成 $\int\mathrm{d}\Omega_n\,D^J_{\cdot\lambda_n}(\Omega_n)^*D^{J'}_{\cdot\lambda_n}(\Omega_n)=\frac{4\pi}{2J+1}\delta_{JJ'}(\cdots)$ を使うと、各 J で $\mathrm{Abs}\,a^J=a^Ja^{J\dagger}$（2 体の状態の空間の行列）を得る。これは $S^J=1+2ia^J$ が（他の状態が開いていなければ）ユニタリーであることと同じで、a^J の固有値は円 $|a-\frac{i}{2}|=\frac12$ の上（他の状態が開いていれば内側）にあり、$|\mathrm{Re}\,a^J_{(k)}|\le\frac12$ である。同じく、どの基底でも $|S^J_{ii}|\le1$ から $|\mathrm{Re}\,a^J_{ii}|\le\frac12$、$|S^J_{fi}|\le1$ から $|a^J_{fi}|\le\frac12$ である。$\phi\phi\to\phi\phi$ の $J=0$ では $a_0=\frac{\beta}{64\pi}\int\mathrm{d}c\,\mathcal{M}$ で、$\phi^3+\phi^4$ のノートの a_ℓ と同じである。

■ **状態とスピノル。** カイラル表示 $\gamma^0=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$、$\gamma^i=\begin{pmatrix}0&\sigma^i\\-\sigma^i&0\end{pmatrix}$、$\gamma^5=\mathrm{diag}(-1,1)$ で、$u(p,\lambda)=(\sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi,\sqrt{p\cdot\bar\sigma}\,\xi)$、$v(p,\lambda)=(\sqrt{p\cdot\sigma}\,\eta,-\sqrt{p\cdot\bar\sigma}\,\eta)$ とする。ξ は $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{p}}$ の固有値 2λ の、η は固有値 -2λ の固有ベクトルである。$\pm z$ 方向のスピノルを決め、角度 θ の終状態のスピノルは $\exp(-i\theta\Sigma_y/2)$ で回して作る。これで終状態は始状態の回転になり、上の展開が成り立つ。$J=0$ では $\lambda_i=\lambda_f=0$ の状態だけが寄与する。パリティは、ϕ が擬スカラー（0^-）なので $\phi\phi$ が $(-1)^L=+1$、$\psi\bar\psi$ が $(-1)^{L+1}$ で、$J=0$ の $\psi\bar\psi$ は ${}^1S_0$（0^-）と ${}^3P_0$（0^+）である。s チャンネルの ϕ は ${}^1S_0$ とだけ、$\phi\phi$ は ${}^3P_0$ とだけ結合する。

■ **高エネルギーの極限。** $s\gg m^2,M^2$ で質量を無視すると、$E=|\boldsymbol{p}|=\sqrt{s}/2$ として $u(p,+)=\sqrt{2E}(0,\xi_+)$、$u(p,-)=\sqrt{2E}(\xi_-,0)$、$v(p,+)=\sqrt{2E}(\eta,0)$、$v(p,-)=\sqrt{2E}(0,-\eta)$ である。$p_1\parallel+z$ では $\xi_+=(1,0)$、$\xi_-=(0,1)$、$p_2\parallel-z$ の v では $\eta=(1,0)$（$\lambda=+$）、$(0,1)$（$\lambda=-$）である。γ^5 は下（右手）の成分に $+1$、上（左手）に -1 を掛け、γ^0 は上下を入れ替える。よって $\bar v(p_2,\lambda)\gamma^5u(p_1,\lambda)=2E\,\eta^\dagger\xi_\lambda=\sqrt{s}$（$\lambda=\pm$）で、$\lambda_1\ne\lambda_2$ では 0 である。$(\bar u\gamma^5v)^*=v^\dagger\gamma^5\gamma^0u=-\bar v\gamma^5u$ と回転での不変性から、終状態では $\bar u(p_3,\lambda)\gamma^5v(p_4,\lambda)=-\sqrt{s}$ である。t チャンネルの双線形は、$R_2\equiv e^{-i\theta\sigma_y/2}$、$c\equiv\cos\frac{\theta}{2}$、$s_\theta\equiv\sin\frac{\theta}{2}$ として、$\bar u(p_3,-)\gamma^5u(p_1,+)=2E(R_2\xi_-)^\dagger\xi_+=-\sqrt{s}\,s_\theta$、$\bar v(p_2,+)\gamma^5v(p_4,-)=2E\,(1,0)\cdot(s_\theta,-c)=\sqrt{s}\,s_\theta$ で、積は $-s\,s_\theta^2=t$ である（$(--)\to(++)$ も同じ）。同じヘリシティの間の $\bar u\gamma^5u$ は、$\gamma^5\gamma^0$ がカイラリティを入れ替えるので 0 である。よって、$\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$ の振幅は、s チャンネルが $y^2\sqrt{s}(-\sqrt{s})/s=-y^2$（4 つの組すべて）、$t$ チャンネルが $-y^2\,t/(t-m^2)\to-y^2$（$(\lambda\lambda)\to(-\lambda,-\lambda)$ だけ）で、角度によらない。$J=0$ の射影 $a=\frac{1}{32\pi}\int\mathrm{d}c\,\mathcal{M}=\mathcal{M}/(16\pi)$ から本文の 2×2 行列を得る。固有ベ

クトルは $(1,1)/\sqrt{2}$（固有値 $-3y^2/(16\pi)$、s チャンネルを含むので ${}^1S_0$）と $(1,-1)/\sqrt{2}$（$+y^2/(16\pi)$、${}^3P_0$）である。$\psi\bar\psi(\lambda\lambda)\to\phi\phi$ の振幅は $b^{(0)}\bar v\not k_1 u$ で、γ^μ はカイラリティを保つので $\lambda_1=\lambda_2$ では質量なしで 0 になる。質量を残すと、$u(p_1,+)=(\sqrt{E-p}\,\xi_+,\sqrt{E+p}\,\xi_+)$、$v(p_2,+)=(\sqrt{E+p}\,\eta,-\sqrt{E-p}\,\eta)$（$\eta=\xi_+=(1,0)$）と $\not k=\begin{pmatrix}0 & k\cdot\sigma\\ k\cdot\bar\sigma & 0\end{pmatrix}$ から $\bar v\not k_1 u=\sqrt{E^2-p^2}\,\eta^\dagger(k\cdot\bar\sigma-k\cdot\sigma)\xi_+=2M\,\eta^\dagger(\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{\sigma})\xi_+=2M|\boldsymbol{k}|\cos\theta\simeq M\sqrt{s}\cos\theta$ で、$(--)$ では符号が逆になる。$t-M^2=-2pk(A-c)$、$u-M^2=-2pk(A+c)$（付録 I、$A-1\simeq 2M^2/s$）から $1/(t-M^2)-1/(u-M^2)=-\frac{1}{2pk}[\frac{1}{A-c}-\frac{1}{A+c}]$ で、$\int_{-1}^1 \mathrm{d}c\,c[\frac{1}{A-c}-\frac{1}{A+c}]=2A\ln\frac{A+1}{A-1}-4\simeq 2\ln(s/M^2)-4$ を使うと、$J=0$ の射影は $|a^0_{\phi\phi,\psi\bar\psi(\lambda\lambda)}|\simeq\frac{1}{32\sqrt{2}\pi}y^2M\sqrt{s}\cdot\frac{2}{s}[2\ln(s/M^2)-4]=\sqrt{2}\,\frac{y^2}{16\pi}\frac{M}{\sqrt{s}}[\ln(s/M^2)-2]$ である。$\phi\phi\to\phi\phi$ は $a=\frac{1}{64\pi}\cdot 2\cdot(-\lambda)=-\lambda/(32\pi)$ である。$J=1/2$ の $\psi(+)\phi\to\psi(+)\phi$ では、s チャンネルが $y^2\bar u_3(-\not p)u_1/s$、$u$ チャンネルが $y^2\bar u_3(\not k_2-\not p_1)u_1/u$ で、$\not p_1 u_1=0$ と $\bar u_3\not p u_1=\bar u_3(\not p_3+\not k_2)u_1=\bar u_3\not k_2 u_1$ を使うと、$\mathcal{M}=y^2X(1/u-1/s)$、$X\equiv\bar u_3\not k_2 u_1$ である。$\boldsymbol{k}_2=-E\boldsymbol{n}$ で $k_2\cdot\sigma=E(1+\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})$、$\xi_+(\boldsymbol{n})=R_2\xi_+=(c,s_\theta)$ から $X=4E^2\xi_+(\boldsymbol{n})^\dagger\xi_+=s\,c$ で、$u=-sc^2$ とあわせて $\mathcal{M}=-y^2(1/c+c)$ である。$d^{1/2}_{\frac12\frac12}=c$ で射影すると $a=-\frac{y^2}{32\pi}\int\mathrm{d}c'\,(1+c^2)=-\frac{3y^2}{32\pi}$（$\int_{-1}^1\mathrm{d}c'\,\cos^2\frac{\theta}{2}=1$）で、$(-)$ のヘリシティも同じである。

■ **走る結合での条件。** $y^2(t)=y^2(0)/(1-10y^2(0)t/(4\pi)^2)$（$t=\ln(\mu/m)$）なので、$y^2(\mu)\le 8\pi/3$ が $\mu\le E$ で成り立つ条件は $y^2(0)\le(8\pi/3)/[1+\frac{80\pi}{3(4\pi)^2}\ln(E/m)]=(8\pi/3)/[1+\frac{5}{3\pi}\ln(E/m)]$ である。$y=0$ では $\lambda(t)=\lambda(0)/(1-3\lambda(0)t/(4\pi)^2)$ で、$\lambda(\mu)\le 16\pi$ の条件は $\lambda(0)\le 16\pi/[1+\frac{48\pi}{(4\pi)^2}\ln(E/m)]=16\pi/[1+\frac{3}{\pi}\ln(E/m)]$ である。$y\neq 0$ の領域は二つの方程式を数値積分して求めた。

■ **1 ループの要素。** S 行列要素（式 (16)、(20)）を結合の構造に分ける。$(4\pi)^2(\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}}+\lambda)=\lambda^2\mathcal{A}_{\lambda\lambda}+y^4\mathcal{A}_{yy}+4\lambda y^2[B_0^{MM}+m^2B_0^{MM\prime}](m^2)$ で、$\mathcal{A}_{\lambda\lambda}$ は ϕ の泡、$\mathcal{A}_{yy}$ はフェルミオンの箱である。$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ は $a_{\mathrm{phys}}=y^4[\hat a-M(B_0+B_1)(M^2)(1/X+1/W)]+\lambda y^2\hat a_\lambda$、$b_{\mathrm{phys}}=y^4[\hat b+(\hat r_\psi+\hat r_\phi)(1/X-1/W)-2M^2(B_0+B_1)(M^2)(1/X^2-1/W^2)]$ で、$\hat a_\lambda$ は λ の三角形、$\hat r$ は $(4\pi)^2\delta R/y^2$ である。ヘリシティの振幅は $[a_{\mathrm{phys}}\bar v u+b_{\mathrm{phys}}\bar v\not k_1 u]/(4\pi)^2$ に陽なスピノルを入れて作る。$\mathrm{Abs}\,a=aa^\dagger$ を結合で展開すると、1 ループの次数で $\mathrm{Abs}\,a^{(1)}=a^{(0)}a^{(0)\dagger}$ である。$J=0$ で開いている 2 体の状態は $\phi\phi$ と $\psi\bar\psi(\pm\pm)$ だけで（$\psi\phi$ は半整数の J）、3 体の状態の寄与は振幅が y^3 の次数なので $\mathrm{Abs}\,a$ の y^6 の次数である。Abs の側は $\hat a$ などの係数の虚部から作り、変換の項（$p^2=m^2$、M^2 の B は実）は分散の側だけに入る。μ を変えるときは、結合を 1 ループの解で μ まで走らせ、ループの部分を μ で評価した。

付録 M　有効ポテンシャルの改良と bounce の導出

■ **繰り込み群での改良。** 式 (10) の $V_{\mathrm{CW}}(\phi;g_i,\mu)$ は $[\mu\partial_\mu+\sum_i\beta_i\partial_{g_i}-\gamma_\phi\phi\partial_\phi]V=0$ を満たす（付録 E、g_i は質量を含む）。この 1 階の偏微分方程式の特性曲線は $\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}t=\mu$、$\mathrm{d}g_i/\mathrm{d}t=\beta_i$、$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}t=-\gamma_\phi\phi$ で、V はその上で一定である。よって $\mu(t)=me^t$、$g_i(t)$、$\phi(t)=\xi(t)\phi$、$\xi(t)=\exp(-\int_0^t\gamma_\phi\mathrm{d}t')$ として $V(\phi;g_i,m)=V(\xi(t)\phi;g_i(t),me^t)$ が任意の t で成り立つ。右辺を 1 ループの V_{CW} と 1 ループの走りで評価したものが式 (26) で、t を対数が小さくなるようにとれば、$y^2t/(4\pi)^2$ の高い次数の項（leading log）が足し上がる。$\gamma_\phi=2y^2/(4\pi)^2$ と $\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t=10y^4/(4\pi)^2$ から $\int_0^t\gamma_\phi\mathrm{d}t'=\frac{2}{(4\pi)^2}\int y^2\frac{(4\pi)^2\mathrm{d}y^2}{10y^4}=\frac15\ln\frac{y^2(t)}{y^2(0)}$ で、$\xi=(y^2(t)/y^2(0))^{-1/5}$ である。同じく $\mathrm{d}\ln M/\mathrm{d}t=-y^2/(4\pi)^2$ から $M(t)=M(0)(y^2(t)/y^2(0))^{-1/10}$ である。$m^2(t)$ は数値で積分した。$\phi=0$ は特性曲線の上で動かないので、$V(0;g_i(t),me^t)$ は t によらない。よって $\Delta V(\phi)=V_{\mathrm{CW}}(\xi\phi;g_i(t),me^t)-V_{\mathrm{CW}}(0;g_i(t),me^t)$ で、真空のエネルギーとその走りは消える。質量を無視できる大きな場では

$$\lambda_{\mathrm{eff}}(\phi)=\xi^4\Big\{\lambda(t)+\frac{24}{64\pi^2}\Big[\frac{\lambda^2}{4}\Big(\ln\frac{|\lambda|\xi^2\phi^2}{2\mu_t^2}-\frac32\Big)-4y^4\Big(\ln\frac{y^2\xi^2\phi^2}{\mu_t^2}-\frac32\Big)\Big]\Big\},\qquad \mu_t=me^t$$

である。$\lambda<0$ では $m_\phi^2(\phi)<0$ となり V は虚部を持つが、これは一様な場の配位が不安定であることを表し、実部をとる。

■ **bounce と場の規格化。** Euclid の作用 $S=\int\mathrm{d}^4x[\frac12(\partial\phi)^2+\Delta V(\phi)]$ で、ϕ は $\mu=m$ で規格化した場である。大きさ R の bounce の運動量は $1/R$ 程度なので、$\mu\approx 1/R$ で規格化した場 $\varphi=\xi\phi$ に移ると、運動項は $\frac12(\partial\varphi)^2$（1 ループの次数で）、ポテンシャルは $\lambda(1/R)\varphi^4/24$ になる。ξ は運動項とポテンシャルの両方から消え、作用は付録 K

の $16\pi^2/|\lambda|$ で $\lambda=\lambda(1/R)$ としたものになる。この μ の選び方の不定性は、1 ループの行列式（手順 (10)）が μ 依存 $16\pi^2\,\partial|\lambda|^{-1}/\partial\ln\mu$ を打ち消すことで取り除かれる。

■ **質量の項と Derrick のスケーリング。** 作用を $S=T+V_2+V_4$（$T=\frac{1}{2}\int(\partial\phi)^2$、$V_2=\frac{1}{2}m^2\int\phi^2$、$V_4=-\frac{|\lambda|}{24}\int\phi^4$）と分ける。停留点 ϕ_* のまわりで $\phi_a(x)=\phi_*(x/a)$ と変えると $S(a)=a^2T+a^4(V_2+V_4)$、$\phi_b=b\phi_*$ と変えると $S(b)=b^2(T+V_2)+b^4V_4$ で、$a=b=1$ で停留することから $2T+4V_2+4V_4=0$ と $2T+2V_2+4V_4=0$ を得る。差から $V_2=0$ で、$m^2>0$ では $\phi_*\equiv0$ でなければならない。よって質量があると $d=4$ に有限の大きさの bounce はない。Fubini の形の配位 ϕ_R では $V_2=\frac{1}{2}m^2\cdot2\pi^2\frac{48R^2}{|\lambda|}\int_0^L r^3(r^2+R^2)^{-2}\mathrm{d}r=\frac{24\pi^2m^2R^2}{|\lambda|}[\ln\frac{L^2+R^2}{R^2}+\frac{R^2}{L^2+R^2}-1]$ で、$\phi_R\propto r^{-2}$ の裾は質量のために $r\gtrsim1/m$ で指数関数的に減るので $L\sim1/m$ で切れる。$V_2>0$ は $R\to0$ で 0 になり、作用の下限 $16\pi^2/|\lambda|$ は $R\to0$ でだけ近づく。

付録 N　崩壊率の 1 ループの前因子の導出

■ **崩壊率の式。** Callan と Coleman [17] の式で、ゆらぎの演算子の零モードを集団座標に換える。スケール不変な bounce の零モードは、並進の 4 つと大きさ R の 1 つである。AFS [18] は、演算子を $1/(3\lambda_A\phi_b^2)$ で割って規格化し直すと（Euclid 空間を球面 S^4 に共形に写すことにあたる）、零モードが規格化可能になり、Jacobian が $J_d=J_T=R^{-1}\sqrt{6S/(5\pi)}$ になることを示した（彼らの式 (3.29)、(3.30)）。よって $\Gamma/V=e^{-S}(6S/5\pi)^{5/2}\,\mathrm{Im}\int\mathrm{d}R\,R^{-5}[\det\hat{O}_\phi/\det{}'O_\phi]^{1/2}\times$（フェルミオン）である。規格化し直した ϕ の演算子の固有値は $\lambda_n(x)=(n+1)(n+2)/6+x$（$x=-1$ が bounce、縮退度 $d_n=(n+1)(n+2)(2n+3)/6$）と厳密に分かる。$n=0$ が負のモード（$\lambda_0=-2/3$）、$n=1$ の 5 つが零モードである。部分波 l ごとには、$-\partial^2-24xR^2/(r^2+R^2)^2$ の動径方向の行列式の比が $R_l(x)=\Gamma(1+l)\Gamma(2+l)/[\Gamma(\frac{3}{2}+l-\frac{\kappa}{2})\Gamma(\frac{3}{2}+l+\frac{\kappa}{2})]$（$\kappa=\sqrt{1-24x}$）である（AFS の式 (4.27)）。和は大きい n で発散するので、x と x^2 の項を各 n で引いて有限の和 $S^\phi_{\rm fin}=\frac{15}{2}+6\gamma_E-i\pi-12\zeta'(-1)+\ln\frac{7776}{3125}$ を作り（零モードの $5\ln(x+1)$ を除く）、引いた分を $\overline{\rm MS}$ の Feynman 図 $-S_{\rm loops}=(\frac{3}{2\epsilon}+\frac{5}{2}+3\gamma_E+3\ln\frac{R\mu}{2})x^2$ として足し戻す（x の 1 次の項は次元正則化で 0）。$\frac{3}{2\epsilon}$ は S の λ の対抗項と打ち消し、$[\det\hat{O}/\det{}'O]^{1/2}=i(5/6)^{5/2}\exp(-\frac{5}{4}+6\zeta'(-1)+3\ln\frac{R\mu}{2})$ を得る（$(5/6)^{5/2}=\exp(-\frac{1}{2}\ln\frac{7776}{3125})$）。$(6S/5\pi)^{5/2}(5/6)^{5/2}=(S/\pi)^{5/2}$ で、式 (28) の ϕ の部分になる。

■ **フェルミオンの行列式。** $M=0$ では $\bar\psi(\partial\!\!\!/+iy\gamma^5\phi)\psi$ はカイラル回転で $\bar\psi(\partial\!\!\!/+y\phi)\psi$ に移り（付録 C）、AFS の $(y_A/\sqrt{2})\phi\bar\psi\psi$ で $y_A=\sqrt{2}y$ である。$\lambda\phi^4/4!=\lambda_A\phi^4/4$ から $\lambda_A=\lambda/6$ で、bounce は同じ $\phi_b=\sqrt{48/|\lambda|}R/(r^2+R^2)=\sqrt{8/|\lambda_A|}R/(r^2+R^2)$ である。フェルミオンの演算子は半整数のスピンの球面調和関数で部分波 $j=\pm\frac{3}{2},\pm\frac{5}{2},\ldots$（縮退度 $j^2-\frac{1}{4}$）に分かれ、2 成分の動径方向の演算子

$$M_j=\begin{pmatrix}\partial_r^2-\frac{j(j-1)}{r^2}-W^2 & -W'\\ -W' & \partial_r^2-\frac{j(j+1)}{r^2}-W^2\end{pmatrix},\qquad W=y\phi_b=\frac{2\sqrt{|w|}R}{r^2+R^2}$$

の行列式の比 $R_j=\det M_j/\det\hat{M}_j$ に帰着する（AFS の式 (5.97)）。AFS は $R_j=[\Gamma(a)^2/(\Gamma(a+z)\Gamma(a-z))]^2$（$a=|j|+\frac{1}{2}$、$z^2=y_A^2/\lambda_A=w$）を与えた。本ノートでは、Gel'fand–Yaglom の方法で、$r\to0$ で正則な 2 つの解 $(r^j,0)$、$(0,r^{j+1})$ から始めて $M_j\Psi=0$ を積分し、解の行列の行列式の自由な場合との比の $r\to\infty$ の値として R_j を数値的に求めた。これは上の式と一致し、比が Γ 関数の比の 2 乗であることも確かめた（$|w|$ が小さいとき $\ln R_j=-2\psi'(a)w$）。和は、$\ln R_j$ の w の 1 次の項と、非対角の項を落とした $R_{j,\rm diag}=R_{j-3/2}(-w/6)R_{j-1/2}(-w/6)$ の w^2 の項を引いて収束させ（これが $S^\psi_{\rm fin}(w)$）、引いた分を $\overline{\rm MS}$ の Feynman 図 $-\frac{1}{4}\mathrm{Tr}(\Box^{-1}\mathcal{W}\Box^{-1}\mathcal{W})$、$\mathcal{W}=y^2\phi_b^2+y\partial\!\!\!/\phi_b$ として足し戻す。その有限部分が式 (28) の w と w^2 の項で、極は S の対抗項と打ち消す。$S^\psi_{\rm fin}$ は、AFS の閉じた形（負の次数のポリガンマ関数を含む）は使わず、確かめた R_j から和を数値的にとった。

■ **Feynman 図の項の確認。** ϕ_b^2 と ϕ_b の 4 次元の Fourier 変換は、$\int\mathrm{d}^4x\,e^{iqx}(r^2+R^2)^{-2}=2\pi^2K_0(qR)$、$\int\mathrm{d}^4x\,e^{iqx}(r^2+R^2)^{-1}=4\pi^2RK_1(qR)/q$ である。$\overline{\rm MS}$ の $B_0(q)$ の有限部分 $(2-\ln(q^2/\mu^2))/(4\pi)^2$ とあわせて $\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}=\frac{1}{8\pi^2}\int q^3\mathrm{d}q$ を数値積分すると、AFS の式 (4.16)、(4.17)、(5.110) の有限部分を全桁で再現した。ϕ の有限部分の和は、厳密な固有値で n について直接和をとって確かめた（収束は $1/n$）。

■ μ 依存。 式 (28) の陽な $\ln\mu$ の係数は $3+\frac{2}{3}w-\frac{1}{3}w^2$ である。$S=-16\pi^2/\lambda$ の走りは $\mathrm{d}S/\mathrm{d}\ln\mu=16\pi^2\beta_\lambda/\lambda^2=3+\frac{8y^2}{\lambda}-\frac{48y^4}{\lambda^2}$ で、$w=12y^2/\lambda$ から $\frac{2}{3}w=\frac{8y^2}{\lambda}$、$\frac{1}{3}w^2=\frac{48y^4}{\lambda^2}$ なので、両者は打ち消し合う。S の 3、$8y^2/\lambda$、$-48y^4/\lambda^2$ はそれぞれ ϕ の泡、ϕ の場の繰り込み、フェルミオンの箱にあたる。w に依存する他の項の μ 依存は 2 ループの次数で、μ^* のまわりの幅として評価した。$|w|$ が大きいと $S^\psi_{\rm fin}$ は $w^2\ln|w|$ のように大きくなり、$\mu=1/R$ では $-w^2\ln(R\mu/2)/3$ とあわせて大きな対数が残る。$\mu\approx 2/R$ でこれが小さくなる。$\lambda\to 0^-$ では $|w|\to\infty$ で、どの μ でも補正は S と同じ程度になる。

■ 宇宙論的な条件。 $\phi^3+\phi^4$ のノートと同じく、$m=m_h$、H_0^{-1} を宇宙の年齢と大きさとして $(\Gamma/V)H_0^{-4}<1$、すなわち $\ln(\Gamma/(Vm^4))<-4\ln(m_h/H_0)=-404.7$ を求めた。$\Gamma/V=\int_{1/\Lambda}^{1/\mu_0}\mathrm{d}R\,R^{-5}e^{E(R)}$ は $R=1/\Lambda$ の近くで決まる。木の評価 $E=-16\pi^2/|\lambda(1/R)|$ で $t=\ln(1/mR)$ について数値積分し、等号になる Λ を $\Lambda_{\max}$ とした。

付録 O　$\lambda\approx 0$ の近くの足し上げの導出

■ 次数の数え方。 ループの数を $\hbar$ で数え、λ を $\hbar y^4/(4\pi)^2$ の次数とする。bounce の作用 $S=16\pi^2/|\lambda|$ は $1/\hbar$ の次数である（$\phi_b\propto|\lambda|^{-1/2}$）。1 ループのフェルミオンの行列式は $\hbar^0$ の係数を持つが、その中の ϕ_b の 4 次の項 $y^4\int\phi_b^4/(4\pi)^2\propto y^4/((4\pi)^2\lambda^2)$ は $1/\hbar$ の次数になり、S と並ぶ。$w=12y^2/\lambda$ で書くと、w^2 の項が $1/\hbar$、w の 1 次の項と ϕ の行列式が $\hbar^0$ である。2 ループの有効ポテンシャルの $y^6\phi^4/(4\pi)^4$ の項は $y^2/(4\pi)^2$ だけ小さく、$\hbar^0$ の次数になる。本ノートでは、その主要な対数（bounce の中の y の走り）だけを入れ、残りは κ の幅で見積もった。

■ 微分展開。 $M=0$ でカイラル回転した Euclid の作用 $\bar\psi(\partial\!\!\!/+y\phi)\psi$ でフェルミオンを積分すると、有効作用に $-\mathrm{Tr}\ln(\partial\!\!\!/+y\phi)$ が加わる。一定の ϕ では、これは $-2\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln(k^2+m^2)$（$m=y\phi$、4 成分）で、$\overline{\rm MS}$ で $V_\psi=-\frac{m^4}{(4\pi)^2}(\ln\frac{m^2}{\mu^2}-\frac{3}{2})$ になる。$\phi=\phi_0+\delta\phi$ の 2 次の項は $\frac{1}{2}\mathrm{Tr}(S\,y\delta\phi\,S\,y\delta\phi)$、$S=(\mathrm{i}k\!\!\!/+m)^{-1}=(-\mathrm{i}k\!\!\!/+m)/(k^2+m^2)$ で、$\mathrm{Tr}[(-\mathrm{i}k\!\!\!/+m)(-\mathrm{i}(k\!\!\!/+p\!\!\!/)+m)]=4(m^2-k\cdot(k+p))$ から

$$\Pi(p^2)=4y^2\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{m^2-k\cdot(k+p)}{(k^2+m^2)((k+p)^2+m^2)}=4y^2\Big[\Big(2m^2+\frac{p^2}{2}\Big)B(p)-A\Big]$$

である（$A=\int(k^2+m^2)^{-1}$、$B(p)=\int[(k^2+m^2)((k+p)^2+m^2)]^{-1}$）。$\Pi(0)=4y^2(2m^2B(0)-A)$ は $\partial_\phi^2V_\psi$ に等しい。$B(p)=B(0)-p^2/(6m^2(4\pi)^2)+O(p^4)$ と $\overline{\rm MS}$ の $B(0)=-\ln(m^2/\mu^2)/(4\pi)^2$ から、p^2 の係数は $Z_\psi=4y^2[\frac{1}{2}B(0)-\frac{1}{3(4\pi)^2}]$ で、式 (29) になる。$\partial Z_\psi/\partial\ln\mu=4y^2/(4\pi)^2=2\gamma_\phi$ は場の異常次元と合う。

Fubini の解の上の積分には、$u=r^2/R^2$ として $y^2\phi_b^2=(4|w|/R^2)(1+u)^{-2}$、$\int\mathrm{d}^4x\,\phi_b^4=384\pi^2/\lambda^2$、$\int\mathrm{d}^4x\,\frac{1}{2}(\partial\phi_b)^2=32\pi^2/|\lambda|$（$=2S$、Derrick の関係）を使う。重みは $\phi_b^4\,\mathrm{d}^4x\propto u(1+u)^{-4}\mathrm{d}u$、$(\partial\phi_b)^2\mathrm{d}^4x\propto u^2(1+u)^{-4}\mathrm{d}u$ で、$\int_1^\infty v^{-n}\ln v\,\mathrm{d}v=1/(n-1)^2$ から平均 $\langle\ln(1+u)\rangle$ はそれぞれ $\frac{5}{6}$、$\frac{11}{6}$ である。よって $\langle\ln(y^2\phi_b^2/\mu^2)\rangle=\ln|w|-2\ln\frac{R\mu}{2}-\frac{5}{3}$、$\ln|w|-2\ln\frac{R\mu}{2}-\frac{11}{3}$ で、

$$-\int\mathrm{d}^4x\,V_\psi=\frac{w^2}{6}\Big(\ln|w|-2\ln\frac{R\mu}{2}-\frac{19}{6}\Big),\qquad-\int\mathrm{d}^4x\,\frac{1}{2}Z_\psi(\partial\phi_b)^2=-\frac{w}{3}\Big(\ln|w|-2\ln\frac{R\mu}{2}-3\Big)$$

となる（$w<0$）。これを式 (28) のフェルミオンの部分と比べると、$\ln\mu$ の係数がそれぞれ一致し、$\frac{1}{2}S^\psi_{\rm fin}$ の漸近形が得られる。高次の微分の項は、$\int(\partial\ln\phi_b)^4$ のように $O(1)$ か、$y\phi_b<1/r$ になって展開が破れる $r\gtrsim\sqrt{|w|}R$ で切れる対数 $O(\ln|w|)$ である。

■ 球面への写像。 $\Omega=2R/(r^2+R^2)$ とすると $\Omega^2\mathrm{d}x^2$ は半径 1 の S^4 の計量で、$r=R\tan(\theta/2)$、$\Omega=(1+\cos\theta)/R$ である。$\phi=\Omega\chi$ と置くと、境界の項を除いて $\int\mathrm{d}^4x\,\frac{1}{2}(\partial\phi)^2=\int_{S^4}[\frac{1}{2}(\nabla\chi)^2+\chi^2]$（$\chi^2$ は共形結合 $\frac{1}{12}\mathcal{R}\chi^2$、$\mathcal{R}=12$）、$\int\mathrm{d}^4x\,\phi^4=\int_{S^4}\chi^4$ である。$O(4)$ 対称な配位では体積要素は $2\pi^2\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta$ で、$t=\cos\theta$ として

$$S[\chi]=2\pi^2\int_{-1}^1\mathrm{d}t\,(1-t^2)\Big[\frac{1}{2}(1-t^2)\chi_t^2+\chi^2+\frac{\chi^4}{24}\lambda_{\rm eff}(\Omega\chi)\Big],\qquad\lambda_{\rm eff}\equiv\frac{24V_0}{\phi^4}$$

となる。$\lambda_{\rm eff}$ が定数なら $\chi=\sqrt{12/|\lambda|}$（Fubini の解）が解で、$S=16\pi^2/|\lambda|$ である。2 次のゆらぎの演算子は $-\Delta+2+\frac{\lambda}{2}\chi^2=-\Delta-4$ で、Gegenbauer 多項式 $C_n\equiv C_n^{3/2}(t)$（$-\Delta C_n=n(n+3)C_n$）を固有関数に、固有値

$n(n+3)-4=-4,0,6,14,\dots$ を持つ（AFS の $\lambda_n(-1)$ の 6 倍）。$n=0$ が負のモード、$n=1$（$\cos\theta$）が大きさを変えるモードである。$\lambda_{\rm eff}$ が $\Omega\chi$ に対数的に依存すると、作用は $n=1$ の方向に傾き、停留点がなくなる。そこで χ の $n=1$ の成分を 0 に固定し（大きさ R の定義）、残りの成分について作用を停留させる（拘束つきの bounce [20]）。

■ **1 次の項と μ_R。** 一つの μ で固定した 1 ループのポテンシャルは $\lambda_{\rm eff}=\lambda(\mu)-b[\ln(y^2\phi^2/\mu^2)-\frac{3}{2}]$、$b=24y^4/(4\pi)^2$ である。Fubini の解の振幅を $\lambda_R\equiv\lambda_{\rm eff}(\phi_R)$ で決め、$\lambda_{\rm eff}=\lambda_R-b\ln(\phi^2/\phi_R^2)$ と書くと、1 次の寄与 $\int\mathrm{d}^4x\,(V_0-\lambda_R\phi^4/4!)$ は球面上の一様な平均 $\langle\ln(\phi_b^2/\phi_R^2)\rangle$ に比例する。$\int_{-1}^{1}(1-t^2)\ln(1+t)\,\mathrm{d}t=\frac{4}{3}\ln 2-\frac{10}{9}$ から $\langle\ln(y^2\phi_b^2)\rangle=\ln(4|w_R|/R^2)-\frac{5}{3}$（$w_R=12y^2/\lambda_R$）で、平らな空間の重み $\frac{5}{6}$ と同じである。1 次の寄与が消える条件は

$$\lambda_R=\lambda(\mu)-b\Big[\ln\frac{48y^2}{|\lambda_R|R^2\mu^2}-\frac{19}{6}\Big]$$

で、右辺から左辺を引いたものは λ_R について単調なので、解は一つである。$\mu=\mu_R$ ととると括弧が 0 になって $\lambda_R=\lambda(\mu_R)$ となり、条件は式 (30) の $\mu_R R=2\sqrt{|w_R|}\,e^{-19/12}$ になる。λ_R の μ 依存では β_λ の $-48y^4$ が $2b$ で打ち消され、残りは $(3\lambda^2+8\lambda y^2)/(4\pi)^2$ の次数である。

■ **2 次の項。** $\chi=\sqrt{12/|\lambda_R|}\,g$ とすると $S=(24\pi^2/|\lambda_R|)F[g]$、

$$F=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}t\,(1-t^2)\Big[\frac{1}{2}(1-t^2)g_t^2+g^2-\frac{g^4}{2}(1+\varepsilon L)\Big],\qquad L=\ln g^2+2\ln(1+t)-2\ln 2+\frac{5}{3},\qquad \varepsilon=\frac{b}{|\lambda_R|}$$

で、F は ε だけで決まる（$\varepsilon=0$、$g=1$ で $F=\frac{2}{3}$）。$g=1+\delta g$ の 2 次まで展開すると、源は $J=-\varepsilon(2L+1)|_{g=1}$ で、δg を消すと $\delta^2F=-\frac{1}{2}\sum_{n\neq1}J_n^2/[h_n(n(n+3)-4)]$、$J_n=\int(1-t^2)JC_n\,\mathrm{d}t$、$h_n=\int(1-t^2)C_n^2\,\mathrm{d}t=(n+1)(n+2)/(n+\frac{3}{2})$ である。$(1-t^2)C_n=\frac{(n+1)(n+2)}{2n+3}(P_n-P_{n+2})$ と $\int_{-1}^{1}\ln(1+t)P_k\,\mathrm{d}t=2(-1)^{k+1}/(k(k+1))$（$k\geq1$）から

$$I_n\equiv\int_{-1}^{1}(1-t^2)\ln(1+t)\,C_n\,\mathrm{d}t=\frac{4(-1)^{n+1}}{n(n+3)}\quad(n\geq1),\qquad J_0=-\frac{4}{3}\varepsilon,\quad J_1=-4\varepsilon,\quad J_{n\geq2}=\frac{16(-1)^n}{n(n+3)}\varepsilon$$

である。$J_1\neq0$ は作用が大きさの方向に傾くことを表し、拘束で除く。$n=0$（負のモード）は $+\frac{1}{6}\varepsilon^2$ を、$n\geq2$ は $-\frac{1}{2}\varepsilon^2\sum_{n\geq2}256(n+\frac{3}{2})/[n^2(n+3)^2(n+1)(n+2)(n-1)(n+4)]$ を与える。部分分数に分けると $\frac{4}{3}(n+4)^{-1}+4(n+3)^{-1}-\frac{16}{3}(n+2)^{-1}-\frac{16}{3}(n+1)^{-1}+\frac{4}{3}(n-1)^{-1}+4n^{-1}+\frac{16}{3}[(n+3)^{-2}-n^{-2}]$ で、どの部分も望遠鏡和になり、和は $\frac{19}{135}$ である。よって $f=F/\frac{2}{3}=1+(\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\cdot\frac{19}{135})\varepsilon^2=1+\frac{13}{90}\varepsilon^2$ である。

■ **形の変形。** $g=\sum_{n\neq1}a_nC_n$ と展開し、F とその勾配、Hessian を Gauss–Jacobi の求積（重み $1-t^2$）で作り、Newton 法で停留点を求めた（付録 Q）。ε を 0 から少しずつ増やして解を追うと、拘束した Hessian の負の固有値は $\varepsilon\leq4$ でつねに一つである。$\varepsilon\approx1$ で Fubini の解から直接 Newton 法を始めると、負の固有値を二つ持つ別の停留点に収束するので、この追跡が要る。$\varepsilon\to0$ で $(f-1)/\varepsilon^2\to\frac{13}{90}$、次の項は $-0.133\varepsilon^3$ である。変形は ϕ の小さい側（$t\to-1$、$\lambda_{\rm eff}>0$）で g を下げ、$\varepsilon=4$ では g の最小が 0.05 になる。

■ **次の次数と μ 依存。** 一般の μ では $S_{\rm LO}=16\pi^2f(\varepsilon)/|\lambda_R|$（$\lambda_R$ は上の条件の解、$\varepsilon=b(\mu)/|\lambda_R|$）で、次の次数は式 (31) の μ_R を μ に、w_R を $12y^2(\mu)/\lambda_R$ に換えたものである。フェルミオンの部分は Fubini の解の振幅 $\sqrt{48/|\lambda_R|}$ で決まるので、w は $\lambda(\mu)$ ではなく λ_R で作る。$S_{\rm LO}$ の $\ln\mu$ 依存は λ_R を通して $(16\pi^2/\lambda_R^2)(3\lambda^2+8\lambda y^2)/(4\pi)^2\approx3+\frac{2}{3}w_R$ で、次の次数の $3\ln(R\mu/2)$ と $\frac{2}{3}w_R\ln(R\mu/2)$ がこれを打ち消す。

■ **bounce の中の走りと κ。** 上の V_0 は一つの μ で固定した 1 ループのポテンシャルで、bounce の中での y の走りを含まない。これを主要な対数で入れるため、場を μ_R で規格化したまま $\lambda_{\rm eff}(\phi)=\tilde\lambda(t)+\tilde b(t)(\frac{3}{2}+2\ln\kappa)$、$me^t=\kappa\tilde y(t)\phi$ とした。$\tilde y=y\xi=y^{3/5}y_R^{2/5}$（$y_R=y(\mu_R)$、$\xi$ は μ_R から測った場の規格化の因子）は場の規格化を含む湯川結合、$\tilde b=24\tilde y^4/(4\pi)^2$、$\tilde\lambda=\lambda\xi^4$ は $\mathrm{d}\tilde\lambda/\mathrm{d}t=-48\tilde y^4/(4\pi)^2$（$\beta_\lambda-4\gamma_\phi\lambda$ のフェルミオンの部分）に従い、$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t=10y^4/(4\pi)^2$ を使うと $\tilde\lambda=\lambda(\mu_R)-24y_R^{8/5}(y^{2/5}-y_R^{2/5})$ と閉じた形になる。$\ell=\ln\kappa$ の依存は、$\tilde y^4$ の走り $g_y=12y^2/(4\pi)^2$ を使って $\delta\lambda_{\rm eff}\simeq\tilde b g_y\,\ell(\ell+\frac{3}{2})$ で、$\kappa_c=e^{-3/4}$（$\ln(\tilde y^2\phi^2/\mu^2)-\frac{3}{2}=0$ のスケール）で停留する。これは 2 ループの次数である。$\kappa=\kappa_c/2$、κ_c、$2\kappa_c$ の $S_{\rm LO}$ を球面の Newton 法で求め、固定した μ の値との差を幅とした（$\kappa=1$ は固定した μ の値と 0.1% で一致する。$\kappa=2$ は停留点から遠く、$y=1.4$、$\lambda=3$ では S を 57% 変える）。

■ **切断の条件。** $\ln(\Gamma/(Vm^4)) = \ln\int_{t\le\ln(\Lambda/m)} \mathrm{d}t\, e^{4t+E}$（$t = \ln(1/mR)$）を求めた。被積分関数は t が 1 下がると e^{-300} 程度に落ちるので、上限の近くで決まる。$\Lambda_{\max}$ のまわりで E が ΔS だけ下がると、$\ln\Lambda_{\max}$ は $\Delta S/(\mathrm{d}E/\mathrm{d}\ln(1/R)+4)$ だけ上がる。κ の幅はこれで求めた。

付録 P　$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の 1 ループの振幅の導出

■ **図と符号。** $\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \psi(p_3)\bar\psi(p_4)$ の振幅は、二つのフェルミオンの線の積の和である。s 型（$\bar v_2\cdots u_1$ と $\bar u_3\cdots v_4$）は木の s チャンネルと同じ符号 $+1$、t 型（$\bar u_3\cdots u_1$ と $\bar v_2\cdots v_4$）は -1 を持つ。頂点は $y\gamma^5$、伝播関数は $i(\not k+M)/(k^2-M^2)$ と $i/(k^2-m^2)$ で、$\int\frac{\mathrm{d}^4\ell}{(2\pi)^4} = \frac{i}{(4\pi)^2}\times$（COLLIER、LoopTools の規格化の積分）である。1 ループの図は、ϕ の伝播関数への自己エネルギーの挿入、頂点の補正、二つの ϕ を交換する箱からなる。外線の自己エネルギーは留数として扱う。

■ **頂点の補正。** 頂点の関数 $y\gamma^5+V_y$（式 (6)）を、質量殻上のスピノルで挟む。s チャンネルの $\psi(p_1)\bar\psi(p_2)$ の頂点では、入ってくるフェルミオンの運動量が $p=p_1$、出ていくフェルミオンの運動量が $p'=-p_2$、入ってくる ϕ の運動量が $q=-p_1-p_2$ で、$q^2=s$、$p^2=p'^2=M^2$ である。$\not p_1 u_1 = Mu_1$、$\bar v_2\not p_2 = -M\bar v_2$、$\not p_1\gamma^5 = -\gamma^5\not p_1$ を使うと

$$\bar v_2\, M\not q\gamma^5 u_1 = 2M^2\,\bar v_2\gamma^5 u_1, \qquad \bar v_2\not q\not p\gamma^5 u_1 = -2M^2\,\bar v_2\gamma^5 u_1$$

となり、$\bar v_2 V_y u_1 = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}G(s)\,\bar v_2\gamma^5 u_1$、$G(x) = B_0^{Mm}(M^2) + 2M^2[C_0+C_2](x) + xC_1(x)$ を得る。t チャンネルの $\bar u_3\cdots u_1$ の頂点（$p=p_1$、$p'=p_3$、$q=p_3-p_1$）でも、$\bar u_3\not q\gamma^5 u_1 = 2M\bar u_3\gamma^5 u_1$、$\bar u_3\not q\not p\gamma^5 u_1 = -2M^2\bar u_3\gamma^5 u_1$ から同じ形で $q^2=t$ になる。反フェルミオンの側（$p=-p_4$ など）も $\not p v_4 = Mv_4$ なので同じである。すなわち、質量殻上では頂点の補正は擬スカラーの形状因子 $G(q^2)$ だけで、各チャンネルの木を $1-2y^2G(x)/(4\pi)^2$ 倍する。被積分関数 $\bar w\gamma^5(\not p'-\not\ell+M)\gamma^5(\not p-\not\ell+M)\gamma^5 w'/(D_\phi(\ell)D_\psi(\ell-p)D_\psi(\ell-p'))$ から階数 2 の C のテンソルと 4 次元の γ 行列で数値的に作るときは、$g^{\mu\nu}C_{00}$ の項 $\gamma^5\gamma_\mu\gamma^5\gamma^\mu\gamma^5 C_{00} = -D\,C_{00}\gamma^5$ の $D=4-2\epsilon$ と C_{00} の極 $\Delta/4$ の積から出る有理項 $-(D-4)\Delta/4 = +\frac12$（頂点 1 つあたり $\frac12 y^3\bar w\gamma^5 w'/(4\pi)^2$）を加える。

■ **自己エネルギーと留数。** ϕ の伝播関数は $i/(x-m^2-\Sigma_\phi(x))$ で、極質量 $m_{\rm p}^2 = m^2+\Sigma_\phi(m_{\rm p}^2)$ で書くと、1 ループでは $i[1/(x-m_{\rm p}^2)+\hat\Sigma_\phi(x)/(x-m_{\rm p}^2)^2]$、$\hat\Sigma_\phi(x) = \Sigma_\phi(x)-\Sigma_\phi(m_{\rm p}^2)$ である。4 点結合のループ $\frac{\lambda}{2}A_0(m^2)$ は x によらないので消え、$\hat\Sigma_\phi = -\frac{2y^2}{(4\pi)^2}[xB_0^{MM}(x)-m^2B_0^{MM}(m^2)]$ が残る。木の振幅は外線のスピノルと ϕ の質量にしか質量を含まないので、外線を極質量のスピノルにとり、外線ごとに $R_\psi^{1/2}$ を掛ければよい（式 (17)）。式 (32) の括弧の μ 依存は、$\partial G/\partial\ln\mu = 2$、$\partial(\delta R_\psi)/\partial\ln\mu = -y^2/(4\pi)^2$、$\partial[\hat\Sigma_\phi(x)/(x-m^2)]/\partial\ln\mu = -4y^2/(4\pi)^2$ から $-10y^2/(4\pi)^2$ で、木の $y^2(\mu)$ の走り $10y^4/(4\pi)^2$ と打ち消す。

■ **箱。** t 型の直接の箱で、一つ目の ϕ（運動量 ℓ）が p_1 の側から p_2 の側へ、二つ目（$p_1-p_3-\ell$）が p_3 の側から p_4 の側へ移るとする。$\bar u_3\cdots u_1$ の線の内線の運動量は $p_1-\ell$、$\bar v_2\cdots v_4$ の線（矢印は p_4 の脚から p_2 の脚へ）の内線の運動量は $-p_2-\ell$ である。$\gamma^5(\not\ell+M)\gamma^5 = -\not\ell+M$ から、線はそれぞれ $\bar u_3(M-\not p_1+\not\ell)u_1 = \bar u_3\not\ell u_1$、$\bar v_2(M+\not p_2+\not\ell)v_4 = \bar v_2\not\ell v_4$ になる（Dirac 方程式）。i の因子は伝播関数 4 本の $i^4=1$ と積分の $i/(4\pi)^2$ で、統計の符号 -1 とあわせて $(4\pi)^2\mathcal{M} = -y^4[\bar u_3\gamma_\mu u_1][\bar v_2\gamma_\nu v_4]D_{td}^{\mu\nu}$ となる。$D^{\mu\nu} = \int \ell^\mu\ell^\nu/(D_\phi(\ell)D_\psi(\ell+k_1)D_\phi(\ell+k_2)D_\psi(\ell+k_3)) = g^{\mu\nu}D_{00}+\sum_{i,j}k_i^\mu k_j^\nu D_{ij}$ で、$(k_1,k_2,k_3) = (-p_1,p_3-p_1,p_2)$、外線の質量の 2 乗はすべて M^2、二つの不変量は (t,s) である。交差した箱（一つ目の ϕ が p_4 の側へ）では、$\bar v_2\cdots v_4$ の線の内線が $\ell-p_4$ で、$\bar v_2(M+\not p_4-\not\ell)v_4 = -\bar v_2\not\ell v_4$ と符号が反転し、$(k_1,k_2,k_3) = (-p_1,p_3-p_1,-p_4)$、不変量は (t,u) である。s 型の箱（$\psi\bar\psi$ が二つの ϕ に消滅し、二つの ϕ が $\psi\bar\psi$ を作る）も同じで、$\bar v_2\cdots u_1$ の線は $\bar v_2\not\ell u_1$、$\bar u_3\cdots v_4$ の線は直接で $\bar u_3\not\ell v_4$、交差で $-\bar u_3\not\ell v_4$ になる。(k_1,k_2,k_3) は直接が $(-p_1,-p_1-p_2,-p_3)$、交差が $(-p_1,-p_1-p_2,-p_4)$、不変量は (s,t)、(s,u) で、統計の符号は $+1$ である。分子は $\ell^\mu\ell^\nu$ だけで、4 点の階数 2 の積分は有限なので、箱は紫外発散も有理項も持たない。

■ **部分波とユニタリー性。** $J=0$ の部分波は、手順 (8) と同じ式 (25) で、$d^0_{00}=1$ である。$J=0$ の 2 体の状態は $\phi\phi$、$\psi\bar\psi(++)$、$\psi\bar\psi(--)$ の三つで（$\lambda_1\ne\lambda_2$ の状態は $|\lambda|=1>J$）、ユニタリー性 $\mathrm{Abs}\,a^{0(1)} = a^{0(0)}a^{0(0)\dagger}$ の右辺は、$\psi\bar\psi$ の要素では $\psi\bar\psi(\pm\pm)$ と $\phi\phi$（$\sqrt{s}>2m$）の中間状態の和になる。$\phi\phi$ の中間状態の寄与は s 型の箱の虚部に、

$\psi\bar{\psi}$ の中間状態の寄与は $\hat{\Sigma}_\phi(s)$、$G(s)$ と t 型の箱の虚部に現れる。$J=1$ の状態は $\psi\bar{\psi}$ の 4 つのヘリシティの組で（同種のスカラー 2 つは $J=1$ を持たない）、ヘリシティを反転させる振幅も確かめられる。$\mathrm{Re}\, a^0$ は、木のときと同じく実対称な行列で、その固有値の絶対値が $\frac{1}{2}$ 以下であることを (C) の条件とした。

付録 Q　検算の細部

第 5〜7 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。

■ **手順 (1)。** パラメータは、湯川結合を `yps`、4 点結合を `lamphi`、ϕ の質量を `mphi`、ψ の質量を `Mpsi` と書いた。ϕ^3 のノートで `g` という名前が FeynRules の UFO 出力を止めたので、一文字の名前は避けた。MadGraph の結合の次数は、`yps` を `YUK`= 1、`lamphi` を `YUK`= 2 と数える。λ は y^2 と同じ次数なので、`YUK` が 2 増えるごとにループの次数が一つ上がる。模型ファイルを作るときに一つ落とし穴があった。Mathematica のパッケージファイルでは、行末で式が完結していると、そこで文が終わる。ラグランジアンを $\cdots -$ `Mpsi` $\bar{\psi}\psi$ で改行して次の行を $+\frac{1}{2}\cdots$ で始めたところ、1 行目だけが代入され、FeynRules は ϕ の質量を見つけず、頂点も 0 個になった（エラーは出ない）。式全体を括弧で囲んで直した。FeynArts の模型の頂点は `C[S[1],S[1],S[1],S[1]]` と `C[-F[1],F[1],S[1]]` で、後者は $\{\{c_L,0\},\{c_R,0\}\}$ の形のカイラルな係数を持つ。

■ **手順 (2)。** FeynRules が書いた FeynArts の模型では、湯川の頂点の係数は記号 `gc2L`、`gc2R` で書かれ、その値はモデルファイルの末尾の置き換えの表 `M$FACouplings` $=\{$`gc2L` $\to -$`yps`, `gc2R` $\to$ `yps`$\}$ にある。FeynCalc はこの表を自動では使わないので、`CreateFeynAmp` の出力に手で適用した。適用しないと、スピン和に `gc2L`、`gc2R` が残る。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ の模型では頂点の係数が $-i$ `gphi` のように直接書かれていたので、この問題は起きなかった。カイラルな射影 $\omega_\pm$ は、`FCFAConvert` のオプション `UndoChiralSplittings` で γ^5 にまとめた。MadGraph では、固定エネルギーの粒子どうしの衝突（`lpp`= 0、ビームのエネルギーは $\sqrt{s}/2$）で、カットをかけずに全断面積を求めた。断面積は、ログには 4 桁、`results.dat` とバナーにも 5 桁しか書かれない。(A) では $|\mathcal{M}|^2$ が定数なので、積分の統計誤差は相対 10^{-9} の程度しかなく、差を統計誤差で割ると桁の丸めのために 10^4〜10^5 になる。そこで表 4 では、統計誤差と最後の桁の半分の大きい方を実効誤差とした。5 桁の出力でも、(A) の値は解析式を丸めたものと一致する（例えば $\sqrt{s}=2.5$ で 619720 と 619716.6）。

■ **手順 (3)。** FeynCalc の `DiracSimplify` は、既定では γ^5 を奇数個含むフェルミオンの線をカイラルな射影 $\omega_\pm$ で書き直す（オプション `ToDiracGamma67 -> True`）。そのままだと V_y の結果に $\omega_\pm$ が残り、Dirac 構造に分けられない。`ToDiracGamma67 -> False`、`DiracSubstitute67 -> True` として γ^5 のまま扱った。V_4 では、TID の結果に $s+t+u$ の組み合わせが現れるので、$u=4m^2-s-t$ を代入してから積分の名前をそろえた。LoopTools の値は FeynHelpers の `LToolsEvaluate` で求めた。これは各スカラー積分を「有限部分 + 極 $/\epsilon$」の形で返す。TID の係数は D を含むので、$D=4-2\epsilon$ と置いてから ϵ^0 の項をとった。$D\to 4$ としてから評価すると、$(D-4)\times$ 極から来る有理数の項を落とす。また、係数を早く浮動小数点数にすると、$(D-2)/(D-2)$ のような因子が約分されずに残る。Package-X の `ScalarC0`、`ScalarD0` は、引数に質量の 2 乗ではなく質量をとる。COLLIER の 3 点のテンソル係数は `C_cll` の `C(0,1,0)`、`C(0,0,1)` が C_1、C_2 である。LoopTools の C_0 の誤りについて、新しく分かったことがある。誤る点では、LoopTools 自身が “Discrepancy in C0” と表示し、版 a（主に FF）の正しい値と版 b の誤った値を並べ、誤った方を返す。版の選択（version key を `KeyC0` の 0〜3 倍）を変えても、返す値は変わらなかった。FF は “lambda(p1,p2,p3) < 0” と警告する。ただし、$\lambda<0$ の点がすべて誤るわけではない（V_y の $(-1,-2,-3)$ の点は正しい）。γ^5 の処方の比較では、FeynCalc の `FCSetDiracGammaScheme` で BMHV の処方を選んで V_ϕ、V_ψ、V_y を計算した。外線の運動量の $D-4$ 次元の部分は、テンソル積分の簡約の後で 0 とした。箱のトレースは、BMHV の処方では “Not all non-chiral traces were evaluated” というエラーで止まった。

■ **手順 (4)。** FormCalc は、一つのセッションで別の過程を計算しようとすると止まる（`DeclareProcess::incomp`）。過程を替えるたびに `ClearProcess[]` を呼んだ。FormCalc のスピノルの鎖の名前（`F1`、`F2`）はセッションごとに入れ替わるので、名前ではなく中身で区別した。FormCalc の鎖は `DiracChain[Spinor[k[1],M,-1], ..., Spinor[k[2],M,1]]` の形で、フェルミオンの線が $k[1]$ から $k[2]$ へ向かう。$\bar{v}(p_2)\Gamma u(p_1)$ を逆向きに書くと、荷電共

役で $\Gamma = 1$ の鎖の符号は変わらず、$\Gamma = \gamma^\mu$ の鎖の符号は変わる。木の振幅で全体の位相を決めると、$\langle 1|1|2\rangle$ の係数が $-a$、$\langle 1|\not{k}_1|2\rangle$ の係数が b になる。この対応が二つの係数の両方で、全ての点で成り立つことが検算になっている。FormCalc の `PaVeReduce -> True` の結果には `IGram[x]`（$= 1/x$）と 3 引数の `Den[p, m, d]`（$= (p-m)^{-d}$）が現れるので、数値にする前に置き換えた。FeynCalc では、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は積分の引数が浮動小数点数でないと止まる（$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の t は平方根を含む）。係数は厳密なままにして、積分の引数だけを数値にした。ユニタリー性の積分では、高いエネルギーで被積分関数が二つの方向（$\boldsymbol{p}_1$ と $\boldsymbol{k}_1$）の近くに山を持つ。40×40 点の求積では $\sqrt{s} = 10$ で相対 3×10^{-3} しか合わなかったので、中間状態のスピンの和を完全性の関係 $\sum u\bar{u} = \not{q} + M$、$\sum v\bar{v} = \not{q} - M$ で行列にまとめ、240×240 点にした。

■ **手順 (5)。** NLOCT と MadLoop の手順は ϕ^3、$\phi^3 + \phi^4$ のノートと同じで、FeynRules の `Core/Loop.m` の局所パッチ、`FlavorExpand -> True`、`FeynmanGauge = True`、結合の次数の名前を `QCD` に変えた作業用の UFO、MadLoop の検査プログラムの μ_R の固定を使った。$\overline{\text{MS}}$ の UFO は、NLOCT の `MSbar -> True` を使わず、on-shell の対抗項の頂点の $1/\epsilon$ の部分だけを取り出して作った。この極は、場の繰り込みの極を含めて式 (5) と同じになる。スカラー理論と違い、R2 の頂点が三つ現れ、NLOCT の `R2$vertlist` は正しい形で書かれた。NLOCT のフェルミオンの 2 点の対抗項は `TensDot[SlashedP[2], ProjM]` の形で書かれるので、$\not{p}\omega_\pm = (\not{p} \pm \not{p}\gamma^5)/2$ と直してから係数を比べた。MadGraph の部分過程のディレクトリは `P0_phiphi_phiphi` と `P0_psipsix_phiphi` である。

■ **手順 (6)。** `xsec_collier.f90` は手順 (4) の `scat_collier.f90` と同じ関数で、$(\sqrt{s}, \cos\theta)$ の分点の一覧を読んで $\mathcal{M}_A^{(1)}$、a、b を書き出す。$\phi\phi \to \psi\bar{\psi}$ の MadLoop は、手順 (5) の on-shell の作業用の UFO から `phi phi > psi psi~ [virt=QCD]` で作り（図は Born 2、ループ 11、R2 4、UV 20）、検査プログラムは手順 (5) と同じく μ_R を固定した。始状態にスピンがなく終状態は区別できる粒子なので、MadLoop の Born は $\sum|\mathcal{M}^{(0)}|^2$、有限部分は $\sum 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})$ そのものである。$2 \to 2$ の分点はエネルギーごとに作るので（式の A が $\sqrt{s}$ による）、MadLoop も各エネルギーの 48 点で走らせた。山を平らにしない Gauss–Legendre の 48 点では、$\sqrt{s} = 20m$ で $\sigma_{\bar{B}}^{(0)}$ が相対 1.3×10^{-3}、$\sigma_{\bar{B}}^{(1)}$ が 2.7×10^{-3} ずれた。σ_3 の求積は、二つの組のそれぞれで、対の不変質量、$\cos\theta$ の半分ずつ、$\cos\theta^*$、ϕ^* に n 点ずつ（ϕ^* は等間隔）、計 $2n^4$ 点を使った。スピン和の確認には、MadGraph の `output standalone` の検査プログラムに `PS.input` で運動量を与えた（$n = 8$ の三つの変数の取り方の分点から 997 点おきに選び、$\sqrt{s} = 2.5m, 5m, 20m$ の計 69 点）。モンテカルロ積分は、$\sqrt{s}$ ごとに 200 万点（乱数の種 1）、ψ の向きの分布には 600 万点（種 3）を使った。MadGraph の断面積は、固定エネルギーの ϕ のビーム（`lpp = 0`）、カットなし、2 万事象（y^3 の図だけの過程は `/ phi` で作り 10 万事象、λy の図だけは `/ psi`）で求めた。$\sqrt{s} = 10m$ の $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ のずれは、`sde_strategy = 2`、`output` の `--hel_recycling=False`、`limhel = 0`、ヘリシティのサンプリング（`nhel = 1`）、5 倍の事象数のどれでも残った（これらは手で試したもので、スクリプトには含めていない）。

■ **手順 (7)。** `rg_feyncalc.wl` は、手順 (4) と (3) の振幅と自己エネルギーを同じ手順で作り直す（約 4 分）。記号的な μ 依存は、`PaVeReduce` でスカラー積分にした後、紫外で有限な C_0、D_0 を記号のまま残し、A_0、B_0 を Package-X で評価して `ScaleMu` で微分して求めた。数値は、Package-X では `ScaleMu` を、LoopTools では `LToolsSetMudim` を μ にして求めた。COLLIER（`rg_collier.f90`、手順 (4)、(6) と同じ関数）では `SetMuUV2_cll` で μ^2 を与え、$\phi\phi \to \phi\phi$ を ϕ の泡とフェルミオンの箱に分けて書き出した。MadLoop は手順 (5) の 4 つのプログラムを `MU_R.input` で μ_R を与えて走らせた。$\overline{\text{MS}}$ の MadLoop の $\phi\phi \to \phi\phi$ の有限部分は $-\lambda\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_A^{(1)}$、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ は Re をとった a、b の干渉で、留数と質量のずれの項は μ ごとに $B_0(\mu) = B_0(m) + \ln\mu^2$、$B_1(\mu) = B_1(m) - \frac{1}{2}\ln\mu^2$ として足した。図 6 の μ の点は $m/4$ から $4m$ の等比の 33 点で、1 ループの部分は COLLIER の値である。図 7 の軌道は式 (9) の閉じた形から描き、基準点の軌道は数値積分（`solve_ivp`、相対許容誤差 10^{-12}）と比べた。

■ **手順 (8)。** `pw_numeric.py` は、ヘリシティのスピノルと木の振幅を Python で陽に作り、$\cos\theta$ の区間の半分ずつで伝播関数の山を平らにする変換（付録 I）をして、Gauss–Legendre の 48 点ずつで射影した。変換の A は、その s で開いている過程の伝播関数の山のうち最も近いものからとった。Wigner の d 関数は和の公式から作り、$J \le 2$ の既知の形と比べた。(A) の走査は $\sqrt{s} = 2M + 10^{-4}m$ から $10^4 m$ までの 160 点で、(y^2, λ) の平面の 181 本の半直線に沿って境界を求めた。(B)、(C) の領域は、許される y が λ を固定したときに区間にならないところがあるので、

(y,λ) の格子（55×57 点）の上の破れの大きさの等高線として描いた。(C) の 1 ループの振幅は `pw_collier.f90`（手順 (4)、(6)、(7) と同じ関数で、λ の三角形と $\phi\phi\to\phi\phi$ の二つの構造を別に書き出す）で、$2m<\sqrt{s}\le 4m$ の 30 点と $\sqrt{s}=5m$、$10m$ で求めた。

■ **手順 (9)。** `bounce_numeric.py` は、4 つの走る量 (y^2,λ,m^2,M) を $t=0$ から y の Landau 極の 98% まで `solve_ivp`（相対許容誤差 10^{-12}）で積分し、ξ は閉じた形と γ_ϕ の数値積分の両方で求めて比べた（10^{-13}）。ΔV は $\phi=1$〜$10^5 m$ の 401 点で求め、$me^t=M_\psi(\phi)$ の選び方では t を方程式 $t=\frac{1}{2}\ln[M^2(t)+y^2(t)\xi^2(t)\phi^2]$ の解として決めた。$me^t<m$ になるところは $t=0$ とした。Fubini の解の確認は、$|\lambda|$ と R の 3 つの組で動径方向の方程式を $r=10^{-6}/\phi(0)$ から級数で始めて積分した。

■ **手順 (10)。** `prefactor_numeric.py` の Gel'fand–Yaglom の積分は `solve_ivp`（DOP853、相対許容誤差 10^{-12}）で $r=4000R$ まで行い、$r\to\infty$ の値は ϕ では $A+(c+d\ln r)/r^2$ を 3 点に、フェルミオンでは $A+c/r^2$ を 2 点に当てはめて求めた。$S^{\psi}_{\rm fin}(w)$ は $j\le300$ の和に j^{-3} の裾を足し、$\ln(-w)$ の 141 点の 3 次のスプラインで補間した（2×10^{-6}）。μ^* は $\mu R\in[\max(0.5,\mu_0 R),60]$ で E を最小にする値として求めた。$\Lambda_{\max}$ の積分は $t=\ln(1/mR)$ の 400 点の台形則である。

■ **手順 (11)。** `resum_numeric.py` の $S^{\psi}_{\rm fin}$ は手順 (10) と同じ部分波の和である。漸近形の確認では $j\le3000$ まで和をとり（$j\le1500$ との差は $|w|=1000$ で 3×10^{-9}）、Δ_ψ には $j\le600$ の値の $\ln(-w)$ の 91 点（$|w|\le5000$）のスプラインを使った（8×10^{-6}）。球面の問題は Gegenbauer の基底 $n\le40$ と Gauss–Jacobi の 800 点で解き、$n\le60$、2000 点との差は $\varepsilon=1$〜4 で 3×10^{-10} である。Newton 法は、$g>0$ を保つように歩幅を半分にしながら進めた。$f(\varepsilon)$ は ε の刻み 0.05 の解のスプラインで、各点で勾配は 10^{-9} 以下、負の固有値は一つである。κ を変えた $\lambda_{\rm eff}$ の微分は $\ln\phi$ の中心差分（刻み 10^{-3}）でとった。$\Lambda_{\max}$ の積分は $\ln\Lambda$ から 0.6 下までの 61 点の台形則で、$\Lambda_{\max}$ は `brentq`（$\ln\Lambda$ で 10^{-9}）で求めた。全体の実行は約 30 秒である。

■ **手順 (12)。** `scatC_collier.f90` は、ϕ の自己エネルギーの B_0、頂点の C のテンソル係数（被積分関数の経路と、式 (6) の規約の二通り）、4 つの箱の階数 2 の D のテンソル係数を、COLLIER の `C_cll`、`D_cll` で求める。COLLIER の二つの分岐（COLI と DD）の値は $\sqrt{s}=5m$ で 6×10^{-12}、前方に近い $\cos\theta=0.99$ でも 5×10^{-9} で一致した。`scatC_numeric.py` はヘリシティのスピノル（手順 (8) と同じカイラル表示）で式 (32) を組み立て、$D^{\mu\nu}$ を $g^{\mu\nu}D_{00}+\sum k_i^\mu k_j^\nu D_{ij}$ として $[\bar w\gamma_\mu w'][\bar w''\gamma_\nu w''']$ と縮約する。FeynCalc では 12 個の図を `TID` で PaVe 関数に簡約し、クラスごとに 4 つの構造の複素共役を掛けて `FermionSpinSum` でトレースにした（約 1 分）。図のクラスはループの伝播関数の数（1 と 2 が自己エネルギー、3 が頂点、4 が箱）と、スピノルの鎖 $\bar u_3\cdots u_1$ の有無（t 型）で分けた。MadLoop の手順は手順 (5) と同じで（`YUK` を `QCD` に読み替え）、図は Born 2、ループ 12、R2 6 である。MadLoop の三つの簡約のライブラリ（Ninja、COLLIER、CutTools）の値は互いに 10^{-14} で一致し、ヘリシティの選別を止めても変わらないが、CutTools の 4 倍精度の計算は倍精度の値と相対 2×10^{-8} 異なる。$J=1$ のユニタリー性は $\psi\bar\psi$ の閾値のすぐ上（$p=0.053M$）では両辺が p^6 のように 4×10^{-12} まで小さくなり、相対的な差は 2×10^{-5} に見えるが、差の絶対値は倍精度の丸め（10^{-16}）である。$\cos\theta$ の分点は手順 (8) と同じ写像の 2×48 点で、$J=1$ の偏差は分点を 4 倍にしても変わらない。(C) の格子は y に 46 点、λ に 78 点で、全体の実行は約 80 秒である。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d=4,6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則、1 ループ積分の一般式（付録 C）、$\overline{\rm MS}$ の有限部分（付録 G）、検算の手順と道具。

[2] $\phi^3+\phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d=4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。4 点頂点の Feynman 則と対称性因子（付録 A）、bounce と前因子の数値計算。

[3] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[4] S. Coleman, E. Weinberg, "Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking," Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。1 ループの有効ポテンシャル。

[5] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。3.6 節の表（Dirac

の双線形の C、P、T の変換)。
[6] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, “Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. 1. Wave function renormalization,” Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。
[7] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, “Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. 2. Yukawa couplings,” Nucl. Phys. B **236**, 221 (1984)。
[8] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, “Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory. 3. Scalar quartic couplings,” Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。
[9] M.-x. Luo, H.-w. Wang, Y. Xiao, “Two-loop renormalization group equations in general gauge field theories,” Phys. Rev. D **67**, 065019 (2003)。次元を持つ結合（質量）をダミーの場の方法で扱う。
[10] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (Cambridge University Press, 2007)。52 章（スカラーの湯川結合の β 関数)。
[11] M. Jacob, G. C. Wick, “On the general theory of collisions for particles with spin,” Annals Phys. **7**, 404 (1959)。ヘリシティの部分波。
[12] L. Allwicher, P. Arnan, D. Barducci, M. Nardecchia, “Perturbative unitarity constraints on generic Yukawa interactions,” JHEP **10**, 129 (2021)。4.1 節の模型 1（$N = 1$)。
[13] M. Sher, “Electroweak Higgs potentials and vacuum stability,” Phys. Rept. **179**, 273 (1989)。繰り込み群で改良した有効ポテンシャル。
[14] S. Fubini, “A new approach to conformal invariant field theories,” Nuovo Cim. A **34**, 521 (1976)。
[15] G. H. Derrick, “Comments on nonlinear wave equations as models for elementary particles,” J. Math. Phys. **5**, 1252 (1964)。
[16] G. Isidori, G. Ridolfi, A. Strumia, “On the metastability of the standard model vacuum,” Nucl. Phys. B **609**, 387 (2001)。
[17] C. G. Callan, S. Coleman, “The fate of the false vacuum. 2. First quantum corrections,” Phys. Rev. D **16**, 1762 (1977)。
[18] A. Andreassen, W. Frost, M. D. Schwartz, “Scale invariant instantons and the complete lifetime of the Standard Model,” Phys. Rev. D **97**, 056006 (2018)。スケール不変な bounce のまわりの行列式の閉じた形（式 (3.31)、(4.27)、(5.5)、(5.9)、(5.98)、(5.110))。
[19] A. Andreassen, W. Frost, M. D. Schwartz, “Consistent use of effective potentials,” Phys. Rev. D **91**, 016009 (2015)。$\lambda \sim \hbar$ と数える有効ポテンシャルの次数の数え方。
[20] I. Affleck, “On constrained instantons,” Nucl. Phys. B **191**, 429 (1981)。大きさを固定した instanton。