擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）

2026 年 10 月 12 日

概要

ϕ^3 理論と $\phi^3 + \phi^4$ 理論のノート [1, 2] に続き、フェルミオンを含む模型を $d = 4$ で調べる。模型は、実の擬スカラー場 ϕ と Dirac フェルミオン ψ が、湯川結合 $-iy\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ と自己相互作用 $\lambda\phi^4/4!$ を持つ理論である。パリティ（$\phi \to -\phi$）があるので ϕ の 1 次と 3 次の項は現れず、結合は y と λ の二つで閉じる。本ノートでは、まず Feynman 則、閉じたフェルミオンのループの符号、1 ループの 1PI 関数（ϕ と ψ の自己エネルギー、湯川の頂点、ϕ の 4 点関数）、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、繰り込み群の係数を手で求めた。$\beta_y = 5y^3/(4\pi)^2$、$\beta_\lambda = (3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4)/(4\pi)^2$ で、フェルミオンのループが β_λ に負の項 $-48y^4$ を与える。フェルミオンの箱の図は、トレースを伝播関数の分母で書き直すと、B_0、C_0、D_0 だけの短い式になる。1 ループでは比 λ/y^2 の流れが解析的に解ける。その結果、$\lambda > r_+ y^2$（$r_+ = (1 + \sqrt{145})/3 \approx 4.35$）なら λ が、$\lambda < r_+ y^2$ なら λ が負になるのが、y の Landau 極より先に起こる。基準点 $y = \lambda = 1$（$\mu = m$）では、$\mu \approx 19.5\, m$ で $\lambda = 0$ となる。木のレベルでは、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ は $\psi\bar{\psi}$ の閾値で p 波から始まり、$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ のスピン和はフェルミオンの質量に陽によらない。$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの S 行列要素の μ 依存は、β_λ の三つの項をすべて含む。最後に検算の計画を定め、その最初の二つの手順を行った。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts と UFO の頂点、MadGraph の図の数は手計算と一致した。同種のフェルミオンの散乱 $\psi\psi \to \psi\psi$ を加えた四つの過程の木の振幅とスピン和は、FeynCalc でも、Dirac 行列とスピノルを陽に作った数値計算でも手計算と一致し、MadGraph の断面積は数値積分と統計誤差の 1.4 倍以内で一致した。1 ループの 1PI 関数では、極と六つの対抗項が FeynCalc の結果と記号として一致し、有限部分は Package-X、LoopTools、COLLIER と相対 5×10^{-12} 以内で一致した（LoopTools が誤った C_0 を返す一点を除く）。γ^5 を BMHV の処方で扱うと、四つの 1PI 関数は NDR と有限の局所的な項だけ異なる。$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅も二つのスピノルの構造の係数として閉じた形に書け、FeynCalc と FormCalc の結果、COLLIER での数値、外線のスピンを固定したユニタリー性と一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 4

4 検算の計画 9

5 検算 10

6 議論と今後 13

付録 A Feynman 則と対称性因子の導出 14

付録 B 次元とべき数え上げ 14

付録 C γ^5、トレース、パリティ 15

付録 D 1PI 関数と対抗項の導出 16

付録 E 繰り込み群と有効ポテンシャルの導出 17

付録 F　木の振幅と断面積の導出 19

付録 G　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と S 行列要素の導出 20

付録 H　1 ループの $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の導出 21

付録 I　γ^5 の処方の違いの導出 22

付録 J　検算の細部 23

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、フェルミオンを含む最も簡単な繰り込み可能な模型で、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造はどうなるか。そして、その構造を ϕ^3 理論と同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の物理について何が言えるか。**とくに、摂動論が使える結合の範囲と、フェルミオンのループによる真空の不安定化を調べる。

第一の問いを立てる理由は、これまでの二つのノート [1, 2] がスカラー場だけを扱い、フェルミオンに固有の計算をツールで確かめる機会がなかったからである。フェルミオンを入れると、閉じたループの符号 -1 とスピンのトレース、γ^5 の扱い、自己エネルギーの Lorentz 構造（$\not{p}$ の項と質量の項）、外線のスピン和、フェルミオンの LSZ の留数が新たに現れる。場の繰り込み δ_ϕ も 1 ループで 0 でなくなる。擬スカラーの湯川結合を選ぶのは、パリティによって ϕ の 1 次と 3 次の項が禁じられ、繰り込みで閉じる結合が y と λ の二つだけになるからである。タドポールを打ち消す線形項も要らない。第二の問いを立てる理由は、この模型が、トップクォークのループが標準模型のヒッグスの 4 点結合を高エネルギーで負にする機構を、最も簡単な形で含むからである。$\phi^3 + \phi^4$ 理論で作った bounce と前因子の道具を、フェルミオンの寄与を加えて使える。

求める量は五つである。(i) Feynman 則と対称性因子、閉じたフェルミオンのループの符号。(ii) 1 ループの 1PI 関数（ϕ の 2 点・4 点関数、ψ の 2 点関数、湯川の頂点）の紫外発散部分と、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数と、繰り込み群の係数（β_y、β_λ、二つの質量の走り、二つの場の異常次元）。(iv) $\phi\phi \to \phi\phi$、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$、$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ の木の振幅、$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅とその S 行列要素、フェルミオンの極質量と留数。(v) 応用として、部分波のユニタリー性の限界と、真空の安定性（繰り込み群で改良した有効ポテンシャル、$\lambda < 0$ の bounce、フェルミオンの行列式を含む崩壊率）。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の出発点になる繰り込み群の流れと有効ポテンシャルを述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)〜(4)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 I に、検算の細部は付録 J にある。

2　設定

模型は、質量 m の実の擬スカラー場 ϕ と、質量 M の Dirac フェルミオン ψ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & \bar{\psi}\,(i\not{\partial} - M)\,\psi + \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - iy\mu^\epsilon\,\phi\,\bar{\psi}\gamma^5\psi - \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4 \\ & + \delta_\psi\,\bar{\psi}\,i\not{\partial}\,\psi - \delta_M\bar{\psi}\psi + \frac{1}{2}\,\delta_\phi\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - i\delta_y\mu^\epsilon\,\phi\,\bar{\psi}\gamma^5\psi - \frac{\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4\end{aligned} \tag{1}$$

とする。1 行目が繰り込まれた量で書いた模型、2 行目が対抗項である。$\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ はエルミートなので、湯川の項 $-y\phi\,\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ は実の y でエルミートである（付録 C）。定数項（真空のエネルギー）とその対抗項は、有効ポテンシャルを扱うときにだけ加える。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実の擬スカラー場と、その（繰り込まれた）質量（模型ファイル `Src/PsYukawa.fr` の `phi`、`mphi`）
ψ, M	Dirac フェルミオンと、その質量（`psi`、`Mpsi`）
y	擬スカラーの湯川結合（`yps`）。無次元
λ	4 点結合（`lamphi`）。無次元
D, ϵ	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$ と、その 4 からのずれ
μ	繰り込みスケール（$\overline{\mathrm{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	$1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_ϕ, δ_m, δ_ψ, δ_M, δ_y, δ_λ	ϕ の場・ϕ の質量・ψ の場・ψ の質量・湯川結合・4 点結合の対抗項（$\overline{\mathrm{MS}}$）
Z_ϕ, Z_ψ	場の繰り込み定数 $Z_\phi = 1 + \delta_\phi$、$Z_\psi = 1 + \delta_\psi$
$D_a(k)$, I_1^a, I_2^{ab}	伝播関数の分母 $k^2 - m_a^2 + i0$ と、1 点・2 点のスカラー積分（式 (3)）。添字 a, b は内線の質量 m または M
V_ϕ, V_ψ, V_y, V_4	1PI の ϕ の 2 点関数、ψ の 2 点関数、$\phi\bar\psi\psi$ の 3 点関数、ϕ の 4 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, B_1, C_0, C_i, D_0	1 ループ積分の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分。LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じ。$B_n^{ab}(p^2) \equiv B_n(p^2; m_a^2, m_b^2)$
$\mathcal{F}(x, x')$	フェルミオンの箱の図の和を B_0、C_0、D_0 で書いたもの（式 (7)）
s, t, u	Mandelstam 変数
$\mathcal{M}_A$, $\mathcal{M}_B$, $\mathcal{M}_C$	$\phi\phi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$、$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の振幅（式 (11)）。上付きの (0)、(1) は木と 1 ループ
$\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のフェルミオンのスピンについての和（平均ではない）
Σ_ϕ, Σ_ψ	自己エネルギー $\Sigma_\phi \equiv iV_\phi$、$\Sigma_\psi \equiv iV_\psi$。完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma_\phi)$、$i/(\not p - M - \Sigma_\psi)$
m_{p}, R_ϕ, M_{p}, R_ψ	ϕ と ψ の極質量と留数（式 (15)、(17)）
β_y, β_λ	$\beta_y \equiv \mathrm{d}y/\mathrm{d}\ln\mu$、$\beta_\lambda \equiv \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon \to 0$ の値）
γ_m, γ_M	質量の走り $\gamma_m \equiv \mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$、$\gamma_M \equiv \mu\,\mathrm{d}M/\mathrm{d}\mu$
γ_ϕ, γ_ψ	場の異常次元 $\gamma_\phi \equiv \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\ln Z_\phi/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_\psi \equiv \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\ln Z_\psi/\mathrm{d}\ln\mu$
r, $r_\pm$	比 $r \equiv \lambda/y^2$ と、その流れの固定点 $r_\pm = (1 \pm \sqrt{145})/3$（式 (9)）
V_{eff}, $m_\phi^2(\phi)$, $M_\psi^2(\phi)$	1 ループの有効ポテンシャルと、場に依存する質量の 2 乗（式 (10)）
E_ϕ, E_ψ, V_y, V_4, L	図の外の ϕ 線、外のフェルミオン線、湯川の頂点、4 点頂点、ループの数

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。$\not a \equiv \gamma^\mu a_\mu$、$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$、$(\gamma^5)^2 = 1$ である。
2. 場は実スカラー ϕ と Dirac フェルミオン ψ がそれぞれ 1 つで、相互作用は擬スカラーの湯川結合と ϕ^4 だけとする。y は実数で、物理量は y^2 だけによる（$\phi \to -\phi$ で $y \to -y$）。$\lambda \geq 0$、$m^2 > 0$、$M > 0$ とする。ϕ が $\psi\bar\psi$ に崩れないように $m < 2M$ とする。
3. 模型はパリティ $\phi(t, \boldsymbol{x}) \to -\phi(t, -\boldsymbol{x})$、$\psi(t, \boldsymbol{x}) \to \gamma^0\psi(t, -\boldsymbol{x})$ で不変とする。これは ϕ、ϕ^3、$\phi\bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi$ の項を禁じる（付録 C）。そのため、タドポールを打ち消す線形項も、3 点結合も置かない。
4. 時空次元は $d = 4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。D 次元では ϕ の質量次元は $1 - \epsilon$、ψ の質量次元は $3/2 - \epsilon$ なので、無次元の y と λ に μ^ϵ、$\mu^{2\epsilon}$ を掛けて書く（付録 B）。
5. γ^5 は D 次元のすべての γ^μ と反可換とし（NDR）、スピンのトレースは $\mathrm{tr}\,1 = 4$ とする。1 ループでは、この処方に曖昧さは生じない（付録 C）。
6. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。
7. 数値を比べるときの基準点は $m = \mu = 1$、$M = 0.7$、$y = \lambda = 1$ とする（M と μ は m を単位とする）。$M \neq m$ とするのは、二つの質量の取り違えをツールの検算で見つけられるようにするためである。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。積分の記号はこれまでのノートと同じで、質量の違う内線を区別する添字を加えた。




図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。破線は ϕ、矢印の付いた実線は ψ で、矢印はフェルミオン数の流れの向きである。上の段は左から ϕ と ψ の伝播関数、湯川の頂点、4 点頂点。下の段はそれぞれの対抗項で、$\otimes$ は対抗項の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。閉じたフェルミオンのループには -1 とトレースが付く。




図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。括弧は外線の付け方の数である。(a) と (f) は閉じたフェルミオンのループで、-1 とトレースが付く。(f) の 6 通りは、4 本の外線をループに付ける巡回の順序（向きを区別して $3! = 6$）である。(g) と (h) は γ^5 を奇数個含むトレースで 0 になり、パリティで禁じられた ϕ と ϕ^3 の項が生じないことを表す（付録 C）。

3　結果

■ Feynman 則と対称性因子。 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。ϕ の伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$、ψ の伝播関数は $i(\not{p}+M)/(p^2-M^2+i0)$、湯川の頂点は $y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点頂点は $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。湯川の頂点に i が付かないのは、相互作用 $-iy\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ の $-i$ と、頂点の規則の i が打ち消すからである。対抗項は、ϕ の 2 点の挿入 $i(\delta_\phi p^2-\delta_m)$、$\psi$ の 2 点の挿入 $i(\delta_\psi\not{p}-\delta_M)$、湯川の挿入 $\delta_y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点の挿入 $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ になる。閉じたフェルミオンのループには、因子 -1 とスピンのトレースが付く。1 ループの 1PI 図は図 2 の (a)〜(f) である。対称性因子は、ϕ の線だけでできたループ（(b)、(e)）で 1/2、フェルミオンの線を含むループで 1 である。フェルミオンの線には向きがあるので、二つの内線が入れ替わる対称性がない。フェルミオンの箱 (f) は、4 本の外線をループに付ける順序が 6 通りあり、互いに向きが逆の 2 つずつは同じ値を持つ。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。

■ **べき数え上げ。** 外の ϕ 線 E_ϕ 本、外のフェルミオン線 E_ψ 本の図の表面的な発散次数は、$d=4$ で

$$\omega = 4 - E_\phi - \frac{3}{2}E_\psi \tag{2}$$

である（付録 B）。湯川の頂点と 4 点頂点はどちらも無次元の結合なので、ω は頂点の数によらない。$\omega \geq 0$ となるのは、$(E_\phi, E_\psi) = (1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(0,2),(1,2)$ の 6 種類である。このうち ϕ の 1 点関数と 3 点関数はパリティで 0 になる。残りの 4 種類が図 2 の V_ϕ（$\omega=2$）、V_4（$\omega=0$）、V_ψ（$\omega=1$）、V_y（$\omega=0$）で、式 (1) の対抗項がちょうどそれらに対応する。$\phi\phi\psi\bar{\psi}$ の 4 点関数（$\omega=-1$）と、フェルミオン 4 本の関数（$\omega=-2$）は有限である。

■ **パリティと消える図。** 1 ループで ϕ の 1 点関数を作る図は、フェルミオンのループ (g) だけである。そのトレース $\mathrm{tr}[\gamma^5(\not{k}+M)]$ は 0 である。ϕ の 3 点関数を作る図はフェルミオンの三角形 (h) で、そのトレースは γ^5 を 3 つ含み、γ^5 を 1 つにまとめると、残りの γ 行列は 3 個以下になる。γ^5 と 3 個以下の γ 行列のトレースは 0 なので、(h) も 0 である（付録 C）。これらが 0 になるのは、パリティが ϕ と ϕ^3 の項を禁じることの 1 ループでの現れである。したがって、本模型には線形項 $Y\phi$ も 3 点結合も要らない。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$（$m_a = m$ または M）と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$I_1^a \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)}, \qquad I_2^{ab}(p^2) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\,D_b(k+p)} \tag{3}$$

と定義する。図 2 の図を Feynman 則で書き、トレースと γ^5 を整理して対抗項を加えると

$$\begin{aligned}
V_\phi(p^2) &= 2y^2\mu^{2\epsilon}\big[p^2 I_2^{MM}(p^2) - 2I_1^M\big] + \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{2}\,I_1^m + i\big(\delta_\phi p^2 - \delta_m\big),\\
V_\psi(p) &= y^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\not{k} - M}{D_M(k)\,D_m(k-p)} + i\big(\delta_\psi \not{p} - \delta_M\big),\\
V_y &= -iy^3\mu^{3\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\big(M^2 - k^2 - M\not{q} - \not{q}\not{k}\big)\gamma^5}{D_M(k+q)\,D_M(k)\,D_m(k-p)} + \delta_y\mu^\epsilon\gamma^5,\\
V_4 &= \frac{\lambda^2\mu^{4\epsilon}}{2}\sum_{x=s,t,u} I_2^{mm}(x) - y^4\mu^{4\epsilon}\sum_{(6)}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{T}{D_M(k_1)D_M(k_2)D_M(k_3)D_M(k_4)} - i\,\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}
\end{aligned} \tag{4}$$

となる（付録 D）。V_ψ の p は入ってくるフェルミオンの運動量である。V_y では、入ってくるフェルミオンの運動量を p、入ってくる ϕ の運動量を q、出ていくフェルミオンの運動量を $p' = p+q$ とした。V_4 の $k_1,\ldots,k_4$ は箱の 4 本の伝播関数の運動量で、トレースは $T = \mathrm{tr}[(M-\not{k}_1)(M+\not{k}_2)(M-\not{k}_3)(M+\not{k}_4)]$ である。$\gamma^5(\not{\phi}+M)\gamma^5 = -\not{\phi}+M$ を使って γ^5 を消した。V_ϕ の第 1 項の符号は、閉じたフェルミオンのループの -1 から来る。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。** $d=4$ で発散するのは、I_1、I_2、ベクトルの 2 点積分、および V_y と V_4 の中で分子の運動量の 2 乗が分母の運動量の 2 乗を打ち消す項である。極を取り出すと（付録 D）、式 (4) の極を消す対抗項は

$$\begin{aligned}
\delta_\phi &= -\frac{2y^2}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_m = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{\lambda m^2}{2} - 4y^2M^2\Big)\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\psi = -\frac{y^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}},\\
\delta_M &= -\frac{y^2 M}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_y = \frac{y^3}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\lambda = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{3\lambda^2}{2} - 24y^4\Big)\Delta_{\mathrm{UV}}
\end{aligned} \tag{5}$$

である。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違って、ϕ の場の対抗項 δ_ϕ が 0 でなくなる。これはフェルミオンのループ (a) の極が p^2 に比例する部分を持つからで、閉じたループの -1 のために $\delta_\phi < 0$ である。δ_λ の $-24y^4$ はフェルミオンの箱 (f) の 6 つの図から来て、やはり -1 のために負である。δ_M の符号は、スカラーの湯川結合 $y\phi\bar{\psi}\psi$ の場合と逆になる。γ^5 がフェルミオンの伝播関数の質量の項の符号を反転させるからである。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (5) を式 (4) に入れて $\epsilon \to 0$ とすると

$$
\begin{aligned}
V_\phi(p^2) &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2 B_0^{MM}(p^2) - 2A_0(M^2)\big) + \frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big],\\
V_\psi(p) &= -\frac{iy^2}{(4\pi)^2}\Big[\not{p}\, B_1^{Mm}(p^2) + M\, B_0^{Mm}(p^2)\Big],\\
V_y &= -\frac{y^3}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{Mm}(p'^2) + M\not{q}\, C_0 + q^2 C_1 - \not{q}\not{p}\, C_2\Big]\gamma^5,\\
V_4 &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[\frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u} B_0^{mm}(x) - 2y^4 \sum_{(x,x')} \mathcal{F}(x,x')\Big]
\end{aligned}
\tag{6}
$$

となる（付録 D）。A_0、B_0、B_1、C_i は LoopTools の規約の $\overline{\rm MS}$ の有限部分で、B_1 は $\int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/(D_a(k)D_b(k+p))$ の p^μ の係数、$C_i \equiv C_i(q^2, p'^2, p^2; M^2, M^2, m^2)$ である。V_4 は外線の ϕ がすべて質量殻上（$p_i^2 = m^2$）のときの値で、和は $(x,x') = (s,t),(t,u),(u,s)$ についてとる。フェルミオンの箱の図の和は

$$
\mathcal{F}(x,x') = (2m^4 - xx')\, D_0^M(x,x') + 2\big[B_0^{MM}(x) + B_0^{MM}(x')\big] + 2(x - 2m^2)\, C_0^M(x) + 2(x' - 2m^2)\, C_0^M(x') \tag{7}
$$

となる。ここで $C_0^M(x) \equiv C_0(m^2, m^2, x; M^2, M^2, M^2)$、$D_0^M(x,x')$ は外線の質量の 2 乗がすべて m^2 で、二つのチャンネルの不変量が x、x' の箱の積分（内線の質量はすべて M）である。この短い形は、トレース T の中の内積 $k_i \cdot k_j$ を分母 $D_M(k_i)$、$D_M(k_j)$ と外線の不変量で書き直すと、T が分母の 2 次式になることから得られる（付録 D）。その際、T の定数項からフェルミオンの質量 M は消える。自己エネルギーは

$$
\Sigma_\phi = -\frac{1}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2 B_0^{MM}(p^2) - 2A_0(M^2)\big) + \frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big], \qquad \Sigma_\psi = \frac{y^2}{(4\pi)^2}\Big[\not{p}\, B_1^{Mm}(p^2) + M\, B_0^{Mm}(p^2)\Big]
$$

である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから

$$
\begin{gathered}
\beta_y = \frac{5y^3}{(4\pi)^2}, \qquad \beta_\lambda = \frac{3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_m = \frac{\lambda m^2 + 4y^2 m^2 - 8y^2 M^2}{(4\pi)^2},\\
\gamma_M = -\frac{y^2 M}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_\phi = \frac{2y^2}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma_\psi = \frac{y^2}{2(4\pi)^2}
\end{gathered}
\tag{8}
$$

を得る（付録 E）。β_y の係数 5 は、頂点 (d) の 2 と、場の繰り込みからの $2\gamma_\psi + \gamma_\phi$ の 3 の和である。β_λ の三つの項は、ϕ の泡 (e)（$3\lambda^2$）、外線 4 本の場の繰り込み（$4\gamma_\phi\lambda = 8\lambda y^2$）、フェルミオンの箱 (f)（$-48y^4$）から来る。$\gamma_M$ が負であることも、スカラーの湯川結合（$+3y^2M/(4\pi)^2$）と違う点である。$M = 0$ では、カイラル回転 $\psi \to e^{i\pi\gamma^5/4}\psi$ で擬スカラーの湯川結合はスカラーの湯川結合に移るので、質量によらない β_y、β_λ、γ_ϕ、γ_ψ は両者で同じである（付録 C）。

1 ループでは、比 $r \equiv \lambda/y^2$ の流れが解析的に解ける（付録 E）。$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\ln\mu = y^2(3r^2 - 2r - 48)/(4\pi)^2$ で、その零点は $r_\pm = (1 \pm \sqrt{145})/3$（$r_+ = 4.3472$、$r_- = -3.6805$）である。$\mu = \mu_0$ での値を r_0、y_0 とすると

$$
\frac{r - r_+}{r - r_-} = \frac{r_0 - r_+}{r_0 - r_-}\Big(\frac{y^2}{y_0^2}\Big)^{\sqrt{145}/5}, \qquad \frac{y^2}{y_0^2} = \frac{1}{1 - 10y_0^2\ln(\mu/\mu_0)/(4\pi)^2} \tag{9}
$$

となる。y^2 は μ とともに増え、$\ln(\mu_{\rm L}/\mu_0) = (4\pi)^2/(10y_0^2)$ で Landau 極に達する。$r_0 < r_+$ なら r は減り続けて 0 を横切り、Landau 極で r_- に近づく。すなわち、λ は y の Landau 極より先に負になる。$r_0 > r_+$ なら r は増え続け、λ のほうが先に発散する。$r = r_+$ は低エネルギーで引きつける固定点である。基準点 $y_0 = \lambda_0 = 1$、$\mu_0 = m$ では、λ は $\mu = 19.49\, m$ で 0 になり、y の Landau 極は $\mu_{\rm L} = 7.2 \times 10^6\, m$ にある。λ が負になることは、次の有効ポテンシャルが大きな場で下に有界でなくなることを意味し、手順 (9)、(10) で調べる真空の不安定性の出発点になる。

■ **有効ポテンシャル。** $\overline{\rm MS}$ の 1 ループの有効ポテンシャルは

$$
\begin{gathered}
V_{\rm eff}(\phi) = \Lambda + \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{24}\phi^4 + \frac{1}{64\pi^2}\Big[m_\phi^4\Big(\ln\frac{m_\phi^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big) - 4M_\psi^4\Big(\ln\frac{M_\psi^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big)\Big],\\
m_\phi^2(\phi) = m^2 + \frac{\lambda}{2}\phi^2, \qquad M_\psi^2(\phi) = M^2 + y^2\phi^2
\end{gathered}
\tag{10}
$$




図 3: 木の図。(A) $\phi\phi \to \phi\phi$ の接触項。(B) $\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ の t、u チャンネルのフェルミオンの交換。(C) $\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の s、t チャンネルの ϕ の交換（相対符号 -1）。時間は左から右に流れる。

である（Coleman と Weinberg [4]、導出は付録 E）。Λ は真空のエネルギーである。フェルミオンの項の係数 -4 は、Dirac フェルミオンの自由度 4 と、Grassmann 数の積分の符号から来る。擬スカラーの湯川結合では、場に依存する質量は $M_\psi^2 = M^2 + y^2\phi^2$ で、ϕ の 1 次の項を持たない（スカラーの湯川結合では $(M + y\phi)^2$）。$V_{\rm eff}$ の μ 依存が、係数の走りと場の異常次元で打ち消される条件から、式 (8) の β_λ と γ_m が再び得られ、真空のエネルギーの走り $\mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}\ln\mu = (m^4 - 4M^4)/(2(4\pi)^2)$ も決まる。木のポテンシャルの極小は $\phi = 0$ だけだが、大きな ϕ ではフェルミオンの項 $-4y^4\phi^4\ln(y^2\phi^2/\mu^2)/(64\pi^2)$ が効き、$\mu \sim \phi$ での λ が負なら $V_{\rm eff}$ は下に有界でなくなる。

■ **木の散乱振幅。** 三つの過程を考える（図 3、付録 F）。$\phi(p_1)\phi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ は、3 点結合がないので接触項だけである。$\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \phi(k_1)\phi(k_2)$ は t と u チャンネルのフェルミオンの交換で、s チャンネルの図はない。$\psi(p_1)\bar\psi(p_2) \to \psi(p_3)\bar\psi(p_4)$ は s と t チャンネルの ϕ の交換で、二つの図の相対符号は -1 である。振幅とスピン和は

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M}_A^{(0)} = -\lambda,\\
&\mathcal{M}_B^{(0)} = y^2\,\bar v(p_2)\Big[\frac{\not k_1}{t-M^2} + \frac{\not k_2}{u-M^2}\Big]u(p_1), \qquad \sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2 = \frac{2y^4\big[(t-M^2)(u-M^2)-m^4\big](t-u)^2}{(t-M^2)^2(u-M^2)^2},\\
&\sum|\mathcal{M}_C^{(0)}|^2 = 4y^4\Big[\frac{s^2}{(s-m^2)^2} + \frac{t^2}{(t-m^2)^2} + \frac{st}{(s-m^2)(t-m^2)}\Big]
\end{aligned} \tag{11}$$

である（付録 F）。$\mathcal{M}_B$ では、質量殻上の $\bar v(p_2)$ と $u(p_1)$ に挟まれて、交換されるフェルミオンの運動量 $\not p_1$ と質量 M の項が消えた。重心系で ψ と ϕ の運動量の大きさを p、k、散乱角を θ とすると、$t - u = 4pk\cos\theta$、$(t-M^2)(u-M^2) - m^4 = k^2(s - 4p^2\cos^2\theta)$ なので

$$\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2 = \frac{32y^4p^2k^4\cos^2\theta\,(s - 4p^2\cos^2\theta)}{(t-M^2)^2(u-M^2)^2}$$

となる（付録 F）。p^2 に比例するので、$\psi\bar\psi$ の閾値（$p \to 0$）の近くでは、$\psi\bar\psi \to \phi\phi$ は p 波から始まり、$\sigma v \propto v^2$ である。これは、S 波の $\psi\bar\psi$（${}^1S_0$ と ${}^3S_1$）のパリティがどちらも負で、同種の擬スカラー 2 つの状態（軌道角運動量が偶数なのでパリティが正）に移れないことの現れである。ただし、$\psi\bar\psi$ の閾値で $\phi\phi$ を作れるのは $m < M$ のときだけである。基準点のように $m > M$ では、断面積は $\phi\phi$ の閾値（$k \to 0$）から始まり、$\sum|\mathcal{M}_B|^2 \propto k^4$、すなわち $\sigma_B \propto k^5$ と、終状態が D 波であるようにふるまう。$\sum|\mathcal{M}_C|^2$ には M が陽に現れない。$\bar\psi\gamma^5\psi$ の型の双一次形式の 2 乗のスピン和が、$2s$、$-2t$、$-2st$ のように質量によらない形になるからで、M は運動学（$s+t+u = 4M^2$）を通してだけ入る。

全断面積は、重心系の始状態と終状態の運動量の大きさを p、k として

$$\sigma_A = \frac{\lambda^2}{32\pi s}, \qquad \sigma_B = \frac{1}{2}\,\frac{k}{64\pi^2 sp}\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2, \qquad \sigma_C = \frac{1}{64\pi^2 s}\int\mathrm{d}\Omega\,\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}_C^{(0)}|^2 \tag{12}$$

である（付録 F）。$\frac14$ は始状態のスピンの平均、σ_A と σ_B の $\frac12$ は終状態の同種の ϕ の因子である。$\psi\bar\psi \to \psi\bar\psi$ の終状態の ψ と $\bar\psi$ は区別できるので、$\frac12$ は付かない。

■ **1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と S 行列要素。** 3 点結合がないので、$\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの振幅（外線の補正を除く）は 1PI の 4 点関数だけで、$i\mathcal{M}_A^{(1)} = V_4$ である。式 (6) から

$$(4\pi)^2\,\mathcal{M}_A^{(1)} = \frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u}B_0^{mm}(x) - 2y^4\sum_{(x,x')}\mathcal{F}(x,x') \tag{13}$$

を得る。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}_A^{(1)}(s,t)=\frac{\lambda^2 p}{16\pi\sqrt{s}}+\frac{1}{2}\,\frac{p_\psi}{16\pi^2\sqrt{s}}\int\mathrm{d}\Omega_q\sum_{\text{spins}}\mathcal{M}(\phi_1\phi_2\to\psi\bar\psi)\,\mathcal{M}^*(\phi_3\phi_4\to\psi\bar\psi)\tag{14}$$

を満たす（付録 G）。第 1 項は $\phi\phi$ の中間状態（同種粒子の $\frac12$ を含む）、第 2 項は $\psi\bar\psi$ の中間状態で、$p_\psi=\sqrt{s/4-M^2}$、$\phi_3\phi_4$ は終状態の $\phi(k_1)\phi(k_2)$ である。$m<2M$ でも $s\ge4m^2>4M^2$ なので、物理的な領域では $\psi\bar\psi$ の中間状態がいつも開いている。前方 $t=0$ では、これは光学定理 $\operatorname{Im}\mathcal{M}_A^{(1)}(s,0)=2p\sqrt{s}\,[\sigma_A+\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)]$ になる。$\sum|\mathcal{M}(\phi\phi\to\psi\bar\psi)|^2$ は式 (11) の $\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2$ と同じ関数である。

$\overline{\text{MS}}$ の質量 m は伝播関数の極ではなく、外線の留数も 1 ではない。ϕ の極質量と留数は

$$m_{\text{p}}^2=m^2-\frac{1}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(m^2B_0^{MM}(m^2)-2A_0(M^2)\big)+\frac{\lambda}{2}A_0(m^2)\Big],\qquad R_\phi=1-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{MM}(m^2)+m^2B_0^{MM\prime}(m^2)\Big]\tag{15}$$

である（付録 G）。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違い、フェルミオンのループのために R_ϕ は y^2 の次数で 1 からずれ、μ にも依存する（$\mu\,\mathrm{d}R_\phi/\mathrm{d}\mu=-2\gamma_\phi$）。木の振幅 $-\lambda$ は質量によらないので、S 行列要素 $R_\phi^2(\mathcal{M}_A^{(0)}+\mathcal{M}_A^{(1)})$ は

$$\mathcal{M}_{A,\text{phys}}=-\lambda+\frac{4\lambda y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_0^{MM}(m_{\text{p}}^2)+m_{\text{p}}^2B_0^{MM\prime}(m_{\text{p}}^2)\Big]+\mathcal{M}_A^{(1)}\big|_{m\to m_{\text{p}}}\tag{16}$$

となる。結合を固定して μ を変えると $\mu\partial\mathcal{M}_{A,\text{phys}}/\partial\mu=(3\lambda^2+8\lambda y^2-48y^4)/(4\pi)^2=\beta_\lambda$ で、これは木の振幅の $-\lambda(\mu)$ の走りとちょうど打ち消し合う（付録 G）。$3\lambda^2$ は ϕ の泡、$-48y^4$ はフェルミオンの箱、$8\lambda y^2$ は外線の留数から来るので、$\phi\phi\to\phi\phi$ の S 行列要素の μ 依存だけで β_λ の三つの項がすべて読み取れる。

フェルミオンの極質量と留数は、$\Sigma_\psi=\not p\,\Sigma_V(p^2)+M\Sigma_S(p^2)$（$\Sigma_V=y^2B_1^{Mm}/(4\pi)^2$、$\Sigma_S=y^2B_0^{Mm}/(4\pi)^2$）から

$$M_{\text{p}}=M\Big[1+\frac{y^2}{(4\pi)^2}\big(B_0^{Mm}+B_1^{Mm}\big)\Big],\qquad R_\psi=1+\frac{y^2}{(4\pi)^2}\Big[B_1^{Mm}+2M^2\big(B_0^{Mm\prime}+B_1^{Mm\prime}\big)\Big]\tag{17}$$

である（付録 G）。B はすべて $p^2=M^2$ での値である。M_{p} は μ によらず（$\mu\,\partial(B_0+B_1)/\partial\mu=1$ と γ_M が打ち消す）、外線のフェルミオン 1 本ごとに S 行列要素に $R_\psi^{1/2}$ が掛かる。これらは $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の 1 ループの S 行列要素（手順 (5)）で使う。

■ **1 ループの $\psi\bar\psi\to\phi\phi$。** 外線にフェルミオンを持つ過程の 1 ループの振幅も、手で閉じた形に書ける。外線の補正を除いた 1 ループの図は、内線のフェルミオンの自己エネルギー（t、u チャンネルに 1 つずつ）、頂点の補正（4 つ）、箱（2 つ）、ϕ の 2 本の内線が 4 点頂点で終わる三角形（λ の三角形、1 つ）、s チャンネルの ϕ にフェルミオンの三角形が付いた図（2 つ）の 11 個である。最後の 2 つはトレースが γ^5 と 3 個以下の γ 行列しか含まないので 0 になる。Dirac 方程式と $k_2=p_1+p_2-k_1$ を使うと、どの図も二つのスピノルの構造 $\bar v(p_2)u(p_1)$ と $\bar v(p_2)\not k_1u(p_1)$ だけで書ける（$\bar v(p_2)(\not p_1+\not p_2)u(p_1)=0$ なので $\bar v\not k_2u=-\bar v\not k_1u$）。木の振幅は $b^{(0)}\bar v\not k_1u$、$b^{(0)}=y^2[1/(t-M^2)-1/(u-M^2)]$ である。$\overline{\text{MS}}$ で繰り込んだ 1 ループの振幅は

$$\begin{aligned}
(4\pi)^2\mathcal{M}_B^{(1)}&=a\,\bar v(p_2)u(p_1)+b\,\bar v(p_2)\not k_1u(p_1),\\
a&=\lambda y^2M\,C_1^\lambda+y^4M\sum_{x=t,u}\Big\{\frac{B_0(x)+B_1(x)}{x-M^2}-\big[C_0^{(1)}+C_2^{(1)}+C_0^{(2)}+C_2^{(2)}\big](x)\\
&\qquad-(x-M^2)\big[D_1+D_2+D_3\big](x)+C_1^s+C_2^s\Big\},\\
b&=y^4\sum_{x=t,u}\sigma_x\Big\{\frac{(x+M^2)B_1(x)+2M^2B_0(x)}{(x-M^2)^2}-\frac{B_0(x)+m^2C_1^{(1)}(x)+2M^2\big[C_0^{(1)}+C_2^{(1)}\big](x)}{x-M^2}\\
&\qquad-\frac{B_0(M^2)+m^2C_1^{(2)}(x)+2M^2C_0^{(2)}(x)+(x+M^2)C_2^{(2)}(x)}{x-M^2}\\
&\qquad+m^2D_0(x)+C_0^M(s)+(x-M^2)D_2(x)\Big\}
\end{aligned}\tag{18}$$

である（付録 H）。$\sigma_t=1$、$\sigma_u=-1$ で、積分は LoopTools の規約の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分である。$B_n(x)\equiv B_n(x;M^2,m^2)$、頂点の積分は $C_n^{(1)}(x)\equiv C_n(m^2,x,M^2;M^2,M^2,m^2)$（$\psi(p_1)$ の側）と $C_n^{(2)}(x)\equiv C_n(m^2,M^2,x;M^2,M^2,m^2)$（$\bar\psi(p_2)$

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	書き出した FeynArts 模型の係数と、図の対称性因子	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン和 (11)	付録 F	記号として一致	—	—	断面積
1PI 関数の極と対抗項 (5)	付録 D	PaVe 関数に簡約し、極を抽出。γ^5 の処方（NDR と BMHV）の比較	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (6)、(7)	付録 D	対抗項を加える	解析式	数値	—
1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (13)、S 行列要素 (16)、$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$	付録 G、後で	記号として比べる（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
全断面積（$2 \to 3$ を含む）	後で	—	—	COLLIER	MadLoop、$2 \to 3$
繰り込み群 (8)、(9)	付録 E	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R
部分波とユニタリー性の限界	後で	—	—	COLLIER	—
有効ポテンシャル (10) と $\lambda < 0$ の bounce	付録 E、後で	—	—	—	—
フェルミオンの行列式を含む崩壊率	後で	—	—	—	—

の側)、箱は $D_n(x) \equiv D_n(M^2, m^2, m^2, M^2, x, s; m^2, M^2, M^2, M^2)$、箱から ϕ 以外の内線を 1 本除いた三角形は $C_n^s \equiv C_n(M^2, s, M^2; m^2, M^2, M^2)$ と $C_0^M(s)$、λ の三角形は $C_1^\lambda \equiv C_1(M^2, M^2, s; m^2, m^2, m^2)$ である。a の各項は順に、λ の三角形、自己エネルギー、二つの頂点の補正、箱から来る。λ の三角形は $\bar{v}u$ の構造だけを持つ。箱は、分子の $\not{\ell}$ を Dirac 方程式と伝播関数の分母で消すと、テンソル積分を経ずに D_0、$D_{1,2,3}$、三角形の積分で書ける（付録 H)。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{Im} a\,\bar{v}u + \operatorname{Im} b\,\bar{v}\not{k}_1 u}{(4\pi)^2} = \frac{1}{2}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_q \sum_{\text{spins}} \mathcal{M}_C(\psi\bar{\psi} \to \psi_q\bar{\psi}_q)\,\mathcal{M}^*(\phi\phi \to \psi_q\bar{\psi}_q) \\ + \frac{1}{4}\frac{k}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_q\, \mathcal{M}_B^{(0)}(\psi\bar{\psi} \to \phi_q\phi_q)\,(-\lambda)\end{aligned} \tag{19}$$

を満たす（付録 H)。右辺の第 1 項は $\psi\bar{\psi}$ の中間状態（$|\boldsymbol{q}| = p$)、第 2 項は $\phi\phi$ の中間状態（$|\boldsymbol{q}| = k$、同種粒子の $\frac{1}{2}$）で、外線のスピンを固定した等式である。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [3] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (4) のトレースと γ^5 の整理、式 (5) の極、式 (6) の V_y の形、式 (7) のもとになるトレースの書き直し、式 (11) のスピン和は、FeynCalc で予備的に確かめた。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれるので、これまでのノートと同じく本ノートの V

表 3: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。

過程	図の数	内訳
$\phi\phi \to \phi\phi$	1	接触項（ϕ^3 がないので交換の図はない）
$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$	2	t、u チャンネルのフェルミオンの交換
$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$	2	s、t チャンネルの ϕ の交換
$\psi\psi \to \psi\psi$	2	t、u チャンネルの ϕ の交換
$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi\phi$	7	フェルミオンの線から 3 つの ϕ を出す順序 $3! = 6$、$\psi\bar{\psi} \to \phi^* \to \phi\phi\phi$（$\lambda$）1
$\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$	7	上の過程の交差（フェルミオンの線に 3 つの ϕ を付ける順序 6、λ を通る図 1）

に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `PsYukawa.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 三つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で、断面積を MadGraph で確かめる。(3) 1 ループの 1PI 関数 V_ϕ、V_ψ、V_y、V_4 の極と対抗項を FeynCalc・Package-X で確かめ、有限部分を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。γ^5 を BMHV の処方で扱ったときの違いも調べる。(4) 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、数値をツールどうしで比べ、虚部をフェルミオンの中間状態を含むユニタリー性で確かめる。(5) ϕ と ψ の極質量と留数で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 全断面積を、1 ループの補正と $2 \to 3$ の過程を含めて求める。(7) S 行列要素の μ 依存から β_y、β_λ、γ_m、γ_M を読み取り、式 (8) と文献の値と比べ、比 λ/y^2 の流れ（式 (9)）を描く。(8) $\phi\phi$ と $\psi\bar{\psi}$ のヘリシティの状態を合わせた部分波のユニタリー性から、(y, λ) の限界を出す。(9) 繰り込み群で改良した有効ポテンシャルで λ が負になる尺度を求め、$\lambda < 0$ の bounce（大きさを決めない instanton）の作用を求める。(10) フェルミオンの揺らぎの行列式を含む崩壊率の 1 ループの前因子を求め、(y, λ) の真空の準安定性の限界を出す。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で、手順 (2) は `run_tree_check.sh` で、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh` で、手順 (4) は `run_scat_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/PsYukawa.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項を除いた部分である。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 J に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は二つで、$\bar{\psi}\psi\phi$ の頂点は $\texttt{yps}\,\gamma^5$、4 点頂点は $-i\,\texttt{lamphi}$ となり、図 1 の $y\gamma^5$、$-i\lambda$ と一致した。パリティで禁じられた ϕ^3 の頂点やスカラーの湯川の頂点は現れない。FeynArts の模型では、湯川の頂点はカイラルな射影 $\omega_\pm = (1 \pm \gamma^5)/2$ の係数の組 $\{c_L, c_R\} = \{-\texttt{yps}, \texttt{yps}\}$ として書かれ、$c_L\omega_- + c_R\omega_+ = \texttt{yps}\,\gamma^5$ である。UFO では、頂点の Lorentz 構造が `Gamma5`、結合が `yps` である。FeynArts の模型と UFO は `Src/generated/` に書き出した。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 3 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_PsYukawa.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅とスピン和。** `Src/generated/PsYukawa_FA` の FeynArts 模型から木の図を作り、FeynCalc で振幅を組み立ててスピンについて和をとった。図の数は表 3 と同じだった。(A) の振幅は $-\lambda$ と記号として一致した。(B) では振幅そのものも比べた。FeynCalc の振幅と式 (11) の $\mathcal{M}_B^{(0)}$ の差の絶対値の 2 乗をスピンについて和をとると、記号として 0 になった。これは、すべてのスピンの組で二つの振幅が全体の符号まで一致することを意味する。(B) と (C) のスピン和も、式 (11) と記号として一致した。(C) の干渉項は二つの図の相対符号で決まるので、FeynArts のフェルミオンの符号の規則が手計算の -1 と一致したことになる。

同種のフェルミオンの符号も確かめるため、四つ目の過程として (D) $\psi(p_1)\psi(p_2) \to \psi(p_3)\psi(p_4)$ を加えた。これ

表 4: 木の全断面積（$m=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2}=0.3893794\times10^{9}$ pb）。「解析式」は式 (12)（(D) は式 (20) と因子 $\frac{1}{2}$）の数値積分（相対精度 10^{-12}）、「誤差」は MadGraph のモンテカルロ積分の統計誤差、「実効誤差」はそれと MadGraph の出力の最後の桁の半分の大きい方である。

過程	$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	誤差 [pb]	実効誤差 [pb]	差／実効誤差
(A) $\phi\phi\to\phi\phi$	2.5	6.19717×10^{5}	6.197×10^{5}	1.4×10^{-3}	50	−0.33
	5.0	1.54929×10^{5}	1.549×10^{5}	3.1×10^{-4}	50	−0.58
	10.0	3.87323×10^{4}	3.873×10^{4}	1.1×10^{-5}	5	−0.46
(B) $\psi\bar\psi\to\phi\phi$	2.5	1.58555×10^{5}	1.585×10^{5}	290	290	−0.19
	5.0	2.81465×10^{5}	2.814×10^{5}	685	685	−0.09
	10.0	1.27316×10^{5}	1.276×10^{5}	207	207	+1.37
(C) $\psi\bar\psi\to\psi\bar\psi$	2.5	3.17031×10^{6}	3.171×10^{6}	1360	1360	+0.50
	5.0	8.51663×10^{5}	8.522×10^{5}	654	654	+0.82
	10.0	2.24601×10^{5}	2.246×10^{5}	172	172	−0.01
(D) $\psi\psi\to\psi\psi$	2.5	7.26136×10^{5}	7.261×10^{5}	857	857	−0.04
	5.0	3.51095×10^{5}	3.510×10^{5}	472	472	−0.20
	10.0	1.06122×10^{5}	1.062×10^{5}	110	110	+0.71

は t と u チャンネルの ϕ の交換で、二つの図の相対符号は -1 である。スピン和は

$$\sum|\mathcal{M}_D^{(0)}|^2=4y^4\Big[\frac{t^2}{(t-m^2)^2}+\frac{u^2}{(u-m^2)^2}+\frac{tu}{(t-m^2)(u-m^2)}\Big] \tag{20}$$

である（付録 F）。これは (C) の式で s と u を入れ替えたもので、交差の関係と合う。FeynCalc のスピン和はこれとも記号として一致した。

これとは独立に、Python で Dirac 行列とスピノルを陽に作り（Dirac 表示）、トレースを使わずに、Feynman 則のままの振幅の 2 乗をすべてのスピンの組について足した。(B) では、Dirac 方程式で項を消す前の振幅を使った。式 (11)、(20) と第 3 節の重心系の式は、$\sqrt{s}=2.1$〜10、$\cos\theta=-0.9$〜0.77 の 20 点で、相対 3×10^{-15} 以内で一致した。$\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ での値は (B) 0.711692751300461、(C) 11.21332568891513、(D) 10.01693737249565 で、FeynCalc で評価した値と表示した桁まで一致した。

断面積は、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませて求め、式 (12) の数値積分と比べた（(D) は終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を付け、σ_C と同じ式で求めた）。表 4 に示すように、四つの過程と三つのエネルギーの 12 点すべてで、差は誤差の 1.4 倍以内だった。(A) は $|\mathcal{M}|^2$ が定数なので MadGraph の積分の誤差がほぼ 0 で、比べられるのは MadGraph が出力する桁までである（付録 J）。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`tree_mg5.mg5`（MadGraph）、`tree_sigma.py`（陽なスピノルの計算、数値積分、比較）である。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** FeynArts の模型から 1 ループの 1PI 図を作ると、ϕ の 1 点関数が 1 個、ϕ の 3 点関数が 2 個（向きが逆のフェルミオンの三角形）、V_ϕ が 2 個、V_ψ が 1 個、V_y が 1 個、V_4 が 9 個（ϕ の泡 3 個とフェルミオンの箱 6 個）で、図 2 と一致した。FeynCalc でトレースと γ^5 を NDR で整理し、TID でテンソル積分をスカラー積分 A_0、B_0、C_0、D_0 に簡約した。ϕ の 1 点関数と 3 点関数はトレースで 0 になった。V_ϕ、V_ψ、V_y、V_4 は、式 (4) を $(2\pi)^D$ 倍したものと記号として一致した。比べるときは、手計算の式の B_1、C_1、C_2 も同じくスカラー積分に簡約した。V_4 は外線を質量殻上に置いて比べ、式 (7) の $\mathcal{F}$ で書いた形と一致した。式 (7) のもとになるトレースの書き直し（付録 D）も、外線の運動量が質量殻上にない一般の場合に、記号として確かめた。Package-X で極を取り出すと、六つの対抗項はすべて式 (5) と一致した。V_y の γ^5 以外の三つの Dirac 構造は紫外有限だった。

有限部分は、基準点の 48 個の値で比べた（表 5）。Package-X と LoopTools は FeynCalc の振幅を評価し、COLLIER はノートの式 (6)、(7) を評価した。2 点関数だけでできた V_ϕ と V_ψ は、Feynman パラメータの積分 $B_0^{ab}=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln(\Delta_x-i0)$、$B_1^{ab}=\int_0^1\mathrm{d}x\,x\ln(\Delta_x-i0)$ を mpmath で 30 桁で数値積分した値とも比べた。これはどのツールにもよらない基準である。表 5 に示すように、一点を除いて、すべての値が相対 5×10^{-12} 以内で一致した。Package-X の C_0、D_0 を含む値の差 10^{-12} の程度は、$\phi^3+\phi^4$ のノートと同じく Package-X の数値の精度の限界である。除いた一点は V_y の $(p^2,k^2,p'^2)=(M^2,m^2,M^2)$ で、LoopTools の $C_0(m^2,M^2,M^2;M^2,M^2,m^2)$

表 5: 1 ループの 1PI 関数の有限部分の比較（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$）。値は式 (6) の括弧（$b=(4\pi)^2V/i$、V_y は $(4\pi)^2V_y$ の各 Dirac 構造の係数）で、差は同じ点の括弧の絶対値の最大で割った。「基準」は比べる相手で、V_ϕ、V_ψ では mpmath の Feynman パラメータの積分、V_y、V_4 では COLLIER（ノートの式）である。V_y の LoopTools の値は、誤った C_0 を返す一点を除く。

関数	点	基準	Package-X	LoopTools	COLLIER
V_ϕ	$p^2=-5$〜10 の 6 点	mpmath	$<10^{-16}$	2.6×10^{-14}	1.2×10^{-14}
V_ψ（$\not{p}$、1）	$p^2=-5$〜10 の 6 点	mpmath	$<10^{-16}$	1.2×10^{-15}	1.1×10^{-15}
V_y（4 構造）	(p^2,k^2,p'^2) の 6 点	COLLIER	2.6×10^{-12}	3.6×10^{-15}	—
V_4	$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$	COLLIER	5.4×10^{-12}	3.1×10^{-15}	—

が $-21.747+9.691i$ を返した（正しい値は Package-X と COLLIER の -1.10566）。これは ϕ^3 のノートで見つけた LoopTools の C_0 の誤りと同じ種類で、LoopTools は自分で “Discrepancy in C0” と表示し、内部の別の実装（版 a）では正しい値を出しながら、誤った値を返す（付録 J）。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`oneloop_collier.f90`（COLLIER）、`oneloop_numeric.py`（mpmath と比較）である。

■ **手順 (3) の続き：γ^5 の処方。** 本ノートは γ^5 を D 次元で反可換とする NDR の処方をとる（前提 5）。比べるため、同じ図を Breitenlohner–Maison–’t Hooft–Veltman（BMHV）の処方でも計算した。BMHV では、γ^5 は 4 次元の γ 行列とだけ反可換で、$D-4$ 次元の部分とは可換である。ループ運動量を 4 次元の部分と $D-4$ 次元の部分に $q=\bar q+\hat q$ と分けると、$\gamma^5(\not q+M)\gamma^5=-\not{\bar q}+\not{\hat q}+M$ となる。したがって NDR との違いは、γ^5 に挟まれた伝播関数の中の $\hat q$ の符号だけである。外線の運動量は 4 次元とした。結果は次の通りである。四つの 1PI 関数のどれでも、極は二つの処方で同じで、差は有限だった。差は外線の運動量と質量の多項式（局所的な項）で、括弧の単位で

$$\Delta b_\phi=y^2\Big(\frac{4}{3}p^2-8M^2\Big),\qquad \Delta b_\psi=0,\qquad \Delta b_y=-y^3\ (\gamma^5\text{ の係数}),\qquad \Delta b_4=-64y^4$$

である（$\Delta b\equiv b_{\rm BMHV}-b_{\rm NDR}$）。これらは、差が $\hat q^2$ の項から $(D-4)\times$ 極として生じることを使って、手でも導ける（付録 I）。V_ϕ、V_ψ、V_y は FeynCalc の BMHV の処方でそのまま計算し、手で導いた値と一致した。V_4 では、γ^5 を 4 個含むトレースで FeynCalc の BMHV の計算が止まり、$\hat q$ を含む箱のテンソル積分の簡約も 10 分で終わらなかった。そこで、BMHV の規則 $\gamma^5(\not k+M)\gamma^5=-\not{\bar k}+\not{\hat k}+M$ で γ^5 を除いたトレースを FeynCalc で計算し、差のうち紫外で効く q の 4 次の項だけを積分した。これは付録 I の議論を FeynCalc で行ったもので、V_y に使うと FeynCalc の BMHV の計算と同じ値を与え、V_4 では $-64y^4$ を与えた。差が局所的なので、BMHV で NDR と同じ繰り込まれた 1PI 関数を得るには、有限の対抗項 $\delta'_\phi=-\frac{4y^2}{3(4\pi)^2}$、$\delta'_m=-\frac{8y^2M^2}{(4\pi)^2}$、$\delta'_y=\frac{y^3}{(4\pi)^2}$、$\delta'_\lambda=-\frac{64y^4}{(4\pi)^2}$ を加えればよい。極が同じなので 1 ループの β 関数は処方によらず、物理量は、パラメータを物理的な入力で決めれば一致する。ただし、二つの処方の $\overline{\rm MS}$ のパラメータは有限の量だけ異なる。スクリプトは `oneloop_bmhv.wl` である。

■ **手順 (4)：1 ループの散乱振幅。** 二つの過程の 1 ループの振幅（外線の補正を除き、$\overline{\rm MS}$ で繰り込んだもの）を、FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求めた。$\phi\phi\to\phi\phi$ の FeynArts の図は 9 個（ϕ の泡 3 個とフェルミオンの箱 6 個）で、3 点結合がないので可約な図はない。振幅は FeynCalc でも FormCalc でも式 (13) と記号として一致した。$\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の図は 11 個で、内訳は第 3 節で述べた通りである。FeynCalc で各図を基底 $\bar v u$、$\bar v\not k_1 u$ に分け、自己エネルギー、頂点の補正、箱、λ の三角形、フェルミオンの三角形の五つの組ごとに式 (18) の対応する項と比べると、すべて記号として一致した。フェルミオンの三角形は 0 だった。紫外の極は、式 (5) から作った対抗項の図（頂点の δ_y と、内線の δ_ψ、δ_M）とちょうど打ち消し合った。FormCalc の経路では、FeynCalc の手を加えない FeynArts と、FormCalc 自身のテンソル積分の簡約を使った。振幅は二つのスピノルの鎖 $\langle1|1|2\rangle$、$\langle1|\not k_1|2\rangle$ だけで書かれ、γ^5 を含む鎖は現れなかった。FormCalc の鎖はフェルミオンの線の向きが逆なので、ベクトルの鎖の符号だけが変わる。木の振幅で全体の位相を合わせると、二つの係数はそれぞれ $-a$、b にあたる（付録 J）。Δ を変えたときの FormCalc の振幅の変化は、対抗項から予想される量と倍精度で一致した。

数値は、基準点の 6 点（$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$）で、FeynCalc と Package-X、FeynCalc と LoopTools、FormCalc と LoopTools の値を、式 (13)、(18) を COLLIER で評価した値と比べた（表 6）。すべて相対 10^{-9} 以内で、Package-X 以外は 3×10^{-13} 以内で一致した。Package-X の差がほかより大きいのは、質量の違う内線を持つ

表 6: 1 ループの散乱振幅の比較（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$、$\sqrt{s}=2.5,5,10$、$\cos\theta=0.3,0.9$ の 6 点の最大）。左の 3 列は、COLLIER で評価したノートの式（式 (13)、(18)）からの相対的なずれで、$\phi\phi\to\phi\phi$ は $|\mathcal{M}^{(1)}|$、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ は $|a|+|b|$ で割った。右の列は、虚部とユニタリー性の積分（式 (14)、(19)）の相対的なずれで、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ は 4 つのスピンの組の最大である。

過程	量	FeynCalc+Package-X	FeynCalc+LoopTools	FormCalc+LoopTools	ユニタリー性
$\phi\phi\to\phi\phi$	$(4\pi)^2\mathcal{M}^{(1)}$	5.4×10^{-12}	3.8×10^{-15}	1.6×10^{-13}	2.4×10^{-14}
$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$	a、b	8.4×10^{-10}	1.7×10^{-14}	2.8×10^{-13}	9.4×10^{-14}




図 4: $\sqrt{s}=5m$ での 1 ループの振幅の角度依存性（$m=\mu=1$、$M=0.7$、$y=\lambda=1$）。左は $\phi\phi\to\phi\phi$ の $(4\pi)^2\mathcal{M}^{(1)}$、中と右は $\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ の係数 a、b（式 (18)）。線は COLLIER で評価したノートの式（実線が実部、破線が虚部）、丸は FeynCalc と Package-X、バツは FormCalc と LoopTools、左の四角はユニタリー性の積分（式 (14)）による虚部である。a は $\cos\theta$ について偶、b は奇で、$t\leftrightarrow u$ の対称性を表す。

箱の D_0 の数値の精度による。虚部は、式 (14)、(19) のユニタリー性と比べた。右辺の木の振幅は Dirac 表示の行列で作り、中間状態のスピンの和は完全性の関係でとり、中間状態の向きについて 240×240 点の求積で積分した。$\phi\phi\to\phi\phi$ では $\psi\bar{\psi}$ の中間状態を含む虚部が、$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ では外線の 4 つのスピンの組のそれぞれで、相対 10^{-13} 以内で一致した。$\psi\bar{\psi}\to\phi\phi$ の虚部では、$\psi\bar{\psi}$ の中間状態と $\phi\phi$ の中間状態の寄与が同じ程度の大きさで逆の符号を持つ（例えば $\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$ のあるスピンの組で 9.895×10^{-3} と -5.256×10^{-3}、和が 4.639×10^{-3}）。図 4 に、$\sqrt{s}=5m$ での角度依存性を示す。スクリプトは `scat_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`scat_formcalc.wl`（FormCalc、LoopTools）、`scat_collier.f90`（COLLIER）、`scat_numeric.py`（比較、ユニタリー性、図）である。

6　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** フェルミオンを入れたことで、スカラー理論にはなかった三つの特徴が現れた。一つ目は、閉じたフェルミオンのループの符号 -1 で、これが $\delta_\phi<0$ と β_λ の $-48y^4$ を与える。二つ目は、γ^5 がフェルミオンの伝播関数の質量の項の符号を変えることで、δ_M と γ_M の符号がスカラーの湯川結合と逆になる。三つ目は、フェルミオンの箱の図の簡単さで、トレースを分母で書き直すと、テンソル積分を経ずに B_0、C_0、D_0 だけで書ける。物理としては、比 λ/y^2 の流れが 1 ループで解析的に解け、λ が負になる尺度か、λ が発散する尺度のどちらかが、y の Landau 極より手前に必ず現れる。

■ **今後。** 次は手順 (5) で、ϕ と ψ の極質量と留数（式 (15)、(17)）で二つの過程の S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop の値と比べる。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数。** ϕ の伝播関数 $i/(p^2-m^2+i0)$ の導出は ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じである。ψ の運動項 $\bar\psi(i\partial\!\!\!/-M)\psi$ は、運動量空間 ($\psi\propto e^{-ip\cdot x}$) で $\bar\psi(p\!\!\!/-M)\psi$ となる。伝播関数はその逆行列の i 倍で、$(p\!\!\!/-M)(p\!\!\!/+M)=p\!\!\!/p\!\!\!/-M^2=p^2-M^2$ から $i(p\!\!\!/-M)^{-1}=i(p\!\!\!/+M)/(p^2-M^2+i0)$ である。

■ **頂点と対抗項。** 頂点の因子は「$i\times(\mathcal{L}_{\rm int}$ の係数 $)\times($ 同種の場の付け方の数 $)$」である。湯川の項 $-iy\mu^\epsilon\phi\bar\psi\gamma^5\psi$ では、ϕ、$\bar\psi$、ψ はどれも 1 つずつで付け方は 1 通りなので、頂点は $i\cdot(-iy\mu^\epsilon\gamma^5)=y\mu^\epsilon\gamma^5$ である。γ^5 はスピンの添字を持つ行列で、フェルミオンの線に沿って伝播関数と並べて掛ける。4 点頂点 $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ の導出は $\phi^3+\phi^4$ のノート [2] の付録 A と同じである。対抗項も同じ規則に従う。$\frac12\delta_\phi(\partial\phi)^2-\frac12\delta_m\phi^2$ は、2 本の線の付け方 2 通りが $\frac12$ を打ち消して $i(\delta_\phi p^2-\delta_m)$ になる。$\delta_\psi\bar\psi i\partial\!\!\!/\psi-\delta_M\bar\psi\psi$ は運動量空間で $\bar\psi(\delta_\psi p\!\!\!/-\delta_M)\psi$ なので $i(\delta_\psi p\!\!\!/-\delta_M)$、湯川の対抗項は $i\cdot(-i\delta_y\mu^\epsilon\gamma^5)=\delta_y\mu^\epsilon\gamma^5$、4 点の対抗項は $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。

■ **閉じたフェルミオンのループ。** 湯川の頂点 2 つを結ぶループを例にとる。$\langle(\bar\psi\Gamma\psi)_x(\bar\psi\Gamma\psi)_y\rangle$（$\Gamma=\gamma^5$）を成分で書くと $\bar\psi_a(x)\Gamma_{ab}\psi_b(x)\,\bar\psi_c(y)\Gamma_{cd}\psi_d(y)$ で、縮約 $\psi_b(x)\bar\psi_c(y)=S_{bc}(x-y)$ と $\psi_d(y)\bar\psi_a(x)=S_{da}(y-x)$ をとる。後者を作るには、$\psi_d(y)$ を $\bar\psi_a(x)$ の左まで動かす必要がある。ψ_d は Grassmann 数の $\bar\psi_c$、ψ_b、$\bar\psi_a$ の 3 つを通り抜けるので、符号 $(-1)^3=-1$ が付く。こうして $-\Gamma_{ab}S_{bc}\Gamma_{cd}S_{da}=-{\rm tr}[\Gamma S(x-y)\Gamma S(y-x)]$ となる。頂点が n 個のループでも、最後の ψ を最初の $\bar\psi$ の左に動かすとき、奇数個（$2n-1$ 個）の Grassmann 数を通り抜けるので、符号はいつも -1 で、添字はトレースになる。

■ **対称性因子の数え方。** 図の値は、$\langle\cdots\frac{1}{n!}(i\int\mathcal{L}_{\rm int})^n\rangle$ の Wick の縮約のうち、その図を与えるものの数を、頂点の係数とともに数えて決める。同じ種類の頂点が n 個あると $1/n!$ が付くが、どの頂点をどこに置くかの入れ替え $n!$ と打ち消す。湯川の頂点の係数（i と μ の因子を除く）は $-iy\gamma^5$ で、組み合わせの因子を持たない。

(a) ϕ の自己エネルギーのフェルミオンのループ。湯川の頂点 2 つの 1/2! は、頂点の入れ替えの 2 と打ち消す。外の ϕ を頂点 x と y の ϕ に付ける方法は 1 通り、$\psi(x)\bar\psi(y)$ と $\psi(y)\bar\psi(x)$ の縮約も 1 通りである。よって対称性因子は 1 である。スカラーの泡（ϕ^3 理論の 1/2）と違うのは、二つのフェルミオンの内線が、フェルミオン数の流れの向き（$x\to y$ と $y\to x$）で区別されるからである。(b) 4 点頂点のタドポール型の図は $\phi^3+\phi^4$ のノートの (c) と同じで 1/2 である。

(c) ψ の自己エネルギー。湯川の頂点 2 つの 1/2! は入れ替えと打ち消す。入ってくる ψ を一方の頂点の $\bar\psi$ に、出ていく $\bar\psi$ を他方の頂点の ψ に付ける方法は 1 通りで、残りの $\psi\bar\psi$ と $\phi\phi$ の縮約もそれぞれ 1 通りである。よって 1 である。(d) 湯川の頂点の補正も同様に、頂点 3 つの 1/3! が入れ替えの 3! と打ち消し、残りの縮約は 1 通りなので 1 である。(e) λ^2 の泡は $\phi^3+\phi^4$ のノートの (f) と同じで 1/2 である。

(f) フェルミオンの箱。湯川の頂点 4 つの 1/4! は、4 本の外の ϕ を 4 つの頂点に割り当てる方法 4! 通りと打ち消す。4 つの頂点を 1 本の向きのあるフェルミオンのループで結ぶ縮約は、頂点 1 から出発して残り 3 つを訪れる順序の数 $3!=6$ 通りある。それぞれが一つの図で、対称性因子は 1 である。6 つは、ループの向きだけが逆の 2 つずつ、すなわち外線の巡回の順序が同じ 3 組に分かれる。向きが逆の二つの図の値が等しいことは付録 C で示す。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** D 次元の作用は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項から ϕ の質量次元は $(D-2)/2=1-\epsilon$、ψ の質量次元は $(D-1)/2=\frac32-\epsilon$ である。湯川の項の係数の質量次元は $D-(1-\epsilon)-2(\frac32-\epsilon)=(4-2\epsilon)-4+3\epsilon=\epsilon$、$\phi^4$ の係数の質量次元は $D-4(1-\epsilon)=2\epsilon$ である。そこで、無次元の y と λ を使って、係数を $y\mu^\epsilon$、$\lambda\mu^{2\epsilon}$ と書く。

■ **発散次数。** ループ L 個、ϕ の内線 I_ϕ 本、フェルミオンの内線 I_ψ 本の図では、ループ運動量の積分が $4L$、ϕ の伝播関数が -2、フェルミオンの伝播関数が -1（分子の $k\!\!\!/$ のため）の次数を与えるので、$\omega=4L-2I_\phi-I_\psi$ である。湯川の頂点 V_y 個、4 点頂点 V_4 個とすると $L=I_\phi+I_\psi-V_y-V_4+1$ である。線の端の数を場ごとに数える

と、ϕ では $V_y + 4V_4 = E_\phi + 2I_\phi$、フェルミオンでは $2V_y = E_\psi + 2I_\psi$ である。よって

$$\omega = 4(I_\phi + I_\psi - V_y - V_4 + 1) - 2I_\phi - I_\psi = 2I_\phi + 3I_\psi - 4V_y - 4V_4 + 4$$
$$= (V_y + 4V_4 - E_\phi) + \left(3V_y - \frac{3}{2}E_\psi\right) - 4V_y - 4V_4 + 4 = 4 - E_\phi - \frac{3}{2}E_\psi$$

となり、式 (2) を得る。E_ψ は偶数なので、$\omega \geq 0$ となるのは $E_\psi = 0$ で $E_\phi \leq 4$、$E_\psi = 2$ で $E_\phi \leq 1$ の場合だけである。

付録 C　γ^5、トレース、パリティ

■ **γ^5 の処方。** NDR では、D 次元で $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$、$(\gamma^5)^2 = 1$ とする。これから、任意のベクトル a と数 M について $\gamma^5(\not{a} + M)\gamma^5 = -\not{a}\gamma^5\gamma^5 + M = -\not{a} + M$ である。トレースは $\mathrm{tr}\,1 = 4$、奇数個の γ^μ のトレースは 0、$\mathrm{tr}[\not{a}\not{b}] = 4a\cdot b$、$\mathrm{tr}[\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}] = 4[(a\cdot b)(c\cdot d) - (a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)]$ である。γ^5 を偶数個含むトレースは、反可換性で γ^5 を隣り合わせて $(\gamma^5)^2 = 1$ で消せるので、γ^5 を含まないトレースに帰着し、曖昧さはない。図 (a)、(c)、(d)、(f) はすべてこの型である（(c) と (d) はトレースではなく開いたフェルミオンの線だが、同じく反可換性だけで整理できる）。

■ **奇数個の γ^5 を含むトレース。** 図 (g) のトレースは $-\mathrm{tr}[\gamma^5\, i(\not{k} + M)]$ で、$\mathrm{tr}[\gamma^5] = 0$ と $\mathrm{tr}[\gamma^5\gamma^\mu] = 0$ から 0 である。図 (h) では、γ^5 を 3 つ含むトレースを反可換性で $\pm\mathrm{tr}[\gamma^5(\not{a} + M)(\not{b} + M)(\not{c} + M)]$ の形にでき、展開すると γ^5 と 3 個以下の γ^μ のトレースだけが残る。4 次元ではそれらはすべて 0 である（0 でない最小のものは $\mathrm{tr}[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma] \propto \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$）。$D$ 次元の NDR では γ^5 を含むトレースの値は一般に曖昧だが、ループ積分の後に残る独立なベクトルは外線の運動量 2 つだけで、$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ を 4 つの独立なベクトルで縮約した量は作れない。したがって (h) はどの処方でも 0 である。

■ **エルミート性。** $(\bar\psi i\gamma^5\psi)^\dagger = -i\psi^\dagger\gamma^{5\dagger}\gamma^{0\dagger}\psi = -i\psi^\dagger\gamma^5\gamma^0\psi = i\psi^\dagger\gamma^0\gamma^5\psi = \bar\psi i\gamma^5\psi$ である（$\gamma^{5\dagger} = \gamma^5$、$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0$、$\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$ を使った）。

■ **パリティ。** $\psi \to \gamma^0\psi$ のとき $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0 \to \psi^\dagger\gamma^0\gamma^0 = \bar\psi\gamma^0$ なので、$\bar\psi\psi \to \bar\psi\gamma^0\gamma^0\psi = \bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi \to \bar\psi\gamma^0 i\gamma^5\gamma^0\psi = -\bar\psi i\gamma^5\psi$ である。運動項は $\boldsymbol{x} \to -\boldsymbol{x}$ とあわせて不変である。したがって、$\phi \to -\phi$ とあわせると $\phi\bar\psi i\gamma^5\psi$ と ϕ^2、ϕ^4 は不変で、ϕ、ϕ^3、$\phi\bar\psi\psi$、$\bar\psi i\gamma^5\psi$ は符号を変える。正則化（次元正則化と、1 ループの NDR）がこの対称性を保つので、後者の項は対抗項としても要らない。

■ **ループの向きと荷電共役。** 荷電共役の行列 C は $C^{-1}\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^T$、$C^{-1}\gamma^5 C = (\gamma^5)^T$ を満たす。よって $(\not{k} + M)^T = C^{-1}(-\not{k} + M)C$ である。n 個の湯川の頂点を持つループのトレースを転置すると

$$\mathrm{tr}[\gamma^5(\not{k}_1 + M)\gamma^5(\not{k}_2 + M)\cdots\gamma^5(\not{k}_n + M)] = \mathrm{tr}[(-\not{k}_n + M)\gamma^5\cdots(-\not{k}_2 + M)\gamma^5(-\not{k}_1 + M)\gamma^5]$$

となる（$\mathrm{tr}X^T = \mathrm{tr}X$、$C$ と C^{-1} はトレースの中で打ち消す）。右辺は、頂点を逆の順に回り、各伝播関数の運動量の符号を変えたもの、すなわち向きが逆のループのトレースである。分母 $D_M(k_i)$ は $k_i \to -k_i$ で不変なので、向きが逆の二つの図は等しい。ベクトルの頂点 γ^μ なら頂点ごとに -1 が付いて Furry の定理になるが、γ^5 には付かない。

■ **カイラル回転。** $\psi \to e^{i\theta\gamma^5}\psi$ のとき $\bar\psi \to \psi^\dagger e^{-i\theta\gamma^5}\gamma^0 = \bar\psi e^{i\theta\gamma^5}$ である。運動項は $\bar\psi e^{i\theta\gamma^5}\gamma^\mu e^{i\theta\gamma^5}\psi = \bar\psi\gamma^\mu e^{-i\theta\gamma^5}e^{i\theta\gamma^5}\psi = \bar\psi\gamma^\mu\psi$ で不変で、$\bar\psi\psi \to \bar\psi e^{2i\theta\gamma^5}\psi = \cos 2\theta\,\bar\psi\psi + \sin 2\theta\,\bar\psi i\gamma^5\psi$ である。$\theta = \pi/4$ とすると $\bar\psi\psi \to \bar\psi i\gamma^5\psi$ となり、$M = 0$ のスカラーの湯川理論 $-y\phi\bar\psi\psi$ は本模型の $M = 0$ の場合に移る。したがって、質量によらない量（β_y、β_λ、γ_ϕ、γ_ψ）は両者で等しい。質量の項 $-M\bar\psi\psi$ は回転で $-M\bar\psi i\gamma^5\psi$ に移るので、γ_M と γ_m の M^2 の項は両者で異なりうる。

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出

■ **積分の規約。** ϕ^3 のノートの付録 C と同じく、$\overline{\rm MS}$ では

$$\mu^{2\epsilon} I_1^a = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[m_a^2\Delta_{\rm UV} + A_0(m_a^2)\big], \qquad \mu^{2\epsilon} I_2^{ab}(p^2) = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[\Delta_{\rm UV} + B_0^{ab}(p^2)\big]$$

で、$A_0(m^2) = m^2(1-\ln(m^2/\mu^2))$、$B_0^{ab}(p^2) = -\int_0^1 {\rm d}x\,\ln[\Delta_x/\mu^2]$、$\Delta_x = xm_b^2 + (1-x)m_a^2 - x(1-x)p^2 - i0$ である。ベクトルの 2 点積分は、Feynman のパラメータで分母を $[(k+xp)^2-\Delta_x]^2$ とまとめ、$k = \ell - xp$ とずらすと、ℓ^μ の奇関数の項が消えて

$$\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{k^\mu}{D_a(k)D_b(k+p)} = -p^\mu\int_0^1{\rm d}x\,x\,\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2-\Delta_x)^2} = \frac{i}{(4\pi)^2}\,p^\mu\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV} + B_1^{ab}(p^2)\Big]$$

となる。$B_1^{ab}(p^2) = \int_0^1{\rm d}x\,x\ln[\Delta_x/\mu^2]$ で、LoopTools の $B_1(p^2,m_a^2,m_b^2)$ の $\Delta=0$ の値である。3 点と 4 点の積分は、LoopTools の規約で $\int{\rm d}^Dk\,\{1,k^\mu\}/(D_a(k)D_b(k+r_1)D_c(k+r_2)) = \frac{i}{(4\pi)^2}\{C_0,\ r_1^\mu C_1 + r_2^\mu C_2\}$（$\mu^{2\epsilon}$ を含む、引数は $(r_1^2,(r_2-r_1)^2,r_2^2;m_a^2,m_b^2,m_c^2)$）と、同様の D_0 で表す。C_0、C_i、D_0 は有限である。

■ V_ϕ。　図 (a) は、ループの -1、頂点 2 つ、伝播関数 2 本から

$$-\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}{\rm tr}\Big[y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+M)}{D_M(k)}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+\not p+M)}{D_M(k+p)}\Big] = y^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{{\rm tr}[(-\not k+M)(\not k+\not p+M)]}{D_M(k)D_M(k+p)}$$

である（$-i^2=1$ と $\gamma^5(\not k+M)\gamma^5 = -\not k+M$）。トレースは $-4k\cdot(k+p)+4M^2$ で、$k\cdot(k+p) = \frac{1}{2}[D_M(k) + D_M(k+p) + 2M^2 - p^2]$ を使うと $2p^2 - 2D_M(k) - 2D_M(k+p)$ になる。$D_M(k)$ と $D_M(k+p)$ はそれぞれ一方の伝播関数を消し、積分変数をずらすとどちらも I_1^M を与える。よって (a) $= 2y^2\mu^{2\epsilon}[p^2 I_2^{MM}(p^2) - 2I_1^M]$ である。図 (b) は $\phi^3+\phi^4$ のノートと同じく $\frac{\lambda}{2}\mu^{2\epsilon}I_1^m$ である。上の積分の展開を入れると

$$V_\phi = \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[2y^2\big(p^2(\Delta_{\rm UV}+B_0^{MM}) - 2(M^2\Delta_{\rm UV} + A_0(M^2))\big) + \frac{\lambda}{2}\big(m^2\Delta_{\rm UV} + A_0(m^2)\big)\Big] + i(\delta_\phi p^2 - \delta_m)$$

で、$\Delta_{\rm UV}$ の係数が p^2 によらず 0 になる条件は $2y^2/(4\pi)^2 + \delta_\phi/\Delta_{\rm UV} = 0$ と $(-4y^2M^2 + \frac{\lambda}{2}m^2)/(4\pi)^2 - \delta_m/\Delta_{\rm UV} = 0$ である。これが式 (5) の δ_ϕ、δ_m で、残りが式 (6) の V_ϕ である。

■ V_ψ。　入ってくるフェルミオンの運動量を p、ループのフェルミオンの運動量を k とすると、ϕ の内線の運動量は $p-k$ で、

$$\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i(\not k+M)}{D_M(k)}\,y\mu^\epsilon\gamma^5\,\frac{i}{D_m(k-p)} = -y^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{-\not k+M}{D_M(k)D_m(k-p)}$$

となり、式 (4) の V_ψ を得る。$k\to -k$ とすると分母は $D_M(k)D_m(k+p)$ になり、上のベクトルの積分の規約（$a=M$、$b=m$）が使えて、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/(D_M(k)D_m(k-p)) = -\frac{i}{(4\pi)^2}p^\mu[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV} + B_1^{Mm}]$ である。よって

$$V_\psi = \frac{iy^2}{(4\pi)^2}\Big[-\not p\Big(-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV} + B_1^{Mm}\Big) - M\big(\Delta_{\rm UV} + B_0^{Mm}\big)\Big] + i(\delta_\psi\not p - \delta_M)$$

で、極が消える条件 $y^2/(2(4\pi)^2) + \delta_\psi/\Delta_{\rm UV} = 0$、$-y^2M/(4\pi)^2 - \delta_M/\Delta_{\rm UV} = 0$ から式 (5) の δ_ψ、δ_M を得る。

■ V_y。　フェルミオンの線に沿って、出ていく側から書く。入ってくるフェルミオン（運動量 p）が ϕ の内線（運動量 $p-k$）を出して運動量 k になり、外の ϕ（運動量 q）を吸って $k+q$ になり、ϕ の内線を吸って $p'=p+q$ で出ていく。値は

$$\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,y\gamma^5\frac{i(\not k+\not q+M)}{D_M(k+q)}\,y\gamma^5\frac{i(\not k+M)}{D_M(k)}\,y\gamma^5\,\frac{i}{D_m(k-p)}\,\mu^{3\epsilon}$$

で、$i^3 = -i$ と $\gamma^5(\not k+\not q+M)\gamma^5 = M - \not k - \not q$ から、分子は $-iy^3(M-\not k-\not q)(M+\not k)\gamma^5$ になる。積を展開すると $M^2 + M\not k - M\not k - \not k\not k - M\not q - \not q\not k = M^2 - k^2 - M\not q - \not q\not k$ で、式 (4) の V_y を得る。$M^2-k^2 = -D_M(k)$ は伝播関数 $D_M(k)$ を消し、残る $\int 1/(D_M(k+q)D_m(k-p))$ は運動量の差 $(k+q)-(k-p) = p'$ の 2 点積分

$I_2^{Mm}(p'^2)$ である。残りの 2 項は 3 点積分で、上の規約で $r_1 = q$、$r_2 = -p$、$(a,b,c) = (M,M,m)$ とすると、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/(\cdots) = \frac{i}{(4\pi)^2}(q^\mu C_1 - p^\mu C_2)$ なので、$\not{q}\not{k} \to \frac{i}{(4\pi)^2}(q^2 C_1 - \not{q}\not{p} C_2)$ である。まとめると

$$V_y = -iy^3 \cdot \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[-\big(\Delta_{\rm UV} + B_0^{Mm}(p'^2)\big) - M\not{q} C_0 - q^2 C_1 + \not{q}\not{p} C_2\Big]\gamma^5 + \delta_y\gamma^5$$

で、$\Delta_{\rm UV}$ の項は $-y^3\Delta_{\rm UV}\gamma^5/(4\pi)^2$ である。これを打ち消す $\delta_y = y^3\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ が式 (5) で、残りが式 (6) の V_y である。$M^2 - k^2$ の代わりに $M^2 - (k+q)^2$ を作るように整理すると、$B_0^{Mm}(p^2)$ を含む別の形になる。二つは PaVe 関数の恒等式で移り合う。

■ **V_4 の泡。** λ^2 の泡は $\phi^3+\phi^4$ のノートと同じで $\frac{\lambda^2}{2}\sum_x I_2^{mm}(x)$、極は $\frac{3\lambda^2}{2}\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}$ である。

■ **フェルミオンの箱。** 一つの図は、ループの -1、頂点 4 つ、伝播関数 4 本の $i^4 = 1$ から $-y^4\mu^{4\epsilon}\int {\rm tr}[\gamma^5(\not{k}_1 + M)\gamma^5(\not{k}_2 + M)\gamma^5(\not{k}_3 + M)\gamma^5(\not{k}_4 + M)]/(D_1D_2D_3D_4)$ である（$D_i \equiv D_M(k_i)$）。1 番目と 3 番目の伝播関数の γ^5 を挟む組を $\gamma^5(\not{k} + M)\gamma^5 = M - \not{k}$ で整理すると、トレースは $T = {\rm tr}[(M - \not{k}_1)(M + \not{k}_2)(M - \not{k}_3)(M + \not{k}_4)]$ になる。展開すると、γ 行列 0 個の項 $4M^4$、2 個の項 $4M^2\sum_{i<j}\sigma_{ij}\,k_i\cdot k_j$（$\sigma_{ij}$ は k_i、k_j の前の符号の積で、$\sigma_{12} = \sigma_{14} = \sigma_{23} = \sigma_{34} = -1$、$\sigma_{13} = \sigma_{24} = +1$）、4 個の項 $4[(k_1\cdot k_2)(k_3\cdot k_4) - (k_1\cdot k_3)(k_2\cdot k_4) + (k_1\cdot k_4)(k_2\cdot k_3)]$ である。

$s_{ij} \equiv (k_i - k_j)^2$ と置く。s_{ij} は外線の運動量の和の 2 乗で、$k_i\cdot k_j = \frac{1}{2}(D_i + D_j) + a_{ij}$、$a_{ij} \equiv M^2 - \frac{1}{2}s_{ij}$ である。これを入れて D_i について整理する。2 次の項は、4 個の項から $\frac{1}{4}[(D_1+D_2)(D_3+D_4) - (D_1+D_3)(D_2+D_4) + (D_1+D_4)(D_2+D_3)] = \frac{1}{2}(D_1D_3 + D_2D_4)$ だけが残る。1 次の項は、2 個の項から $M^2\sum\sigma_{ij}\frac{1}{2}(D_i+D_j) = -\frac{1}{2}M^2\sum_i D_i$、4 個の項から D_1 の係数 $\frac{1}{2}(a_{34} - a_{24} + a_{23})$（$D_2$、$D_3$、$D_4$ も同様）が来て、合わせると D_1 の係数は $\frac{1}{2}(a_{34} - a_{24} + a_{23} - M^2) = \frac{1}{4}(s_{24} - s_{23} - s_{34})$ となる。定数項は

$$M^4 + M^2\sum_{i<j}\sigma_{ij}a_{ij} + (a_{12}a_{34} - a_{13}a_{24} + a_{14}a_{23})$$

で、$\sum\sigma_{ij}a_{ij} = -2M^2 + \frac{1}{2}(s_{12}+s_{23}+s_{34}+s_{14}-s_{13}-s_{24})$、$a_{12}a_{34} - a_{13}a_{24} + a_{14}a_{23} = M^4 - \frac{1}{2}M^2(s_{12}+s_{34}+s_{14}+s_{23}-s_{13}-s_{24}) + \frac{1}{4}(s_{12}s_{34} - s_{13}s_{24} + s_{14}s_{23})$ を入れると、M^4 と M^2 の項はすべて打ち消し、$\frac{1}{4}(s_{12}s_{34} + s_{23}s_{14} - s_{13}s_{24})$ だけが残る。4 倍して

$$\begin{aligned} T = {}& (s_{12}s_{34} + s_{23}s_{14} - s_{13}s_{24}) + 2(D_1D_3 + D_2D_4) \\ & + (s_{24} - s_{23} - s_{34})D_1 + (s_{13} - s_{34} - s_{14})D_2 + (s_{24} - s_{14} - s_{12})D_3 + (s_{13} - s_{12} - s_{23})D_4 \end{aligned}$$

を得る。$D_1D_3/(D_1D_2D_3D_4) = 1/(D_2D_4)$ は運動量の差 $k_4 - k_2$ の 2 点積分で $I_2^{MM}(s_{24})$ を、D_2D_4 の項は $I_2^{MM}(s_{13})$ を与える。D_i の 1 次の項はその伝播関数を消して 3 点積分を、定数項は 4 点積分を与える。外線が質量殻上（$s_{12} = s_{23} = s_{34} = s_{14} = m^2$）のとき、定数項は $2m^4 - s_{13}s_{24}$、D_1 と D_3 の係数は $s_{24} - 2m^2$、D_2 と D_4 の係数は $s_{13} - 2m^2$ である。D_1 を消した三角形の外線の不変量は $(s_{23}, s_{34}, s_{24}) = (m^2, m^2, s_{24})$ で $C_0^M(s_{24})$、D_3 を消したものも (s_{12}, s_{14}, s_{24}) で $C_0^M(s_{24})$、D_2 と D_4 を消したものは $C_0^M(s_{13})$ である。よって一つの図は

$$-\frac{iy^4}{(4\pi)^2}\Big[(2m^4 - s_{13}s_{24})D_0^M + 2\big(B_0^{MM}(s_{13}) + B_0^{MM}(s_{24}) + 2\Delta_{\rm UV}\big) + 2(s_{24} - 2m^2)C_0^M(s_{24}) + 2(s_{13} - 2m^2)C_0^M(s_{13})\Big]$$

で、$\Delta_{\rm UV}$ を除いた括弧が式 (7) の $\mathcal{F}(s_{13}, s_{24})$ である。(s_{13}, s_{24}) は、ループで隣り合う外線の対の二通りの和の 2 乗で、外線の巡回の順序が同じ二つの図（向きが逆）は同じ組を与える。3 組の順序は (s,t)、(t,u)、(u,s) を与えるので、6 つの図の和は $-\frac{2iy^4}{(4\pi)^2}\sum_{(x,x')}[\mathcal{F}(x,x') + 4\Delta_{\rm UV}]$ である。極は $-\frac{24iy^4}{(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}$ で、泡の極と合わせて $-i\delta_\lambda$ が打ち消す条件から、式 (5) の $\delta_\lambda = (\frac{3}{2}\lambda^2 - 24y^4)\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ を得る。

付録 E　繰り込み群と有効ポテンシャルの導出

■ **裸の量。** 裸の場を $\phi_0 = Z_\phi^{1/2}\phi$、$\psi_0 = Z_\psi^{1/2}\psi$ とし、式 (1) が裸のラグランジアン $\bar\psi_0(i\partial\!\!\!/ - M_0)\psi_0 + \frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2 - iy_0\phi_0\bar\psi_0\gamma^5\psi_0 - \frac{\lambda_0}{4!}\phi_0^4$ に等しいとする。各項の係数を比べると

$$M_0 = \frac{M + \delta_M}{Z_\psi}, \qquad m_0^2 = \frac{m^2 + \delta_m}{Z_\phi}, \qquad y_0 = \frac{\mu^\epsilon(y + \delta_y)}{Z_\psi Z_\phi^{1/2}}, \qquad \lambda_0 = \frac{\mu^{2\epsilon}(\lambda + \delta_\lambda)}{Z_\phi^2}$$

である。例えば湯川の項では $\mu^\epsilon(y+\delta_y)\phi\bar\psi\psi = y_0 Z_\phi^{1/2} Z_\psi\,\phi\bar\psi\psi$ である。以下、$\Delta_{\rm UV}$ を $1/\epsilon$ と書く（定数部分は β 関数に効かない）。式 (5) を入れて 1 ループの次数まで展開すると

$$\mu^{-\epsilon} y_0 = y + \frac{a_y}{\epsilon},\quad a_y = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(y^3 + \frac{y^3}{2} + y^3\Big) = \frac{5y^3}{2(4\pi)^2},$$
$$\mu^{-2\epsilon}\lambda_0 = \lambda + \frac{a_\lambda}{\epsilon},\quad a_\lambda = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{3}{2}\lambda^2 - 24y^4 + 4\lambda y^2\Big),$$
$$m_0^2 = m^2 + \frac{a_m}{\epsilon},\quad a_m = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(\frac{\lambda m^2}{2} - 4y^2M^2 + 2y^2m^2\Big),$$
$$M_0 = M + \frac{a_M}{\epsilon},\quad a_M = \frac{1}{(4\pi)^2}\Big(-y^2 M + \frac{y^2 M}{2}\Big) = -\frac{y^2 M}{2(4\pi)^2}$$

である。a_y の三つの項は δ_y、$-y\delta_\psi$、$-\frac{1}{2}y\delta_\phi$ から、a_λ の最後の項は $-2\lambda\delta_\phi$ から、a_m の最後の項は $-m^2\delta_\phi$ から、a_M の第 2 項は $-M\delta_\psi$ から来る。

■ **β 関数と質量の走り。** 結合 g_i の裸の量を $g_{i,0} = \mu^{\rho_i\epsilon}[g_i + a_i(g)/\epsilon]$（$y$ は $\rho=1$、λ は $\rho=2$、質量は $\rho=0$）と書く。$\ln\mu$ で微分して 0 と置くと $0 = \rho_i\epsilon(g_i + a_i/\epsilon) + \beta_i + \sum_j(\partial_j a_i)\beta_j/\epsilon$ である。$\beta_j = -\rho_j\epsilon g_j + b_j$ と置いて ϵ^0 の項を比べると、1 ループの次数で

$$b_i = \Big(\sum_j \rho_j g_j \frac{\partial}{\partial g_j} - \rho_i\Big)a_i$$

を得る（$\rho_i\epsilon g_i$ と $-\rho_i\epsilon g_i$ は打ち消す）。a_y は y の 3 次なので $b_y = (3-1)a_y = 5y^3/(4\pi)^2$ である。a_λ の各項に $2\lambda\partial_\lambda + y\partial_y - 2$ を掛けると、λ^2 の項は $4-2=2$ 倍、λy^2 の項は $2+2-2=2$ 倍、y^4 の項は $4-2=2$ 倍になり、$b_\lambda = 2a_\lambda = (3\lambda^2 + 8\lambda y^2 - 48y^4)/(4\pi)^2$ である。質量では $\rho=0$ なので、$\gamma_m = (2\lambda\partial_\lambda + y\partial_y)a_m = (\lambda m^2 + 4y^2m^2 - 8y^2M^2)/(4\pi)^2$、$\gamma_M = y\partial_y a_M = -y^2M/(4\pi)^2$ である（質量自身の走りは a/ϵ の中では高次）。これが式 (8) である。

■ **場の異常次元。** $\ln Z_\phi = -2y^2/((4\pi)^2\epsilon)$ を $\ln\mu$ で微分し、$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}\ln\mu = 2y\beta_y = -2\epsilon y^2 + O(y^4)$ を使うと $\mathrm{d}\ln Z_\phi/\mathrm{d}\ln\mu = 4y^2/(4\pi)^2$、すなわち $\gamma_\phi = 2y^2/(4\pi)^2$ である。同様に $\ln Z_\psi = -y^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$ から $\gamma_\psi = y^2/(2(4\pi)^2)$ である。b_y は $2\cdot\frac{y^3}{(4\pi)^2}$（$\delta_y$ の寄与の 2 倍）$+(2\gamma_\psi+\gamma_\phi)y$ とも書け、本文の分解を得る。

■ **有効ポテンシャル。** 定数の背景場 ϕ のまわりの 1 ループの有効ポテンシャルは、各場の揺らぎの演算子の行列式から決まる。ϕ の揺らぎの質量の 2 乗は $V_0'' = m^2 + \frac{\lambda}{2}\phi^2 = m_\phi^2$ である。フェルミオンの演算子は運動量空間で $\not p - M - iy\phi\gamma^5$ である。$X \equiv \not p - iy\phi\gamma^5$ と置くと、$\not p$ と γ^5 の反可換性から $X^2 = p^2 - y^2\phi^2$ で、$\mathrm{tr}X = 0$ なので X の固有値は $\pm\sqrt{p^2 - y^2\phi^2}$（それぞれ 2 重）である。よって 4×4 の行列式は $\det(X-M) = [(\sqrt{p^2-y^2\phi^2} - M)(-\sqrt{p^2-y^2\phi^2} - M)]^2 = (p^2 - M_\psi^2)^2$、$M_\psi^2 = M^2 + y^2\phi^2$ である。Euclid の運動量で書くと、スカラーの寄与は $+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^D p_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2 + m_\phi^2)$、フェルミオンの寄与は Grassmann 数の積分が行列式を分母でなく分子に与えるので符号が逆で、$-\int\frac{\mathrm{d}^D p_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2 + M_\psi^2)^2 = -4\cdot\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^D p_E}{(2\pi)^D}\ln(p_E^2 + M_\psi^2)$ である。$\frac{1}{2}\int\ln(p_E^2 + X)$ を X で微分すると $\frac{1}{2}\int(p_E^2+X)^{-1} = -\frac{X}{2(4\pi)^2}(\Delta_{\rm UV} + 1 - \ln\frac{X}{\mu^2})$ で、極を $\overline{\rm MS}$ の対抗項で除いてから X で積分すると $\frac{X^2}{64\pi^2}(\ln\frac{X}{\mu^2} - \frac{3}{2})$ を得る（積分定数は Λ に含める）。これで式 (10) を得る。

■ **有効ポテンシャルからの確認。** $V_{\rm eff}$ は繰り込まれた場 $\phi = Z_\phi^{-1/2}\phi_0$ の関数で、裸の場を固定して μ を変えると $\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}\ln\mu = -\gamma_\phi\phi$ である。よって $[\mu\partial_\mu + \sum_i\beta_i\partial_{g_i} - \gamma_\phi\phi\partial_\phi]V_{\rm eff} = 0$ が成り立つ。1 ループの部分の陽な μ 依存は $\mu\partial_\mu V_1 = -\frac{1}{32\pi^2}(m_\phi^4 - 4M_\psi^4)$ で、$m_\phi^4 = m^4 + \lambda m^2\phi^2 + \frac{\lambda^2}{4}\phi^4$、$4M_\psi^4 = 4M^4 + 8y^2M^2\phi^2 + 4y^4\phi^4$ である。木の部分には

$$\Big(\sum_i\beta_i\partial_{g_i} - \gamma_\phi\phi\partial_\phi\Big)V_0 = \frac{\mathrm{d}\Lambda}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{1}{2}(\gamma_m - 2\gamma_\phi m^2)\phi^2 + \frac{1}{24}(\beta_\lambda - 4\gamma_\phi\lambda)\phi^4$$

が働く。ϕ の各次数で和を 0 とすると、$\mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}\ln\mu = (m^4 - 4M^4)/(32\pi^2)$、$\gamma_m = 2\gamma_\phi m^2 + (\lambda m^2 - 8y^2M^2)/(16\pi^2)$、$\beta_\lambda = 4\gamma_\phi\lambda + \frac{24}{32\pi^2}(\frac{\lambda^2}{4} - 4y^4)$ を得る。$\gamma_\phi = 2y^2/(16\pi^2)$ と $16\pi^2 = (4\pi)^2$ を入れると、式 (8) の γ_m と β_λ に一致する。$\phi^3+\phi^4$ 理論と違い、ここでは場の異常次元の項 $-\gamma_\phi\phi\partial_\phi$ がないと一致しない。β_y は 1 ループの有効ポテンシャルには γ_ϕ を通してしか現れず、この方法では確かめられない。

■ 比 λ/y^2 の流れ。 $t\equiv\ln(\mu/\mu_0)$ とする。$\mathrm{d}y^2/\mathrm{d}t=2y\beta_y=10y^4/(4\pi)^2$ を解くと $y^2=y_0^2/(1-10y_0^2t/(4\pi)^2)$ で、式 (9) の第 2 式を得る。$r=\lambda/y^2$ について $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=\frac{1}{y^2}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}-\frac{\lambda}{y^4}\frac{\mathrm{d}y^2}{\mathrm{d}t}=\frac{y^2}{(4\pi)^2}(3r^2+8r-48-10r)=\frac{y^2}{(4\pi)^2}(3r^2-2r-48)$ である。$3r^2-2r-48=0$ の解は $r_\pm=(2\pm\sqrt{4+576})/6=(1\pm\sqrt{145})/3$ である。新しい変数 $\sigma\equiv\int_0^t y^2\,\mathrm{d}t'/(4\pi)^2$ をとると、$\mathrm{d}\ln y^2/\mathrm{d}t=10y^2/(4\pi)^2$ から $\sigma=\frac{1}{10}\ln(y^2/y_0^2)$ で、$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\sigma=3(r-r_+)(r-r_-)$ となる。部分分数で

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\ln\frac{r-r_+}{r-r_-}=\Big(\frac{1}{r-r_+}-\frac{1}{r-r_-}\Big)3(r-r_+)(r-r_-)=3(r_+-r_-)=2\sqrt{145}$$

なので、$\ln\frac{r-r_+}{r-r_-}=\ln\frac{r_0-r_+}{r_0-r_-}+2\sqrt{145}\,\sigma=\ln\frac{r_0-r_+}{r_0-r_-}+\frac{\sqrt{145}}{5}\ln\frac{y^2}{y_0^2}$ となり、式 (9) の第 1 式を得る。$r_-<r_0<r_+$ では左辺の比は負で、y^2 とともに絶対値が増え、$y^2\to\infty$（Landau 極）で $r\to r_-$ となる。$r=0$ での比は r_+/r_- なので、$\lambda=0$ となるのは $(y^2/y_0^2)^{\sqrt{145}/5}=(r_+/r_-)(r_0-r_-)/(r_0-r_+)$ のときである。$r_0=y_0=1$ ではこれは $y^2/y_0^2=1.23164$、$t=(4\pi)^2(1-y_0^2/y^2)/(10y_0^2)=2.96994$、すなわち $\mu=19.4907\,\mu_0$ である（λ と y の方程式を数値で積分しても同じ値になる）。$r_0>r_+$ では比は正で増え、1 に達する（$r\to\infty$）のは $(y^2/y_0^2)^{\sqrt{145}/5}=(r_0-r_-)/(r_0-r_+)$ のとき、すなわち y の Landau 極より手前である。$y^2\to0$（低エネルギー）では比は 0 に近づき、$r\to r_+$ となる。

付録 F　木の振幅と断面積の導出

■ $\phi\phi\to\phi\phi$。 4 点頂点 1 つで $i\mathcal{M}_A=-i\lambda$、すなわち $\mathcal{M}_A^{(0)}=-\lambda$ である。

■ $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の振幅。 入ってくる $\psi(p_1)$ は $u(p_1)$、入ってくる $\bar\psi(p_2)$ は $\bar v(p_2)$ を与え、フェルミオンの線は $\bar v(p_2)\cdots u(p_1)$ である。t チャンネルでは ψ が $\phi(k_1)$ を出して運動量 p_1-k_1 になり、$\bar\psi$ と消えて $\phi(k_2)$ を出す。u チャンネルは $k_1\leftrightarrow k_2$ である。よって

$$i\mathcal{M}_B=\bar v(p_2)\Big[y\gamma^5\frac{i(\not p_1-\not k_1+M)}{t-M^2}y\gamma^5+y\gamma^5\frac{i(\not p_1-\not k_2+M)}{u-M^2}y\gamma^5\Big]u(p_1)$$

で、$\gamma^5(\not a+M)\gamma^5=-\not a+M$ から $\mathcal{M}_B=y^2\bar v(p_2)[(M-\not p_1+\not k_1)/(t-M^2)+(M-\not p_1+\not k_2)/(u-M^2)]u(p_1)$ である。Dirac 方程式 $\not p_1u(p_1)=Mu(p_1)$ から $(M-\not p_1)u(p_1)=0$ なので、式 (11) の $\mathcal{M}_B^{(0)}$ を得る。各図の対称性因子は 1 である。

■ $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ のスピン和。 $A\equiv a\not k_1+b\not k_2$（$a=1/(t-M^2)$、$b=1/(u-M^2)$）と置くと、$\bar A\equiv\gamma^0A^\dagger\gamma^0=A$ なので、$\sum_{\text{spins}}|\mathcal{M}_B|^2=y^4\,\mathrm{tr}[(\not p_2-M)A(\not p_1+M)A]=y^4\{\mathrm{tr}[\not p_2A\not p_1A]-M^2\mathrm{tr}[AA]\}$ である（$\sum u\bar u=\not p+M$、$\sum v\bar v=\not p-M$、γ 行列が奇数個の項は 0）。運動学は $s+t+u=2M^2+2m^2$、$p_1\cdot p_2=\frac{s}{2}-M^2$、$k_1\cdot k_2=\frac{s}{2}-m^2$、$p_1\cdot k_1=p_2\cdot k_2=\frac{1}{2}(M^2+m^2-t)\equiv\tau$、$p_1\cdot k_2=p_2\cdot k_1=\frac{1}{2}(M^2+m^2-u)\equiv\upsilon$ である。トレースの公式から

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[\not p_2A\not p_1A]&=4(a^2+b^2)\Big[2\tau\upsilon-m^2\Big(\frac{s}{2}-M^2\Big)\Big]+8ab\Big[\tau^2+\upsilon^2-\Big(\frac{s}{2}-M^2\Big)\Big(\frac{s}{2}-m^2\Big)\Big],\\ M^2\,\mathrm{tr}[AA]&=4M^2\big[(a^2+b^2)m^2+2ab\,k_1\cdot k_2\big]\end{aligned}$$

である。$X\equiv t-M^2$、$W\equiv u-M^2$ とすると、$M^2+m^2-t=m^2-X$、$M^2+m^2-u=m^2-W$、$s=2m^2-X-W$ である。a^2+b^2 の係数は $2\tau\upsilon-\frac{m^2s}{2}=\frac{1}{2}[(m^2-X)(m^2-W)-m^2(2m^2-X-W)]=\frac{1}{2}(XW-m^4)$、$2ab$ の係数は $\tau^2+\upsilon^2-\frac{s}{2}\big(\frac{s}{2}-m^2\big)=\frac{1}{4}[(m^2-X)^2+(m^2-W)^2-(X+W)^2+2m^2(X+W)]=\frac{1}{2}(m^4-XW)$ になる。よって

$$\sum|\mathcal{M}_B|^2=4y^4(XW-m^4)\Big[\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{X^2}+\frac{1}{W^2}\Big)-\frac{1}{XW}\Big]=2y^4(XW-m^4)\frac{(W-X)^2}{X^2W^2}$$

で、$W-X=u-t$ から式 (11) を得る。重心系では $p_1=(E,\boldsymbol{p})$、$p_2=(E,-\boldsymbol{p})$、$k_1=(E,\boldsymbol{k})$、$k_2=(E,-\boldsymbol{k})$（$E=\sqrt{s}/2$、$p=|\boldsymbol{p}|$、$k=|\boldsymbol{k}|$、$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{k}=pk\cos\theta$）で、$t-u=-2p_1\cdot k_1+2p_1\cdot k_2=4\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{k}=4pk\cos\theta$ である。また $t=M^2+m^2-2(E^2-pk\cos\theta)$ から $X=m^2-\frac{s}{2}+2pk\cos\theta$、$W=m^2-\frac{s}{2}-2pk\cos\theta$ で、$XW-m^4=(\frac{s}{2}-m^2)^2-4p^2k^2\cos^2\theta-m^4=\frac{s}{2}(\frac{s}{2}-2m^2)-4p^2k^2\cos^2\theta=k^2(s-4p^2\cos^2\theta)$ である（$k^2=\frac{s}{4}-m^2$）。よって $\sum|\mathcal{M}_B|^2=2y^4\cdot k^2(s-4p^2\cos^2\theta)\cdot16p^2k^2\cos^2\theta/(X^2W^2)$ で、第 3 節の重心系の式を得る。$s>4p^2$ なので、これは物理的な領域で負にならない。$p\to0$（$s\to4M^2$）は $k^2=M^2-m^2>0$、すなわち $m<M$ のときだけ物理的な領域にある。

■ $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$。 s チャンネルでは始状態の対が消えて ϕ になり、終状態の対を作る。t チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_3)$ と $\bar{\psi}(p_2) \to \bar{\psi}(p_4)$ の線が ϕ を交換する。フェルミオンの演算子の並べ替えから二つの図の相対符号は -1 で、

$$\mathcal{M}_C = \frac{y^2}{s-m^2}[\bar{v}_2\gamma^5 u_1][\bar{u}_3\gamma^5 v_4] - \frac{y^2}{t-m^2}[\bar{u}_3\gamma^5 u_1][\bar{v}_2\gamma^5 v_4]$$

である ($u_1 = u(p_1)$ など。$i\mathcal{M}$ は頂点 2 つの y^2 と伝播関数の i の積)。複素共役は $(\bar{a}\gamma^5 b)^* = \bar{b}\gamma^0\gamma^{5\dagger}\gamma^0 a = -\bar{b}\gamma^5 a$ である。$|s|^2$ の項では $\sum|\bar{v}_2\gamma^5 u_1|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5] = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(M - \not{p}_1)] = 4(p_1\cdot p_2 + M^2) = 2s$、同様に $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 v_4|^2 = 2s$ で、$4y^4 s^2/(s-m^2)^2$ となる。$|t|^2$ の項では $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 u_1|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_3 + M)(M - \not{p}_1)] = 4(p_1\cdot p_3 - M^2) = -2t$、$\sum|\bar{v}_2\gamma^5 v_4|^2 = -\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(-M - \not{p}_4)] = 4(p_2\cdot p_4 - M^2) = -2t$ で、$4y^4 t^2/(t-m^2)^2$ となる ($p_1\cdot p_3 = p_2\cdot p_4 = M^2 - t/2$)。干渉項は

$$2\,\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}_s\mathcal{M}_t^* = -\frac{2y^4}{(s-m^2)(t-m^2)}\,\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5(\not{p}_3 + M)\gamma^5(\not{p}_4 - M)\gamma^5]$$

で (二つの複素共役の -1 は打ち消す)、トレースは $\mathrm{tr}[(\not{p}_2 - M)(\not{p}_1 - M)(\not{p}_3 + M)(\not{p}_4 + M)]$ に等しい。4 個の項は $(s-2M^2)^2 - (2M^2-u)^2 + (2M^2-t)^2$、2 個の項は $4M^2[(p_1\cdot p_2) + (p_3\cdot p_4) - (p_1\cdot p_3) - (p_1\cdot p_4) - (p_2\cdot p_3) - (p_2\cdot p_4)] = 4M^2(s+t+u-6M^2) = -8M^4$、0 個の項は $4M^4$ である ($p_1\cdot p_4 = p_2\cdot p_3 = M^2 - u/2$)。$u = 4M^2 - s - t$ を入れると、和は $-t(2s+t-4M^2) + t^2 - 4M^2 t = -2st$ になる。よって干渉項は $4y^4 st/((s-m^2)(t-m^2))$ で、式 (11) を得る。

■ $\psi\psi \to \psi\psi$。 t チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_3)$ と $\psi(p_2) \to \psi(p_4)$ の線が、u チャンネルでは $\psi(p_1) \to \psi(p_4)$ と $\psi(p_2) \to \psi(p_3)$ の線が ϕ を交換する。二つの図は終状態のフェルミオンの入れ替えで移り合うので、相対符号は -1 で、

$$\mathcal{M}_D = \frac{y^2}{t-m^2}[\bar{u}_3\gamma^5 u_1][\bar{u}_4\gamma^5 u_2] - \frac{y^2}{u-m^2}[\bar{u}_4\gamma^5 u_1][\bar{u}_3\gamma^5 u_2]$$

である。運動学は $p_1\cdot p_2 = p_3\cdot p_4 = \frac{s}{2} - M^2$、$p_1\cdot p_3 = p_2\cdot p_4 = M^2 - \frac{t}{2}$、$p_1\cdot p_4 = p_2\cdot p_3 = M^2 - \frac{u}{2}$ である。$|t|^2$ の項では、(C) と同じ計算で $\sum|\bar{u}_3\gamma^5 u_1|^2 = \sum|\bar{u}_4\gamma^5 u_2|^2 = -2t$ となり、$4y^4 t^2/(t-m^2)^2$ を与える。$|u|^2$ の項も同様に $4y^4 u^2/(u-m^2)^2$ である。干渉項は、二つの複素共役の -1 が打ち消して

$$2\,\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}_t\mathcal{M}_u^* = -\frac{2y^4}{(t-m^2)(u-m^2)}\,\mathrm{tr}[(\not{p}_3 + M)\gamma^5(\not{p}_1 + M)\gamma^5(\not{p}_4 + M)\gamma^5(\not{p}_2 + M)\gamma^5]$$

で、トレースは $\mathrm{tr}[(\not{p}_3 + M)(\not{p}_1 - M)(\not{p}_4 + M)(\not{p}_2 - M)]$ に等しい。4 個の項は $(2M^2-t)^2 - (s-2M^2)^2 + (2M^2-u)^2$、2 個の項は $4M^2[(p_3\cdot p_4) + (p_1\cdot p_2) - (p_1\cdot p_3) - (p_2\cdot p_3) - (p_1\cdot p_4) - (p_2\cdot p_4)] = 4M^2(s+t+u-6M^2) = -8M^4$、0 個の項は $4M^4$ である。$a \equiv 2M^2 - t$、$b \equiv 2M^2 - u$ と置くと $s - 2M^2 = a + b - 2M^2$ で、和は $a^2 + b^2 - (a+b-2M^2)^2 - 4M^4 = -2ab + 4M^2(a+b) - 8M^4 = -2(a-2M^2)(b-2M^2) = -2tu$ になる。よって干渉項は $4y^4 tu/((t-m^2)(u-m^2))$ で、式 (20) を得る。

■ **断面積。** 重心系で、流束の因子は $4E_1E_2|v_1 - v_2| = 4p\sqrt{s}$、2 体の位相空間は $\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{k}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega$ なので、$\sigma = \frac{k}{64\pi^2 sp}\int \mathrm{d}\Omega\,\overline{|\mathcal{M}|^2} \times S$ (S は終状態の同種粒子の因子) である。$\overline{|\mathcal{M}|^2}$ は始状態のスピンの平均で、フェルミオン 2 つでは $\frac{1}{4}\sum$ である。$\phi\phi \to \phi\phi$ は $k = p$、$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \lambda^2$、$S = \frac{1}{2}$ で、$\sigma_A = \frac{1}{64\pi^2 s}\cdot 4\pi\lambda^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{\lambda^2}{32\pi s}$ である。$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ は $p = \sqrt{s/4 - M^2}$、$k = \sqrt{s/4 - m^2}$、$S = \frac{1}{2}$、$\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ は $k = p$、$S = 1$ で、式 (12) を得る。

付録 G　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ と S 行列要素の導出

■ **図の分類。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの図で外線の補正を除いたものは、1PI の 4 点関数 V_4 と、木の図の内線や頂点に補正を付けた図である。3 点結合がないので、木の図は接触項だけで内線を持たず、頂点の補正は V_4 そのものである。よって $i\mathcal{M}_A^{(1)} = V_4$ で、式 (6) から式 (13) を得る。

■ **ユニタリー性。** ϕ^3 のノートの付録 I と同じく、S 行列のユニタリー性から $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i\to f)=\sum_n\int \mathrm{d}\Phi_n\,\mathcal{M}(i\to n)\mathcal{M}^*(f\to n)$ を得る（n に同種粒子があればその因子を含める）。λ^2、y^4 の次数では中間状態は 2 粒子だけで、右辺の振幅は木の振幅である。$\phi\phi$ の中間状態は同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を持ち、$\mathcal{M}^{(0)}=-\lambda$ なので $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\cdot 4\pi\lambda^2=\frac{\lambda^2 p}{16\pi\sqrt{s}}$ を与える。これは $\frac{\lambda^2}{2(4\pi)^2}\mathrm{Im}B_0^{mm}(s)=\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\pi\beta$ ($\beta=2p/\sqrt{s}$) に等しい。$\psi\bar\psi$ の中間状態では ψ と $\bar\psi$ が区別できるので因子 $\frac{1}{2}$ はなく、スピンについて和をとる。$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{p_\psi}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega_q$ なので、式 (14) を得る。前方 ($k_1=p_1$、$k_2=p_2$) では右辺は $|\mathcal{M}|^2$ の積分になり、$\phi\phi$ の項は $2p\sqrt{s}\,\sigma_A$、$\psi\bar\psi$ の項は $2p\sqrt{s}\,\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)$ ($\sigma(\phi\phi\to\psi\bar\psi)=\frac{p_\psi}{64\pi^2 sp}\int\mathrm{d}\Omega\sum|\mathcal{M}|^2$) になる。

$\phi(k_1)\phi(k_2)\to\psi(q_1)\bar\psi(q_2)$ の振幅は、付録 付録 F と同じ手順で $y^2\bar u(q_1)[\not k_1/(t-M^2)+\not k_2/(u-M^2)]v(q_2)$ ($t=(q_1-k_1)^2$、$u=(q_1-k_2)^2$) である。ここでは $\bar u(q_1)(M-\not q_1)=0$ を使った。スピン和は $y^4\,\mathrm{tr}[(\not q_1+M)A(\not q_2-M)A]$ で、トレースの巡回性から $\mathrm{tr}[(\not q_2-M)A(\not q_1+M)A]$ と同じ形なので、$\sum|\mathcal{M}_B^{(0)}|^2$ と同じ関数である。

■ **ϕ の極質量と留数。** 完全な伝播関数 $i/(p^2-m^2-\Sigma_\phi(p^2))$ の極は $m_\mathrm{p}^2=m^2+\Sigma_\phi(m_\mathrm{p}^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ_ϕ を m^2 で評価してよい。式 (6) の後の Σ_ϕ から式 (15) の m_p^2 を得る。極のまわりで $p^2-m^2-\Sigma_\phi\simeq(p^2-m_\mathrm{p}^2)(1-\Sigma'_\phi)$ なので、留数は $R_\phi\simeq 1+\Sigma'_\phi(m^2)$ で、$\Sigma'_\phi=-\frac{2y^2}{(4\pi)^2}(B_0^{MM}+p^2B_0^{MM\prime})$ から式 (15) の R_ϕ を得る。$\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$、$\mu\,\partial A_0(M^2)/\partial\mu=2M^2$、$\mu\,\partial B_0'/\partial\mu=0$ と式 (8) の γ_m から、$\mu\,\mathrm{d}m_\mathrm{p}^2/\mathrm{d}\mu=\gamma_m-\frac{1}{(4\pi)^2}[2y^2(2m^2-4M^2)+\lambda m^2]=0$ である。一方 $\mu\,\mathrm{d}R_\phi/\mathrm{d}\mu=-4y^2/(4\pi)^2=-2\gamma_\phi$ で、留数は $\overline{\mathrm{MS}}$ の場の規格化に依存する。

■ **S 行列要素。** LSZ の簡約公式から、S 行列要素は、外線を切り落とした振幅に外線の数だけ $R_\phi^{1/2}$ を掛けたものである。$\mathcal{M}_A^{(0)}=-\lambda$ は質量によらないので、1 ループの次数で $R_\phi^2(\mathcal{M}_A^{(0)}+\mathcal{M}_A^{(1)})=-\lambda-2\lambda\Sigma'_\phi(m^2)+\mathcal{M}_A^{(1)}$ となる。1 ループの項の中の m を m_p に替えても違いは高次なので、式 (16) を得る。結合を固定して μ で微分すると、式 (13) の B_0 の各項が 2 を与え、$\frac{\lambda^2}{2}\cdot 3\cdot 2-2y^4\cdot(4\cdot 3)\cdot 2=3\lambda^2-48y^4$（$\mathcal{F}$ の和は B_0^{MM} を各チャンネルにつき 4 つ含む）、留数の項が $4\lambda y^2\cdot 2=8\lambda y^2$ を与える。和は $(4\pi)^2\beta_\lambda$ で、$\mathrm{d}(-\lambda)/\mathrm{d}\ln\mu=-\beta_\lambda$ と打ち消し合い、$\mathcal{M}_{A,\mathrm{phys}}$ は μ によらない。

■ **フェルミオンの極質量と留数。** 完全な伝播関数は $i/(\not p-M-\Sigma_\psi)$ で、$\Sigma_\psi=\not p\,\Sigma_V(p^2)+M\Sigma_S(p^2)$ は $\not p$ と可換なので、$\not p$ を数のように扱える。$p^2=\not p^2$ と見て Σ_ψ を $\not p$ の関数とみなし、極 $\not p=M_\mathrm{p}$ のまわりで展開すると $\not p-M-\Sigma_\psi(\not p)\simeq(\not p-M_\mathrm{p})(1-\Sigma'_\psi(M))$ で、$M_\mathrm{p}=M+\Sigma_\psi(M)=M[1+\Sigma_V(M^2)+\Sigma_S(M^2)]$、$\Sigma'_\psi\equiv\mathrm{d}\Sigma_\psi/\mathrm{d}\not p|_{\not p=M}=\Sigma_V+2M^2(\Sigma'_V+\Sigma'_S)$ である（$\mathrm{d}f(\not p^2)/\mathrm{d}\not p=2\not p f'$）。留数は $R_\psi=1/(1-\Sigma'_\psi)\simeq 1+\Sigma'_\psi$ である。式 (6) の後の Σ_ψ から $\Sigma_V=y^2B_1^{Mm}/(4\pi)^2$、$\Sigma_S=y^2B_0^{Mm}/(4\pi)^2$ で、式 (17) を得る。$\mu\,\partial B_1/\partial\mu=-1$ ($B_1=\int x\ln(\Delta_x/\mu^2)$ から $-2\int x\,\mathrm{d}x$) と $\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$ から、$\mu\,\mathrm{d}M_\mathrm{p}/\mathrm{d}\mu=\gamma_M+My^2/(4\pi)^2=0$ である。

付録 H　1 ループの $\psi\bar\psi\to\phi\phi$ の導出

■ **規約。** $i\mathcal{M}$ は図の和で、$(4\pi)^2\mathcal{M}=a\,\bar v u+b\,\bar v\not k_1 u$（$\bar v\equiv\bar v(p_2)$、$u\equiv u(p_1)$）と書く。使う関係は、Dirac 方程式 $\not p_1 u=Mu$、$\bar v\not p_2=-M\bar v$、運動量の保存 $k_2=p_1+p_2-k_1$、$p_1\cdot k_1=\frac{1}{2}(M^2+m^2-t)$、それに $\gamma^5(\not d+M)\gamma^5=M-\not d$ である。$P\equiv p_1-k_1$（$P^2=t$）とすると $\bar v\not P u=M\bar v u-\bar v\not k_1 u$、$(M-\not P)u=\not k_1 u$ である。u チャンネルの図は $k_1\leftrightarrow k_2$、$t\leftrightarrow u$ で得られ、$\bar v\not k_2 u=-\bar v\not k_1 u$ なので b の寄与の符号が変わる（$\sigma_u=-1$）。

■ **自己エネルギー。** $i\mathcal{M}=\bar v(y\gamma^5)\frac{i(\not P+M)}{t-M^2}V_\psi(P)\frac{i(\not P+M)}{t-M^2}(y\gamma^5)u$ に式 (6) の $V_\psi=-\frac{iy^2}{(4\pi)^2}(\not P B_1+MB_0)$ を入れると、$(4\pi)^2\mathcal{M}=y^4\bar v\gamma^5(\not P+M)(\not P B_1+MB_0)(\not P+M)\gamma^5 u/(t-M^2)^2$ である。$\not P B_1+MB_0$ は $\not P$ と可換なので、$(\not P+M)^2=t+M^2+2M\not P$ を使って $(\not P+M)(\not P B_1+MB_0)(\not P+M)=\not P\,X+M\,Z$、$X=(t+M^2)B_1+2M^2B_0$、$Z=(t+M^2)B_0+2tB_1$ となる。γ^5 で挟むと $-\not P X+MZ$ で、$\bar v(-\not P X+MZ)u=M(Z-X)\bar v u+X\bar v\not k_1 u$、$Z-X=(t-M^2)(B_0+B_1)$ である。よって $a=y^4M(B_0+B_1)/(t-M^2)$、$b=y^4X/(t-M^2)^2$ を得る。

■ **$\psi(p_1)$ の側の頂点の補正。** $i\mathcal{M}=\bar v(y\gamma^5)\frac{i(\not P+M)}{t-M^2}V_y\,u$ で、V_y は式 (6) で入ってくるフェルミオンを p_1、入ってくる ϕ を $-k_1$、出ていくフェルミオンを P としたもの、$V_y=-\frac{y^3}{(4\pi)^2}[B_0(t)+m^2C_1-M\not k_1 C_0+\not k_1\not p_1 C_2]\gamma^5$ ($C_n=C_n^{(1)}(t)$) である。u に作用させると $\not k_1\not p_1\gamma^5 u=-\not k_1\gamma^5\not p_1 u=-M\not k_1\gamma^5 u$ なので、$V_y u=-\frac{y^3}{(4\pi)^2}(\alpha-\beta\not k_1)\gamma^5 u$、$\alpha=B_0(t)+m^2C_1$、$\beta=M(C_0+C_2)$ である。$\gamma^5(\not P+M)(\alpha-\beta\not k_1)\gamma^5=(M-\not P)(\alpha+\beta\not k_1)$ から、$(4\pi)^2\mathcal{M}=$

$-\frac{y^4}{t-M^2}\bar{v}(M-\not{p})(\alpha+\beta\not{k}_1)u$ である。$\bar{v}(M-\not{p})u=\bar{v}\not{k}_1 u$（$(M-\not{p}_1)u=0$）と、$\bar{v}(M-\not{p}_1+\not{k}_1)\not{k}_1 u=M\bar{v}\not{k}_1 u-\bar{v}\not{p}_1\not{k}_1 u+m^2\bar{v}u=2M\bar{v}\not{k}_1 u+(t-M^2)\bar{v}u$（$\not{p}_1\not{k}_1=2p_1\cdot k_1-\not{k}_1\not{p}_1$）から、$a=-y^4\beta$、$b=-y^4(\alpha+2M\beta)/(t-M^2)$ を得る。

■ $\bar{\psi}(p_2)$ の側の頂点の補正。 $i\mathcal{M}=\bar{v}V_y\frac{i(\not{p}+M)}{t-M^2}(y\gamma^5)u$ で、V_y は入ってくるフェルミオンを P、入ってくる ϕ を $-k_2$、出ていくフェルミオンを $-p_2$ としたもの、$V_y=-\frac{y^3}{(4\pi)^2}[B_0(M^2)+m^2C_1-M\not{k}_2C_0+\not{k}_2\not{P}C_2]\gamma^5$ ($C_n=C_n^{(2)}(t)$) である。$\gamma^5(\not{P}+M)\gamma^5 u=(M-\not{P})u=\not{k}_1 u$ なので、$(4\pi)^2\mathcal{M}=-\frac{y^4}{t-M^2}\bar{v}[\alpha'-M\not{k}_2C_0+\not{k}_2\not{P}C_2]\not{k}_1 u$、$\alpha'=B_0(M^2)+m^2C_1$ である。$\not{k}_2=\not{p}_1+\not{p}_2-\not{k}_1$ と Dirac 方程式から $\bar{v}\not{k}_2\not{k}_1 u=(M^2-t)\bar{v}u-2M\bar{v}\not{k}_1 u$、$\bar{v}\not{k}_2\not{P}\not{k}_1 u=(t+M^2)\bar{v}\not{k}_1 u+M(t-M^2)\bar{v}u$ である（後者は $\not{P}\not{k}_1=\not{p}_1\not{k}_1-m^2$ と前者を使う）。よって $a=-y^4M(C_0+C_2)$、$b=-y^4[\alpha'+2M^2C_0+(t+M^2)C_2]/(t-M^2)$ を得る。

■ 箱。 フェルミオンの線に沿って $u(p_1)$ から、ϕ の内線（運動量 ℓ）を出し、$\phi(k_1)$、$\phi(k_2)$ を出し、ϕ の内線を吸う図では、伝播関数は $D_0=\ell^2-m^2$、$D_1=(\ell-p_1)^2-M^2$、$D_3=(\ell-P)^2-M^2$、$D_4=(\ell+p_2)^2-M^2$ で、i の因子は $i^4=1$ である。γ^5 を整理すると、分子は $\bar{v}(M+\not{p}_2+\not{\ell})(M+\not{P}-\not{\ell})(M-\not{p}_1+\not{\ell})u=\bar{v}\not{\ell}(M+\not{P}-\not{\ell})\not{\ell}u$ となる（両端は Dirac 方程式）。$\not{\ell}\not{P}\not{\ell}=2(\ell\cdot P)\not{\ell}-\ell^2\not{P}$、$\ell^2=D_0+m^2$、$2\ell\cdot P=D_0+m^2+t-M^2-D_3$ を使うと、

$$\bar{v}\not{\ell}(M+\not{P}-\not{\ell})\not{\ell}u=M(D_0+m^2)\bar{v}u+(t-M^2-D_3)\bar{v}\not{\ell}u-(D_0+m^2)\bar{v}\not{P}u=(D_0+m^2)\bar{v}\not{k}_1 u+(t-M^2-D_3)\bar{v}\not{\ell}u$$

となる（$(D_0+m^2)\not{\ell}$ の項は打ち消す）。よって $i\mathcal{M}=y^4\{\bar{v}\not{k}_1 u[m^2I_4+I_3^{(134)}]+(t-M^2)\bar{v}\gamma_\mu uI_4^\mu-\bar{v}\gamma_\mu uI_3^{(014)\mu}\}$ で、I_4、I_4^μ は 4 本の伝播関数の積分、$I_3^{(134)}$ は D_0 を除いた（フェルミオンだけの）三角形、$I_3^{(014)\mu}$ は D_3 を除いた三角形である。LoopTools の規約で $(r_0,\ldots,r_3)=(0,-p_1,-P,p_2)$ とすると、$I_4^\mu=\frac{i}{(4\pi)^2}(-p_1^\mu D_1-P^\mu D_2+p_2^\mu D_3)$（$-P=k_1-p_1$）なので $\bar{v}\gamma_\mu uI_4^\mu=\frac{i}{(4\pi)^2}[-M(D_1+D_2+D_3)\bar{v}u+D_2\bar{v}\not{k}_1 u]$、$I_3^{(014)\mu}=\frac{i}{(4\pi)^2}(-p_1^\mu C_1^s+p_2^\mu C_2^s)$ なので $\bar{v}\gamma_\mu uI_3^{(014)\mu}=-\frac{i}{(4\pi)^2}M(C_1^s+C_2^s)\bar{v}u$、$I_3^{(134)}=\frac{i}{(4\pi)^2}C_0^M(s)$（$\ell\to\ell+p_1$ と移すと外線の不変量は k_1^2、k_2^2、s）である。まとめて $a=-y^4M[(t-M^2)(D_1+D_2+D_3)-(C_1^s+C_2^s)]$、$b=y^4[m^2D_0+C_0^M(s)+(t-M^2)D_2]$ を得る。箱は紫外有限で、対抗項を持たない。

■ λ の三角形。 $u(p_1)$ が $\phi(\ell)$ を、続いて $\phi(p_1+p_2-\ell)$ を出し、二つの ϕ が 4 点頂点で $\phi(k_1)\phi(k_2)$ になる。i の因子は $(-i\lambda)i^3=-\lambda$ で、対称性因子は 1 である（4 点頂点の 4 本の線の付け方 4! と 1/4!、二つの湯川の頂点の入れ替え 2 と 1/2! が打ち消す）。分子は $\bar{v}\gamma^5(\not{p}_1-\not{\ell}+M)\gamma^5 u=\bar{v}\not{\ell}u$ で、$\int\ell^\mu/(D_m(\ell)D_M(\ell-p_1)D_m(\ell-p_1-p_2))=-\frac{i}{(4\pi)^2}[p_1^\mu C_1^\lambda+(p_1+p_2)^\mu C_2^\lambda]$、$\bar{v}(\not{p}_1+\not{p}_2)u=0$ から $i\mathcal{M}=-\lambda y^2\cdot(-\frac{i}{(4\pi)^2})MC_1^\lambda\bar{v}u$、すなわち $a=\lambda y^2MC_1^\lambda$、$b=0$ である。

■ 対抗項。 内線の自己エネルギーの対抗項 $i(\delta_\psi\not{p}-\delta_M)$ は、上の自己エネルギーの計算で V_ψ を置き換えたもの、すなわち $B_1\to-\frac{(4\pi)^2}{y^2}\delta_\psi=\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0\to\frac{(4\pi)^2}{y^2M}\delta_M=-\Delta_{\rm UV}$ で、自己エネルギーの極（B_1 の $-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0$ の $\Delta_{\rm UV}$）をちょうど打ち消す。頂点の対抗項は二つの頂点で木の振幅の $2\delta_y/y=2y^2\Delta_{\rm UV}/(4\pi)^2$ 倍で、頂点の補正の極を打ち消す。こうして、式 (18) の積分を $\overline{\rm MS}$ の有限部分とした式が、繰り込まれた振幅になる。

■ ユニタリー性。 付録 付録 G と同じく $2\,{\rm Abs}\,\mathcal{M}(i\to f)=\sum_n\int{\rm d}\Phi_n\,\mathcal{M}(i\to n)\mathcal{M}^*(f\to n)$ で、y^4、$y^2\lambda$ の次数では中間状態は $\psi\bar{\psi}$ と $\phi\phi$ である（Abs は係数の関数 a、b の虚部をとったもの）。$\psi\bar{\psi}$ の中間状態は区別できる粒子なので因子 $\frac{1}{2}$ を持たず、中間状態のスピンについて和をとる。$\mathcal{M}_C$ は付録 付録 F と同じ符号の規約（s チャンネルが $+$、t チャンネルが $-$）で、$\mathcal{M}(\phi\phi\to\psi_q\bar{\psi}_q)=y^2\bar{u}(q_1)[\not{k}_1/((q_1-k_1)^2-M^2)+\not{k}_2/((q_1-k_2)^2-M^2)]v(q_2)$ である。二つの振幅の状態の規約はそろえてある（Wick の縮約で $\bar{v}(p_2)\cdots u(p_1)$、$\bar{u}(q_1)\cdots v(q_2)$ が正の符号になる）。s チャンネルの項はトレース ${\rm tr}[(\not{q}_1+M)\gamma^5(\not{q}_2-M)\Gamma]$（$\Gamma$ はベクトル 2 つの線形結合）が 0 なので寄与しない。$\phi\phi$ の中間状態は $\mathcal{M}^*(\phi\phi\to\phi\phi)=-\lambda$ と同種粒子の $\frac{1}{2}$ を持つ。${\rm d}\Phi_2=\frac{|\boldsymbol{q}|}{16\pi^2\sqrt{s}}{\rm d}\Omega_q$ を入れると式 (19) を得る。

付録 I　γ^5 の処方の違いの導出

■ BMHV の処方。 D 次元の γ^μ を 4 次元の部分と $D-4$ 次元の部分に $\gamma^\mu=\bar{\gamma}^\mu+\hat{\gamma}^\mu$ と分ける。BMHV の処方では、γ^5 は $\bar{\gamma}^\mu$ と反可換、$\hat{\gamma}^\mu$ と可換である。ループ運動量 $q=\bar{q}+\hat{q}$ について $\gamma^5\not{q}\gamma^5=-\not{\bar{q}}\gamma^5\gamma^5+\not{\hat{q}}\gamma^5\gamma^5=-\not{\bar{q}}+\not{\hat{q}}$

なので、$\gamma^5(\not{\ell}+M)\gamma^5 = -\not{\ell}+M+2\hat{\not{q}}$（$a=q+$ 外線の運動量、外線の運動量は 4 次元）となる。NDR の $-\not{\ell}+M$ との違いは $2\hat{\not{q}}$ である。

■ **積分の規則。** 外線の運動量が 4 次元なので、$\hat{q}$ を含む積分は $\hat{g}^{\mu\nu}$（$D-4$ 次元の計量、$\hat{g}^{\mu}{}_{\mu} = D-4$）でしか表せない。よって $\int \hat{q}^\mu f = 0$、$\int \hat{q}^\mu \bar{q}^\nu f = 0$ で、$\int \hat{q}^2 f$ はテンソル積分 $\int q^\mu q^\nu f$ の $g^{\mu\nu}$ の係数の $(D-4)$ 倍になる。この係数が紫外の極 c/ϵ を持つと、$(D-4)c/\epsilon = -2c$ が有限に残る。極を持たなければ、$\epsilon \to 0$ で 0 になる。したがって、差は紫外で最も発散の強い項だけから決まり、運動量と質量の多項式になる。以下、$(4\pi)^2$ と i の因子は括弧の単位に含める。必要な極は、Feynman のパラメータで分母を $(\ell^2-\Delta)^n$ にまとめて

$$\int \frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{\ell^\mu\ell^\nu}{(\ell^2-\Delta)^2}\Big|_{\text{pole}} = \frac{i}{(4\pi)^2}\frac{g^{\mu\nu}\Delta}{2\epsilon}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{\ell^\mu\ell^\nu}{(\ell^2-\Delta)^3}\Big|_{\text{pole}} = \frac{i}{(4\pi)^2}\frac{g^{\mu\nu}}{4\epsilon}$$

である。2 点積分では $\Delta = M^2 - x(1-x)p^2$ を x で積分して、$g^{\mu\nu}$ の係数 B_{00} の極は $\frac{1}{2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta = \frac{6M^2-p^2}{12\epsilon}$、3 点積分では Feynman のパラメータの因子 $2\int \mathrm{d}F = 1$ から C_{00} の極は $\frac{1}{4\epsilon}$ である。

■ V_ϕ。 FeynArts の運動量のとり方で、トレースは NDR で $\mathrm{tr}[(M-\not{q})(M-\not{p}+\not{q})] = 4(M^2+p\cdot q-q^2)$、BMHV で $\mathrm{tr}[(M-\not{q})(M-\not{p}+\bar{\not{q}}-\hat{\not{q}})] = 4(M^2+p\cdot q-\bar{q}^2+\hat{q}^2)$ である（$q\cdot\bar{q}=\bar{q}^2$、$q\cdot\hat{q}=\hat{q}^2$）。差は $8\hat{q}^2$ で、$\Delta V_\phi = y^2\int 8\hat{q}^2/(D_M(q)D_M(q-p)) = 8y^2\frac{i}{(4\pi)^2}(D-4)B_{00} \to 8y^2\frac{i}{(4\pi)^2}(-2)\frac{6M^2-p^2}{12}$、すなわち $\Delta b_\phi = \frac{4}{3}y^2(p^2-6M^2)$ である。

■ V_ψ。 $\gamma^5(\not{\ell}+M)\gamma^5$ の違いは $2\hat{\not{q}}$ で、$\hat{q}$ の 1 次なので積分すると 0 になる。$\Delta b_\psi = 0$ である。

■ V_y。 分子 $\gamma^5(\not{k}+\not{q}+M)\gamma^5(\not{q}+M)\gamma^5$ の違いは $2\hat{\not{q}}(M+\not{q})\gamma^5$ である。$\hat{q}$ の 1 次の項 $2M\hat{\not{q}}\gamma^5$ と $2\hat{\not{q}}\bar{\not{q}}\gamma^5$ は積分で 0 になり、$2\hat{\not{q}}\hat{\not{q}}\gamma^5 = 2\hat{q}^2\gamma^5$ だけが残る。その積分は $2(D-4)C_{00} \to 2(-2)\frac{1}{4} = -1$（$\frac{i}{(4\pi)^2}$ を単位として）である。$V_y = -iy^3\int(\cdots)$ なので $\Delta V_y = -iy^3\frac{i}{(4\pi)^2}(-1)\gamma^5 = -\frac{y^3}{(4\pi)^2}\gamma^5$、すなわち $\Delta b_y = -y^3$ である。

■ V_4。 箱のトレースの 1 番目と 3 番目の伝播関数が γ^5 に挟まれるので、BMHV のトレースは $\mathrm{tr}[(A_1+\delta)B_2(A_3+\delta)B_4]$ と書ける（$A_i = M-\not{k}_i$、$B_i = M+\not{k}_i$、$\delta = 2\hat{\not{q}}$）。NDR との差は $\mathrm{tr}[\delta B_2A_3B_4]+\mathrm{tr}[A_1B_2\delta B_4]+\mathrm{tr}[\delta B_2\delta B_4]$ で、紫外で効くのは q の 4 次の項だけである（$k_i \to q$ としてよい）。それぞれ $-2\,\mathrm{tr}[\hat{\not{q}}\not{q}\not{q}\not{q}] = -8q^2\hat{q}^2$、$-2\,\mathrm{tr}[\not{q}\not{q}\hat{\not{q}}\not{q}] = -8q^2\hat{q}^2$、$4\,\mathrm{tr}[\hat{\not{q}}\not{q}\hat{\not{q}}\not{q}] = 16(2\hat{q}^4-q^2\hat{q}^2)$ で、和は $-32q^2\hat{q}^2+32\hat{q}^4$ である。対称な積分で $\hat{q}^2 \to \frac{D-4}{D}q^2$、$\hat{q}^4 \to \frac{(D-4)(D-2)}{D(D+2)}q^4$（$\int q^\mu q^\nu q^\rho q^\sigma \propto g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}+g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}$ を $\hat{g}_{\mu\nu}\hat{g}_{\rho\sigma}$ で縮約）なので、差は $(D-4)\big[-\frac{32}{D}+\frac{32(D-2)}{D(D+2)}\big]q^4 \to (D-4)(-\frac{16}{3})q^4$ である。$\int q^4/(q^2-M^2)^4$ の極は $\frac{i}{(4\pi)^2}\frac{1}{\epsilon}$ なので、一つの図の差は $-y^4\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}(-2)(-\frac{16}{3}) = -\frac{32}{3}\frac{iy^4}{(4\pi)^2}$、6 つの図で $-64\frac{iy^4}{(4\pi)^2}$、すなわち $\Delta b_4 = -64y^4$ である。ϕ の泡の 3 つの図は γ^5 を含まないので差がない。

付録 J　検算の細部

第 5 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。

■ **手順 (1)。** パラメータは、湯川結合を `yps`、4 点結合を `lamphi`、ϕ の質量を `mphi`、ψ の質量を `Mpsi` と書いた。ϕ^3 のノートで `g` という名前が FeynRules の UFO 出力を止めたので、一文字の名前は避けた。MadGraph の結合の次数は、`yps` を `YUK`= 1、`lamphi` を `YUK`= 2 と数える。λ は y^2 と同じ次数なので、`YUK` が 2 増えるごとにループの次数が一つ上がる。模型ファイルを作るときに一つ落とし穴があった。Mathematica のパッケージファイルでは、行末で式が完結していると、そこで文が終わる。ラグランジアンを `···- Mpsi` $\bar{\psi}\psi$ で改行して次の行を $+\frac{1}{2}$`···` で始めたところ、1 行目だけが代入され、FeynRules は ϕ の質量を見つけず、頂点も 0 個になった（エラーは出ない）。式全体を括弧で囲んで直した。FeynArts の模型の頂点は `C[S[1],S[1],S[1]]` と `C[-F[1],F[1],S[1]]` で、後者は $\{\{c_L,0\},\{c_R,0\}\}$ の形のカイラルな係数を持つ。

■ **手順 (2)。** FeynRules が書いた FeynArts の模型では、湯川の頂点の係数は記号 `gc2L`、`gc2R` で書かれ、その値はモデルファイルの末尾の置き換えの表 `M$FACouplings` = {`gc2L` → −`yps`, `gc2R` → `yps`} にある。FeynCalc はこの表を自動では使わないので、`CreateFeynAmp` の出力に手で適用した。適用しないと、スピン和に `gc2L`、`gc2R` が残る。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ の模型では頂点の係数が $-i$ `gphi` のように直接書かれていたので、この問題は起きなかった。

カイラルな射影 $\omega_\pm$ は、`FCFAConvert` のオプション `UndoChiralSplittings` で γ^5 にまとめた。MadGraph では、固定エネルギーの粒子どうしの衝突（`lpp`= 0、ビームのエネルギーは $\sqrt{s}/2$）で、カットをかけずに全断面積を求めた。断面積は、ログには 4 桁、`results.dat` とバナーにも 5 桁しか書かれない。(A) では $|\mathcal{M}|^2$ が定数なので、積分の統計誤差は相対 10^{-9} の程度しかなく、差を統計誤差で割ると桁の丸めのために 10^4〜10^5 になる。そこで表 4 では、統計誤差と最後の桁の半分の大きい方を実効誤差とした。5 桁の出力でも、(A) の値は解析式を丸めたものと一致する（例えば $\sqrt{s} = 2.5$ で 619720 と 619716.6）。

■ **手順 (3)。** FeynCalc の `DiracSimplify` は、既定では γ^5 を奇数個含むフェルミオンの線をカイラルな射影 $\omega_\pm$ で書き直す（オプション `ToDiracGamma67 -> True`）。そのままだと V_y の結果に $\omega_\pm$ が残り、Dirac 構造に分けられない。`ToDiracGamma67 -> False`、`DiracSubstitute67 -> True` として γ^5 のまま扱った。V_4 では、TID の結果に $s+t+u$ の組み合わせが現れるので、$u = 4m^2 - s - t$ を代入してから積分の名前をそろえた。LoopTools の値は FeynHelpers の `LToolsEvaluate` で求めた。これは各スカラー積分を「有限部分 + 極 $/\epsilon$」の形で返す。TID の係数は D を含むので、$D = 4 - 2\epsilon$ と置いてから ϵ^0 の項をとった。$D \to 4$ としてから評価すると、$(D-4)\times$ 極から来る有理数の項を落とす。また、係数を早く浮動小数点数にすると、$(D-2)/(D-2)$ のような因子が約分されずに残る。Package-X の `ScalarC0`、`ScalarD0` は、引数に質量の 2 乗ではなく質量をとる。COLLIER の 3 点のテンソル係数は `C_cll` の `C(0,1,0)`、`C(0,0,1)` が C_1、C_2 である。LoopTools の C_0 の誤りについて、新しく分かったことがある。誤る点では、LoopTools 自身が “Discrepancy in C0” と表示し、版 a（主に FF）の正しい値と版 b の誤った値を並べ、誤った方を返す。版の選択（version key を `KeyC0` の 0〜3 倍）を変えても、返す値は変わらなかった。FF は “lambda(p1,p2,p3) < 0” と警告する。ただし、$\lambda < 0$ の点がすべて誤るわけではない（V_y の $(-1,-2,-3)$ の点は正しい）。γ^5 の処方の比較では、FeynCalc の `FCSetDiracGammaScheme` で BMHV の処方を選んで V_ϕ、V_ψ、V_y を計算した。外線の運動量の $D-4$ 次元の部分は、テンソル積分の簡約の後で 0 とした。箱のトレースは、BMHV の処方では “Not all non-chiral traces were evaluated” というエラーで止まった。

■ **手順 (4)。** FormCalc は、一つのセッションで別の過程を計算しようとすると止まる（`DeclareProcess::incomp`）。過程を替えるたびに `ClearProcess[]` を呼んだ。FormCalc のスピノルの鎖の名前（`F1`、`F2`）はセッションごとに入れ替わるので、名前ではなく中身で区別した。FormCalc の鎖は `DiracChain[Spinor[k[1],M,-1], ..., Spinor[k[2],M,1]]` の形で、フェルミオンの線が $k[1]$ から $k[2]$ へ向かう。$\bar{v}(p_2)\Gamma u(p_1)$ を逆向きに書くと、荷電共役で $\Gamma = 1$ の鎖の符号は変わらず、$\Gamma = \gamma^\mu$ の鎖の符号は変わる。木の振幅で全体の位相を決めると、$\langle 1|1|2\rangle$ の係数が $-a$、$\langle 1|\not{k}_1|2\rangle$ の係数が b になる。この対応が二つの係数の両方で、全ての点で成り立つことが検算になっている。FormCalc の `PaVeReduce -> True` の結果には `IGram[x]`（$= 1/x$）と 3 引数の `Den[p, m, d]`（$= (p-m)^{-d}$）が現れるので、数値にする前に置き換えた。FeynCalc では、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は積分の引数が浮動小数点数でないと止まる（$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$ の t は平方根を含む）。係数は厳密なままにして、積分の引数だけを数値にした。ユニタリー性の積分では、高いエネルギーで被積分関数が二つの方向（$\boldsymbol{p}_1$ と $\boldsymbol{k}_1$）の近くに山を持つ。40×40 点の求積では $\sqrt{s} = 10$ で相対 3×10^{-3} しか合わなかったので、中間状態のスピンの和を完全性の関係 $\sum u\bar{u} = \not{q} + M$、$\sum v\bar{v} = \not{q} - M$ で行列にまとめ、240×240 点にした。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則、1 ループ積分の一般式（付録 C）、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分（付録 G）、検算の手順と道具。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。4 点頂点の Feynman 則と対称性因子（付録 A）、bounce と前因子の数値計算。

[3] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[4] S. Coleman, E. Weinberg, “Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking,” Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。1 ループの有効ポテンシャル。