

한국판 국제하지불안척도(ver 2.2)

지시사항 : 하지불안증후군 증상이 있는 경우만 답하세요

지난주에

1. 전반적으로, 하지불안증후군으로 인한 팔, 다리의 불쾌감을 어떻게 평가하시겠습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

2. 전반적으로, 하지불안증후군 때문에 움직여야 하는 필요성을 어떻게 평가하시겠습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

3. 전반적으로, 하지불안증후군으로 인한 팔 혹은 다리의 불쾌감은 팔이나 다리를 움직임으로써 얼마나 줄어들었습니까?

☐ 4 줄어들지 않았다☐ 3 약간 줄어들었다☐ 2 보통으로 줄어들었다

☐ 1 거의 완전히 줄어들었다☐ 0 하지불안 증상이 없었다

4. 하지불안증후군 증상으로 인해 수면장애는 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

5. 하지불안증후군 증상으로 인해 낮에 느끼는 피곤함과 졸림은 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

6. 하지불안증후군은 대체로 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

7. 하지불안증후군 증상을 얼마나 자주 경험했습니까?

☐ 4 매우 자주(1주일에 6-7일)☐ 3 자주(1주일에 4-5일)☐ 2 때때로(1주일에 2-3일)

☐ 1 간혹(1주일에 하루)☐ 0 전혀 없었다

8. 하지불안증후군 증상이 있을 때 증상은 평균적으로 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다(하루8시간이상)☐ 3 심했다(하루3-8시간)☐ 2 보통 이었다(하루1-3시간)

☐ 1 가벼웠다(하루1시간미만)☐ 0 없었다

9. 전반적으로 하지불안증후군 증상이 일상적인 활동(예를 들면; 만족스런 가족관계, 가정생활, 사회생활, 학교생활 또는 직장생활)을 하는데 미친 영향은 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

10. 하지불안증후군 증상으로 인한 기분장애(예를 들면; 화남, 우울, 슬픔, 불안, 예민함 등)가 얼마나 심했습니까?

☐ 4 매우 심했다☐ 3 심했다☐ 2 보통이었다☐ 1 가벼웠다☐ 0 없었다

DSMC SLEEP SCALE II

등록번호 :

평 가 일 :

성 명 :

나이/성별 :세 / ☐남 ☐여

계명대학교 동산병원 신경과 수면센터
KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN HOSPITAL SLEEP CENTER
| <http://goodsleep.or.kr> |

| 053-258-4351(접수) | 053-258-4377(수면다원검사실) | 053-258-4378(수면센터) |

한국판 피쳐버그 수면의 질 지수 (PSQI-K)

※ 다음은 지난 1달(4주) 동안 당신의 일상적인 수면습관에 관한 질문입니다.

지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 ☒ 표시 혹은 기록을 해주시기 바랍니다.

1. 지난 한달 동안, 당신은 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까? 보통 오전/오후 시 분
2. 지난 한달 동안, 당신은 밤에 잠자리에 들어서 잠들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까? 시간 분
3. 지난 한달 동안, 당신은 평소 아침 몇 시에 일어났습니까? 보통 오전/오후 시 분
4. 지난 한달 동안, 당신이 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까?
(이것은 당신이 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다.) 하루 밤에 시간 분
5. 지난 한달 동안, 당신은 아래의 이유로 잠자는 데 얼마나 자주 문제가 있었습니까? □에 ☒ 표시 하세요.

문 항	지난 한달 동안 없었다. (없다)	한 주에 1번보다 적게 (주1회 미만)	한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	한 주에 3번 이상 (주3회 이상)
1) 취침 후30분 이내에 잠들 수 없었다.	☐	☐	☐	☐
2) 한밤중이나 새벽에 깼다.	☐	☐	☐	☐
3) 화장실에 가려고 일어나야 했다.	☐	☐	☐	☐
4) 편안하게 숨 쉴 수가 없었다.	☐	☐	☐	☐
5) 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다.	☐	☐	☐	☐
6) 너무 춥다고 느꼈다.	☐	☐	☐	☐
7) 너무 덥다고 느꼈다.	☐	☐	☐	☐
8) 나쁜 꿈을 꾸었다.	☐	☐	☐	☐
9) 통증이 있었다.	☐	☐	☐	☐
10) 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요. (이유는? _____) 지난 한달 동안, 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는 데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	☐	☐	☐	☐

6. 지난 한달 동안, 당신은 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가하십니까?
☐ 매우 좋음 ☐ 상당히 좋음 ☐ 상당히 나쁨 ☐ 매우 나쁨
7. 지난 한달 동안, 당신은 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? (처방약 또는 약국에서 구입한 약)
☐ 지난 한달 동안 없었다 ☐ 한 주에 1번보다 적게 ☐ 한 주에 1~2번 정도 ☐ 한 주에 3번 이상
8. 지난 한달 동안, 당신은 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?
☐ 지난 한달 동안 없었다 ☐ 한 주에 1번보다 적게 ☐ 한 주에 1~2번 정도 ☐ 한 주에 3번 이상
9. 지난 한달 동안, 당신은 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?
☐ 전혀 없었다 ☐ 매우 조금 있었다 ☐ 다소 있었다 ☐ 매우 많이 있었다

한국판 수면에 대한 역기능적 신념 및 태도 척도

아래에 제시된 내용은 사람들이 수면에 대해 갖고 있는 생각과 태도를 적은 것입니다. 각각의 문장에 대해 동의 하는 정도를 표시해 주십시오. 정답은 없습니다. 당신이 갖고 있는 개인적인 생각의 정도에 체크해 주십시오. 당신의 상황과 직접적으로 맞지 않더라도, 모든 문항에 답해 주시기 바랍니다.

문 항	전혀 그렇지 않다				보통 이다				매우 그렇다	
1. 낮에 기운을 차리고 일을 잘 하려면 8시간은 자야한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 전날 잠을 충분히 못 자면, 다음날 낮잠을 자거나 잠을 좀 더 오래자서 보충해야한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 만성 불면증이 내 건강에 심각한 영향을 미칠지도 모른다는 염려를 한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 잠을 잘 조절할 수 있는 능력을 잃을지도 모른다는 걱정을 한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 밤에 잠을 잘 못자면 다음날 일상 활동을 하는데 지장을 준다고 알고 있다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 낮 동안 맑은 정신으로 일을 잘 하기 위해서는 밤에 잠을 잘 못 자느니 수면제를 먹는 것이 더 낫다고 생각한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 낮에 짜증나고 우울하거나 불안하게 느낀다면, 그건 대개 전날 밤에 잠을 잘 못 잤기 때문이다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 하룻밤 잠을 잘 못자면, 그것이 그 주 전체의 수면 스케줄에 지장을 준다고 알고 있다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 충분히 잠을 못자면 다음날 낮에 기능을 거의 할 수 없다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 밤에 잠을 잘 수 있을 것인지 절대 예측할 수 없다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 수면 장애로 인해 생기는 부정적인 문제들에 대처할 만한 능력이 거의 없다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 낮에 피곤하고, 기력이 없거나 기능을 잘 못한다고 느낄 때는, 보통 그 전날 밤에 잠을 잘 자지 못했기 때문이다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 불면증은 근본적으로 화학적 불균형에 의해 생긴다고 생각한다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 불면증 때문에 인생을 즐기지 못하고 내가 원하는 것을 하지 못하게 된다고 느낀다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 잠을 못 잘 때 유일한 해결책은 약물치료일 것이다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 밤에 잠을 잘 못잔 다음날은 사회 혹은 가정에서 내가 해야 할 일들을 피하거나 취소하게 된다.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

뒷면계속 →