

[인적사항]

등록번호

성명

평가일

생년월일

나이

성별

의심진단

[인적사항 및 기본정보]

직업

직업명 (유인 경우)

교대근무

학력

결혼상태

세전 연가 가계 수입

선택



신체계측

신장 (cm)

몸무게 (kg)



BMI

목둘레 (cm)



허리둘레 (cm)



생활습관

카페인

선택



커피: 하루 잔 차: 하루 잔 음료: 하루 잔

음주

선택



흡연

선택



시작나이 세 흡연기간 년 금연연도 년

운동

선택



운동종류 → 주 회 1회당 분

[병력 및 약물]

현재 앓고 있는 질환

선택



질환명:

질환명 기재

현재 복용 중인 약물

선택



약물명:

약물명 기재

수면문제로 방문했던 병원의 수



1. 불면증 심각도 (ISI)

아래 각 질문에서 수면상황을 고려하여 해당번호에 V표 해주십시오.

1. 현재 (지난 2주) 불면문제(들)의 심각도를 평가하십시오.

1) 잠들기 어려움

☒ 없음

☐ 약간

☐ 중간

☐ 심함

☐ 매우

2) 잠을 유지하기 어려움

☒ 없음☐ 약간☐ 중간☐ 심함☐ 매우

3) 너무 일찍 깨는 문제

☒ 없음☐ 약간☐ 중간☐ 심함☐ 매우

2. 현재 수면패턴에 대해 얼마나 만족/불만족하십니까?

☐ 매우 만족☒ 만족☐ 중간☐ 불만족☐ 매우 불만족

3. 수면문제로 일상 활동(예: 주간피로, 업무 혹은 일상적 가사능력, 집중력, 기억력, 기분 등)이 어느 정도까지 방해가 됩니까?

☒ 전혀 방해되지 않음☐ 조금 방해됨☐ 다소 방해됨☐ 많이 방해됨☐ 매우 많이 방해됨

4. 수면문제가 다른 사람에 비해 얼마나 현저하게 삶의 질을 손상시키고 있다고 생각하십니까?

☒ 전혀 현저하지 않음☐ 조금 현저함☐ 다소 현저함☐ 많이 현저함☐ 매우 많이 현저함

5. 현재 수면문제에 관하여 얼마나 걱정/괴로워하십니까?

☒ 전혀☐ 조금☐ 다소☐ 많이☐ 매우 많이

2. 한국판 엡워스 졸음 척도 (Korean ESS)

단순한 피곤함과는 다르게 다음의 상황에서 얼마나 깜박 졸거나 혹은 잠들어버릴 것 같습니까? 최근의 일상생활을 참고하시기 바랍니다.

1. 앉아서 책(신문, 잡지, 서류 등)을 읽을 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

2. TV 볼 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

3. 공공장소(모임, 극장 등)에서 가만히 앉아 있을 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

4. 쉬지 않아 1시간 동안 운행 중인 차(자동차, 버스, 열차)에 승객으로 앉아 있을 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

5. 오후에 주위상황이 허락되어 쉬려고 누워 있을 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

6. 앉아서 상대방과 이야기할 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

7. 점심식사 후 조용히 앉아 있을 때

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

8. 교통 혼잡으로 몇 분 동안 멈춰선 차 안에서

☒ 전혀 (0)☐ 조금 (1)☐ 상당히 (2)☐ 매우많이 (3)

3. 수면무호흡 위험도평가 (STOP-Bang)

각 항목에 예 또는 아니오로 답해 주십시오.

(S) 귀하는 코를 크게 곱니까?

문이 닫힌 상태에서 밖에서 들을 수 있을 정도 또는 같이 잠을 자는 상대가 귀하가 밤에 코를 곤다고 밀쳐 낼 정도로 큰 경우

☐ 예☒ 아니오

(T) 피곤합니까?

낮 동안 종종 지치거나 피곤하거나 졸림을 느낍니까?(예:운전중 졸드는 것)

☐ 예☒ 아니오

(O) 누군가가 보았습니까?

귀하가 수면 중에 숨을 멈추거나 숨이 막히거나 숨을 헐떡이는 것을 누군가가 보았습니까?

☐ 예☒ 아니오

(P) 혈압이 있습니까? 고혈압이 있거나 치료를 받고 있습니까?

☐ 예☒ 아니오

(B) 체질량지수(BMI:kg/m²)가 30보다 높습니까?

☐ 예☒ 아니오

(A) 나이가 50세보다 많습니까?

☐ 예☒ 아니오

(N) 목둘레가 큼니까? (목젖주위로 측정 : 남성>43cm, 여성>41cm)

☐ 예☒ 아니오

(G) 성별이 남성입니까?

☐ 예☒ 아니오

4. 하지 불안 증후군 (RLS 진단기준)

아래 4가지 필수 진단기준에 모두 해당되면 하지불안증후군으로 진단합니다.

1. 다리를 움직이고 싶은 충동, 대개 다리에 불편하거나 불쾌한 느낌이 동반된다.

(때때로 불편한 느낌 없이 다리를 움직이고 싶은 충동을 느끼거나, 다리와 함께 팔 또는 다른 신체부위의 증상이 동반되기도 한다.)

☐ 예☒ 아니오

2. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌이 쉬거나 누워있거나 앉아 있을 때처럼 움직이지 않을 때 시작되거나 더 악화된다.

☐ 예☒ 아니오

3. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌은 걷거나 뻗을 때처럼 움직임에 따라 부분적으로나 전체적으로 완화된다.

☐ 예☒ 아니오

4. 움직이고 싶은 충동이나 불쾌한 느낌은 낮 시간보다 저녁이나 밤에 더 나빠지거나, 단지 저녁이나 밤에 발생한다.

(증상이 매우 심해지면 야간 악화가 현저하지는 않지만, 과거에는 그런 증상이 있었다.)

☐ 예☒ 아니오

5. 건강관련 삶의 질 척도 (SF-36) ver.2

지난 한 달 동안의 건강상태에 대한 질문입니다.

1. 평소 당신의 건강상태에 대해서 어떻게 생각하십니까?

☒ 매우 좋다☐ 좋다☐ 보통이다☐ 별로 좋지 않다☐ 매우 좋지 않다

2. 1년 전과 비교해서, 현재의 당신의 건강상태가 어떻다고 생각하십니까?

☒ 1년 전보다 매우 좋다☐ 1년 전보다 좋은 편이다☐ 1년 전과 비슷하다☐ 1년 전보다 조금 나빠졌다☐ 1년 전보다 많이 나빠졌다

3. 다음의 항목은 일상생활에서의 활동에 관한 항목들입니다. 건강상의 이유로 다음의 활동을 하는 것이 어렵다고 느끼십니까?

1) 격한 활동, 예를 들어, 달리기, 무거운 물건 들어올리기, 격한 스포츠에 참여하기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

2) 적당한 활동, 예를 들어 밥상 들어 나르기, 집안 청소하기, 가벼운 스포츠에 참여하기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

3) 시장바구니를 들거나 운반하기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

4) 3-4층까지 계단 오르기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

5) 2층까지 계단 오르기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

6) 몸을 앞으로 구부리거나 무릎을 꿇다 구부렸다 하기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

7) 1킬로미터 이상 걷기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

8) 수백 미터 정도 걷기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

9) 1백 미터 정도 걷기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

10) 혼자서 목욕하기, 옷 갈아입기

☐ 많은 어려움이 있다☐ 약간의 어려움이 있다☒ 전혀 어려움이 없다

4. 지난 한 달 동안, 일(가사 포함)이나 일상적인 활동을 하실 때, 신체적인 이유로 다음과 같은 문제가 어느 정도 있었습니까?

1) 일이나 일상적인 활동의 시간을 줄였다

☐ 그렇다☒ 아니다

2) 일이나 일상적인 활동을 원하는 만큼 하지 못했다

☐ 그렇다☒ 아니다

3) 일이나 일상적인 활동 중에서 내용에 따라서는 못했던 것들이 있었다

☐ 그렇다☒ 아니다

4) 일이나 일상적인 활동을 하는 것이 어려웠다(예를 들어 평소보다 많은 노력이 필요했다 등)

☐ 그렇다☒ 아니다

5. 지난 한 달 동안, 일(가사 포함)이나 일상적인 활동을 하실 때, 심리적인 이유(예를 들면, 우울하거나 불안을 느끼거나 하는 등의 이유)로 다음과 같은 문제가 어느 정도 있었습니까?

1) 일이나 일상적인 활동의 시간을 줄였다

☐ 그렇다☒ 아니다

2) 일이나 일상적인 활동을 원하는 만큼 하지 못했다

☐ 그렇다

☒ 아니다

3) 일이나 일상적인 활동을 평소처럼 집중해서 할 수 없었다

☐ 그렇다

☒ 아니다

6. 지난 한 달 동안, 신체적 또는 심리적인 이유로 인해 가족, 친구, 이웃, 그 외의 아는 사람들과의 일상적인 사회 활동에 어느 정도 지장을 받았습니까?

☒ 전혀 지장이 없었다

☐ 적지만 지장이 있었다

☐ 어느 정도 지장이 있었다

☐ 많은 지장이 있었다

☐ 매우 많은 지장이 있었다

7. 지난 한 달 동안, 신체적인 통증을 어느 정도 느꼈습니까?

☒ 전혀 없었다

☐ 희미한 통증을 느꼈다

☐ 어느 정도 통증이 있었다

☐ 많은 통증이 있었다

☐ 매우 많은 통증이 있었다

8. 지난 한 달 동안, 신체적인 통증으로 인해 일상적인 일(외부활동과 가사를 포함해서)에 어느 정도 지장을 받았습니까?

☒ 전혀 지장이 없었다

☐ 적지만 지장이 있었다

☐ 어느 정도 지장이 있었다

☐ 많은 지장이 있었다

☐ 매우 많은 지장이 있었다

9. 다음의 질문들은 지난 한 달 동안에 일상적으로 어떤 일들이 있었고, 당신이 어떻게 느꼈는지에 관한 것입니다.

1) 의욕으로 가득 차 있었습니까?

☐ 항상

☐ 거의 항상

☒ 보통

☐ 때때로

☐ 드물게

☐ 전혀 없음

2) 불안하고 초조했습니까?

☐ 항상

☐ 거의 항상

☒ 보통

☐ 때때로

☐ 드물게

☐ 전혀 없음

3) 어떻게 할 수 없을 정도로 의기소침해 있었습니까?

☐ 항상

☐ 거의 항상

☒ 보통

☐ 때때로

☐ 드물게

☐ 전혀 없음

4) 안정되고 평온한 기분이었습니까?

☐ 항상

☐ 거의 항상

☒ 보통

☐ 때때로

☐ 드물게

☐ 전혀 없음

5) 활력(에너지)으로 넘쳐 있었습니까?

☐ 항상

☐ 거의 항상

☒ 보통

☐ 때때로

☐ 드물게

☐ 전혀 없음

6) 상심하고, 우울한 기분이었습니까?

☐ 항상☐ 거의 항상☒ 보통☐ 때때로☐ 드물게☐ 전혀 없음

7) 지쳤습니까?

☐ 항상☐ 거의 항상☒ 보통☐ 때때로☐ 드물게☐ 전혀 없음

8) 행복한 기분이었습니까?

☐ 항상☐ 거의 항상☒ 보통☐ 때때로☐ 드물게☐ 전혀 없음

9) 피곤을 느꼈습니까?

☐ 항상☐ 거의 항상☒ 보통☐ 때때로☐ 드물게☐ 전혀 없음

10. 지난 한 달 동안, 친구나 친척을 방문하는 등, 사람들과의 만남의 시간이 신체적 또는 심리적
인 이유로 어느 정도 지장을 받았습니까?

☐ 항상 지장이 있었다☐ 거의 항상 지장이 있었다☐ 때때로 지장이 있었다☐ 드물게 지장이 있었다☒ 전혀 지장이 없었다

11. 다음의 각 항목이 당신에게 어느 정도 적용된다고 생각하십니까?

1) 나는 다른 사람들 보다 더 쉽게 아픈 것 같다

☐ 매우 그렇다☐ 거의 그렇다☒ 모르겠다☐ 거의 그렇지 않다☐ 전혀 그렇지 않다

2) 나는 보통 사람들 만큼 건강하다

☐ 매우 그렇다☐ 거의 그렇다☒ 모르겠다☐ 거의 그렇지 않다☐ 전혀 그렇지 않다

3) 나의 건강이 나빠질 것 같은 느낌이 든다

☐ 매우 그렇다☐ 거의 그렇다☒ 모르겠다☐ 거의 그렇지 않다☐ 전혀 그렇지 않다

4) 나의 건강상태는 매우 좋다

☐ 매우 그렇다☐ 거의 그렇다☒ 모르겠다☐ 거의 그렇지 않다☐ 전혀 그렇지 않다

작성 불가

Sleep Scale I의 하지불안증후군(RLS) 4개 진단기준이 모두 '예'인 경우에만 작성할 수 있습니다.

2. 한국판 피쳐버그 수면의 질 지수 (PSQI-K)

다음은 지난 1달(4주) 동안 당신의 일상적인 수면습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변을 해주시기 바랍니다.

1. 지난 한달 동안, 당신은 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?

보통 시 분

2. 지난 한달 동안, 당신은 밤에 잠자리에 들어서 잠들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?

시간 분

3. 지난 한달 동안, 당신은 평소 아침 몇 시에 일어났습니까?

보통 시 분

4. 지난 한달 동안, 당신이 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까?

하루 밤에 시간 분

5. 지난 한달 동안, 당신은 아래의 이유로 잠자는 데 얼마나 자주 문제가 있었습니까?

a) 취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다.

☐ 없었다

☐ 한 주에 1번 미만

☐ 한 주에 1-2번

☒ 한 주에 3번 이상

b) 한밤중이나 새벽에 깼다.

☐ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☐ 한 주에 1-2번☒ 한 주에 3번 이상

c) 화장실에 가려고 일어나야 했다.

☐ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☐ 한 주에 1-2번☒ 한 주에 3번 이상

d) 편안하게 숨 쉴 수가 없었다.

☐ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☒ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

e) 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다.

☐ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☒ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

f) 너무 춥다고 느꼈다.

☐ 없었다☒ 한 주에 1번 미만☐ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

g) 너무 덥다고 느꼈다.

☐ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☒ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

h) 나쁜 꿈을 꾸었다.

☒ 없었다☐ 한 주에 1번 미만☐ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

i) 통증이 있었다.

☐ 없었다☒ 한 주에 1번 미만☐ 한 주에 1-2번☐ 한 주에 3번 이상

j) 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요.

(이유는? 지난 한달 동안, 잤는데 기입한 이유들 때문에 잠자는 데 얼마나 자주 어려움이 있었는지)

☐ 없었다

☐ 한 주에 1번 미만

☐ 한 주에 1-2번

☐ 한 주에 3번 이상

6. 지난 한달 동안, 당신은 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가하십니까?

☐ 매우 좋음

☐ 상당히 좋음

☒ 상당히 나쁨

☐ 매우 나쁨

7. 지난 한달 동안, 당신은 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? (처방약 또는 약국에서 구입한 약)

☒ 지난 한달 동안 없었다

☐ 한 주에 1번보다 적게

☐ 한 주에 1-2번 정도

☐ 한 주에 3번 이상

8. 지난 한달 동안, 당신은 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?

☐ 지난 한달 동안 없었다

☐ 한 주에 1번보다 적게

☒ 한 주에 1-2번 정도

☐ 한 주에 3번 이상

9. 지난 한달 동안, 당신은 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?

☐ 전혀 없었다

☒ 매우 조금 있었다

☐ 다소 있었다

☐ 매우 많이 있었다

3. 한국판 수면에 대한 역기능적 신념 및 태도 척도 (DBAS-16)

아래에 제시된 내용은 사람들이 수면에 대해 갖고 있는 생각과 태도를 적은 것입니다. 각각의 문장에 대해 동의하는 정도를 표시해 주십시오. 정답은 없습니다. 당신이 갖고 있는 개인적인 생각의 정도에 체크해 주십시오.

1. 낮에 기운을 차리고 일을 잘 하려면 8시간은 자야한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

2. 전날 잠을 충분히 못 자면, 다음날 낮잠을 자거나 잠을 좀 더 오래자서 보충해야한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

3. 만성 불면증이 내 건강에 심각한 영향을 미칠지도 모른다는 염려를 한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

4. 잠을 잘 조절할 수 있는 능력을 잃을지도 모른다는 걱정을 한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

5. 밤에 잠을 잘 못자면 다음날 일상 활동을 하는데 지장을 준다고 알고 있다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

6. 낮 동안 맑은 정신으로 일을 잘 하기 위해서는 밤에 잠을 잘 못 자느니 수면제를 먹는 것이 더 낫다고 생각한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

7. 낮에 짜증나고 우울하거나 불안하게 느낀다면, 그건 대개 전날 밤에 잠을 잘 못 잤기 때문이다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

8. 하룻밤 잠을 잘 못자면, 그것이 그 주 전체의 수면 스케줄에 지장을 준다고 알고 있다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

9. 충분히 잠을 못자면 다음날 낮에 기능을 거의 할 수 없다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

10. 밤에 잠을 잘 수 있을 것인지 절대 예측할 수 없다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

11. 수면 장애로 인해 생기는 부정적인 문제들에 대처할 만한 능력이 거의 없다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

12. 낮에 피곤하고, 기력이 없거나 기능을 잘 못한다고 느낄 때, 보통 그 전날 밤에 잠을 자지 못했기 때문이다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

13. 불면증은 근본적으로 화학적 불균형에 의해 생긴다고 생각한다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

14. 불면증 때문에 인생을 즐기지 못하고 내가 원하는 것을 하지 못하게 된다고 느낀다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

15. 잠을 못 잘 때 유일한 해결책은 약물치료일 것이다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

16. 밤에 잠을 잘 못자 다음날은 사회 혹은 가정에서 내가 해야 할 일들을 피하거나 취소하게 된다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전혀 그렇지 않다

보통이다

매우 그렇다

검사 결과

환자 정보

- | 나이: -세 | 성별: - | 평가일: 2026-08-27

Scale I 결과

불면증 심각도 (ISI)

1 / 28

응답: 7/7 문항

임상적 불면증 없음 (0-7)

엠피스 졸음 척도 (ESS)

0 / 24

응답: 8/8 문항

정상 범위 (0-10)

STOP-Bang (수면무호흡 위험도)

0 / 8

응답: 8/8 문항

저위험 (0-2)

하지불안증후군 (RLS)

0 / 4

개 총족

응답: 4/4 문항

진단기준 미충족 (0/4 총족)

Scale II 결과

국제하지불안척도 (K-IRLS)

— / 40

해당없음 (RLS 진단기준 미충족)

피처버그 수면의 질 (PSQI-K)

14 / 21

C1(수면질):2 | C2(수면잠복기):2 | C3(수면시간):3 | C4(수면효율):3 | C5(수면장애):2 | C6(수면약물):0 | C7(주간기능장애):2

수면효율: 1.7% | 총 수면시간: 0.1시간

매우 나쁜 수면의 질 (11-21)

역기능적 신념 및 태도 (DBAS-16)

5.9 / 10

평균 (합계: 94)

응답: 16/16 문항

중등도 역기능적 신념

