#184

【威染症法の届け出】水痘・帯状疱疹ウイルス(以下 VZV)の初感染による感染症の うち 24 時間以上の入院(他疾患で入院中水痘を発症、24 時間以上経過したもの)は 5 **類全数7**日以内。 VZV は2本鎖 DNA(第1群)でヘルペスウイルス科 Varicellovirus 属の varicella zoster virus(HHV-3)。 20 世紀の初めには水痘と帯状疱疹の組織の同 一性が判明、その後一人の患者で水痘発病時と回復後に発症した帯状疱疹で得た2つの DNA の制限酵素切断で得た塩基配列のパターンが全く同一であるのがわかり単一ウイ ルスによる疾患と確定。 【水痘】は幼児期に感染し終生免疫を得る。 成人期の初感染 は重症化しやすく水痘肺炎などを合併しやすい*。 妊婦の場合は先天性水痘症候群 (CVS) を生ずることがある。 日本では 95%が 10 歳以下で感染、15 歳以上は少ない が増加の傾向にある。 水痘は終生免疫と考えられてきたが再感染があることが知られ てきた。 麻疹には特徴的な咳があり、咳のない麻疹は無い*。 水痘も麻疹と同じく感 染力が極めて強く暴露があると **90**%以上発症(咳はあまりない***が**子供なので抱き上げ ることが多く接触感染が多い)。 【ワクチン】1971 年阪大微研の高橋理明が大阪警察 病院の小児科で典型的な水痘の子の水疱液を採取、その子が「岡」であったのが Oka strain の語源。 VZV は細胞嗜好性が強く cell-free ワクチンを得るため数十代の継代低 温組織培養が行われた(低温馴化)。 Oka strain は弱毒生ワクチンで 1974 年ネフロー

ゼ児の予防接種が中京病院で成功。 Lancet に掲載され、免疫不全に生 ワク投与の強い批判もあったが世 界的注目を浴びた。 1979 年米国 に導入され、1996 年より岡株によ

任意接種	希望者。水痘は¥1万? 2-3割は発症した*
定期接種	無料、年齢で接種票を送付。原則個別接種
個別接種	指定医療機関。本人希望、接種努力義務有り*
集団接種	学校などで全員接種。一部自治体は今も

る定期接種開始。日本では2014年定期接種となった。ワクチンの効果は10年程度? 【帯状疱疹】日本人の場合はVZV初感染による発症は成人ではまずないので普通は帯 状疱疹。 小児科以外は水痘入院例の届け出は殆どない(2011年に84歳の成人水痘1例)。 水痘は冬から春にかけて増加するが、21年間(1997~2006)にわたる宮崎ス

タディで水痘の発症と帯状疱疹の発生には明瞭な逆相関が見られた。これは水痘発症児からの VZV の伝播によるブースター効果と考えられた。 2014 年定期接種導入後の小児の水痘減少によるこの効果の減少で 20~40 歳の帯状疱疹が急激に増加しつつある(右図)。 VZV ワクチンは Oka strain の 18 倍のウイルス量を持つ帯状疱疹ワクチンで、米国で有効性が確認されている。 【初感染】 初感染かどうかは記憶機能を持つ TH1、TH2、CD8、B 細胞の TCR 遺



図2. 1997年の発症率に対する1998~2017年までの年間発症率の比の値

伝子領域に VZV の抗原提示を受けた結果の再構成があるかによる(利根川進)。 生ワクで水痘を発症し、その後時間を経て帯状疱疹を発症した場合を初感染とみるかどうかは微妙。 Oka strain ワクチンには 2~3 割の breakthrough (通り抜け) があり青年期の水痘は軽症であることが判っている (米では 1996 年より定期接種)。帯状疱疹は内科

1990年1月~1990年12月 n=184 60 40 30 20 15- 20- 25- 30- 35- 40- 50- 60- 70-年齢(能) 図 1. 成人水痘の年齢分布

体が低値であれば、広範なレベルの水疱を伴う場合でも播種性帯状疱疹の可能性が高い。しかし免疫不全でIgM 抗体価上昇がない場合は成人水痘(初感染)も否定できない。

* は奥方に聞いた話で文献未確認。予防法は ①Oka ワクチン、50 歳以上は VZV ワクチン ②水痘帯状疱疹免疫グロブリン(VZIG)③抗ウイルス剤予防 投与。 水痘ウイルスに濃厚接触後の①は有効でない*。



臨床では VZV IgG 抗体価の上昇が特徴的な疾患で、IgM 抗



図2. 成人水痘の発疹