



新抗インフル薬：キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害剤 ゾフルーザ (S-033188)

<https://l-hospitalier.github.io>

2018.2

感染対策の基礎知識

#126


【抗インフル薬】は現在 4 種類。① ノイラミターゼ阻害剤（タミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタ）は A、B 型に有効。ウイルス増殖の抑制ではなく、増殖したウイルスは細胞から出るときに宿主細胞膜で作ったカプセルを被って細胞外に出るが（出芽）、この時細胞膜を切り離すノイラミニダーゼを阻害、出られなくする。このため、宿主細胞にウイルスが行き渡った**発症 48 時間以後**や**重症例には使用しない**。② M2 蛋白阻害薬は A 型にのみ有効な**アマンタジン**（シンメトレル）で細胞内に入ったウイルスが活動するため蛋白の被覆を外すの（脱殻）に必要なウイルス周辺の酸性化を阻害。現在は耐性のため使用されない。③ RNA ポリメラーゼ阻害薬は A、B 型に有効な**ファビピラビル Favipiravir**（アビガン）。ウイルス RNA の複製を阻害し広範なウイルスに有効と考えられる。ノロやエボラ、鳥インフルにも有効とされる。新規の④**ゾフルーザ (S-033188)** はシオノギとホフマン・ラ・ロッシュが開発中（2017 年秋に治験Ⅲ相を終了）の新しい機序の抗ウイルス薬で、細胞に侵入した後増殖に必要なウイルス RNA 複製の最初の mRNA の合成開始を阻害する。【感染と増殖】インフルエンザウイルスはマイナス鎖（遺伝子をコードする**プラス鎖 RNA**とは相補的配列）の一本鎖 RNA で、自身のゲノム（vRNA）をヒトの細胞核内に潜り込ませ、増殖するためにウイルスの mRNA の合成を開始するための“スタートとなる部分（PCR のプライマー）”を必要とする。インフルエンザウイルスはヒトの mRNA からこれを切り出す（端から削り出すのがエキソヌクレアーゼ、途中で切るのがエンドヌクレアーゼ）。ヒト mRNA から切り出した開始点となる部分を“**キャップ構造を含むプライマー**”と呼び、これを作らせないのが**キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬**。ウイルスは増殖に必要なタンパク質を合成できず、細胞内でのウイルス増殖は抑制される。【現

状】③のアビガン 200mg（富士フィルム）は 2014 年に製造承認。適応は他剤無効の新型または再興型インフルエンザで国が当該インフルエンザに使用すると判断したもの¹。④のゾフルーザはタミフルに較べて有害事象が少なく、グロー

バルⅢ相試験（1500 名）でタミフル 150mg/day、5 日間と比較、経口投与 1 回のみでタミフルと同等の罹病期間短縮という結果を得た（2018.1 現在未発売）。【ワクチン】の有効性については諸説あるがハリソンも CMDT も有効性を認めている。厚生省は「13 歳以上は 1 回」だが、医師の裁量で 2 回の道も残す（自由診療で医療機関の収入増に多大に貢献）。この経済構造から医師の**利益相反（conflict of interest : COI）**は明らかで利益相反開示後ワクチン接種 2 回を薦める？ CDC の集計では米国での有効率 10~60%（2004~2017）²。

¹ H29.3.3 厚生省医薬品審査管理課長発。

² <https://www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/effectiveness-studies.htm>
CDC は成人の two doses については全く触れていない。



SEASONAL FLU VACCINE EFFECTIVENESS

