


# 筋小胞体、細胞膜（T管）のCaチャンネルと悪性症候群

<https://l-hospitalier.github.io>

2017.1

筋収縮がCa依存なのはセント＝ジェルジ・アルベルトのアクチン・ミオシン超沈殿や名取のスキンド・ファイバー<sup>\*1</sup>で知られていた。江橋らがトロポニン、トロポミオシンを発見、CaはトロポニンCと結合しアクチン＝ミオシンの反応を起こし全ての筋収縮はCaで起きることが判明。Caチャンネルには電位依存性Caチャンネル(Voltage-dependent calcium channel, VDCC)とイオンチャンネル内蔵型がある。【VDCC】のL型は平滑筋や心筋などにあり長い活動電位を作り、いわゆるCa拮抗剤(アムロジン等)で抑制される<sup>\*2</sup>。N型は神経伝導、リリカで抑制、T型は洞結節細胞に存在しリズムを生成。【イオンチャンネル内蔵型】はインスリン等のホルモン作用にかかわり、G蛋白共役受容体活性化の結果のイノシトール3リン酸(IP<sub>3</sub>)によりCaを放出するIP<sub>3</sub>受容体と、T管のジヒドロピリジン受容体(DHPR)がある。筋細胞にはIP<sub>3</sub>と電気刺激に反応するDHPRの両方ある。筋細胞膜の脱分極はT管に伝わりT管の電位依存性ジヒドロピリジン受容体が少量のCaを放出、このCaが筋小胞体(Sarcoplasmic Reticulum)のリアノジン受容体を刺激して大量のCaを細胞質に放出して筋収縮を起こす(Ca誘導性Ca放出<sup>\*3</sup>)。リアノジンは植物アルカロイドでこの受容体に結合し半開きに固定するのでこの名がある。リアノジン受容体には骨格筋のRyR1、心筋のRyR2、脳その他のRyR3の3種ある。カフェインはリアノジン受容体を開に、ダントリウムは閉に固定する。L型のジヒドロピリジン系Ca拮抗剤(ニフェジピン等ジピンがつく)は血管のみに作用し、心抑制がないので急激に作用すると神経反射で頻脈発作を起こし危険。【心筋】骨格筋では収縮の強さを変化させるため、刺激がSRのT管のCaチャンネル(DHPR)を開くとSRのCaチャンネル(RyR1)も連動し最大収縮に十分なCaをSRが供給する。カテコラミンは心筋細胞膜のβ受容体に結合、アデニル酸サイクレースを活性化、これがATPからcAMPを産生しプロテインカイネース(PK)を活性化、PKは細胞膜のCaチャンネルとリアノジン受容体双方をリン酸化しCa流入とSRからのCa放出の双方を増加、心筋収縮を増強させ強心効果を発揮する。



A: 収縮時 細胞膜の活動電位が横行小管を伝導して三連構造に達する。B: 弛緩時 Ca<sup>2+</sup>は筋小胞体に取り込まれる。C: 三連構造の一部の拡大図。横行小管の膜にはジヒドロピリジン受容体(DHP受容体; L型Ca<sup>2+</sup>チャンネルタンパク質)があり、これがL型Ca<sup>2+</sup>電流をもたらす。筋小胞体膜にはリアノジン受容体がある。DHP受容体と筋小胞体膜の間には足状構造がある。

<sup>\*1</sup>名取礼二は水溶液中の筋肉の細胞膜を除去して1本の筋肉繊維標本を作ってもチリチリになってしまうのを、ミシン油のなかで作成。電気刺激での収縮に成功した。後に水溶液中の残留Caが筋を収縮させていたことが判明(1948)。

<sup>\*2</sup>骨格筋は収縮に必要なCaをほぼSRからの放出で賄う、平滑筋はSRが未発達で収縮は細胞外からの流入Caにも依存するのでCa拮抗剤有効。心筋はその中間。 <sup>\*3</sup>Calcium-Induced Calcium-Release (CICR)、Makoto Endoh(1975)