https://l-hospitalier.github.io

2018.4

【キャップ転用】 細菌は栄養だけを宿主細胞に依存するが、多くのウイルスはホスト細胞の転写や翻訳を操作する蛋白質を作り、ホスト自身の蛋白よりウイルスの蛋白を合成するようにする。 全てのウイルスは自身の蛋白生産を宿主のリボゾームに行わせる(ウイルスの中には自身の遺伝子の複製、転写もホストに行わせるものもある)。 原核生物(細菌)では翻訳開始は開始コドン(AUG)*1とその数塩基上流にある、発見者の名前をとった

シャイン-ダルガルノ配列(SD 配列、Shine-Dalgarno sequence)と 呼ばれる 7 塩基(AGGAGGU)の保存された配列が必要(ここにリボ ゾームが結合する)。 真核生物では SD 配列はなく代わりに tRNA が 2 種の開始因子(eukaryotic initiation factor, eIF)と結合した 43S 開始複合体が

mRNA の末端にあるメチルグアノシンの 5'CAP 構造(上図)と結合し、AUG の開始コ ドンを探してスキャンを始める。リボゾームは AUG に到達すると活性化されて完全な 808 リボゾームになる。 ウイルスには宿主の5'キャップを切断するエンドヌクレアー ぜを持ち、さらに遊離した5'CAPをウイルスのmRNA合成のプライマーとして使うも のもあり、これを「キャップ転用(cap snatching)*2」と呼ぶ。 CAP 依存性エンド ヌクレアーゼ阻害剤 *3 はこれを阻害。 $\boxed{5'$ キャップ $\boxed{1}$ は真核生物の細胞質 mRNA などの 5'末端に見られる修飾構造で、成熟 mRNA の分解を防ぎ安定性と翻訳開始などに関与 している。ミトコンドリアや葉緑体の mRNA にはキャップ構造は存在しない。 mRNA の 5'とメチル化されたグアノシンの 5'を 3 リン酸で結合した mRNA を酵素による分解 から保護するキャップのようなはたらきを持つ構造として 1975 年東大の古市と三浦に より発見された(Nature 253:374-375,1975)<mark>【ウイルスの増殖】</mark>は多様であるが次の 過程を経る。 <a>①感染ウイルス粒子の解体 ②ウイルス・ゲノムの複製 ③宿主細胞の翻 訳装置によるウイルス蛋白の合成 ④これらの成分を集合させてから子孫のウイルスの 組立て、を経て宿主細胞に感染した1個のウイルス粒子(ビリオン virion)は数千個の ウイルスになる。 この急激なウイルスの増殖がしばしば宿主細胞死をもたらす。 主細胞は壊れ(溶解)子孫ウイルスは近傍細胞に感染する。 ウイルス感染でみられる 臨床症状の多くはこのウイルスの細胞溶解作用(cytolytic effect)による。 Herpes の 水泡も皮膚の感染表皮細胞が死んだ結果。<mark>【ウイルスの構造】</mark>ウイルスのゲノムは蛋白 の規則正しい層構造のキャプシッド(capsid)でかこまれている。 エンベロープのあ るウイルス (enveloped virus) では宿主細胞から離れる時にキャプシドが宿主の細胞膜 の脂質2重層で包まれる。 エンベロープウイルス(インフルなど)は宿主細胞を殺さ ずに出芽によって外に出るので慢性感染を起こしたり癌化を助けたりするが、エンベロ ープのないウイルスは感染した宿主細胞を溶解して外に出る。 これらのウイルス・ゲ ノムに共通して書き込まれている蛋白は3種類あり、①ゲノム複製のための蛋白 ②ゲ ノムを包む蛋白 ③ウイルスに都合が良いように宿主細胞の機能や構造を変化させる蛋 白の3種である。 【ウイルスに対する宿主の免疫】 一般にウイルス表面には病原体関 連分子配列(pathogen associated molecular sequences, PUMPS*4)は存在しない(ウ イルスの蛋白は宿主のリボゾームで作られ、エンベロープは宿主の細胞膜)。 唯一ウ イルスに特有の分子配列は2本鎖RNA(dsRNA, double-stranded RNA)で宿主細胞は これを使い RNA 干渉*4 (RNA interference, RNAi) を免疫に利用する。

^{*1}A:アデニン G:グアニン C:シトシン T:チミン RNA なので T:チミンではなく U:ウラシル。 ^{*2}Bruce Alberts 他:「THE CELL 細胞の分子生物学 4 版」1449p。 ^{*3} ゾフルーザ ^{*4} Charles Janeway ^{*5} dsRNA は細胞の正常な遺伝活動では産生されず、20~25 塩基対の 2 重鎖 RNA である small interfering RNA(siRNA)は自分と相補的配列の RNA の特異的な切断を誘導する(Fire & Mello 1998, 2006 年ノーベル賞)。