

塩素イオンと酸-塩基の定義の変遷

https://l-hospitalier.github.io

2019.11



Gilbert Newton Lewis

UC Berkeley の 化学の教授で多 数のノーベルリ 学者を育てた。 (UCB で石を投 げるとノーベル 賞学者に当たる といわれた)。

自身も共有結合 の発見や重水の 単離などル変数で のノーベルが でを 挙げたが 1946 年、Labo で・ア でしているの 発見された。

ゲッチンゲン大 留学時の師 W Nernst とト ラブルになり、 Nernst の指示で 3 回ノーベル賞 の受賞を阻止さ れた証拠が残っ ている。

【塩素 chlorine クローリン】は塩化物 (クロライド chloride)、例えば NaCl をつくる。 より電気陰性度の高い F と結合した Cl F (フッ化塩素) は塩化物ではない。 血液中の Cl の主な役割は浸透圧、体液とイオン中性度の維持。 ヒトの塩素は総量 3200 mmol (35.5 x 3.2) = 113.6 g でほとんど細胞外液にある。 血漿中の濃度は約 100 mmol/L (= mEq/L)だが Na⁺の次に多く細胞外液の陰イオンの 70 %を占める (残り 30 %は HCO $_3$)。 細胞内 Cl は 2~5 mEq/L と少ないが赤血球細胞膜はイオンを通しにくいので血球内の炭酸脱水酵素 Carbonic Anhydrase $^{'1}$ で CO $_2$ + H_2 O \Rightarrow H_2 CO $_3$ \Rightarrow H^+ + HCO $_3$ $^-$ となると H は赤血球内に留まる。 電気的中性を保つため Cl の赤血球内へクロライド・シフトが起き、赤血球細胞内 Cl イオン濃度は例外的に 70 mEq/L の高濃度となる(#196 酸素吸入③参照)。 クロライド・シフトは赤血球が CO $_2$ を末梢組織から肺へ有効に輸送するためと血液 pH を正常に保つためのメカニズム。 通常 Na と Cl はペアで移動するのでNa と Cl の同時測定は無意味なことが多い。 しかし Cl 単独の変化がある場合は酸塩 基平衡のインバランスを示唆し、アニオン・ギャップの要素として重要な意味がある (Na と Cl の解離は酸塩基異常の存在を考える)。 Cl は血清浸透圧の 1/3 を担い Na を Cl の解離は酸塩基異常の存在を考える)。 Cl は血清浸透圧の 1/3 を担い Na を Cl の解離は酸塩基異常の存在を考える)。 Cl は血清浸透圧の 1/3 を担い Na を Cl の解離は酸塩基異常の存在を考える)。 Cl は血清浸透圧の 1/3 を担い Na を Cl の の の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl の に 1/3 を 20 に Na を Cl に 1/4 に

#214

とともに循環血液量と血圧を調整。【消化管】CIイオンは胃の壁細胞から塩酸として 分泌され食物消化の他、消化管の細菌増殖制御因子として重要。 胃液、膵液、腸液な どの分泌液中の Clイオンは完全に消化管で再吸収され、下痢や嘔吐がない状態では Cl は腎排泄で調節される。 CI 排泄の調節は Na⁺同様レニン・アンジオテンシン・アルド ステロン系による。CI 排泄は HCO3 再吸収と産生に関与し腎による血液 pH の調節機 構でもある。 呼吸性アシドーシスの腎性代償は HCO3 の再吸収亢進と引き換えに尿中 への CI 喪失を起こすので慢性呼吸性アシドーシスは低 CI 血症を呈する。【酸塩基の <mark>定義】①アレニウスの定義(S Arrhenius</mark> 1903 年ノーベル賞)「酸は**水溶液中で水素** イオン H⁺(実際はヒドロニウムイオン H₃O⁺)を発生する物質、塩基は**水酸化イオン** OH を発生。 これは水溶液以外では定義できない ②ブレンステッド・ローリーの定義 (JN Brønsted と M Lowry) 「酸はプロトン (H⁺) 供与体、塩基はプロトン受容体」。 彼らは 1923 年、独立に発表したが H*のない物質には適用不可。 現在は3ルイスの定 義(GN Lewis)「酸は電子対供与体、塩基は電子対受容体」(②と同じ 1923 年)が 主流。<mark>【超酸】</mark>は**ルイス酸**の一種で極めて危険な物質。 数 mg の暴露で死亡例も。【フ **ルオロ(硫)酸**】は最強の**超酸**の一つでテフロンの製造にも使う。 水と触れるとフッ 化水素(HF)を発生。 純度 99,999 %は 2019 年現在日本企業のみ生産、半導体洗浄に 使用。 フッ化水素 HF は義歯の製作に使用するがフッ化ナトリウム NaF は虫歯予防に 塗布*²。【マジック酸】はジョージ・オラー(George Andrew Olah、カルボカチオン研 究で 1994 年ノーベル化学賞(米)) が作成した 5 フッ化アンチモンとフルオロ硫酸の 混合物(フルオロアンチモン酸)。 ロウソクを溶かして手品のように消失させるので マジック酸の名前がある。 ロウソクは炭化水素(油脂)の混合物、低品質重油やロウ ソクを分解して高価なレーシングカー用燃料の低分子炭化水素化合物に変換できる。

F/S\O

フルオロスルホ

(フルオロ硫酸)

FSO₂OH



 $*^1$ 炭酸デヒドラターゼとも。 $*^2$ 八王子歯科事件は 1982 年歯科医が 3 歳女児にフッ化ナトリウム NaF のつもりでフッ化水素 HF を間違えて塗布、女児は口から白煙を上げて死亡。 HF は体内の Ca^{2+} と反応して CaF_2 (フッ化カルシウム、蛍石)を形成するので全身に痛風様の疼痛が起き、激しい低 Ca^{2+} 血症で心停止や心室細動を起こす (意識障害はない)。