Preuves en déduction naturelle du livre I de l'Ethique de Spinoza

Luc POMMERET D'après la traduction de Jarrett

28 février 2025

Résumé

Ce document présente une formalisation en déduction naturelle [?] des propositions du livre I de l'Éthique de Spinoza, s'appuyant sur le travail de Charles Jarrett [3] dans son article fondamental "The Logical Structure of Spinoza's Ethics, Part I" (1978). À l'aide d'une logique bimodale, nous démontrons rigoureusement l'enchaînement logique des 36 propositions de la partie De Deo (De Dieu), établissant ainsi une cohérence interne de l'architecture métaphysique spinoziste. Cette formalisation explicite les relations déductives entre les définitions, axiomes et propositions, offrant un aperçu de la rigueur déductive que Spinoza a insufflée à son système philosophique. Notre travail s'inscrit dans une double tradition : celle des études formelles de l'Éthique initiée par Jarrett et poursuivie par d'autres chercheurs [4, 5], et celle de la vérification assistée par ordinateur des raisonnements philosophiques, rendue possible grâce à l'implémentation complète de ces preuves dans l'assistant de preuve Coq [12].

Table des matières

1	Intr	roduction	2
	1.1	Contexte philosophique et historique	2
	1.2	Objectifs et méthodologie	2
	1.3	Implémentation en Coq et validation computationnelle	3
	1.4		3
2	Not	tation et symboles	3
	2.1	Lexique	3
		2.1.1 Opérateurs modaux	3
	2.2	Règles modales	3
		2.2.1 Prédicats unaires	4
		2.2.2 Prédicats binaires	4
		2.2.3 Prédicats ternaires	4
	2.3	Définitions	4
	2.4	Axiomes	5
3	Pre	euves en déduction naturelle	6
	3.1	Proposition 1 (P1)	6
	3.2	Proposition 2 (P2)	7
	3.3	Proposition 3 (P3)	8
		3.3.1 Lemme DP1	9
		3.3.2 Lemme DP4	9
		3.3.3 Lemme DP5	0
		3.3.4 Lemme DP6	.1
		3.3.5 Lemme DP7	2
		3.3.6 Théorème DPI	.3
		3.3.7 Théorème DPII	4
		3.3.8 Théorème DPIII	.5
	3.4	Proposition 4 (P4)	6
	3.5	Proposition 5 $(P5)$	7
	3.6	Proposition 6 $(P6)$	
		3.6.1 Corollaire de la Proposition 6 (P6c)	
	3.7	Proposition 7 (P7)	
	3.8	Proposition 8 (P8)	
	3.9	Proposition 9 (P9)	

3.10	Proposition 10 (P10)	23
3.11	Proposition 11 (P11)	24
3.12	Proposition 12 (P12)	25
3.13	Proposition 13 (P13)	25
3.14	Proposition 14 (P14)	
	3.14.1 Proposition 14 alternative (P14-A)	
3.15	Proposition 15 (P15)	28
	Proposition 16 (P16)	
3.17	Proposition 17 (P17)	
	3.17.1 Corollaire 2 de la Proposition 17 (P17c2) $\dots \dots \dots$	
	Proposition 18 (P18)	
	Proposition 19 (P19)	
	Proposition 20 (P20)	
	Proposition 21 (P21)	
	Proposition 22 (P22)	
	Proposition 23 (P23)	
	Proposition 24 (P24)	
	Proposition 25 (P25)	
	Proposition 26 (P26)	
	Proposition 27 (P27)	
	Proposition 28 (P28)	
	Proposition 29 (P29)	
	Proposition 30 (P30)	
3.31	Proposition 31 (P31)	
	3.31.1 Proposition 31a (P31a)	
	3.31.2 Proposition 31b (P31b)	
	3.31.3 Proposition 31c (P31c)	
	3.31.4 Proposition 31d (P31d)	
	Proposition 32 (P32)	
	Proposition 33 (P33)	
	Proposition 34 (P34)	
	Proposition 35 (P35)	
3.36	Proposition 36 (P36)	52

1 Introduction

1.1 Contexte philosophique et historique

L'Éthique de Baruch Spinoza (1632-1677) constitue l'une des œuvres majeures de la philosophie occidentale, remarquable tant par sa profondeur conceptuelle que par sa structure déductive rigoureuse more geometrico. Rédigée selon un modèle géométrique inspiré des Éléments d'Euclide, l'œuvre procède par définitions, axiomes, propositions et démonstrations, formant un système métaphysique, épistémologique et éthique cohérent. Le livre I, De Deo (De Dieu), pose les fondements métaphysiques du système spinoziste, établissant la nature de Dieu comme substance unique, et déployant les conséquences de cette ontologie moniste [1].

La structure démonstrative adoptée par Spinoza suggère une aspiration à la même certitude que celle des mathématiques. Cette aspiration a naturellement conduit plusieurs chercheurs à examiner la validité formelle des arguments de Spinoza, en utilisant des outils logiques modernes. Parmi ces travaux, l'article de Charles Jarrett, "The Logical Structure of Spinoza's Ethics, Part I" (1978) [3], représente une contribution majeure, proposant une formalisation complète des concepts et des raisonnements du premier livre de l'Éthique dans un système de logique modale.

D'autres formalisation ont été faites par Baptiste Mélès (jusqu'à la proposition 8) a partir des écrits de Martial Guéroult. Voir pour cela son Github : https://github.com/BapMel/ethicoq.

1.2 Objectifs et méthodologie

Ce document s'inscrit dans cette tradition d'analyse formelle, avec pour objectif principal de présenter de manière claire et systématique les preuves en déduction naturelle des propositions du livre I de l'Éthique, selon la formalisation proposée par Jarrett. La déduction naturelle, système d'inférence développé par Gerhard Gentzen dans les années 1930 [8], offre un cadre particulièrement adapté pour représenter les raisonnements philosophiques, en permettant d'expliciter chaque étape déductive.

Notre approche méthodologique comprend:

- 1. Un lexique formel traduisant les concepts spinozistes en prédicats logiques, tiré de Jarrett [3]
- 2. La formulation des définitions et axiomes dans ce langage formel, également tiré de [3]
- 3. La construction pas à pas des preuves pour chacune des 36 propositions du livre I
- 4. Des théorèmes implicites et lemmes intermédiaires nécessaires aux démonstrations

Il faut noter que cette formalisation est une interprétation du système spinoziste! Celle de Charles Jarrett. Les preuves que je fournis suivent donc cette interprétation Jarrettienne de Spinoza.

1.3 Implémentation en Coq et validation computationnelle

Au-delà de la présentation formelle contenue dans ce document, l'ensemble des preuves a été implémenté dans l'assistant de preuve Coq, permettant une vérification computationnelle de leur validité. Cette implémentation, disponible sur GitHub [12], constitue une étape significative dans l'application des méthodes de vérification formelle à l'histoire de la philosophie.

L'utilisation de Coq apporte plusieurs avantages :

- Une vérification rigoureuse de chaque étape déductive
- L'identification précise des hypothèses implicites dans les raisonnements de Spinoza
- La génération automatique de preuves complètes et vérifiables
- Un cadre pour l'extension future du projet aux autres livres de l'Éthique, ce qui constitue la librairie SpinozaJarrett

Notre travail s'inscrit ainsi dans un courant émergent de "philosophie formelle assistée par ordinateur", rejoignant d'autres efforts comme ceux de [6] et de chercheurs ayant appliqué la vérification formelle à des arguments philosophiques [14].

1.4 État de l'art et positionnement

L'examen formel de l'Éthique de Spinoza a une histoire riche. Au-delà du travail pionnier de Jarrett, on peut citer les analyses de Martial Guéroult [4] en France, qui, sans toujours utiliser la logique formelle contemporaine, a minutieusement étudié l'architecture démonstrative de l'œuvre. Plus récemment, plusieurs chercheurs ont exploré l'application des méthodes formelles modernes à l'Éthique [7].

Notre contribution se distingue par :

- L'utilisation de la déduction naturelle comme système d'inférence, particulièrement adapté à la présentation pédagogique des preuves
- L'implémentation complète dans l'assistant de preuve Coq, offrant une validation computationnelle de tout le livre I de l'*Ethique* [11]
- L'identification explicite des propositions indémontrables dans le système (P33 et P36) et la suggestion d'axiomes supplémentaires

Ce document se veut ainsi à la fois un outil pédagogique pour comprendre la structure logique de l'Éthique, une contribution à l'étude formelle de l'œuvre de Spinoza, et une démonstration de l'applicabilité des méthodes de vérification formelle à l'histoire de la philosophie [13].

2 Notation et symboles

2.1 Lexique

2.1.1 Opérateurs modaux

- L(p) : Nécessité logique p est logiquement nécessaire
- M(p): Possibilité p est possible
- N(p): Nécessité naturelle p est naturellement nécessaire

2.2 Règles modales

- $\mathbf{R1}: \forall P(L(P) \rightarrow N(P))$
 - La nécessité logique implique la nécessité naturelle
- $-\mathbf{R2}: \forall P(N(P) \to P)$

Axiome T pour la nécessité naturelle

- $\mathbf{R3} : \forall P \forall Q (L(P \to Q) \to (L(P) \to L(Q)))$
 - Axiome K pour la nécessité logique
- **R4**: $\forall P(M(P) \rightarrow L(M(P)))$
 - Axiome S5 possibilité et nécessité
- $-\mathbf{R5}: \forall P(P \to L(P))$
 - Règle de nécessitation
- **R6**: $\forall P \forall Q(N(P \rightarrow Q) \rightarrow (N(P) \rightarrow N(Q)))$
 - Axiome de distributivité pour la nécessité naturelle

2.2.1 Prédicats unaires

- $-A_1(x): x \text{ est un attribut}$
- $-B_1(x): x \text{ est libre}$
- $D_1(x): x$ est une instance de désir
- $-E_1(x): x \text{ est éternel}$
- $-F_1(x): x \text{ est fini}$
- $--G_1(x): x$ est un dieu
- $J_1(x): x$ est une instance d'amour
- $-K_1(x): x \text{ est une idée}$
- $-M_1(x): x \text{ est un mode}$
- $N_1(x): x$ est nécessaire
- $--- S_1(x) : x \text{ est une substance}$
- $-T_1(x): x \text{ est vrai}$
- $U_1(x): x$ est un intellect
- $-W_1(x): x \text{ est une volonté}$

2.2.2 Prédicats binaires

- $-A_2(x,y): x \text{ est un attribut de } y$
- $C_2(x,y): x$ est conçu à travers y
- $-I_2(x,y): x \text{ est en } y$
- $-K_2(x,y): x \text{ est cause de } y$
- $-L_2(x,y): x \text{ limite } y$
- $-M_2(x,y): x \text{ est un mode de } y$
- $--O_2(x,y): x$ est un objet de y
- $-P_2(x,y): x$ est la puissance de y
- $R_2(x,y): x$ a plus de réalité que y
- $V_2(x,y): x$ a plus d'attributs que y

2.2.3 Prédicats ternaires

- $-C_3(x,y,z): x$ est commun à y et à z
- $-D_3(x,y,z): x \text{ est divisible entre } y \text{ et } z$

2.3 Définitions

- **D1** : $K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)) \leftrightarrow L(\exists y (y=x))$ Causa sui - ce dont l'essence implique l'existence
- $\mathbf{D2} : F_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land L_2(y, x) \land \forall z (A_2(z, x) \leftrightarrow A_2(z, y)))$
 - Une chose est finie quand elle peut être limitée par une autre de même nature
- **D3** : $S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$
 - Une substance est ce qui est en soi et est conçu par soi
- **D4a**: $A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$
 - Un attribut est ce que l'intellect perçoit de la substance comme constituant son essence

- $\mathbf{D4b} : A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(y,x))$
 - x est un attribut de y
- **D5a**: $M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$
 - Un mode est ce qui est dans autre chose et est conçu par elle
- **D5b**: $M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$
 - x est un mode
- $\mathbf{D6}: G_1(x) \leftrightarrow (S_1(x) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,x)))$
 - Dieu est une substance constituée d'une infinité d'attributs
- **D7a**: $B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))$
 - Une chose est libre quand elle n'est cause que d'elle-même
- **D7b** : $N_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land K_2(y, x))$
 - Une chose est nécessaire quand elle est déterminée par autre chose
- **D8** : $E_1(x) \leftrightarrow L(\exists v(v=x))$
 - L'éternité est l'existence même en tant que nécessaire

2.4 Axiomes

- $\mathbf{A1} : \forall x (I_2(x, x) \vee \exists y (y \neq x \wedge I_2(x, y)))$
 - Tout ce qui est, est soit en soi, soit en autre chose
- **A2**: $\forall x((\neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))) \leftrightarrow C_2(x,x))$
 - Ce qui ne peut être conçu par un autre doit être conçu par soi
- **A3**: $\forall x \forall y (K_2(y,x) \rightarrow N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x)))$
 - D'une cause déterminée suit nécessairement un effet
- **A4**: $\forall x \forall y (K_2(x,y) \leftrightarrow C_2(y,x))$
 - La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause
- $\mathbf{A5} : \forall x \forall y ((\neg \exists z (C_3(z, x, y))) \leftrightarrow (\neg C_2(x, y) \land \neg C_2(y, x)))$
 - Les choses qui n'ont rien en commun ne peuvent être conçues l'une par l'autre
- $\mathbf{A6} : \forall x (K_1(x) \to (T_1(x) \leftrightarrow \exists y (O_2(y,x) \land K_2(x,y))))$
 - L'idée vraie doit s'accorder avec son objet
- $\mathbf{A7} : \forall x (M(\neg \exists y (y = x)) \leftrightarrow \neg L(\exists y (y = x)))$
 - Si une chose peut être conçue comme non existante, son essence n'implique pas l'existence
- **A8**: $\forall x \forall y (I_2(x,y) \rightarrow C_2(x,y))$
 - Si x est en y alors x est conçu par y
- **A9** : $\forall x(\exists y(A_2(y,x)))$
 - Toute chose a un attribut
- $\mathbf{A10} : \forall x \forall y \forall z (D_3(x, y, z) \to M(\neg \exists w (w = x)))$
 - Si x est divisible en y et z alors il est possible que x n'existe pas
- **A11**: $\forall x \forall y (S_1(x) \land L_2(y,x) \rightarrow S_1(y))$
 - Si x est une substance et y limite x alors y est une substance
- **A12**: $\forall x((\exists y(M_2(x,y))) \rightarrow M_1(x))$
 - Si x est un mode de quelque chose alors x est un mode
- **A13** : $M(\exists x(G_1(x)))$
 - Il est possible qu'un Dieu existe
- **A14**: $\forall x (N(\exists y (y = x)) \leftrightarrow \neg F_1(x))$
 - x existe nécessairement si et seulement si x n'est pas fini

3 Preuves en déduction naturelle

3.1 Proposition 1 (P1)

Si x est un mode de y et y est une substance, alors x est en y et y est en soi.

$$\forall x \forall y (M_2(x,y) \land S_1(y) \rightarrow I_2(x,y) \land I_2(y,y))$$

3.2 Proposition 2 (P2)

Deux substances ayant des attributs différents n'ont rien en commun entre elles.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$$

1	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	
2	$S_1(x)$	$\wedge E, 1$
3	$S_1(y)$	$\wedge E$, 1
4	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
5	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \wedge C_2(x,x))$	D3
6	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 2, 5
7	$C_2(x,x)$	$\wedge E, 6$
8	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3
9	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 3, 8
10	$C_2(y,y)$	$\wedge E, 9$
11	$(\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))) \leftrightarrow C_2(x, x)$	A2
12	$C_2(x,x) \to \neg \exists z (z \neq x \land C_2(x,z))$	∧E, 11
13	$\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	\Rightarrow E, 7, 12
14	$\neg (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\forall E, 13$
15	$y \neq x \to \neg C_2(x, y)$	⇒E, 14
16	$x \neq y \to y \neq x$	Logique
17	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
18	$y \neq x$	\Rightarrow E, 17, 16
19	$\neg C_2(x,y)$	\Rightarrow E, 18, 15
20	$(\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
21	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge E, 20$
22	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	\Rightarrow E, 10, 21
23	$\neg(x \neq y \land C_2(y, x))$	$\forall E, 22$
24	$x \neq y \to \neg C_2(y, x)$	\Rightarrow E, 23
25	$\neg C_2(y,x)$	\Rightarrow E, 4, 24
26	$(\neg \exists z (C_3(z, x, y))) \leftrightarrow (\neg C_2(x, y) \land \neg C_2(y, x))$	A5
27	$(\neg C_2(x,y) \land \neg C_2(y,x)) \to \neg \exists z (C_3(z,x,y))$	$\wedge E, 26$
28	$\neg C_2(x,y) \land \neg C_2(y,x)$	$\land I,\ 19,\ 25$
29	$\neg \exists z (C_3(z, x, y))$	\Rightarrow E, 28, 27
30	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y))$	⇒I, 1–29
31	$\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \to \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$	$\forall I, 30$
32	$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$	$\forall I, 31$

3.3 Proposition 3 (P3)

Des choses qui n'ont rien en commun entre elles ne peuvent être cause l'une de l'autre.

$$\forall x \forall y (\neg \exists z (C_3(z, x, y)) \rightarrow \neg K_2(x, y) \land \neg K_2(y, x))$$

Lemmes intermédiaires

3.3.1 Lemme DP1

x est une substance si et seulement si x est en soi.

$$\forall x(S_1(x) \leftrightarrow I_2(x,x))$$

3.3.2 Lemme DP4

Une substance est sa propre cause.

$$\forall x(S_1(x) \to K_2(x,x))$$

3.3.3 Lemme DP5

Toute chose est soit une substance soit un mode.

$$\forall x (S_1(x) \vee M_1(x))$$

1	$\forall x (I_2(x,x) \lor \exists y (y \neq x \land I_2(x,y)))$	A1
2	$I_2(x,x) \vee \exists y (y \neq x \wedge I_2(x,y))$	$\forall E, 1$
3	$I_2(x,x)$	
4	$S_1(x) \leftrightarrow I_2(x,x)$	DP1
5	$S_1(x)$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\vee I, 5$
7	$\exists y(y \neq x \land I_2(x,y))$	
8	$y \neq x \land I_2(x,y)$	
9	$y \neq x$	∧E, 8
10	$I_2(x,y)$	∧E, 8
11	$I_2(x,y) \to C_2(x,y)$	A8
12	$C_2(x,y)$	⇒E, 10, 11
13	$y \neq x \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	$\land I,9,10,12$
14	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a
15	$x \neq y \leftrightarrow y \neq x$	Logique
16	$x \neq y$	\Rightarrow E, 9, 15
17	$x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	$\land I,16,10,12$
18	$M_2(x,y)$	⇒E, 17, 14
19	$(\exists y(M_2(x,y))) \to M_1(x)$	A12
20	$\exists y (M_2(x,y))$	∃I, 18
21	$M_1(x)$	\Rightarrow E, 20, 19
22	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\vee I, 21$
23	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\exists E,7,8–22$
24	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\lor E, 2, 36, 723$
25	$\forall x (S_1(x) \vee M_1(x))$	$\forall I, 24$

3.3.4 Lemme DP6

Une substance et un mode ne peuvent jamais être la même chose.

$$\forall x (\neg (S_1(x) \land M_1(x)))$$

1	$S_1(x) \wedge M_1(x)$	
2	$S_1(x)$	$\wedge E$, 1
3	$M_1(x)$	$\wedge E$, 1
4	$M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	D5b
5	$\exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(y) \wedge M_2(x,y)$	
7	$M_2(x,y)$	$\wedge E, 6$
8	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a
9	$x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	\Rightarrow E, 7, 8
10	$x \neq y$	$\wedge E, 9$
11	$C_2(x,y)$	$\wedge E, 9$
12	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \wedge C_2(x,x))$	D3
13	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 2, 12
14	$C_2(x,x)$	$\wedge E$, 13
15	$(\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))) \leftrightarrow C_2(x, x)$	A2
16	$C_2(x,x) \to \neg \exists z (z \neq x \land C_2(x,z))$	$\wedge E$, 15
17	$\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	⇒E, 14, 16
18	$\neg (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\forall E, 17$
19	$y \neq x \leftrightarrow x \neq y$	Logique
20	$y \neq x$	⇒E, 10, 19
21	$y \neq x \wedge C_2(x,y)$	$\wedge I, 20, 11$
22	$\neg (y \neq x \land C_2(x,y)) \land (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\wedge I, 18, 21$
23		$\perp E, 22$
24		$\exists E, 5, 623$
25	$\neg (S_1(x) \land M_1(x))$	$\neg I, \ 124$
26	$\forall x(\neg(S_1(x) \land M_1(x)))$	$\forall I, 25$

3.3.5 Lemme DP7

Si x est un attribut de y et y est une substance, alors x=y.

$$\forall x \forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$$

1	$A_2(x,y) \wedge S_1(y)$	
2	$A_2(x,y)$	∧E, 1
3	$S_1(y)$	∧E, 1
4	$A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(y,x))$	D4b
5	$A_1(x) \wedge C_2(y,x)$	\Rightarrow E, 2, 4
6	$C_2(y,x)$	$\wedge E, 5$
7	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3
8	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 3, 7
9	$C_2(y,y)$	$\wedge E, 8$
10	$(\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
11	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	∧E, 10
12	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	⇒E, 9, 11
13	$\neg(x \neq y \land C_2(y, x))$	$\forall E, 12$
14	$x \neq y \to \neg C_2(y, x)$	⇒E, 13
15	$C_2(y,x) \to \neg(x \neq y)$	Contraposée
16	$C_2(y,x)$	R, 6
17	$\neg(x \neq y)$	\Rightarrow E, 16, 15
18	x = y	¬E, 17
19	$A_2(x,y) \wedge S_1(y) \to x = y$	⇒I, 1–18
20	$\forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$	∀I, 19
21	$\forall x \forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$	$\forall I, 20$

Théorème implicites importants chez Spinoza

3.3.6 Théorème DPI

Tout est soit une substance, soit un mode, mais pas les deux.

$$\forall x ((S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x)))$$

3.3.7 Théorème DPII

Une substance est ses propres attributs.

$$\forall x(S_1(x) \to A_2(x,x))$$

1	$S_1(x)$	
2	$A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \wedge C_2(y,x))$	D4b
3	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \land C_2(x,x))$	D3
4	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 1, 3
5	$C_2(x,x)$	$\wedge E, 4$
6	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	
7	$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 6, 2
8	$A_1(x) \wedge C_2(x,x) \rightarrow A_2(x,x)$	\Rightarrow I, 6–7
9	$A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	D4a
10	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x)) \rightarrow A_1(x)$	$\wedge E, 9$
11	$S_1(x) \wedge I_2(x,x) \wedge C_2(x,x) \wedge I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	$\wedge I, 1, 4, 4$
12	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	∃I, 11
13	$A_1(x)$	⇒E, 12, 10
14	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	$\wedge I, 13, 5$
15	$A_2(x,x)$	⇒E, 14, 8
16	$S_1(x) o A_2(x,x)$	\Rightarrow I, 1–15
17	$\forall x(S_1(x) \to A_2(x,x))$	$\forall I, 16$

3.3.8 Théorème DPIII

Quelque chose est une substance si et seulement si elle est causa sui.

$$\forall x (S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x))$$

1	$ S_1(x)$	
2	$\forall y(S_1(y) \to K_2(y,y))$	DP4
3	$S_1(x) o K_2(x,x)$	$\forall E, 2$
4	$\forall y(S_1(y) \to K_2(y,y))$ $S_1(x) \to K_2(x,x)$ $K_2(x,x)$	\Rightarrow E, 1, 3
5	$S_1(x) \to K_2(x,x)$	⇒I, 1–4
6	$K_2(x,x)$	
7	$\forall a \forall b (K_2(a,b) \leftrightarrow C_2(b,a))$	A4
8	$K_2(x,x) \leftrightarrow C_2(x,x)$	$\forall E, 7$
9	$C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 6, 8
10	$\forall y (I_2(y,y) \lor \exists z (z \neq y \land I_2(y,z)))$	A1
11	$I_2(x,x) \vee \exists z (z \neq x \wedge I_2(x,z))$	$\forall E, 10$
12	$I_2(x,x)$	
13	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	$\wedge I, 12, 9$
14	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \land C_2(x,x))$	D3
15	$S_1(x)$	⇒E, 13, 14
16	$\exists z(z \neq x \land I_2(x,z))$	
17	$\exists z (z \neq x \land I_2(x, z))$ $z \neq x \land I_2(x, z)$	
18	$I_2(x,z)$	$\wedge E$, 17
19	$\forall a \forall b (I_2(a,b) \to C_2(a,b))$	A8
20	$\forall a \forall b (I_2(a,b) \to C_2(a,b))$ $I_2(x,z) \to C_2(x,z)$	$\forall E, 19$
21	$\begin{array}{c c} C_2(x,z) \\ z \neq x \end{array}$	\Rightarrow E, 18, 20
22		∧E, 17
23	$z \neq x \land C_2(x, z)$	$\wedge I, 22, 21$
24	$\exists y (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\exists I, 23$
25		A2
26	$\exists y(y \neq x \land C_2(x,y))$ $(\neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))) \leftrightarrow C_2(x,x)$ $C_2(x,x) \rightarrow \neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))$ $\neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))$ $\exists y(y \neq x \land C_2(x,y)) \land \neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))$ \bot	$\wedge E, 25$
27		\Rightarrow E, 9, 26
28	$\exists y(y \neq x \land C_2(x,y)) \land \neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))$	$\wedge I, 24, 27$
29		\perp E, 28
30		$\exists E, 16, 17-29$
31	$\neg \exists z (z \neq x \land I_2(x, z))$	$\neg I, 16-30$
32		$\vee E, 11, 1215, 1631$
33	$K_2(x,x) \to S_1(x)$	\Rightarrow I, 6–32
34	$S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x)$	\Rightarrow I, 5, 33
35	$\forall x(S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x))$	$\forall I, 34$

3.4 Proposition 4 (P4)

Deux ou plusieurs choses distinctes ne peuvent se distinguer que par la diversité des attributs de leurs substances, ou par la diversité des affections de ces mêmes substances.

$$\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))$$

```
1
             x \neq y
                                                                                                                                                                                                               DPI
2
               \forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))
3
              (S_1(x) \wedge \neg M_1(x)) \vee (\neg S_1(x) \wedge M_1(x))
                                                                                                                                                                                                               \forall E, 2
                   S_1(x) \wedge \neg M_1(x)
4
5
                                                                                                                                                                                                               \wedge E, 4
                    (S_1(y) \wedge \neg M_1(y)) \vee (\neg S_1(y) \wedge M_1(y))
                                                                                                                                                                                                               ∀E, 2
6
                         S_1(y) \wedge \neg M_1(y)
8
                         S_1(y)
                                                                                                                                                                                                              ^E, 7
9
                         \forall a(S_1(a) \to A_2(a,a))
                                                                                                                                                                                                               DPII
10
                         S_1(x) \rightarrow A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                               ∀E, 9
11
                                                                                                                                                                                                               ⇒E, 5, 10
                         A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                              ∀E, 9
12
                         S_1(y) \to A_2(y,y)
13
                         A_2(y,y)
                                                                                                                                                                                                               ⇒E, 8, 12
                                                                                                                                                                                                              ∧I 11 13 1
14
                         A_2(x,x) \wedge A_2(y,y) \wedge x \neq y
                         \exists z \exists z' (A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z')
                                                                                                                                                                                                               ∃I, 14
15
                         \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              ∨I, 15
16
17
                          \neg S_1(y) \wedge M_1(y)
18
                         M_1(y)
                                                                                                                                                                                                               ∧E, 17
19
                         A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                               ⇒E, 5, 10
                                                                                                                                                                                                               ∧I, 19, ??, 18
20
                         A_2(x,x) \wedge x = x \wedge M_1(y)
21
                         \exists z \exists z' (A_2(z, x) \land z = x \land M_1(y))
                                                                                                                                                                                                               ∃I, 20
                         \exists z\exists z'((A_2(z,x)\wedge A_2(z',y)\wedge z\neq z')\vee (A_2(z,x)\wedge z=x\wedge M_1(y))\vee (A_2(z',y)\wedge z'=y\wedge M_1(x))\vee (M_1(x)\wedge M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                               √I 21
22
23
                    \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              \vee E,\, 6,\, 7\text{--}16,\, 17\text{--}22
24
                    \neg S_1(x) \wedge M_1(x)
25
                    M_1(x)
                                                                                                                                                                                                               ∧E, 24
26
                    (S_1(y) \land \neg M_1(y)) \lor (\neg S_1(y) \land M_1(y))
                                                                                                                                                                                                               \forall E, 2
27
                        S_1(y) \wedge \neg M_1(y)
28
                         S_1(y)
                                                                                                                                                                                                               ∧E, 27
                                                                                                                                                                                                               ∀E, 9
29
                         S_1(y) \rightarrow A_2(y,y)
30
                                                                                                                                                                                                               ⇒E, 28, 29
                         A_2(y,y)
                                                                                                                                                                                                              ∧I, 30, ??, 25
31
                         A_2(y,y) \wedge y = y \wedge M_1(x)
32
                         \exists z \exists z' (A_2(z', y) \land z' = y \land M_1(x))
                                                                                                                                                                                                               ∃I, 31
                         \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
33
                                                                                                                                                                                                               ∨I. 32
34
                         \neg S_1(y) \wedge M_1(y)
                         M_1(y)
35
                                                                                                                                                                                                               ∧E. 34
                         M_1(x) \wedge M_1(y)
                                                                                                                                                                                                               ∧I, 25, 35
36
                                                                                                                                                                                                               ∃I. 36
37
                         \exists z \exists z' (M_1(x) \land M_1(y))
                         \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              ∨I, 37
38
39
                   \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              VE 26 27-33 34-38
              \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              VE, 3, 4-23, 24-39
40
41
        x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                              ⇒I, 1-40
42
        \forall y(x \neq y \rightarrow \exists z \exists z'((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))
                                                                                                                                                                                                               ∀I, 41
        \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))
                                                                                                                                                                                                              ∀I, 42
43
```

3.5 Proposition 5 (P5)

Il ne peut y avoir, dans la nature des choses, deux ou plusieurs substances de même nature, ou, en d'autres termes, de même attribut.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$$

1	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	
2	$S_1(x)$	$\wedge E$, 1
3	$S_1(y)$	$\wedge E$, 1
4	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
5	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	
6	$A_2(z,x) \wedge A_2(z,y)$	
7	$A_2(z,x)$	$\wedge E, 6$
8	$A_2(z,y)$	$\wedge E, 6$
9	$\forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \to a = b)$	DP7
10	$A_2(z,x) \wedge S_1(x) \to z = x$	$\forall E, 9$
11	$A_2(z,x) \wedge S_1(x)$	$\wedge I, 7, 2$
12	z = x	⇒E, 11, 10
13	$A_2(z,y) \wedge S_1(y) \to z = y$	$\forall E, 9$
14	$A_2(z,y) \wedge S_1(y)$	$\wedge I, 8, 3$
15	z = y	⇒E, 14, 13
16		$\wedge I$, 12, 15
17	x = z	12
18	x = y	17,15
19	$x \neq y$	R, 4
20		$\wedge I$, 18, 19
21		$\perp E, 20$
22		$\exists E, 5, 621$
23	$\neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	$\neg I, 5-22$
24	$S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z, x) \land A_2(z, y))$	\Rightarrow I, 1–23
25	$\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$	$\forall I, 24$
26	$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$	$\forall I, 25$

3.6 Proposition 6 (P6)

Une substance ne peut être produite par une autre substance.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg (K_2(x,y) \land \neg K_2(y,x)))$$

3.6.1 Corollaire de la Proposition 6 (P6c)

Une substance ne peut être produite par autre chose.

$$\forall x(S_1(x) \to \neg(\exists y(y \neq x \land K_2(y,x))))$$

3.7 Proposition 7 (P7)

Il appartient à la nature de la substance d'exister.

$$\forall x(S_1(x) \to L(\exists y(y=x)))$$

3.8 Proposition 8 (P8)

Toute substance est nécessairement infinie.

$$\forall x(S_1(x) \to \neg F_1(x))$$

1	$S_1(x)$	
2	$F_1(x)$	
3	$F_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land L_2(y, x) \land \forall z (A_2(z, x) \leftrightarrow A_2(z, y)))$	D2
4	$\exists y (y \neq x \land L_2(y, x) \land \forall z (A_2(z, x) \leftrightarrow A_2(z, y)))$	\Rightarrow E, 2, 3
5	$y \neq x \land L_2(y,x) \land \forall z (A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y))$	
6	$y \neq x$	$\wedge E$, 5
7	$L_2(y,x)$	$\wedge E$, 5
8		$\wedge E, 5$
9		A11
10	$S_1(x) \wedge L_2(y,x) \to S_1(y)$	$\forall E, 9$
11	$S_1(x) \wedge L_2(y,x)$	$\wedge I, 1, 7$
12	$S_1(y)$	⇒E, 11, 10
13	$\forall a(\exists b(A_2(b,a)))$	A9
14	$\exists b(A_2(b,x))$	$\forall E, 13$
15	$A_2(z,x)$	
16	$A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y)$	$\forall E, 8$
17	$A_2(z,y)$	\Rightarrow E, 15, 16
18	$A_2(z,x) \wedge A_2(z,y)$	$\wedge I$, 15, 17
19	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	∃I, 18
20	$\forall a \forall b (S_1(a) \land S_1(b) \land a \neq b \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,a) \land A_2(z,b)))$	P5
21	$S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	$\forall E, 20$
22	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	$\land I,1,12,6$
23	$\neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	\Rightarrow E, 22, 21
24	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)) \land \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	$\wedge I$, 19, 23
25		$\perp E, 24$
26		$\exists E, 14, 15-25$
27		$\exists E,4,5–26$
28	$\neg F_1(x)$	$\neg I, \ 227$
29	$S_1(x) \to \neg F_1(x)$	\Rightarrow I, 1–28
30	$\forall x (S_1(x) \to \neg F_1(x))$	$\forall I, 29$

3.9 Proposition 9 (P9)

Suivant qu'une chose a plus de réalité ou d'être, un plus grand nombre d'attributs lui appartient.

$$\forall x \forall y ((S_1(x) \land S_1(y)) \rightarrow (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y)))$$

3.10 Proposition 10 (P10)

Tout attribut d'une substance doit être conçu par soi.

$$\forall x (A_1(x) \to C_2(x,x))$$

1	$A_1(x)$	
2	$A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	D4a
3	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	\Rightarrow E, 1, 2
4	$S_1(y) \wedge I_2(x,y) \wedge C_2(x,y) \wedge I_2(y,x) \wedge C_2(y,x)$	
5	$S_1(y)$	$\wedge E, 4$
6	$C_2(y,x)$	$\wedge E, 4$
7	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \wedge C_2(y,y))$	D3
8	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 5, 7
9	$C_2(y,y)$	$\wedge E, 8$
10	$(\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
11	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge E$, 10
12	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	⇒E, 9, 11
13	$x \neq y$	
14	$x \neq y \land C_2(y, x)$	$\wedge I, 13, 6$
15	$\exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$ $\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$ $\exists z (z \neq y \land C_2(y, z)) \land \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	∃I, 14
16	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	R, 12
17	$\exists z(z \neq y \land C_2(y,z)) \land \neg \exists z(z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge I$, 15, 16
18		$\perp E, 17$
19		$\neg I, 13-18$
20	x = y	$\neg E, 19$
21	$C_2(y,y)$	R, 9
22	$C_2(x,x)$	20,21
23	$C_2(x,x)$	$\exists E,3,4–22$
24	$A_1(x) \to C_2(x,x)$	\Rightarrow I, 1–23
25	$\forall x (A_1(x) \to C_2(x,x))$	$\forall I, 24$

3.11 Proposition 11 (P11)

Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement.

$$L(\exists x(G_1(x)))$$

1	$M(\exists x(G_1(x)))$	A13
2	$\exists x(G_1(x))$	
3	$G_1(g)$	
4	$G_1(x) \leftrightarrow (S_1(x) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,x)))$	D6
5	$S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(g)$	$\wedge E, 5$
7	$\forall x (S_1(x) \to L(\exists y (y=x)))$	P7
8	$S_1(g) \to L(\exists y (y=g))$	$\forall E, 7$
9	$L(\exists y(y=g))$	\Rightarrow E, 6, 8
10	$\exists y(y=g)$	
11	y = g	
12	$G_1(g)$	R, 3
13	$G_1(y)$	11,12
14	$\exists x (G_1(x))$	$\exists I, 13$
15	$\exists x(G_1(x))$	$\exists E, 10, 11-14$
16	$(\exists y(y=g)) \to (\exists x(G_1(x)))$	\Rightarrow I, 10–15
17	$L((\exists y(y=g)) \to (\exists x(G_1(x))))$	R5, 16
18	$L(\exists y(y=g)) \to L(\exists x(G_1(x)))$	R3, 17
19	$L(\exists x(G_1(x)))$	\Rightarrow E, 9, 18
20	$L(\exists x(G_1(x)))$	$\exists E, 2, 319$
21	$(\exists x (G_1(x))) \to L(\exists x (G_1(x)))$	\Rightarrow I, 2–20
22	$L((\exists x(G_1(x))) \to L(\exists x(G_1(x))))$	R5, 21
23	$M(\exists x(G_1(x))) \wedge L((\exists x(G_1(x))) \rightarrow L(\exists x(G_1(x))))$	$\wedge I, 1, 22$
24	$L(\exists x(G_1(x)))$	S5, 23

3.12 Proposition 12 (P12)

On ne peut concevoir selon sa véritable nature aucun attribut de la substance duquel il résulte que la substance soit divisible.

$$\forall x(S_1(x) \to \neg \exists y \exists z(D_3(x,y,z)))$$

1	$ S_1(x)$	
2	$\exists y \exists z (D_3(x,y,z))$	
3	$D_3(x,y,z)$	
4	$\forall a \forall b \forall c (D_3(a, b, c) \to M(\neg \exists w (w = a)))$	A10
5	$D_3(x,y,z) \to M(\neg \exists w(w=x))$	$\forall E, 4$
6	$M(\neg \exists w(w=x))$	\Rightarrow E, 3, 5
7	$\forall a(S_1(a) \to L(\exists w(w=a)))$	P7
8	$S_1(x) \to L(\exists w(w=x))$	$\forall E, 7$
9	$L(\exists w(w=x))$	\Rightarrow E, 1, 8
10	$\forall a(M(\neg \exists w(w=a)) \leftrightarrow \neg L(\exists w(w=a)))$	A7
11	$M(\neg \exists w(w=x)) \leftrightarrow \neg L(\exists w(w=x))$	$\forall E, 10$
12	$M(\neg \exists w(w=x)) \to \neg L(\exists w(w=x))$	∧E, 11
13		\Rightarrow E, 6, 12
14		$\wedge I, 9, 13$
15		$\perp E, 14$
16		$\exists E, 2, 315$
17	$\neg \exists y \exists z (D_3(x,y,z))$	$\neg I,\ 216$
18	$S_1(x) \to \neg \exists y \exists z (D_3(x, y, z))$	\Rightarrow I, 1–17
19	$\forall x (S_1(x) \to \neg \exists y \exists z (D_3(x, y, z)))$	∀I, 18

3.13 Proposition 13 (P13)

La substance absolument infinie est indivisible.

$$\forall x (S_1(x) \land (\forall w (A_1(w) \to A_2(w, x))) \to \neg \exists y \exists z (D_3(x, y, z)))$$

3.14 Proposition 14 (P14)

Il ne peut exister et on ne peut concevoir aucune autre substance que Dieu.

$$\exists x (G_1(x) \land \forall y (S_1(y) \rightarrow y = x))$$

3.14.1 Proposition 14 alternative (P14-A)

Version alternative de P14 : Il existe exactement un Dieu.

$$\exists x \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = x)$$

3.15 Proposition 15 (P15)

Tout ce qui existe est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu.

$$\forall x \exists g (G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$$

1	$\mid \exists g(G_1(g) \land \forall y(S_1(y) \to y = g))$	P14
2	$G_1(g) \land \forall y (S_1(y) \to y = g)$	
3	$G_1(g)$	$\wedge E, 2$
4	$\forall y(S_1(y) \to y = g)$	$\wedge E, 2$
5	$\forall x(S_1(x) \lor M_1(x))$	DP5
6	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\forall E, 5$
7	$S_1(x)$	
8	$S_1(x) \to x = g$	$\forall E, 4$
9	x = g	\Rightarrow E, 7, 8
10	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \land C_2(x,x))$	D3
11	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 7, 10
12	$I_2(x,x)$	∧E, 11
13	$C_2(x,x)$	∧E, 11
14	$I_2(x,g)$	9,12
15	$C_2(x,g)$	9,13
16	$I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I, 14, 15$
17	$G_1(g) \wedge I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I, 3, 16$
18	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	∃I, 17
19	$M_1(x)$	
20	$M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	D5b
21	$\exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	\Rightarrow E, 19, 20
22	$S_1(y) \wedge M_2(x,y)$	
23	$S_1(y)$	$\wedge E, 22$
24	$M_2(x,y)$	$\wedge E, 22$
25	$S_1(y) \to y = g$	$\forall E, 4$
26	y = g	\Rightarrow E, 23, 25
27	$M_2(x,g)$	24,26
28	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a
29	$x \neq g \land I_2(x,g) \land C_2(x,g)$	\Rightarrow E, 27, 28
30	$I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge E, 29$
31	$G_1(g) \wedge I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I, 3, 30$
32	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	∃I, 31
33	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$ $\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\exists E, 21, 2232$
34	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g)) $ $\lor E, 6, 7-18, 19-33$	
35	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g)) $ $\exists E, 1, 2-34$	
36	$\forall x \exists g (G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\forall I, 35$

3.16 Proposition 16 (P16)

Dieu est cause de toutes choses.

$$\forall x \exists g (G_1(g) \land K_2(g,x))$$

3.17 Proposition 17 (P17)

Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans y être contraint par personne.

$$\exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))$$

```
1
         \exists x (G_1(x) \land \forall y (S_1(y) \to y = x))
2
              G_1(g) \wedge \forall y (S_1(y) \to y = g)
3
              G_1(g)
                                                                                                    \wedge E, 2
4
              \forall y (S_1(y) \to y = g)
                                                                                                    \wedge E, 2
              G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g)))
              S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))
                                                                                                    \RightarrowE, 3, 5
6
7
              S_1(g)
                                                                                                    ∧E, 6
                    \exists x (\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))
8
                          \neg I_2(e,g) \wedge K_2(e,g)
9
                         \neg I_2(e,g)
                                                                                                    ^E, 9
10
11
                         K_2(e,g)
                                                                                                    ∧E, 9
12
                         \forall x(S_1(x) \to \neg(\exists y(y \neq x \land K_2(y,x))))
                                                                                                    P6c
                         S_1(g) \to \neg (\exists y (y \neq g \land K_2(y,g)))
                                                                                                    ∀E, 12
13
                         \neg(\exists y(y \neq g \land K_2(y,g)))
                                                                                                    \RightarrowE, 7, 13
14
15
                         \neg(e \neq g \land K_2(e,g))
                                                                                                    \forall E, 14
                         e = g \vee \neg K_2(e, g)
                                                                                                    De Morgan, 15
16
17
                              e = g
18
                              S_1(g) \leftrightarrow (I_2(g,g) \wedge C_2(g,g))
                                                                                                    D3
                              I_2(g,g) \wedge C_2(g,g)
                                                                                                    \RightarrowE, 7, 18
19
                                                                                                    ∧E, 19
20
                              I_2(g,g)
21
                              I_2(e,g)
                                                                                                    17,20
                              \neg I_2(e,g)
                                                                                                    R, 10
22
                              I_2(e,g) \wedge \neg I_2(e,g)
                                                                                                    ∧I, 21, 22
23
                                                                                                    \perp E, 23
24
25
                              \neg K_2(e,g)
                                                                                                    R, 11
26
                              K_2(e,g)
27
                                                                                                    ∧I, 26, 25
                              K_2(e,g) \wedge \neg K_2(e,g)
                                                                                                    \perp E, 27
28
                                                                                                    \vee E,\ 16,\ 17\text{--}24,\ 25\text{--}28
29
                         -1
30
                   \perp
                                                                                                    \exists E, 8, 9–29
31
               \neg \exists x (\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))
                                                                                                    \neg I, 8-30
                                                                                                    P16
32
               \forall x \exists h(G_1(h) \land K_2(h,x))
              \exists h(G_1(h) \land K_2(h,x))
                                                                                                    ∀E, 32
33
34
                   G_1(h) \wedge K_2(h,x)
                    G_1(h)
                                                                                                    ∧E. 34
35
                    \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                                    P14-A
36
37
                         \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                         G_1(g) \leftrightarrow g = z
38
                                                                                                    ∀E, 37
                         G_1(h) \leftrightarrow h = z
                                                                                                    ∀E, 37
39
                         g = z
                                                                                                    ⇒E, 3, 38
40
41
                         h = z
                                                                                                    \RightarrowE, 35, 39
                         h = g
                                                                                                    40,41
42
43
                         K_2(h,x)
                                                                                                    ∧E, 34
44
                        K_2(g,x)
                                                                                                    42,43
                   K_2(g,x)
                                                                                                    ∃E, 36, 37–44
45
                                                                                                    ∃E, 33, 34–45
46
               K_2(g,x)
47
              \forall x(K_2(g,x))
                                                                                                    \forall I, 46
              G_1(g) \wedge \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \wedge K_2(x,g))) \wedge \forall x(K_2(g,x))
                                                                                                    \land I, 3, 31, 47
48
49
              \exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))
                                                                                                    ∃I, 48
        \exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))
                                                                                                    \exists E,\ 1,\ 2\text{--}49
```

3.17.1 Corollaire 2 de la Proposition 17 (P17c2)

Dieu seul est cause libre.

$$\exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))$$

```
\exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))
              G_1(g) \wedge \neg (\exists x (\neg I_2(x,g) \wedge K_2(x,g))) \wedge \forall x (K_2(g,x))
3
              G_1(g)
                                                                                               \wedge E, 2
                                                                                               \wedge E, 2
4
              \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g)))
              G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g)))
                                                                                               D6
5
              S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))
                                                                                               \RightarrowE, 3, 5
6
              S_1(g)
                                                                                               \wedge E, 6
              \forall x (S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x))
                                                                                               DPIII
8
9
              S_1(g) \leftrightarrow K_2(g,g)
                                                                                               ∀E, 8
10
              K_2(g,g)
                                                                                               ⇒E, 7, 9
              \forall x(S_1(x) \to \neg(\exists y(y \neq x \land K_2(y,x))))
                                                                                               P6c
11
12
              S_1(g) \to \neg(\exists y (y \neq g \land K_2(y,g)))
                                                                                               ∀E, 11
13
              \neg(\exists y(y \neq g \land K_2(y,g)))
                                                                                               ⇒E, 7, 12
              K_2(g,g) \land \neg \exists y (y \neq g \land K_2(y,g))
                                                                                               ∧I, 10, 13
14
15
              B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))
16
              K_2(g,g) \land \neg \exists y (y \neq g \land K_2(y,g)) \leftrightarrow B_1(g)
                                                                                               ∀E, 15
              B_1(g)
                                                                                               \RightarrowE, 14, 16
17
18
                   B_1(x)
19
                   B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))
                                                                                               D7a
20
                   K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x))
                                                                                               ⇒E, 18, 19
21
                   K_2(x,x)
                                                                                               \wedge E, 20
22
                   \forall z(S_1(z) \leftrightarrow K_2(z,z))
                                                                                               DPIII
                   K_2(x,x) \leftrightarrow S_1(x)
                                                                                               ∀E, 22
23
                                                                                               ⇒E, 21, 23
24
                   S_1(x)
25
                    \exists z (G_1(z) \land \forall y (S_1(y) \to y = z))
                                                                                               P14
26
                        G_1(h) \wedge \forall y (S_1(y) \to y = h)
                                                                                               ∧E, 26
27
                         \forall y(S_1(y) \to y = h)
                                                                                               ∀E, 27
28
                         S_1(x) \to x = h
                        x = h
                                                                                               ⇒E, 24, 28
29
                        G_1(h)
                                                                                               ∧E, 26
30
                         \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                               P14-A
31
                              \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
32
                              G_1(g) \leftrightarrow g = z
                                                                                               ∀E, 32
33
34
                              G_1(h) \leftrightarrow h = z
                                                                                               ∀E, 32
35
                              g = z
                                                                                               \RightarrowE, 3, 33
                                                                                               ⇒E, 30, 34
36
                              h = z
37
                                                                                               35,36
                              h = g
                                                                                               R, 29
38
                              x = h
39
                             x = g
                                                                                               38,37
                                                                                               \exists E, 31, 32–39
40
                        x = g
                                                                                               ∃E, 25, 26–40
41
                   x = g
                                                                                               ⇒I, 18–41
42
              B_1(x) \to x = g
43
              \forall x (B_1(x) \to x = g)
                                                                                               ∀I, 42
44
              G_1(g) \wedge B_1(g) \wedge \forall x (B_1(x) \to x = g)
                                                                                               \wedge I,\ 3,\ 17,\ 43
                                                                                               ∃I, 44
             \exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))
45
                                                                                               ∃E, 1, 2–45
        \exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))
```

3.18 Proposition 18 (P18)

Dieu est cause immanente, et non transitive, de toutes choses.

$$\exists g(G_1(g) \land \forall x(I_2(x,g) \leftrightarrow K_2(g,x)))$$

3.19 Proposition 19 (P19)

Dieu et tous ses attributs sont éternels.

$$\exists g(G_1(g) \land E_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \rightarrow E_1(x)))$$

3.20 Proposition 20 (P20)

L'existence et l'essence de Dieu sont une seule et même chose.

$$\exists g(G_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \to x = g))$$

3.21 Proposition 21 (P21)

Tout ce qui suit de l'essence absolue d'un attribut de Dieu existe nécessairement et infiniment.

 $\forall x((\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg(\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v = x)) \land \neg F_1(x)))$

```
\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))
2
                   G_1(g) \wedge A_2(y,g) \wedge x \neq g \wedge K_2(y,x) \wedge \neg (\exists z (z \neq y \wedge K_2(z,x)))
3
                   G_1(g)
                                                                                                                                                                      \wedge E, 2
                                                                                                                                                                      \wedge E, 2
4
                   A_2(y,g)
                   K_2(y,x)
                                                                                                                                                                      \wedge E, 2
5
6
                   G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))
                                                                                                                                                                      D6
7
                   S_1(g) \wedge \forall w (A_1(w) \to A_2(w,g))
                                                                                                                                                                      \RightarrowE. 3. 6
                                                                                                                                                                      ∧E, 7
8
                   S_1(g)
9
                   \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
                                                                                                                                                                      DP7
10
                   A_2(y,g) \wedge S_1(g) \to y = g
                                                                                                                                                                      ∀E, 9
11
                   A_2(y,g) \wedge S_1(g)
                                                                                                                                                                      ∧I. 4. 8
12
                   y = g
                                                                                                                                                                      ⇒E, 11, 10
13
                   K_2(g,x)
14
                    \exists g(G_1(g) \land E_1(g) \land \forall z(A_2(z,g) \to E_1(z)))
                                                                                                                                                                      P19
                        G_1(h) \wedge E_1(h) \wedge \forall z (A_2(z,h) \rightarrow E_1(z))
15
                         G_1(h)
                                                                                                                                                                      ∧E, 15
16
                                                                                                                                                                      ∧E, 15
17
                         E_1(h)
18
                         \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                                                                                                      P14-A
19
                            \forall y(G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                              G_1(g) \leftrightarrow g = z
                                                                                                                                                                      ∀E, 19
20
21
                              G_1(h) \leftrightarrow h = z
                                                                                                                                                                      ∀E, 19
22
                              g = z
                                                                                                                                                                      \RightarrowE, 3, 20
                              h = z
                                                                                                                                                                      \RightarrowE, 16, 21
23
                              g=h
                                                                                                                                                                      22,23
24
                                                                                                                                                                      R, 17
25
                              E_1(h)
26
                              E_1(g)
                                                                                                                                                                      24.25
                                                                                                                                                                      ∃E, 18, 19–26
                        E_1(g)
27
                    E_1(g)
                                                                                                                                                                      ∃E, 14, 15–27
28
29
                    E_1(x) \leftrightarrow L(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      D8
30
                   E_1(g) \leftrightarrow L(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                      ∀E, 29
                   L(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                      ⇒E. 28. 30
31
32
                    \forall p(L(p) \to N(p))
                                                                                                                                                                      R1
33
                   L(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                      \forall E, 32
                                                                                                                                                                      ⇒E, 31, 33
34
                   N(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                      A3
35
                   \forall a \forall b (K_2(a,b) \to N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))
36
                   K_2(g,x) \to N((\exists v(v=g)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      \forall E, 35
37
                   N((\exists v(v=g)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      \RightarrowE, 13, 36
                                                                                                                                                                      R7, 37
                   N((\exists v(v=g)) \to (\exists v(v=x)))
38
                                                                                                                                                                      R6
39
                   \forall p \forall q (N(p \to q) \to (N(p) \to N(q)))
40
                   N((\exists v(v=g)) \to (\exists v(v=x))) \to (N(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                      ∀E, 39
41
                   N(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      \RightarrowE, 38, 40
                   N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      \RightarrowE, 34, 41
42
43
                   \forall a(N(\exists y(y=a)) \leftrightarrow \neg F_1(a))
                                                                                                                                                                      A14
                                                                                                                                                                      ∀E, 43
44
                   N(\exists y(y=x)) \leftrightarrow \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                      ∧E, 44
45
                   N(\exists y(y=x)) \rightarrow \neg F_1(x)
                   \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                      ⇒E, 42, 45
46
47
                   N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                      ∧I, 42, 46
                                                                                                                                                                      ∃E, 1, 2–47
48
              N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
49
         (\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v=x)) \land \neg F_1(x))
                                                                                                                                                                      ⇒I. 1–48
        \forall x ((\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v=x)) \land \neg F_1(x)))
                                                                                                                                                                      ∀I, 49
50
```

3.22 Proposition 22 (P22)

Tout ce qui suit d'un attribut de Dieu en tant que modifié est éternel et infini.

$$\forall x((\exists g \exists y \exists y'(G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg(\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)))$$

```
\exists g \exists y \exists y' (G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))
1
                                            G_1(g) \wedge A_2(y,g) \wedge M_1(y') \wedge \neg F_1(y') \wedge N(\exists v(v=y')) \wedge K_2(y,x) \wedge K_2(y',x) \wedge \neg (\exists z(z \neq y \wedge z \neq y' \wedge K_2(z,x)))
2
3
                                            G_1(g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \wedge E, 2
                                            A_2(y,g)
4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \wedge E. 2
                                            M_1(y')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \wedge E, 2
5
6
                                            \neg F_1(y')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \wedge E, 2
7
                                            N(\exists v(v=y'))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \wedge E, 2
                                            K_2(y,x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \wedge E, 2
8
                                            K_2(y',x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \wedge E,\, 2
10
                                            G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D6
                                            S_1(g) \wedge \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ⇒E. 3.
11
12
                                            S_1(g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ∧E, 11
13
                                            \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DP7
14
                                            A_2(y,g) \wedge S_1(g) \to y = g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ∀E, 13
15
                                           A_2(y,g) \wedge S_1(g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ∧I, 4, 12
16
                                            y = g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ⇒E, 15,
17
                                            K_2(g,x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16.8
18
                                            \forall a \forall b (K_2(a,b) \to N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A3
19
                                            K_2(y',x) \to N((\exists v(v=y')) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \forall E, 18
20
                                            N((\exists v(v=y')) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ⇒E, 9,
                                            N((\exists v(v=y')) \to (\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               R7, 20
21
22
                                            \forall p \forall q (N(p \to q) \to (N(p) \to N(q)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R6
                                            N((\exists v(v=y')) \rightarrow (\exists v(v=x))) \rightarrow (N(\exists v(v=y')) \rightarrow N(\exists v(v=x)))
23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \forall E, 22
24
                                           N(\exists v(v=y')) \to N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ⇒E, 21,
25
                                            N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \RightarrowE, 7,
26
                                            \forall a (N(\exists y (y=a)) \leftrightarrow \neg F_1(a))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ∀E, 26
27
                                           N(\exists y(y=x)) \leftrightarrow \neg F_1(x)
28
                                            N(\exists y(y=x)) \to \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ∧E, 27
29
                                            \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ⇒E, 25,
30
                                           N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ∧I, 25, 2
31
                                N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \exists E, 1, 2
32
                    (\exists g \exists y \exists y' (G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)) \land (\exists x \land y \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land (\exists x \land y \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land K_2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \RightarrowI, 1–3
                    \forall x((\exists g\exists \exists \exists y\exists y'(G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \forall I, 32
33
```

3.23 Proposition 23 (P23)

Tout mode qui existe nécessairement et infiniment découle d'un attribut de Dieu.

$$\forall x (N(\exists v(v=x)) \to \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))))$$

```
1
               N(\exists v(v=x))
2
                                                                                                                                          P14
               \exists g(G_1(g) \land \forall y(S_1(y) \to y = g))
3
                    G_1(g) \wedge \forall y (S_1(y) \to y = g)
4
                    G_1(g)
                                                                                                                                          ∧E. 3
                    \forall x(\exists y(A_2(y,x)))
                                                                                                                                          A9
5
                                                                                                                                          \forall E, 5
6
                    \exists y (A_2(y,g))
7
                          A_2(y,g)
                          G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))
                                                                                                                                          D6
8
9
                          S_1(g) \wedge \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g))
                                                                                                                                          \RightarrowE, 4, 8
10
                          S_1(g)
                                                                                                                                          \wedge E, 9
                                                                                                                                          DP7
11
                          \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
                                                                                                                                          ∀E, 11
                          A_2(y,g) \wedge S_1(g) \rightarrow y = g
12
                                                                                                                                          \wedge I, 7, 10
13
                          A_2(y,g) \wedge S_1(g)
14
                          y = g
                                                                                                                                          \RightarrowE, 13, 12
15
                          \forall z \exists h (G_1(h) \land I_2(z,h) \land C_2(z,h))
                                                                                                                                          P15
                          \exists h(G_1(h) \land I_2(x,h) \land C_2(x,h))
                                                                                                                                          ∀E, 15
16
                               G_1(h) \wedge I_2(x,h) \wedge C_2(x,h)
17
18
                               G_1(h)
                                                                                                                                          ∧E, 17
19
                               I_2(x,h)
                                                                                                                                          ∧E, 17
20
                               C_2(x,h)
                                                                                                                                          ∧E, 17
21
                                \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                                                                          P14-A
22
                                     \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                     G_1(g) \leftrightarrow g = z
23
                                                                                                                                          ∀E, 22
                                                                                                                                          ∀E, 22
                                     G_1(h) \leftrightarrow h = z
24
                                                                                                                                          \RightarrowE, 4, 23
25
                                     g = z
                                     h = z
                                                                                                                                          \RightarrowE, 18, 24
26
27
                                     h = g
                                                                                                                                          25,26
28
                                     C_2(x,h)
                                                                                                                                          R, 20
                                                                                                                                          27,28
29
                                     C_2(x,g)
30
                                                                                                                                          \exists E, 21, 22-29
                                C_2(x,g)
                               \forall a \forall b (K_2(a,b) \leftrightarrow C_2(b,a))
31
                                                                                                                                          A4
                                                                                                                                          ∀E, 31
32
                               K_2(g,x) \leftrightarrow C_2(x,g)
                                                                                                                                          \RightarrowE, 30, 32
33
                                K_2(g,x)
                                                                                                                                          14,33
34
                               K_2(y,x)
35
                                \forall a \forall b (K_2(a,b) \to N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))
                                                                                                                                          Α3
                                K_2(y,x) \to N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                          ∀E, 35
36
37
                               N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                          \RightarrowE, 34, 36
                               N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x)))
                                                                                                                                          R7, 37
38
                                                                                                                                          ∧I, 4, 7, 38
39
                               G_1(g) \wedge A_2(y,g) \wedge N((\exists v(v=y)) \rightarrow (\exists v(v=x)))
40
                               \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \rightarrow (\exists v(v=x))))
                                                                                                                                          ∃I, 39
41
                          \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \rightarrow (\exists v(v=x))))
                                                                                                                                          \exists E, 6, 7-40
                                                                                                                                          ∃E, 2, 3–41
42
                    \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))
43
               N(\exists v(v=x)) \rightarrow \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \rightarrow (\exists v(v=x))))
                                                                                                                                          ⇒I, 1–42
               \forall x (N(\exists v(v=x)) \to \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x)))))
                                                                                                                                          \forall I, 43
44
```

3.24 Proposition 24 (P24)

L'essence des choses produites par Dieu n'implique pas l'existence.

$$\forall x((\exists g(G_1(g) \land x \neq g \land K_2(g,x))) \rightarrow \neg L(\exists v(v=x)))$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1 & & & & & & & & & & & & & \\ \hline 2 & & & & & & & & & \\ \hline 3 & & & & & & & & & \\ \hline 4 & & & & & & & & \\ \hline 4 & & & & & & & \\ \hline 5 & & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 & & & & & & \\ \hline 6 &$$

3.25 Proposition 25 (P25)

Dieu est cause efficiente de l'essence et de l'existence des choses.

$$\forall x \exists g (G_1(g) \land K_2(g,x))$$

3.26 Proposition 26 (P26)

Une chose déterminée à produire un effet a été déterminée par Dieu.

$$\forall x \forall y ((\exists z \exists z' (M_2(y,z) \land M_2(z',z) \land K_2(x,y))) \rightarrow \exists g (G_1(g) \land K_2(g,y)))$$

3.27 Proposition 27 (P27)

Une chose déterminée par Dieu ne peut se rendre indéterminée.

$$\forall x((\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land \neg(\exists z(z \neq g \land K_2(z,x))))) \rightarrow N(\exists v(v = x)))$$

1	$\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land \neg(\exists z(z)))$	$z \neq g \wedge K_2(z, x))))$	
2	$G_1(g) \wedge K_2(g,x) \wedge \neg (\exists z ($	$z \neq g \wedge K_2(z,x)))$	
3	$G_1(g)$		$\wedge E, 2$
4	$K_2(g,x)$		$\wedge E, 2$
5	$\exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)$		P14-A
6	$\forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = h)$		
7	$G_1(g) \leftrightarrow g = h$		$\forall E, 6$
8	g = h		\Rightarrow E, 3, 7
9	$\exists k (G_1(k) \land E_1(k) \land \forall$	$Z(A_2(z,k) \to E_1(z)))$	P19
10	$G_1(k) \wedge E_1(k) \wedge \forall$	$dz(A_2(z,k) o E_1(z))$	
11	$G_1(k)$		∧E, 10
12	$E_1(k)$		∧E, 10
13	$G_1(k) \leftrightarrow k = h$		$\forall E, 6$
14	k = h		\Rightarrow E, 11, 13
15	g = h		R, 8
16	g = k		15,14
17	$E_1(k)$		R, 12
18	$E_1(g)$		16,17
19	$ E_1(x) \leftrightarrow L(\exists v(v : x)) $	=x))	D8
20	$ E_1(g) \leftrightarrow L(\exists v(v = x)) $	=g))	$\forall E, 19$
21			\Rightarrow E, 18, 20
22			R1
23		$N(\exists v(v=g))$	$\forall E, 22$
24			\Rightarrow E, 21, 23
25		$N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))$	A3
26	$K_2(g,x) \to N((\exists a)$	$v(v=g)) \leftrightarrow \exists v(v=x))$	$\forall E, 25$
27		$\exists v(v=x))$	\Rightarrow E, 4, 26
28			R7, 27
29		$\rightarrow (N(p) \rightarrow N(q)))$	R6
30		$(\exists v(v=x))) \to (N(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=x)))$	$\forall E, 29$
31		$N(\exists v(v=x))$	\Rightarrow E, 28, 30
32			\Rightarrow E, 24, 31
33			$\exists E,9,1032$
34			$\exists E, 5, 6–33$
35	$N(\exists v(v=x))$		$\exists E,\ 1,\ 234$
36	$ (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land \neg(\exists z(z \neq x))) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(z \neq x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists z(g,x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x))) (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x)) \land \neg(\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x))) (\exists g(G_1(g) \land K$	$g \wedge K_2(z, x))))) \rightarrow N(\exists v(v = x)))$	\Rightarrow I, 1–35
37	$ \forall x ((\exists g (G_1(g) \land K_2(g, x) \land \neg (\exists z (g, x)))) \land \neg (\exists z (g, x)) \land (\exists z (g, x)) \land \neg (\exists z (g, x)) \land \neg (\exists z (g, x)) \land (\exists z $	$z \neq g \land K_2(z, x))))) \rightarrow N(\exists v(v = x))))$	$\forall I, 36$

3.28 Proposition 28 (P28)

Tout mode fini est déterminé à exister par un autre mode fini.

$$\forall x((F_1(x) \land \neg N(\exists v(v=x))) \to (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land (\forall y(I_2(x,y) \to K_2(y,x))) \land (\exists z(z \neq x \land K_2(z,x) \land \neg N(\exists v(v=z)) \land F_1(z))))))$$

```
1
              F_1(x) \wedge \neg N(\exists v(v=x))
2
              F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      \wedge E, 1
3
                                                                                                                                                                                                                      ∧E. 1
              \neg N(\exists v(v=x))
              \forall z \exists g (G_1(g) \land K_2(g,z))
                                                                                                                                                                                                                      P16
4
5
              \exists g(G_1(g) \land K_2(g,x))
                                                                                                                                                                                                                      ∀E, 4
6
                    G_1(g) \wedge K_2(g,x)
                    G_1(g)
                                                                                                                                                                                                                      ∧E, 6
8
                    K_2(g,x)
                                                                                                                                                                                                                      \wedge E, 6
9
10
                         \forall a \forall b (I_2(a,b) \rightarrow C_2(a,b))
                                                                                                                                                                                                                      A8
11
                         I_2(x,y) \to C_2(x,y)
                                                                                                                                                                                                                      \forall E,\ 10
12
                         C_2(x,y)
                                                                                                                                                                                                                      ⇒E, 9, 11
                         \forall a \forall b (K_2(a,b) \leftrightarrow C_2(b,a))
13
                                                                                                                                                                                                                      A4
                         K_2(y,x) \leftrightarrow C_2(x,y)
                                                                                                                                                                                                                      ∀E. 13
14
                         K_2(y,x)
15
                                                                                                                                                                                                                      ⇒E, 12, 14
16
                    I_2(x,y) \to K_2(y,x)
                                                                                                                                                                                                                      \RightarrowI, 9–15
17
                    \forall y (I_2(x,y) \to K_2(y,x))
                                                                                                                                                                                                                      ∀I, 16
                    \forall x(S_1(x) \vee M_1(x))
                                                                                                                                                                                                                      DP5
18
19
                    S_1(x) \vee M_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      ∀E, 18
20
21
                         \forall a(S_1(a) \rightarrow \neg F_1(a))
                                                                                                                                                                                                                      P8
22
                         S_1(x) \rightarrow \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      ∀E. 21
23
                         \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      ⇒E, 20, 22
24
                         F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      R. 2
                         F_1(x) \wedge \neg F_1(x)
25
                                                                                                                                                                                                                      \wedge I, 24, 23
26
                         \perp
                                                                                                                                                                                                                      \perp E, 25
                                                                                                                                                                                                                      ¬I, 20−26
27
                    \neg S_1(x)
                    S_1(x) \vee M_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      R, 19
28
29
                       \neg M_1(x)
30
                         \neg S_1(x) \wedge \neg M_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      \wedge I, 27, 29
31
                         \neg(S_1(x)\vee M_1(x))
                                                                                                                                                                                                                      De Morgan, 30
                         S_1(x) \vee M_1(x) \wedge \neg (S_1(x) \vee M_1(x))
                                                                                                                                                                                                                      ∧I, 28, 31
32
                         \perp
                                                                                                                                                                                                                      \perp E, 32
33
                                                                                                                                                                                                                      ¬I, 29–33
34
                    M_1(x)
                    F_1(x) \wedge \neg N(\exists v(v=x)) \wedge M_1(x)
                                                                                                                                                                                                                      ∧I, 2, 3, 34
35
36
                    \exists z (z \neq x \land K_2(z, x) \land \neg N(\exists v (v = z)) \land F_1(z))
                                                                                                                                                                                                                      R10, 35
37
                    G_1(g) \wedge K_2(g,x) \wedge (\forall y (I_2(x,y) \rightarrow K_2(y,x))) \wedge (\exists z (z \neq x \wedge K_2(z,x) \wedge \neg N (\exists v (v=z)) \wedge F_1(z)))
                                                                                                                                                                                                                      \land I, 7, 8, 17, 36
                   \exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land (\forall y(I_2(x,y) \rightarrow K_2(y,x))) \land (\exists z(z \neq x \land K_2(z,x) \land \neg N(\exists v(v=z)) \land F_1(z))))
                                                                                                                                                                                                                      ∃I, 37
38
39
              \exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land (\forall y(I_2(x,y) \rightarrow K_2(y,x))) \land (\exists z(z \neq x \land K_2(z,x) \land \neg N(\exists v(v=z)) \land F_1(z))))
                                                                                                                                                                                                                      ∃E, 5, 6–38
40
        (F_1(x) \land \neg N(\exists v(v=x))) \rightarrow (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land (\forall y(I_2(x,y) \rightarrow K_2(y,x))) \land (\exists z(z \neq x \land K_2(z,x) \land \neg N(\exists v(v=z)) \land F_1(z)))))
                                                                                                                                                                                                                      ⇒I, 1–39
        \forall x((F_1(x) \land \neg N(\exists v(v=x))) \rightarrow (\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x) \land (\forall y(I_2(x,y) \rightarrow K_2(y,x))) \land (\exists z(z \neq x \land K_2(z,x) \land \neg N(\exists v(v=z)) \land F_1(z))))))
41
                                                                                                                                                                                                                      ∀I, 40
```

3.29 Proposition 29 (P29)

Rien n'est contingent dans la nature.

$$\exists g (G_1(g) \land L(\exists x (x=g)) \land (\forall x (x \neq g \rightarrow N_1(x))))$$

3.30 Proposition 30 (P30)

L'entendement doit comprendre les attributs et affections de Dieu.

$$\forall x \forall y ((A_1(x) \land T_1(x) \land O_2(y, x)) \rightarrow (A_1(y) \lor M_1(y)))$$

1		$A_1(x)$	$\wedge T_1(x) \wedge O_2(y,x)$	
2		$A_1(x)$		$\wedge E$, 1
3		$T_1(x)$		$\wedge E$, 1
4		$O_2(y,$	x)	$\wedge E$, 1
5		$\forall a(S_1)$	$(a)ee M_1(a))$	DP5
6		$S_1(y)$	$\vee M_1(y)$	$\forall E, 5$
7		S_1	(y)	
8		$\forall a$	$u(\exists b(A_2(b,a)))$	A9
9		$\exists b$	$(A_2(b,y))$	$\forall E, 8$
10			$A_2(z,y)$	
11			$A_2(a,b) \leftrightarrow (A_1(a) \wedge C_2(b,a))$	D4b
12			$A_2(z,y) \leftrightarrow (A_1(z) \wedge C_2(y,z))$	$\forall E, 11$
13			$A_1(z) \wedge C_2(y,z)$	\Rightarrow E, 10, 12
14			$C_2(y,z)$	$\wedge E$, 13
15			$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3
16			$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 7, 15
17			$C_2(y,y)$	∧E, 16
18			$(\neg \exists w (w \neq y \land C_2(y, w))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
19			$C_2(y,y) \to \neg \exists w (w \neq y \land C_2(y,w))$	∧E, 18
20			$\neg \exists w (w \neq y \land C_2(y, w))$	⇒E, 17, 19
21			$z \neq y$	
22			$z \neq y \land C_2(y, z)$	$\wedge I, 21, 14$
23			$\exists w(w \neq y \land C_2(y, w))$	$\exists I,\ 22$
24			$\neg \exists w (w \neq y \land C_2(y, w))$	R, 20
25			$\exists w(w \neq y \land C_2(y,w)) \land \neg \exists w(w \neq y \land C_2(y,w))$	$\wedge I, 23, 24$
26				$\perp E, 25$
27			$\neg(z \neq y)$	$\neg I, 21-26$
28			z = y	$\neg E, 27$
29			$A_1(z)$	$\wedge E$, 13
30			$A_1(y)$	28,29
31			$A_1(y) \vee M_1(y)$	∨I, 30
32		A_{1}	$\Lambda(y) \vee M_1(y)$	$\exists E, 9, 1031$
33		M	$f_1(y)$	
34		A_{1}	$\Lambda(y) \vee M_1(y)$	$\vee I, 33$
35		$A_1(y)$	$\vee M_1(y)$	$\vee E, 6, 7–32, 33–34$
36	(A	$\Lambda_1(x) \wedge X$	$T_1(x) \wedge O_2(y,x)) \rightarrow (A_1(y) \vee M_1(y))$	\Rightarrow I, 1–35
37	$\forall y$	$u((A_1(x)$	$(\wedge T_1(x) \wedge O_2(y,x)) \rightarrow (A_1(y) \vee M_1(y)))$	∀I, 36
38	$\forall x$	$\forall y((A_1)$	$(x) \wedge T_1(x) \wedge O_2(y,x)) \to (A_1(y) \vee M_1(y)))$	∀I, 37

3.31 Proposition 31 (P31)

L'entendement en acte, soit fini, soit infini, comme aussi la volonté, le désir, l'amour, etc., se doivent rapporter à la nature naturée, et non à la naturante.

Cela revient à dire que l'entendement, la volonté, le désir et l'amour sont des modes.

3.31.1 Proposition 31a (P31a)

L'entendement est un mode.

$$\forall x(U_1(x) \to M_1(x))$$

1		$U_1(x)$	
2	$\forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))$ DPI		DPI
3	$ (S_1(x) \wedge \neg M_1(x)) \vee (\neg S_1(x) \wedge M_1(x)) $		$\forall E, 2$
4		$S_1(x) \wedge \neg M_1(x)$	
5		$S_1(x)$	$\wedge E, 4$
6		$\forall a(S_1(a) o A_2(a,a))$	DPII
7		$S_1(x) \to A_2(x,x)$	$\forall E, 6$
8		$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 5, 7
9		$A_2(a,b) \leftrightarrow (A_1(a) \wedge C_2(b,a))$	D4b
10		$A_2(x,x) \leftrightarrow (A_1(x) \wedge C_2(x,x))$	$\forall E, 9$
11		$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 8, 10
12		$A_1(x)$	∧E, 11
13		$\forall a(U_1(a) \to \neg A_1(a))$	A17a
14		$U_1(x) \to \neg A_1(x)$	$\forall E, 13$
15		$\neg A_1(x)$	⇒E, 1, 14
16		$A_1(x) \wedge \neg A_1(x)$	$\wedge I, 12, 15$
17		上	\perp E, 16
18		$\neg S_1(x) \wedge M_1(x)$	
19		$M_1(x)$	∧E, 18
20		$M_1(x)$	$\vee E, 3, 4-17, 18-19$
21	$U_1(x) o M_1(x)$		\Rightarrow I, 1–20
22	$\forall x$	$(U_1(x) \to M_1(x))$	$\forall I, 21$

3.31.2 Proposition 31b (P31b)

La volonté est un mode.

$$\forall x(W_1(x) \to M_1(x))$$

1	$W_1(x)$		
2	$\forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))$	DPI	
3	$(S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x))$	$\forall E, 2$	
4	$S_1(x) \wedge \neg M_1(x)$		
5	$S_1(x)$	$\wedge E, 4$	
6	$\forall a(S_1(a) \to A_2(a,a))$	DPII	
7	$S_1(x) \to A_2(x,x)$	$\forall E, 6$	
8	$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 5, 7	
9	$A_2(a,b) \leftrightarrow (A_1(a) \land C_2(b,a))$	D4b	
10	$A_2(x,x) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(x,x))$	$\forall E, 9$	
11	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	⇒E, 8, 10	
12	$A_1(x)$	∧E, 11	
13	$\forall a(W_1(a) \to \neg A_1(a))$	A17b	
14	$W_1(x) \to \neg A_1(x)$	$\forall E, 13$	
15	$\neg A_1(x)$	⇒E, 1, 14	
16	$A_1(x) \wedge \neg A_1(x)$	$\wedge I, 12, 15$	
17		\perp E, 16	
18	$\neg S_1(x) \wedge M_1(x)$		
19	$M_1(x)$	∧E, 18	
20	$M_1(x)$	$\vee E, 3, 4-17, 18-19$	
21	$W_1(x) \to M_1(x)$	\Rightarrow I, 1–20	
22	$\forall x(W_1(x) \to M_1(x))$ $\forall I, 21$		

3.31.3 Proposition 31c (P31c)

Le désir est un mode.

$$\forall x (D_1(x) \to M_1(x))$$

1	$D_1(x)$		
2	$\forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))$ DPI		
3	$(S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x))$	$\forall E, 2$	
4	$S_1(x) \wedge \neg M_1(x)$		
5	$S_1(x)$	$\wedge E, 4$	
6	$\forall a(S_1(a) o A_2(a,a))$	DPII	
7	$S_1(x) \to A_2(x,x)$	$\forall E, 6$	
8	$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 5, 7	
9	$A_2(a,b) \leftrightarrow (A_1(a) \land C_2(b,a))$	D4b	
10	$A_2(x,x) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(x,x))$	$\forall E, 9$	
11	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 8, 10	
12	$A_1(x)$	∧E, 11	
13	$\forall a(D_1(a) \to \neg A_1(a))$	A17c	
14	$D_1(x) \to \neg A_1(x)$	$\forall E, 13$	
15	$\neg A_1(x)$	⇒E, 1, 14	
16	$A_1(x) \wedge \neg A_1(x)$	$\wedge I, 12, 15$	
17		\perp E, 16	
18	$\neg S_1(x) \wedge M_1(x)$		
19	$M_1(x)$	∧E, 18	
20	$M_1(x)$	$\vee E, 3, 4-17, 18-19$	
21	$D_1(x) \to M_1(x)$	⇒I, 1–20	
22	$\forall x(D_1(x) \to M_1(x))$ $\forall I, 21$		

3.31.4 Proposition 31d (P31d)

L'amour est un mode.

$$\forall x(J_1(x) \to M_1(x))$$

1		$J_1(x)$	
2		$\forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))$	DPI
3		$(S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x))$	$\forall E, 2$
4		$S_1(x) \wedge \neg M_1(x)$	
5		$S_1(x)$	$\wedge E, 4$
6		$\forall a(S_1(a) o A_2(a,a))$	DPII
7		$S_1(x) \to A_2(x,x)$	$\forall E, 6$
8		$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 5, 7
9		$A_2(a,b) \leftrightarrow (A_1(a) \wedge C_2(b,a))$	D4b
10		$A_2(x,x) \leftrightarrow (A_1(x) \wedge C_2(x,x))$	$\forall E, 9$
11		$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	⇒E, 8, 10
12		$A_1(x)$	∧E, 11
13		$\forall a(J_1(a) \to \neg A_1(a))$	A17d
14		$J_1(x) \to \neg A_1(x)$	$\forall E, 13$
15		$\neg A_1(x)$	⇒E, 1, 14
16		$A_1(x) \wedge \neg A_1(x)$	$\wedge I, 12, 15$
17		Т	$\perp E, 16$
18		$\neg S_1(x) \wedge M_1(x)$	
19		$M_1(x)$	∧E, 18
20		$M_1(x)$	$\vee E,3,417,1819$
21	$J_1(x) o M_1(x)$		\Rightarrow I, 1–20
22	$\forall x$	$(J_1(x) \to M_1(x))$	$\forall I, 21$

3.32 Proposition 32 (P32)

La volonté ne peut être appelée cause libre.

$$\forall x(W_1(x) \to (\neg B_1(x) \land N_1(x)))$$

```
W_1(x)
            W_1(x) \rightarrow M_1(x)
            M_1(x)
                                                                                    \RightarrowE, 1, 2
3
               B_1(x)
                 B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))
6
                 K_2(x, x) \land \neg \exists y(y \neq x \land K_2(y, x))
                                                                                    ⇒E, 4, 5
                 \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y, x))
                                                                                    ∧E, 6
                 \forall z \exists g(G_1(g) \land K_2(g, z))
9
                 \exists q(G_1(q) \land K_2(q, x))
                                                                                    ∀E, 8
10
                    G_1(g) \wedge K_2(g, x)
11
                                                                                    ∧E, 10
                      G_1(g)
                                                                                    ∧E. 10
12
                      K_2(q, x)
13
                      G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \rightarrow A_2(y,g)))
                                                                                    D6
14
                      S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \rightarrow A_2(y, g))
                                                                                    ⇒E, 11, 13
                      S_1(g)
15
                                                                                    ∧E, 14
16
                        g = x
17
                                                                                    16,15
                          S_1(x)
                          \forall z((S_1(z) \land \neg M_1(z)) \lor (\neg S_1(z) \land M_1(z)))
18
                                                                                    DPI
                          (S_1(x) \wedge \neg M_1(x)) \vee (\neg S_1(x) \wedge M_1(x))
                                                                                    ∀E, 18
20
                           M_1(x)
                                                                                    R, 3
                             S_1(x) \wedge \neg M_1(x)
21
22
                               \neg M_1(x)
                                                                                    ∧E, 21
23
                               M_1(x) \wedge \neg M_1(x)
                                                                                    ∧I, 20, 22
24
                                                                                    ±E, 23
                              \neg S_1(x) \wedge M_1(x)
                                                                                    ∧E. 25
26
                               \neg S_1(x)
27
                               S_1(x)
                                                                                    R, 17
                               S_1(x) \wedge \neg S_1(x)
                                                                                    ∧I, 27, 26
                                                                                    ⊥E, 28
29
30
                                                                                    VE, 19, 21-24, 25-29
                                                                                    ¬I, 16–30
31
                      g \neq x
32
                      g \neq x \wedge K_2(g, x)
                                                                                    ∧I, 31, 12
33
                                                                                    ∃I, 32
34
                      \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y, x))
                      \exists y(y \neq x \land K_2(y,x)) \land \neg \exists y(y \neq x \land K_2(y,x))
35
                                                                                   ∧I, 33, 34
36
                                                                                    ∃E, 9, 10–36
37
38
                                                                                    ¬I, 4-37
             N_1(x) \leftrightarrow \exists y(y \neq x \land K_2(y, x))
                                                                                    D7b
                                                                                   P16
            \forall z \exists q (G_1(q) \land K_2(q, z))
40
41
             \exists g(G_1(g) \land K_2(g,x))
                                                                                    ∀E, 40
               G_1(g) \wedge K_2(g, x)
                                                                                   ∧E, 42
43
                G_1(g)
44
                K_2(g, x)
                                                                                    ∧E, 42
                 G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \rightarrow A_2(y,g)))
                 S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))
                                                                                    ⇒E, 43, 45
46
47
                S_1(g)
                                                                                    ∧E, 46
48
                   g = x
                                                                                    48,47
49
                      S_1(x)
50
                      \forall z((S_1(z) \land \neg M_1(z)) \lor (\neg S_1(z) \land M_1(z)))
                                                                                    DPI
51
                      (S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x))
                                                                                    \forall E, 50
52
                      M_1(x)
                                                                                    R. 3
53
                       S_1(x) \wedge \neg M_1(x)
                                                                                    ∧E, 53
54
                           \neg M_1(x)
55
                         M_1(x) \wedge \neg M_1(x)
                                                                                    ∧I. 52, 54
                                                                                    \perpE, 55
                        \neg S_1(x) \land M_1(x)
\neg S_1(x)
57
58
                                                                                    ∧E, 57
                                                                                    R, 49
60
                          S_1(x) \wedge \neg S_1(x)
                                                                                    ∧I, 59, 58
61
                                                                                    ⊥E, 60
                                                                                   ∨E, 51, 53–56, 57–61
62
63
                                                                                    ¬I. 48–62
64
                g \neq x \wedge K_2(g, x)
                                                                                    ∧I, 63, 44
65
                \exists y(y \neq x \land K_2(y, x))
                                                                                    ∃I, 64
                                                                                    ⇒E, 65, 39
66
                N_1(x)
67
                                                                                    \exists E,\,41,\,42\text{--}66
                                                                                   ∧I, 38, 67
            \neg B_1(x) \wedge N_1(x)
       W_1(x) \rightarrow (\neg B_1(x) \wedge N_1(x))
                                                                                    ⇒I. 1-68
69
       \forall x(W_1(x) \to (\neg B_1(x) \land N_1(x)))
                                                                                    ∀I, 69
```

3.33 Proposition 33 (P33)

Les choses n'auraient pu être produites par Dieu d'aucune autre manière.

$$\forall g \forall y (G_1(g) \land K_2(g,y) \to \neg M(\exists z (z \neq y \land K_2(g,z))))$$

Note: Jarrett indique explicitement que cette proposition n'est pas dérivable du système formel tel qu'il a été présenté. Pour démontrer cette proposition, il serait nécessaire d'ajouter des axiomes supplémentaires qui formaliseraient le nécessitarisme divin de Spinoza.

Nous pourrions, par exemple, ajouter l'axiome suivant : $\mathbf{R11}: \forall g \forall y \forall z (G_1(g) \land K_2(g,y) \land K_2(g,z) \rightarrow (y=z \lor \neg (\exists v(v=y)) \lor \neg (\exists v(v=z))))$ qui stipule que si Dieu cause deux choses, elles sont soit identiques, soit l'une d'entre elles n'existe pas.

3.34 Proposition 34 (P34)

La puissance de Dieu est son essence même.

$$\exists g(G_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g)))$$

```
\exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                                              P14-A
2
             \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = g)
                                                                                                              ∀E, 2
3
             G_1(g) \leftrightarrow g = g
                                                                                                              Réflexivité
4
             g = g
5
             G_1(g)
                                                                                                              ⇒E. 4. 3
6
             G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g)))
                                                                                                              D6
             S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))
                                                                                                              \RightarrowE, 5, 6
             S_1(g)
                                                                                                              ^E, 7
                   A_2(x,g)
10
                   A_2(x,g) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(g,x))
                   A_1(x) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                              ⇒E, 9, 10
11
12
                   A_1(x)
                                                                                                              ∧E, 11
                                                                                                              ∧E, 11
13
                   C_2(g,x)
                                                                                                              DP7
14
                   \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
15
                   A_2(x, g) \wedge S_1(g) \rightarrow x = g
                                                                                                             \forall E, 14
                                                                                                              ∧I, 9, 8
16
                   A_2(x,g) \wedge S_1(g)
17
                   x = g
                                                                                                              \RightarrowE, 16, 15
                   S_1(g) \leftrightarrow (I_2(g,g) \wedge C_2(g,g))
18
                                                                                                              ⇒E, 8, 18
                   I_2(g,g) \wedge C_2(g,g)
19
20
                   I_2(g,g)
                                                                                                              ∧E, 19
21
                   C_2(g,g)
                                                                                                              ∧E, 19
                   I_2(x,g)
                                                                                                              17.20
22
23
                   C_2(x,g)
                                                                                                              17.21
24
                   I_2(g, x)
                                                                                                              17,20
                   C_2(g,x)
                                                                                                              R. 13
25
26
                   (((I_2(x,g) \land C_2(x,g)) \land I_2(g,x)) \land C_2(g,x)) \leftrightarrow P_2(x,g)
                                                                                                             A19
27
                   ((I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)) \wedge I_2(g,x)) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                             ∧I, 22, 23, 24, 25
28
                  P_2(x, g)
                                                                                                             ⇒E, 27, 26
29
             A_2(x,g) \rightarrow P_2(x,g)
                                                                                                              \RightarrowI, 9–28
                  P_2(x, g)
30
31
                   (((I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)) \wedge I_2(g,x)) \wedge C_2(g,x)) \leftrightarrow P_2(x,g)
                                                                                                             A19
32
                   ((I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)) \wedge I_2(g,x)) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                              ⇒E, 30, 31
                   I_2(x,g) \wedge C_2(x,g) \wedge I_2(g,x) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                              Logique, 32
33
34
                   I_2(x,g)
                                                                                                              ∧E, 33
                   C_2(x,g)
                                                                                                              ∧E, 33
35
                                                                                                              ∧E, 33
36
                   I_2(g, x)
37
                   C_2(g,x)
                                                                                                              ∧E, 33
38
                   A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))
                                                                                                             D4a
39
                   \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x)) \to A_1(x)
                                                                                                             ∧E. 38
                   S_1(g) \wedge I_2(x,g) \wedge C_2(x,g) \wedge I_2(g,x) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                             \land I,\, 8,\, 34,\, 35,\, 36,\, 37
                   \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))
                                                                                                             ∃I, 40
41
                                                                                                              ⇒E, 41, 39
42
                   A_1(x)
43
                   A_1(x) \wedge C_2(g,x)
                                                                                                              \wedge I,\ 42,\ 37
                   A_2(x,g) \leftrightarrow (A_1(x) \wedge C_2(g,x))
                                                                                                              D4b
44
                                                                                                              ⇒E, 43, 44
45
                  A_2(x, g)
             P_2(x,g) \to A_2(x,g)
                                                                                                              ⇒I, 30–45
                                                                                                              ⇒I, 29, 46
47
             A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g)
                                                                                                              ∀I, 47
48
             \forall x (A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g))
                                                                                                              \wedge I, 5, 48
             G_1(g) \wedge \forall x (A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g))
                                                                                                              ∃I, 49
             \exists g(G_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g)))
       \exists g(G_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \leftrightarrow P_2(x,g)))
                                                                                                              \exists E,\,1,\,2\text{--}50
```

3.35 Proposition 35 (P35)

Tout ce qui existe est nécessaire.

$$\exists g(G_1(g) \land L(\exists x(x=g)) \land (\forall x(x \neq g \rightarrow N_1(x))))$$

1	$\mid \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)$	P14-A
2	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
3	$G_1(g) \leftrightarrow g = g$	$\forall E, 2$
4	g = g	Réflexivité
5	$G_1(g)$	\Rightarrow E, 4, 3
6	$L(\exists x(G_1(x)))$	P11
7	$\exists x(G_1(x))$	
8	$G_1(h)$	
9	$G_1(h) \leftrightarrow h = g$	$\forall E, 2$
10		\Rightarrow E, 8, 9
11	$\exists x(x=g)$	∃I, 10
12	$\exists x(x=g)$	$\exists E,\ 7,\ 811$
13	$(\exists x(G_1(x))) \to (\exists x(x=g))$	\Rightarrow I, 7–12
14	$L((\exists x(G_1(x))) \to (\exists x(x=g)))$	R5, 13
15	$L(\exists x(G_1(x))) \to L(\exists x(x=g))$	R3, 14
16	$L(\exists x(x=g))$	\Rightarrow E, 6, 15
17	$x \neq g$	
18	$\forall z \exists h (G_1(h) \land K_2(h, z))$	P16
19	$\exists h(G_1(h) \land K_2(h,x))$	$\forall E, 18$
20	$G_1(h) \wedge K_2(h,x)$	
21	$G_1(h)$	$\wedge E$, 20
22	$K_2(h,x)$	$\wedge E$, 20
23	$G_1(h) \leftrightarrow h = g$	$\forall E, 2$
24	h = g	\Rightarrow E, 21, 23
25	$K_2(g,x)$	24,22
26	$x \neq g$	R, 17
27	$g \neq x$ $g \neq x \land K_2(g, x)$ $\exists y(y \neq x \land K_2(y, x))$ $N_1(x) \leftrightarrow \exists y(y \neq x \land K_2(y, x))$ $N_1(x)$	Symétrie, 26
28	$g \neq x \wedge K_2(g, x)$	$\land I,\ 27,\ 25$
29	$\exists y(y \neq x \land K_2(y,x))$	$\exists I, 28$
30	$ N_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land K_2(y, x)) $	D7b
31	$N_1(x)$	\Rightarrow E, 29, 30
32	$N_1(x)$	$\exists E, 19, 20–31$
33	$x \neq g \to N_1(x)$	⇒I, 17–32
34	$\forall x (x \neq g \to N_1(x))$	$\forall I, 33$
35	$G_1(g) \wedge L(\exists x(x=g)) \wedge (\forall x(x \neq g \to N_1(x)))$	$\land I,5,16,34$
36	$\exists g(G_1(g) \land L(\exists x(x=g)) \land (\forall x(x \neq g \rightarrow N_1(x))))$	$\exists I, 35$
37	$\exists g(G_1(g) \land L(\exists x(x=g)) \land (\forall x(x \neq g \rightarrow N_1(x))))$	$\exists E, 1, 2-36$

3.36 Proposition 36 (P36)

Il n'existe rien dont la nature ne produise quelque effet.

$$\forall x((\exists v(v=x)) \to \exists y(K_2(x,y)))$$

Note: Jarrett indique explicitement que cette proposition n'est pas dérivable du système formel tel qu'il a été présenté. Pour démontrer cette proposition, il serait nécessaire d'ajouter des axiomes supplémentaires concernant la nature productive de toute chose dans le système spinoziste, notamment concernant la productivité causale des modes.

On pourrait esquisser la forme que prendrait une telle preuve :

1	$\exists v(v=x)$			
2	$\forall z (S_1(z) \lor M_1(z))$	DP5		
3	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\forall E, 2$		
4	$S_1(x)$			
5	$\forall z(S_1(z) \leftrightarrow K_2(z,z))$	DPIII		
6	$S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x)$	$\forall E, 5$		
7	$K_2(x,x)$	\Rightarrow E, 4, 6		
8	$\exists y(K_2(x,y))$	∃I, 7		
9	$M_1(x)$			
10	$M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	D5b		
11	$\exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	\Rightarrow E, 9, 10		
12	$S_1(s) \wedge M_2(x,s)$			
13	$S_1(s)$	$\wedge E$, 12		
14	$M_2(x,s)$	$\wedge E$, 12		
15	$orall z(S_1(z) o K_2(z,z))$	DP4		
16	$S_1(s) o K_2(s,s)$	$\forall E, 15$		
17	$K_2(s,s)$	\Rightarrow E, 13, 16		
18	$M_2(x,s) \leftrightarrow (x \neq s \land I_2(x,s) \land C_2(x,s))$	D5a		
19	$x \neq s \land I_2(x,s) \land C_2(x,s)$	⇒E, 14, 18		
20	$igg I_2(x,s)$	∧E, 19		
21	$C_2(x,s)$	∧E, 19		
22	$orall z \exists g (G_1(g) \wedge K_2(g,z))$	P16		
23	$\exists g(G_1(g) \land K_2(g,x))$	$\forall E, 22$		
24	Nécessite d'axiomes supplémentaires concernant la productivité causale			
25	$\exists y(K_2(x,y))$	Incomplet		
26	$\exists y(K_2(x,y))$	$\exists E, 11, 12–25$		
27	$\exists y(K_2(x,y))$	$\lor E,3,48,926$		
28	$(\exists v(v=x)) \to \exists y(K_2(x,y))$	\Rightarrow I, 1–27		
29	$\forall x((\exists v(v=x)) \to \exists y(K_2(x,y)))$	$\forall I, 28$		

Références

- [1] Spinoza, Baruch. Éthique, traduit du latin par Charles Appuhn. Paris : GF-Flammarion, 1965.
- [2] Spinoza, Baruch. *The Collected Works of Spinoza*, édité et traduit par Edwin Curley. Princeton : Princeton University Press, 1985.
- [3] Jarrett, Charles. "The Logical Structure of Spinoza's 'Ethics', Part I." Synthese, vol. 37, no. 1, 1978, pp. 15–65.
- [4] Guéroult, Martial. Spinoza I: Dieu (Éthique, I). Paris: Aubier-Montaigne, 1968.
- [5] Bennett, Jonathan. A Study of Spinoza's Ethics. Indianapolis: Hackett, 1984.
- [6] Mélès, Baptiste. "Pratique mathématique et lecture de Spinoza." Méthodos, no. 19, 2019.
- [7] Mélès, Baptiste. "L'Ethique de Spinoza en Coq." GitHub Repository, 2017-2018. https://github.com/BapMel/ethicoq.
- [8] Gentzen, Gerhard. "Investigations into Logical Deduction." In The Collected Papers of Gerhard Gentzen, édité par M. E. Szabo. Amsterdam: North-Holland, 1969.
- [9] Fitting, Melvin. Proof Methods for Modal and Intuitionistic Logics. Dordrecht: Reidel, 1983.
- [10] Lassaigne, R. et de Rougemont, M. (2004). Logique et fondements de l'informatique : logique du premier ordre, théorie des modèles, calculabilité, lambda-calcul et programmation fonctionnelle, complexité, logiques non classiques, déduction naturelle. Hermes Science Publications, Paris.
- [11] Cori, René, et Daniel Lascar. Logique mathématique. Paris : Dunod, 2003.
- [12] Coq Development Team. "The Coq Proof Assistant." https://coq.inria.fr/.
- [13] Pommeret, Luc. "Projet Spinoza : Formalisation en Coq des propositions du Livre I de l'Éthique." GitHub Repository, 2025. https://github.com/l-pommeret/Projet-Spinoza.
- [14] Coquand, Thierry, et Gérard Huet. "The Calculus of Constructions." Information and Computation, 1988.
- [15] Vidal-Rosset, Joseph. "L'argument d'Anselme en logique du premier ordre" Klesis Revue philosophique, 2020.