Preuves en Déduction Naturelle pour le système de Spinoza

D'après la formalisation de Jarrett

28 février 2025

Table des matières

1	Intr	roduction
2		ation et symboles
	2.1	Lexique
		2.1.1 Opérateurs modaux
	2.2	Règles modales
		2.2.1 Prédicats unaires
		2.2.2 Prédicats binaires
		2.2.3 Prédicats ternaires
	2.3	Définitions
	2.4	Axiomes
3	Pre	uves en déduction naturelle
•	3.1	Proposition 1 (P1)
	3.2	Proposition 2 (P2)
	3.3	Proposition 3 (P3)
	3.4	Lemmes intermédiaires
	5.4	3.4.1 Lemme DP1
		3.4.2 Lemme DP4
		3.4.3 Lemme DP5
		3.4.4 Lemme DP6
	0 -	3.4.5 Lemme DP7
	3.5	Théorème DPI
	3.6	Théorème DPII
	3.7	Théorème DPIII
	3.8	Proposition 4 (P4)
	3.9	Proposition 5 (P5)
		Proposition 6 (P6)
		Corollaire de la Proposition 6 (P6c)
	3.12	Proposition 7 (P7)
	3.13	Proposition 8 (P8)
	3.14	Proposition 9 (P9)
	3.15	Proposition 10 (P10)
	3.16	Proposition 11 (P11)
	3.17	Proposition 12 (P12)
		Proposition 13 (P13)
		Proposition 14 (P14)
		Proposition 14-A (P14-A)
		Proposition 15 (P15)
		Proposition 16 (P16)
		Proposition 17 (P17)
		Corollaire 2 de la Proposition 17 (P17c2)
		Proposition 18 (P18)
		Proposition 19 (P19)
		Proposition 20 (P20)
		1 ()
		1 ()
		Proposition 22 (P22)
	-3-30	Prodosition 72 (P72)

1 Introduction

Ce document présente les preuves en déduction naturelle (système DN) pour les propositions principales de l'Éthique de Spinoza, d'après la formalisation de Charles Jarrett présentée dans The Logical Structure of Spinoza's Ethics, Part I.

2 Notation et symboles

2.1 Lexique

2.1.1 Opérateurs modaux

- L(p): Nécessité logique p est logiquement nécessaire
- M(p): Possibilité p est possible
- N(p): Nécessité naturelle p est naturellement nécessaire

2.2 Règles modales

- **R1**: $\forall P(L(P) \rightarrow N(P))$
 - La nécessité logique implique la nécessité naturelle
- $-\mathbf{R2}: \forall P(N(P) \to P)$
 - Axiome T pour la nécessité naturelle
- **R3**: $\forall P \forall Q (L(P \rightarrow Q) \rightarrow (L(P) \rightarrow L(Q)))$
 - Axiome K pour la nécessité logique
- **R4**: $\forall P(M(P) \rightarrow L(M(P)))$
 - Axiome S5 possibilité et nécessité
- **R5** : $\forall P(P \rightarrow L(P))$
 - Règle de nécessitation
- **R6**: $\forall P \forall Q(N(P \rightarrow Q) \rightarrow (N(P) \rightarrow N(Q)))$
 - Axiome de distributivité pour la nécessité naturelle

2.2.1 Prédicats unaires

- $-A_1(x): x \text{ est un attribut}$
- $-B_1(x): x \text{ est libre}$
- $D_1(x): x$ est une instance de désir
- $-E_1(x): x \text{ est éternel}$
- $-F_1(x): x \text{ est fini}$
- $-G_1(x): x \text{ est un dieu}$
- $J_1(x): x$ est une instance d'amour
- $-K_1(x): x$ est une idée
- $-M_1(x): x \text{ est un mode}$
- $-N_1(x): x$ est nécessaire
- $S_1(x): x$ est une substance
- $-T_1(x): x \text{ est vrai}$
- $U_1(x): x$ est un intellect
- $-W_1(x): x \text{ est une volonté}$

2.2.2 Prédicats binaires

- $-A_2(x,y): x \text{ est un attribut de } y$
- $-C_2(x,y): x \text{ est conçu à travers } y$
- $-I_2(x,y): x \text{ est en } y$
- $-K_2(x,y): x \text{ est cause de } y$
- $-L_2(x,y): x \text{ limite } y$
- $-M_2(x,y): x \text{ est un mode de } y$
- $O_2(x,y) : x \text{ est un objet de } y$
- $-P_2(x,y): x \text{ est la puissance de } y$
- $-R_2(x,y): x$ a plus de réalité que y
- $V_2(x,y): x$ a plus d'attributs que y

2.2.3 Prédicats ternaires

- $-C_3(x,y,z): x$ est commun à y et à z
- $D_3(x,y,z): x$ est divisible entre y et z

2.3 Définitions

- $-\mathbf{D1}: K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)) \leftrightarrow L(\exists y (y=x))$
 - Causa sui ce dont l'essence implique l'existence
- $\mathbf{D2} : F_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land L_2(y, x) \land \forall z (A_2(z, x) \leftrightarrow A_2(z, y)))$
 - Une chose est finie quand elle peut être limitée par une autre de même nature
- $\mathbf{D3} : S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$
 - Une substance est ce qui est en soi et est conçu par soi
- **D4a**: $A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$
 - Un attribut est ce que l'intellect perçoit de la substance comme constituant son essence
- **D4b** : $A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(y,x))$
 - x est un attribut de y
- **D5a**: $M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$
 - Un mode est ce qui est dans autre chose et est conçu par elle
- **D5b**: $M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$
 - x est un mode
- $\mathbf{D6} : G_1(x) \leftrightarrow (S_1(x) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,x)))$
 - Dieu est une substance constituée d'une infinité d'attributs
- **D7a**: $B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))$
 - Une chose est libre quand elle n'est cause que d'elle-même
- **D7b** : $N_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land K_2(y, x))$
 - Une chose est nécessaire quand elle est déterminée par autre chose
- $\mathbf{D8} : E_1(x) \leftrightarrow L(\exists v(v=x))$
 - L'éternité est l'existence même en tant que nécessaire

2.4 Axiomes

- **A1**: $\forall x(I_2(x,x) \vee \exists y(y \neq x \wedge I_2(x,y)))$
 - Tout ce qui est, est soit en soi, soit en autre chose
- **A2**: $\forall x((\neg \exists y(y \neq x \land C_2(x,y))) \leftrightarrow C_2(x,x))$
 - Ce qui ne peut être conçu par un autre doit être conçu par soi
- **A3**: $\forall x \forall y (K_2(y,x) \rightarrow N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x)))$
 - D'une cause déterminée suit nécessairement un effet
- **A4**: $\forall x \forall y (K_2(x,y) \leftrightarrow C_2(y,x))$
 - La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause
- $\mathbf{A5} : \forall x \forall y ((\neg \exists z (C_3(z, x, y))) \leftrightarrow (\neg C_2(x, y) \land \neg C_2(y, x)))$
 - Les choses qui n'ont rien en commun ne peuvent être conçues l'une par l'autre
- **A6**: $\forall x(K_1(x) \rightarrow (T_1(x) \leftrightarrow \exists y(O_2(y,x) \land K_2(x,y))))$
 - L'idée vraie doit s'accorder avec son objet
- **A7**: $\forall x (M(\neg \exists y (y = x)) \leftrightarrow \neg L(\exists y (y = x)))$
 - Si une chose peut être conçue comme non existante, son essence n'implique pas l'existence
- $-\mathbf{A8}: \forall x \forall y (I_2(x,y) \to C_2(x,y))$
 - Si x est en y alors x est conçu par y
- **A9** : $\forall x(\exists y(A_2(y,x)))$
 - Toute chose a un attribut
- **A10**: $\forall x \forall y \forall z (D_3(x,y,z) \rightarrow M(\neg \exists w(w=x)))$
 - Si x est divisible en y et z alors il est possible que x n'existe pas
- - Si x est une substance et y limite x alors y est une substance
- **A12**: $\forall x((\exists y(M_2(x,y))) \rightarrow M_1(x))$
 - Si x est un mode de quelque chose alors x est un mode
- **A13** : $M(\exists x(G_1(x)))$
 - Il est possible qu'un Dieu existe
- **A14**: $\forall x (N(\exists y (y = x)) \leftrightarrow \neg F_1(x))$
 - x existe nécessairement si et seulement si x n'est pas fini

3 Preuves en déduction naturelle

3.1 Proposition 1 (P1)

Si x est un mode de y et y est une substance, alors x est en y et y est en soi.

$$\forall x \forall y (M_2(x,y) \land S_1(y) \rightarrow I_2(x,y) \land I_2(y,y))$$

3.2 Proposition 2 (P2)

Deux substances ayant des attributs différents n'ont rien en commun entre elles.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$$

1	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	
2	$S_1(x)$	$\wedge E$, 1
3	$S_1(y)$	$\wedge E$, 1
4	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
5	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \wedge C_2(x,x))$	D3
6	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 2, 5
7	$C_2(x,x)$	$\wedge E, 6$
8	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3
9	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 3, 8
10	$C_2(y,y)$	$\wedge E, 9$
11	$(\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))) \leftrightarrow C_2(x, x)$	A2
12	$C_2(x,x) \to \neg \exists z (z \neq x \land C_2(x,z))$	∧E, 11
13	$\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	\Rightarrow E, 7, 12
14	$\neg (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\forall E, 13$
15	$y \neq x \rightarrow \neg C_2(x, y)$	⇒E, 14
16	$x \neq y \to y \neq x$	Logique
17	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
18	$y \neq x$	\Rightarrow E, 17, 16
19	$\neg C_2(x,y)$	\Rightarrow E, 18, 15
20	$(\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
21	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge E$, 20
22	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	⇒E, 10, 21
23	$\neg(x \neq y \land C_2(y, x))$	$\forall E, 22$
24	$x \neq y \to \neg C_2(y, x)$	⇒E, 23
25	$\neg C_2(y,x)$	\Rightarrow E, 4, 24
26	$(\neg \exists z (C_3(z, x, y))) \leftrightarrow (\neg C_2(x, y) \land \neg C_2(y, x))$	A5
27	$(\neg C_2(x,y) \land \neg C_2(y,x)) \to \neg \exists z (C_3(z,x,y))$	$\wedge E, 26$
28	$\neg C_2(x,y) \land \neg C_2(y,x)$	$\land I,\ 19,\ 25$
29	$\neg \exists z (C_3(z, x, y))$	⇒E, 28, 27
30	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y))$	\Rightarrow I, 1–29
31	$\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \to \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$	$\forall I, 30$
32	$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (C_3(z, x, y)))$	∀I, 31

3.3 Proposition 3 (P3)

Des choses qui n'ont rien en commun entre elles ne peuvent être cause l'une de l'autre.

$$\forall x \forall y (\neg \exists z (C_3(z, x, y)) \rightarrow \neg K_2(x, y) \land \neg K_2(y, x))$$

3.4 Lemmes intermédiaires

3.4.1 Lemme DP1

x est une substance si et seulement si x est en soi.

$$\forall x(S_1(x) \leftrightarrow I_2(x,x))$$

3.4.2 Lemme DP4

Une substance est sa propre cause.

$$\forall x(S_1(x) \to K_2(x,x))$$

$$\begin{array}{c|cccc}
1 & & & & & & & & & & & & \\
2 & & & & & & & & & & & \\
3 & & & & & & & & & & \\
3 & & & & & & & & & \\
4 & & & & & & & & \\
4 & & & & & & & & \\
5 & & & & & & & \\
4 & & & & & & & \\
5 & & & & & & \\
6 & & & & & & \\
6 & & & & & & \\
7 & & & & & & \\
8 & & & & & \\
8 & & & & & \\
8 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & & \\
9 & & \\
9 & & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\
9 & & \\$$

3.4.3 Lemme DP5

Toute chose est soit une substance soit un mode. $\,$

$$\forall x (S_1(x) \vee M_1(x))$$

1	$\forall x (I_2(x,x) \vee \exists y (y \neq x \wedge I_2(x,y)))$	A1
2	$I_2(x,x) \vee \exists y (y \neq x \wedge I_2(x,y))$	$\forall E, 1$
3	$I_2(x,x)$	
4	$S_1(x) \leftrightarrow I_2(x,x)$	DP1
5	$S_1(x)$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\vee I, 5$
7	$\exists y(y \neq x \land I_2(x,y))$	
8	$y \neq x \wedge I_2(x,y)$	
9	$y \neq x$	$\wedge E, 8$
10	$I_2(x,y)$	∧E, 8
11	$I_2(x,y) o C_2(x,y)$	A8
12	$C_2(x,y)$	⇒E, 10, 11
13	$y \neq x \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	$\land I,9,10,12$
14	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a
15	$x \neq y \leftrightarrow y \neq x$	Logique
16	$x \neq y$	\Rightarrow E, 9, 15
17	$x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	$\land I,16,10,12$
18	$M_2(x,y)$	⇒E, 17, 14
19	$(\exists y(M_2(x,y))) \to M_1(x)$	A12
20	$\exists y (M_2(x,y))$	∃I, 18
21	$M_1(x)$	\Rightarrow E, 20, 19
22	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\vee I, 21$
23	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\exists E, 7, 8\!\!-\!\!22$
24	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\vee E, 2, 3-6, 7-23$
25	$\forall x (S_1(x) \vee M_1(x))$	$\forall I, 24$

3.4.4 Lemme DP6

Une substance et un mode ne peuvent jamais être la même chose.

$$\forall x(\neg(S_1(x) \land M_1(x)))$$

1	$S_1(x) \wedge M_1(x)$	
2	$S_1(x)$	$\wedge E$, 1
3	$M_1(x)$	$\wedge E$, 1
4	$M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	D5b
5	$\exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(y) \wedge M_2(x,y)$	
7	$M_2(x,y)$	$\wedge E, 6$
8	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a
9	$x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y)$	\Rightarrow E, 7, 8
10	$x \neq y$	$\wedge E, 9$
11	$C_2(x,y)$	$\wedge E, 9$
12	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \wedge C_2(x,x))$	D3
13	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 2, 12
14	$C_2(x,x)$	$\wedge E$, 13
15	$(\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))) \leftrightarrow C_2(x, x)$	A2
16	$C_2(x,x) \to \neg \exists z (z \neq x \land C_2(x,z))$	$\wedge E$, 15
17	$\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	\Rightarrow E, 14, 16
18	$\neg (y \neq x \land C_2(x,y))$	$\forall E, 17$
19	$y \neq x \leftrightarrow x \neq y$	Logique
20	$y \neq x$	\Rightarrow E, 10, 19
21	$y \neq x \land C_2(x,y)$	$\wedge I, 20, 11$
22		$\wedge I$, 18, 21
23	<u> </u> _	$\perp E, 22$
24		$\exists E, 5, 623$
25	$\neg (S_1(x) \land M_1(x))$	$\neg I,\ 124$
26	$\forall x (\neg (S_1(x) \land M_1(x)))$	$\forall I, 25$

3.4.5 Lemme DP7

Si x est un attribut de y et y est une substance, alors x=y.

$$\forall x \forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$$

1	$A_2(x,y) \wedge S_1(y)$	
2	$A_2(x,y)$	∧E, 1
3	$S_1(y)$	∧E, 1
4	$A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \land C_2(y,x))$	D4b
5	$A_1(x) \wedge C_2(y,x)$	\Rightarrow E, 2, 4
6	$C_2(y,x)$	$\wedge E, 5$
7	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3
8	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 3, 7
9	$C_2(y,y)$	$\wedge E, 8$
10	$(\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))) \leftrightarrow C_2(y, y)$	A2
11	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge E$, 10
12	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	⇒E, 9, 11
13	$\neg(x \neq y \land C_2(y, x))$	$\forall E, 12$
14	$x \neq y \to \neg C_2(y, x)$	⇒E, 13
15	$C_2(y,x) \to \neg (x \neq y)$	Contraposée
16	$C_2(y,x)$	R, 6
17	$\neg(x \neq y)$	\Rightarrow E, 16, 15
18	x = y	¬E, 17
19	$A_2(x,y) \wedge S_1(y) \to x = y$	\Rightarrow I, 1–18
20	$\forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$	$\forall I, 19$
21	$\forall x \forall y (A_2(x,y) \land S_1(y) \to x = y)$	$\forall I, 20$

3.5 Théorème DPI

Tout est soit une substance, soit un mode, mais pas les deux.

$$\forall x ((S_1(x) \land \neg M_1(x)) \lor (\neg S_1(x) \land M_1(x)))$$

3.6 Théorème DPII

Une substance est ses propres attributs.

$$\forall x(S_1(x) \to A_2(x,x))$$

1	$S_1(x)$	
2	$A_2(x,y) \leftrightarrow (A_1(x) \wedge C_2(y,x))$	D4b
3	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \wedge C_2(x,x))$	D3
4	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 1, 3
5	$C_2(x,x)$	$\wedge E, 4$
6	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	
7	$A_2(x,x)$	\Rightarrow E, 6, 2
8	$A_1(x) \wedge C_2(x,x) \rightarrow A_2(x,x)$	⇒I, 6–7
9	$A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	D4a
10	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x)) \rightarrow A_1(x)$	$\wedge E, 9$
11	$S_1(x) \wedge I_2(x,x) \wedge C_2(x,x) \wedge I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	$\land I,1,4,4$
12	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	∃I, 11
13	$A_1(x)$	\Rightarrow E, 12, 10
14	$A_1(x) \wedge C_2(x,x)$	$\wedge I$, 13, 5
15	$A_2(x,x)$	⇒E, 14, 8
16	$S_1(x) o A_2(x,x)$	\Rightarrow I, 1–15
17	$\forall x(S_1(x) \to A_2(x,x))$	$\forall I, 16$

3.7 Théorème DPIII

Quelque chose est une substance si et seulement si elle est causa sui.

$$\forall x(S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x))$$

3.8 Proposition 4 (P4)

Deux ou plusieurs choses distinctes ne peuvent se distinguer que par la diversité des attributs de leurs substances, ou par la diversité des affections de ces mêmes substances.

$$\forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))$$

```
1
2
                                                                                                                                                                                                                  DPI
              \forall a((S_1(a) \land \neg M_1(a)) \lor (\neg S_1(a) \land M_1(a)))
3
              (S_1(x) \wedge \neg M_1(x)) \vee (\neg S_1(x) \wedge M_1(x))
                                                                                                                                                                                                                  ∀E. 2
                   S_1(x) \wedge \neg M_1(x)
4
5
                    S_1(x)
                                                                                                                                                                                                                  ∧E, 4
                                                                                                                                                                                                                  \forall E, 2
6
                    (S_1(y) \land \neg M_1(y)) \lor (\neg S_1(y) \land M_1(y))
7
                         S_1(y) \wedge \neg M_1(y)
8
                         S_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧E. 7
                         \forall a(S_1(a) \to A_2(a,a))
                                                                                                                                                                                                                  DPII
10
                         S_1(x) \to A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                                  \forall E, 9
11
                         A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                                  \RightarrowE, 5, 10
                         S_1(y) \to A_2(y,y)
12
                                                                                                                                                                                                                  ∀E. 9
13
                         A_2(y,y)
                                                                                                                                                                                                                  \RightarrowE, 8, 12
14
                         A_2(x,x) \wedge A_2(y,y) \wedge x \neq y
                                                                                                                                                                                                                  \wedge I,\ 11,\ 13,\ 1
15
                         \exists z \exists z' (A_2(z, x) \land A_2(z', y) \land z \neq z')
                                                                                                                                                                                                                  ∃I, 14
                         \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
16
                                                                                                                                                                                                                  ∨I, 15
17
                          \neg S_1(y) \wedge M_1(y)
                         M_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧E, 17
18
                         A_2(x,x)
                                                                                                                                                                                                                  ⇒E, 5, 10
19
                                                                                                                                                                                                                  \wedge I, 19, ??, 18
20
                         A_2(x,x) \wedge x = x \wedge M_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∃I 20
                         \exists z \exists z' (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y))
21
22
                         \exists z\exists z'((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                                  VI. 21
                    \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
23
                                                                                                                                                                                                                  \vee E,\ 6,\ 7\text{--}16,\ 17\text{--}22
24
                    \neg S_1(x) \wedge M_1(x)
                    M_1(x)
25
                                                                                                                                                                                                                  \wedge E, 24
                    (S_1(y) \wedge \neg M_1(y)) \vee (\neg S_1(y) \wedge M_1(y))
                                                                                                                                                                                                                  ∀E. 2
26
                         S_1(y) \wedge \neg M_1(y)
27
28
                         S_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧E, 27
29
                         S_1(y) \to A_2(y,y)
                                                                                                                                                                                                                  ∀E, 9
                                                                                                                                                                                                                  \RightarrowE, 28, 29
30
                         A_2(y,y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧I, 30, ??, 25
31
                         A_2(y,y) \wedge y = y \wedge M_1(x)
32
                         \exists z \exists z' (A_2(z', y) \land z' = y \land M_1(x))
                                                                                                                                                                                                                  ∃I, 31
                         \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                                  ∨I, 32
33
34
                         \neg S_1(y) \wedge M_1(y)
35
                         M_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧E, 34
36
                         M_1(x) \wedge M_1(y)
                                                                                                                                                                                                                  ∧I, 25, 35
37
                         \exists z \exists z' (M_1(x) \land M_1(y))
                                                                                                                                                                                                                  ∃I, 36
                         \exists z\exists z'((A_2(z,x)\wedge A_2(z',y)\wedge z\neq z')\vee (A_2(z,x)\wedge z=x\wedge M_1(y))\vee (A_2(z',y)\wedge z'=y\wedge M_1(x))\vee (M_1(x)\wedge M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                                  ∨I, 37
38
39
                   \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                                  \vee E,\ 26,\ 27\text{--}33,\ 34\text{--}38
              \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
40
                                                                                                                                                                                                                  VE, 3, 4-23, 24-39
41
         x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y)))
                                                                                                                                                                                                                  ⇒I, 1–40
         \forall y(x \neq y \rightarrow \exists z \exists z'((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))
                                                                                                                                                                                                                  ∀I, 41
42
43
         \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow \exists z \exists z' ((A_2(z,x) \land A_2(z',y) \land z \neq z') \lor (A_2(z,x) \land z = x \land M_1(y)) \lor (A_2(z',y) \land z' = y \land M_1(x)) \lor (M_1(x) \land M_1(y))))
                                                                                                                                                                                                                  \forall I, 42
```

3.9 Proposition 5 (P5)

Il ne peut y avoir, dans la nature des choses, deux ou plusieurs substances de même nature, ou, en d'autres termes, de même attribut.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$$

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	$S_1(x)$	$\wedge E$, 1
$\begin{array}{ c c c c c }\hline 5 & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	3	$S_1(y)$	$\wedge E$, 1
$ \begin{array}{ c c c c }\hline 6 & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	4	$x \neq y$	$\wedge E$, 1
$ \begin{array}{ c c c c c } \hline 7 & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	5	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	
$ \begin{array}{ c c c c c } 8 & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	6	$A_2(z,x) \wedge A_2(z,y)$	
9 $\forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)$ DP7 $A_2(z,x) \land S_1(x) \rightarrow z = x$ $\forall E, 9$ $A_2(z,x) \land S_1(x)$ $\land I, 7, 2$ $z = x$ $\Rightarrow E, 11, 10$ $A_2(z,y) \land S_1(y) \rightarrow z = y$ $\forall E, 9$ $A_2(z,y) \land S_1(y) \rightarrow z = y$ $\Rightarrow E, 14, 13$ $A_2(z,y) \land S_1(y)$ $\Rightarrow E, 14, 13$ $A_2(z,y) \land S_1(y)$ $\Rightarrow E, 14, 13$ $A_2(z,y) \land S_2(y)$ $A_2(z,y) \land S_2(y)$ $A_2(z,y) \land S_2(y)$ $A_2(z,y) \land S_2(z,y)$ $A_2(z,y) \land S_2(z,y)$	7	$A_2(z,x)$	$\wedge E, 6$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8	$A_2(z,y)$	$\wedge E, 6$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9	$\forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \to a = b)$	DP7
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	$A_2(z,x) \wedge S_1(x) \to z = x$	$\forall E, 9$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11	$A_2(z,x) \wedge S_1(x)$	$\wedge I, 7, 2$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12	z = x	⇒E, 11, 10
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13	$A_2(z,y) \wedge S_1(y) \to z = y$	$\forall E, 9$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14	$A_2(z,y) \wedge S_1(y)$	$\wedge I, 8, 3$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15	$ \qquad \qquad \qquad z = y$	⇒E, 14, 13
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16		$\wedge I$, 12, 15
19 $x \neq y$ R, 4 20 $x = y \land x \neq y$ \land I, 18, 19 21 \bot \bot \bot E, 20 22 \bot $\lnot \exists z (A_2(z, x) \land A_2(z, y))$ \lnot I, 5–22 23 $\lnot \exists z (A_2(z, x) \land A_2(z, y))$ \lnot I, 5–22 24 $S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \lnot \exists z (A_2(z, x) \land A_2(z, y))$ \Rightarrow I, 1–23 25 $\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \lnot \exists z (A_2(z, x) \land A_2(z, y)))$ \forall I, 24	17	x = z	12
20 $x = y \land x \neq y$ \land I, 18, 19 21 $x = y \land x \neq y$ \Rightarrow	18	x = y	17,15
21	19	$x \neq y$	R, 4
22 $\begin{vmatrix} \bot & \exists E, 5, 6-21 \\ -\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)) & \neg I, 5-22 \\ 24 & S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)) & \Rightarrow I, 1-23 \\ \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))) & \forall I, 24 \end{vmatrix}$	20		∧I, 18, 19
23	21		\perp E, 20
24 $S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z, x) \wedge A_2(z, y))$ $\Rightarrow I, 1-23$ 25 $\forall y (S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z, x) \wedge A_2(z, y)))$ $\forall I, 24$	22		$\exists E, 5, 621$
25 $\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$ $\forall I, 24$	23	$\neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	$\neg I, 5-22$
	24	$S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	\Rightarrow I, 1–23
26 $\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$ $\forall I, 25$	25	$\forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$	$\forall I, 24$
	26	$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)))$	$\forall I, 25$

3.10 Proposition 6 (P6)

Une substance ne peut être produite par une autre substance.

$$\forall x \forall y (S_1(x) \land S_1(y) \land x \neq y \rightarrow \neg (K_2(x,y) \land \neg K_2(y,x)))$$

3.11 Corollaire de la Proposition 6 (P6c)

Une substance ne peut être produite par autre chose.

$$\forall x (S_1(x) \to \neg(\exists y (y \neq x \land K_2(y, x))))$$

1		$S_1(x)$	_	
2	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \land C_2(x,x))$			D3
3		$I_2(x, x)$	$(x) \wedge C_2(x,x)$	\Rightarrow E, 1, 2
4		$C_2(x,$	x)	$\wedge E, 3$
5		$(\neg \exists z ($	$z \neq x \land C_2(x,z))) \leftrightarrow C_2(x,x)$	A2
6		$C_2(x,$	$(x) \to \neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	$\wedge E, 5$
7		$\neg \exists z (z$	$z \neq x \wedge C_2(x,z)$	\Rightarrow E, 4, 6
8		$\Box y$	$y(y \neq x \land K_2(y,x))$	
9			$y \neq x \land K_2(y, x)$	
10			$y \neq x$	$\wedge E, 9$
11			$K_2(y,x)$	$\wedge E, 9$
12			$\forall a \forall b (K_2(a,b) \leftrightarrow C_2(b,a))$	A4
13			$K_2(y,x) \leftrightarrow C_2(x,y)$	$\forall E, 12$
14			$C_2(x,y)$	⇒E, 11, 13
15			$y \neq x \land C_2(x,y)$	$\wedge I$, 10, 14
16			$\exists z(z \neq x \land C_2(x,z))$	$\exists I, 15$
17			$\neg \exists z (z \neq x \land C_2(x, z))$	R, 7
18			$\exists z(z \neq x \land C_2(x,z)) \land \neg \exists z(z \neq x \land C_2(x,z))$	$\wedge I, 16, 17$
19			上	$\perp E, 18$
20				$\exists E, 8, 9-19$
21	$\neg \exists y (y \neq x \land K_2(y, x))$			$\neg I,\ 820$
22	$S_1(x) \to \neg(\exists y (y \neq x \land K_2(y, x)))$			⇒I, 1–21
23	$\forall x (S_1(x) \to \neg(\exists y (y \neq x \land K_2(y, x)))) $ $\forall I, 22$			$\forall I, 22$

3.12 Proposition 7 (P7)

Il appartient à la nature de la substance d'exister.

$$\forall x(S_1(x) \to L(\exists y(y=x)))$$

3.13 Proposition 8 (P8)

Toute substance est nécessairement infinie.

$$\forall x(S_1(x) \to \neg F_1(x))$$

1	$S_1(x)$				
2	$F_1(x)$				
3	$F_1(x) \leftrightarrow \exists y (y \neq x \land L_2(y, x) \land \forall z (A_2(z, x) \leftrightarrow A_2(z, y)))$	D2			
4	$\exists y(y \neq x \land L_2(y,x) \land \forall z(A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y)))$	\Rightarrow E, 2, 3			
5	$y \neq x \land L_2(y,x) \land \forall z (A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y))$				
6	$y \neq x$	$\wedge E, 5$			
7	$L_2(y,x)$	$\wedge E, 5$			
8	$\forall z (A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y))$	$\wedge E, 5$			
9	$\forall a \forall b (S_1(a) \land L_2(b, a) \to S_1(b))$	A11			
10	$S_1(x) \wedge L_2(y,x) \to S_1(y)$	$\forall E, 9$			
11	$S_1(x) \wedge L_2(y,x)$	$\wedge I, 1, 7$			
12	$S_1(y)$	⇒E, 11, 10			
13		A9			
14	$\exists b(A_2(b,x))$	$\forall E, 13$			
15	$A_2(z,x)$				
16	$A_2(z,x) \leftrightarrow A_2(z,y)$	$\forall E, 8$			
17	$A_2(z,y)$	\Rightarrow E, 15, 16			
18	$A_2(z,x) \wedge A_2(z,y)$	$\wedge I, 15, 17$			
19	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	∃I, 18			
20	$\forall a \forall b (S_1(a) \land S_1(b) \land a \neq b \rightarrow \neg \exists z (A_2(z,a) \land A_2(z,b)))$	P5			
21		$\forall E, 20$			
22	$S_1(x) \wedge S_1(y) \wedge x \neq y$	$\land I,1,12,6$			
23		\Rightarrow E, 22, 21			
24	$\exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y)) \land \neg \exists z (A_2(z,x) \land A_2(z,y))$	$\wedge I, 19, 23$			
25		$\perp E, 24$			
26		$\exists E, 14, 15–25$			
27		$\exists E,4,5–26$			
28	$\neg F_1(x)$	$\neg I, \ 227$			
29	$S_1(x) \to \neg F_1(x)$	\Rightarrow I, 1–28			
30	$\forall x (S_1(x) \to \neg F_1(x))$	$\forall I, 29$			

3.14 Proposition 9 (P9)

Suivant qu'une chose a plus de réalité ou d'être, un plus grand nombre d'attributs lui appartient.

$$\forall x \forall y ((S_1(x) \land S_1(y)) \to (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y)))$$

$$\begin{array}{c|ccccc}
1 & S_1(x) \wedge S_1(y) \\
\hline
2 & \forall a \forall b ((S_1(a) \wedge S_1(b)) \rightarrow (R_2(a,b) \leftrightarrow V_2(a,b))) & A18 \\
3 & (S_1(x) \wedge S_1(y)) \rightarrow (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y)) & \forall E, 2 \\
4 & R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y) & \Rightarrow E, 1, 3 \\
5 & (S_1(x) \wedge S_1(y)) \rightarrow (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y)) & \Rightarrow I, 1-4 \\
6 & \forall y ((S_1(x) \wedge S_1(y)) \rightarrow (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y))) & \forall I, 5 \\
7 & \forall x \forall y ((S_1(x) \wedge S_1(y)) \rightarrow (R_2(x,y) \leftrightarrow V_2(x,y))) & \forall I, 6
\end{array}$$

3.15 Proposition 10 (P10)

Tout attribut d'une substance doit être conçu par soi.

$$\forall x (A_1(x) \to C_2(x,x))$$

1	$A_1(x)$			
2	$A_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	D4a		
3	$\exists y (S_1(y) \land I_2(x,y) \land C_2(x,y) \land I_2(y,x) \land C_2(y,x))$	\Rightarrow E, 1, 2		
4	$S_1(y) \wedge I_2(x,y) \wedge C_2(x,y) \wedge I_2(y,x) \wedge C_2(y,x)$			
5	$S_1(y)$	$\wedge E, 4$		
6	$C_2(y,x)$	$\wedge E, 4$		
7	$S_1(y) \leftrightarrow (I_2(y,y) \land C_2(y,y))$	D3		
8	$I_2(y,y) \wedge C_2(y,y)$	\Rightarrow E, 5, 7		
9	$C_2(y,y)$	∧E, 8		
10		A2		
11	$C_2(y,y) \to \neg \exists z (z \neq y \land C_2(y,z))$	∧E, 10		
12	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	\Rightarrow E, 9, 11		
13	$x \neq y$			
14	$x \neq y \land C_2(y,x)$	$\wedge I$, 13, 6		
15	$\exists z(z \neq y \land C_2(y,z))$	∃I, 14		
16	$\neg \exists z (z \neq y \land C_2(y, z))$	R, 12		
17	$\exists z(z \neq y \land C_2(y,z)) \land \neg \exists z(z \neq y \land C_2(y,z))$	$\wedge I$, 15, 16		
18		$\perp E, 17$		
19		$\neg I, 13-18$		
20	x = y	¬E, 19		
21	$C_2(y,y)$	R, 9		
22	$C_2(x,x)$	20,21		
23	$C_2(x,x)$			
24	$4 A_1(x) \to C_2(x, x) \qquad \Rightarrow I, 1-23$			
25	$ \forall x (A_1(x) \to C_2(x, x)) $ $\forall I, 24$			

3.16 Proposition 11 (P11)

Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement.


$$L(\exists x(G_1(x)))$$

1	$M(\exists x(G_1(x)))$	A13
2	$\exists x(G_1(x))$	
3	$G_1(g)$	
4	$G_1(x) \leftrightarrow (S_1(x) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,x)))$	D6
5	$S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))$	\Rightarrow E, 3, 4
6	$S_1(g)$	$\wedge E, 5$
7	$\forall x (S_1(x) \to L(\exists y (y=x)))$	P7
8	$S_1(g) o L(\exists y (y=g))$	$\forall E, 7$
9	$L(\exists y(y=g))$	\Rightarrow E, 6, 8
10	$\exists y(y=g)$	
11	y = g	
12	$G_1(g)$	R, 3
13	$G_1(y)$	11,12
14	$\exists x(G_1(x))$	∃I, 13
15	$\exists x (G_1(x))$	$\exists E, \ 10, \ 11-14$
16	$(\exists y(y=g)) \to (\exists x(G_1(x)))$	\Rightarrow I, 10–15
17	$L((\exists y(y=g)) \to (\exists x(G_1(x))))$	R5, 16
18	$L(\exists y(y=g)) \to L(\exists x(G_1(x)))$	R3, 17
19	$L(\exists x(G_1(x)))$	\Rightarrow E, 9, 18
20	$L(\exists x(G_1(x)))$	$\exists E,\ 2,\ 319$
21	$(\exists x(G_1(x))) \to L(\exists x(G_1(x)))$	\Rightarrow I, 2-20
22	$L((\exists x(G_1(x))) \to L(\exists x(G_1(x))))$	R5, 21
23	$M(\exists x(G_1(x))) \land L((\exists x(G_1(x))) \rightarrow L(\exists x(G_1(x))))$	$\wedge I, 1, 22$
24	$L(\exists x(G_1(x)))$	S5, 23

3.17 Proposition 12 (P12)

On ne peut concevoir selon sa véritable nature aucun attribut de la substance duquel il résulte que la substance soit divisible.

$$\forall x(S_1(x) \rightarrow \neg \exists y \exists z(D_3(x,y,z)))$$



3.18 Proposition 13 (P13)

La substance absolument infinie est indivisible.

$$\forall x (S_1(x) \land (\forall w (A_1(w) \to A_2(w, x))) \to \neg \exists y \exists z (D_3(x, y, z)))$$

3.19 Proposition 14 (P14)

Il ne peut exister et on ne peut concevoir aucune autre substance que Dieu.

$$\exists x (G_1(x) \land \forall y (S_1(y) \to y = x))$$

3.20 Proposition 14-A (P14-A)

Version alternative de P14 : Il existe exactement un Dieu.

$$\exists x \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = x)$$

$3.21 \quad \text{Proposition 15 (P15)}$

Tout ce qui existe est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu.

$$\forall x \exists g (G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$$

1	$\exists g(G_1(g) \land \forall y(S_1(y) \to y = g))$ P14				
2	$G_1(g) \land \forall y (S_1(y) \to y = g)$				
3	$G_1(g)$	$\wedge E, 2$			
4	$\forall y (S_1(y) \to y = g)$	$\wedge E, 2$			
5	$\forall x (S_1(x) \vee M_1(x))$	DP5			
6	$S_1(x) \vee M_1(x)$	$\forall E, 5$			
7	$S_1(x)$				
8	$S_1(x) \to x = g$	$\forall E, 4$			
9	x = g	⇒E, 7, 8			
10	$S_1(x) \leftrightarrow (I_2(x,x) \land C_2(x,x))$	D3			
11	$I_2(x,x) \wedge C_2(x,x)$	⇒E, 7, 10			
12	$I_2(x,x)$	∧E, 11			
13	$C_2(x,x)$	∧E, 11			
14	$I_2(x,g)$	9,12			
15	$C_2(x,g)$	9,13			
16	$I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I$, 14, 15			
17	$G_1(g) \wedge I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I, 3, 16$			
18	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	∃I, 17			
19	$M_1(x)$				
20	$M_1(x) \leftrightarrow \exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	D5b			
21	$\exists y (S_1(y) \land M_2(x,y))$	\Rightarrow E, 19, 20			
22	$S_1(y) \wedge M_2(x,y)$				
23	$S_1(y)$	$\wedge E$, 22			
24	$M_2(x,y)$	$\wedge E, 22$			
25	$S_1(y) \to y = g$	$\forall E, 4$			
26	y = y	\Rightarrow E, 23, 25			
27	$M_2(x,g)$	24,26			
28	$M_2(x,y) \leftrightarrow (x \neq y \land I_2(x,y) \land C_2(x,y))$	D5a			
29	$x \neq g \land I_2(x,g) \land C_2(x,g)$	\Rightarrow E, 27, 28			
30	$I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	∧E, 29			
31	$G_1(g) \wedge I_2(x,g) \wedge C_2(x,g)$	$\wedge I, 3, 30$			
32	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	∃I, 31			
33	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\exists E, 21, 22–32$			
34	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\lor E, 6, 718, 1933$			
35	$\exists g(G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\exists E,\ 1,\ 234$			
36	$\forall x \exists g (G_1(g) \land I_2(x,g) \land C_2(x,g))$	$\forall I, 35$			

3.22 Proposition 16 (P16)

Dieu est cause de toutes choses.

$$\forall x \exists g (G_1(g) \land K_2(g,x))$$

3.23 Proposition 17 (P17)

Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans y être contraint par personne.

$$\exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))$$

```
P14
1
         \exists x (G_1(x) \land \forall y (S_1(y) \to y = x))
2
              G_1(g) \wedge \forall y (S_1(y) \to y = g)
3
                                                                                                     \wedge E, 2
              G_1(g)
                                                                                                     ∧E, 2
4
              \forall y(S_1(y) \to y = g)
5
              G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \rightarrow A_2(y,g)))
                                                                                                     D6
6
              S_1(g) \wedge \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))
                                                                                                     \RightarrowE, 3, 5
7
              S_1(g)
                                                                                                     ∧E, 6
                   \exists x (\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))
9
                         \neg I_2(e,g) \wedge K_2(e,g)
                                                                                                     ∧E, 9
10
                         \neg I_2(e,g)
11
                         K_2(e,g)
                                                                                                     ∧E, 9
12
                         \forall x (S_1(x) \to \neg(\exists y (y \neq x \land K_2(y, x))))
                                                                                                     \rm P6c
                                                                                                     ∀E, 12
                         S_1(g) \to \neg(\exists y (y \neq g \land K_2(y,g)))
13
                                                                                                     ⇒E, 7, 13
14
                         \neg(\exists y(y \neq g \land K_2(y,g)))
                                                                                                     \forall E, 14
15
                         \neg(e \neq g \land K_2(e,g))
16
                         e = g \vee \neg K_2(e,g)
                                                                                                     De Morgan, 15
17
                              e = g
                              S_1(g) \leftrightarrow (I_2(g,g) \wedge C_2(g,g))
                                                                                                     D3
                              I_2(g,g) \wedge C_2(g,g)
                                                                                                     \RightarrowE, 7, 18
19
20
                              I_2(g,g)
                                                                                                     ∧E, 19
21
                              I_2(e,g)
                                                                                                     17,20
                                                                                                     R, 10
22
                              \neg I_2(e,g)
23
                              I_2(e,g) \wedge \neg I_2(e,g)
                                                                                                     ∧I, 21, 22
24
                                                                                                     \perp E, 23
25
                               \neg K_2(e,g)
26
                              K_2(e,g)
                                                                                                     R, 11
27
                              K_2(e,g) \wedge \neg K_2(e,g)
                                                                                                     \wedge I, 26, 25
28
                               \perp
                                                                                                     \perp E, 27
                         \perp
                                                                                                     \vee E,\ 16,\ 17\text{--}24,\ 25\text{--}28
29
30
                                                                                                     \exists E, 8, 9-29
31
               \neg \exists x (\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))
                                                                                                     \neg I, 8-30
                                                                                                     P16
32
              \forall x \exists h (G_1(h) \land K_2(h, x))
              \exists h(G_1(h) \land K_2(h,x))
                                                                                                     ∀E, 32
33
34
                   G_1(h) \wedge K_2(h,x)
                   G_1(h)
35
                                                                                                     ∧E, 34
36
                   \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                                                                                                     P14-A
37
                        \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                         G_1(g) \leftrightarrow g = z
                                                                                                     \forall E, 37
38
                         G_1(h) \leftrightarrow h = z
                                                                                                     ∀E, 37
39
40
                                                                                                     ⇒E, 3, 38
                        g = z
41
                         h=z
                                                                                                     \RightarrowE, 35, 39
                         h = g
                                                                                                     40,41
42
                         K_2(h,x)
                                                                                                     ∧E, 34
43
                        K_2(g,x)
44
                                                                                                     42,43
                   K_2(g,x)
                                                                                                     \exists E, 36, 37-44
45
46
              K_2(g,x)
                                                                                                     ∃E, 33, 34–45
47
              \forall x(K_2(g,x))
                                                                                                     \forall I, 46
              G_1(g) \wedge \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \wedge K_2(x,g))) \wedge \forall x(K_2(g,x))
                                                                                                     \wedge I,\,3,\,31,\,47
48
49
              \exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))
                                                                                                     ∃I, 48
        \exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))
                                                                                                     \exists E,\ 1,\ 2\!\!-\!\!49
```

3.24 Corollaire 2 de la Proposition 17 (P17c2)

Dieu seul est cause libre.

$$\exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))$$

1	$\mid \exists g(G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x)))$	P17
2	$G_1(g) \land \neg(\exists x(\neg I_2(x,g) \land K_2(x,g))) \land \forall x(K_2(g,x))$	
3	$G_1(g)$	$\wedge E, 2$
4		$\wedge E, 2$
5	$G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g)))$	D6
6	$S_1(g) \land \forall y (A_1(y) \to A_2(y,g))$	\Rightarrow E, 3, 5
7	$S_1(g)$	$\wedge E, 6$
8	$\forall x (S_1(x) \leftrightarrow K_2(x,x))$	DPIII
9	$S_1(g) \leftrightarrow K_2(g,g)$	$\forall E, 8$
10	$K_2(g,g)$	\Rightarrow E, 7, 9
11	$\forall x (S_1(x) \to \neg(\exists y (y \neq x \land K_2(y, x))))$	P6c
12	$S_1(g) \to \neg(\exists y (y \neq g \land K_2(y,g)))$	$\forall E, 11$
13		\Rightarrow E, 7, 12
14	$K_2(g,g) \land \neg \exists y (y \neq g \land K_2(y,g))$	$\wedge I$, 10, 13
15	$B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))$	D7a
16	$K_2(g,g) \land \neg \exists y (y \neq g \land K_2(y,g)) \leftrightarrow B_1(g)$	$\forall E, 15$
17	$B_1(g)$	⇒E, 14, 16
18	$B_1(x)$	
19	$B_1(x) \leftrightarrow (K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x)))$	D7a
20	$K_2(x,x) \land \neg \exists y (y \neq x \land K_2(y,x))$	⇒E, 18, 19
21	$K_2(x,x)$	$\wedge E, 20$
22	$\forall z (S_1(z) \leftrightarrow K_2(z,z))$	DPIII
23	$K_2(x,x) \leftrightarrow S_1(x)$	$\forall E, 22$
24	$S_1(x)$	\Rightarrow E, 21, 23
25	$\exists z (G_1(z) \land \forall y (S_1(y) \to y = z))$	P14
26	$G_1(h) \land \forall y (S_1(y) \to y = h)$	
27	$\forall y (S_1(y) \to y = h)$	$\wedge E, 26$
28	$S_1(x) \to x = h$	$\forall E, 27$
29		⇒E, 24, 28
30	$G_1(h)$	$\wedge E, 26$
31	$\exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)$	P14-A
32		
33		$\forall E, 32$
34	$G_1(h) \leftrightarrow h = z$	$\forall E, 32$
35	g = z	\Rightarrow E, 3, 33
36	h = z	⇒E, 30, 34
37	h = g	35,36
38	x = h	R, 29
39	x = y	38,37
40	x = g	$\exists E, 31, 32–39$
41	x = g	$\exists E, 25, 2640$
42	$B_1(x) \to x = g$	\Rightarrow I, 18–41
43	$\forall x (B_1(x) \to x = g)$ $G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x (B_1(x) \to x = g)$ $\exists g (G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x (B_1(x) \to x = g))$	$\forall I, 42$
44	$G_1(g) \wedge B_1(g) \wedge \forall x (B_1(x) \to x = g)$	$\wedge I$, 3, 17, 43
45	$\exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))$	∃I, 44
46	$\exists g(G_1(g) \land B_1(g) \land \forall x(B_1(x) \to x = g))$	$\exists E,1,245$

3.25 Proposition 18 (P18)

Dieu est cause immanente, et non transitive, de toutes choses.

$$\exists g(G_1(g) \land \forall x(I_2(x,g) \leftrightarrow K_2(g,x)))$$

3.26 Proposition 19 (P19)

Dieu et tous ses attributs sont éternels.

$$\exists g(G_1(g) \land E_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \rightarrow E_1(x)))$$

3.27 Proposition 20 (P20)

L'existence et l'essence de Dieu sont une seule et même chose.

$$\exists g(G_1(g) \land \forall x(A_2(x,g) \to x = g))$$

3.28 Proposition 21 (P21)

Tout ce qui suit de l'essence absolue d'un attribut de Dieu existe nécessairement et infiniment.

$$\forall x((\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg(\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v = x)) \land \neg F_1(x)))$$

```
\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))
1
2
                   G_1(g) \wedge A_2(y,g) \wedge x \neq g \wedge K_2(y,x) \wedge \neg (\exists z(z \neq y \wedge K_2(z,x)))
3
                                                                                                                                                                     \wedge E, 2
                   G_1(g)
4
                   A_2(y,g)
                                                                                                                                                                     \wedge E, 2
5
                   K_2(y,x)
                                                                                                                                                                     \wedge E, 2
6
                   G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))
                                                                                                                                                                     D6
7
                                                                                                                                                                     \RightarrowE, 3, 6
                   S_1(g) \wedge \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g))
8
                   S_1(g)
                                                                                                                                                                     ∧E, 7
                                                                                                                                                                     DP7
9
                   \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
10
                   A_2(y,g) \wedge S_1(g) \rightarrow y = g
                                                                                                                                                                     \forall E, 9
                   A_2(y,g) \wedge S_1(g)
                                                                                                                                                                     \wedge I, 4, 8
11
                                                                                                                                                                     ⇒E, 11, 10
12
                   y = g
                                                                                                                                                                     12,5
13
                   K_2(g,x)
                                                                                                                                                                     P19
14
                   \exists g(G_1(g) \land E_1(g) \land \forall z(A_2(z,g) \to E_1(z)))
15
                         G_1(h) \wedge E_1(h) \wedge \forall z (A_2(z,h) \to E_1(z))
16
                         G_1(h)
                                                                                                                                                                     ∧E, 15
17
                         E_1(h)
                                                                                                                                                                     ∧E, 15
                                                                                                                                                                     P14-A
18
                         \exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
                              \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)
19
20
                               G_1(g) \leftrightarrow g = z
                                                                                                                                                                     ∀E, 19
                              G_1(h) \leftrightarrow h = z
                                                                                                                                                                     ∀E, 19
21
22
                               g = z
                                                                                                                                                                     \RightarrowE, 3, 20
                              h=z
                                                                                                                                                                     ⇒E, 16, 21
23
                              g = h
24
                                                                                                                                                                     22,23
25
                               E_1(h)
                                                                                                                                                                     R, 17
26
                              E_1(g)
                                                                                                                                                                     24.25
                        E_1(g)
                                                                                                                                                                     ∃E 18 19-26
27
28
                    E_1(g)
                                                                                                                                                                     \exists E, 14, 15-27
29
                   E_1(x) \leftrightarrow L(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                     D8
                   E_1(g) \leftrightarrow L(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                     ∀E, 29
30
                                                                                                                                                                     ⇒E, 28, 30
                   L(\exists v(v=g))
31
32
                   \forall p(L(p) \to N(p))
                                                                                                                                                                     R1
33
                   L(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                     ∀E, 32
                   N(\exists v(v=g))
                                                                                                                                                                     ⇒E, 31, 33
34
                                                                                                                                                                     A3
35
                   \forall a \forall b (K_2(a,b) \to N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))
                                                                                                                                                                     ∀E, 35
36
                   K_2(g,x) \to N((\exists v(v=g)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
37
                   N((\exists v(v=g)) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                     ⇒E, 13, 36
                   N((\exists v(v=g)) \to (\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                     R7, 37
38
                   \forall p \forall q (N(p \rightarrow q) \rightarrow (N(p) \rightarrow N(q)))
                                                                                                                                                                     R6
39
                   N((\exists v(v=g)) \to (\exists v(v=x))) \to (N(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                     ∀E, 39
40
41
                    N(\exists v(v=g)) \to N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                      ⇒E, 38, 40
42
                   N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                     ⇒E, 34, 41
43
                   \forall a(N(\exists y(y=a)) \leftrightarrow \neg F_1(a))
                                                                                                                                                                     A14
                   N(\exists y(y=x)) \leftrightarrow \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                     ∀E, 43
44
                                                                                                                                                                     ∧E, 44
45
                   N(\exists y(y=x)) \to \neg F_1(x)
                   \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                     \RightarrowE, 42, 45
46
47
                   N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                     ∧I, 42, 46
48
             N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                     \exists E,\ 1,\ 2\text{--}47
         (\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v=x)) \land \neg F_1(x))
                                                                                                                                                                     ⇒I, 1–48
49
        \forall x ((\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land x \neq g \land K_2(y,x) \land \neg (\exists z (z \neq y \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v (v=x)) \land \neg F_1(x)))
                                                                                                                                                                     ∀I, 49
50
```

3.29 Proposition 22 (P22)

Tout ce qui suit d'un attribut de Dieu en tant que modifié est éternel et infini.

```
\forall x((\exists g \exists y \exists y'(G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)))
```

```
\exists g \exists y \exists y' (G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))
1
2
                                           G_1(g) \wedge A_2(y,g) \wedge M_1(y') \wedge \neg F_1(y') \wedge N(\exists v(v=y')) \wedge K_2(y,x) \wedge K_2(y',x) \wedge \neg (\exists z(z \neq y \wedge z \neq y' \wedge K_2(z,x)))
3
                                           G_1(g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \wedge E, 2
4
                                           A_2(y,g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge E, 2
5
                                           M_1(y')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge E, 2
6
                                           \neg F_1(y')
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ∧E, 2
7
                                           N(\exists v(v=y'))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge E, 2
8
                                           K_2(y,x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge E, 2
9
                                           K_2(y',x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge E, 2
10
                                           G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D6
                                           S_1(g) \wedge \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g))
11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ⇒E, 3, 10
12
                                           S_1(g)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∧E, 11
                                           \forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \rightarrow a = b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DP7
13
                                           A_2(y,g) \wedge S_1(g) \rightarrow y = g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∀E. 13
14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \wedge I,\,4,\,12
15
                                           A_2(y,g) \wedge S_1(g)
16
                                           y = g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {\Rightarrow} E,\,15,\,14
17
                                           K_2(g,x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16.8
                                           \forall a \forall b (K_2(a,b) \to N((\exists v(v=a)) \leftrightarrow \exists v(v=b)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A3
18
19
                                           K_2(y',x) \to N((\exists v(v=y')) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∀E, 18
20
                                           N((\exists v(v=y')) \leftrightarrow \exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \RightarrowE, 9, 19
21
                                           N((\exists v(v=y')) \to (\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            R7, 20
22
                                           \forall p \forall q (N(p \to q) \to (N(p) \to N(q)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            R6
23
                                           N((\exists v(v=y')) \rightarrow (\exists v(v=x))) \rightarrow (N(\exists v(v=y')) \rightarrow N(\exists v(v=x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∀E. 22
24
                                           N(\exists v(v=y')) \to N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ⇒E, 21, 23
25
                                           N(\exists v(v=x))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \RightarrowE, 7, 24
                                           \forall a (N(\exists y (y = a)) \leftrightarrow \neg F_1(a))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A14
26
27
                                           N(\exists y(y=x)) \leftrightarrow \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∀E, 26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∧E, 27
28
                                           N(\exists y(y=x)) \to \neg F_1(x)
29
                                           \neg F_1(x)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \RightarrowE, 25, 28
                                          N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ∧I, 25, 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \exists E, 1, 2-30
31
                              N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)
32
                   (\exists g \exists y \exists y' (G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)) \land (\exists x \land y \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \RightarrowI, 1–31
                  \forall x((\exists g\exists \exists \exists \forall (G_1(g) \land A_2(y,g) \land M_1(y') \land \neg F_1(y') \land N(\exists v(v=y')) \land K_2(y,x) \land K_2(y',x) \land \neg (\exists z(z \neq y \land z \neq y' \land K_2(z,x))))) \rightarrow (N(\exists v(v=x)) \land \neg F_1(x)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \forall I, 32
33
```

3.30 Proposition 23 (P23)

Tout mode qui existe nécessairement et infiniment découle d'un attribut de Dieu.

$$\forall x (N(\exists v(v=x)) \rightarrow \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \rightarrow (\exists v(v=x))))))$$

1	$ \mid N(\exists v(v=x))$	
2	$\exists g(G_1(g) \land \forall y(S_1(y) \to y = g))$	P14
3	$G_1(g) \land \forall y (S_1(y) \to y = g)$	
4	$G_1(g)$	$\wedge E, 3$
5	$\forall x(\exists y(A_2(y,x)))$	A9
6	$\exists y (A_2(y,g))$	$\forall E, 5$
7	$A_2(y,g)$	
8	$G_1(g) \leftrightarrow (S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g)))$	D6
9	$S_1(g) \land \forall w(A_1(w) \to A_2(w,g))$	\Rightarrow E, 4, 8
10	$S_1(g)$	∧E, 9
11	$\forall a \forall b (A_2(a,b) \land S_1(b) \to a = b)$	DP7
12	$A_2(y,g) \wedge S_1(g) \to y = g$	$\forall E, 11$
13	$A_2(y,g) \wedge S_1(g)$	∧I, 7, 10
14	y = g	\Rightarrow E, 13, 12
15	$\forall z \exists h (G_1(h) \land I_2(z,h) \land C_2(z,h))$	P15
16	$\exists h(G_1(h) \land I_2(x,h) \land C_2(x,h))$	$\forall E, 15$
17	$G_1(h) \wedge I_2(x,h) \wedge C_2(x,h)$	
18	$G_1(h)$	∧E, 17
19	$I_2(x,h)$	∧E, 17
20	$C_2(x,h)$	∧E, 17
21	$\exists z \forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)$	P14-A
22	$\forall y (G_1(y) \leftrightarrow y = z)$	
23	$G_1(g) \leftrightarrow g = z$	$\forall E, 22$
24	$G_1(h) \leftrightarrow h = z$	$\forall E, 22$
25	$ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad $	\Rightarrow E, 4, 23
26	h=z	\Rightarrow E, 18, 24
27	h = g	25,26
28	$C_2(x,h)$	R, 20
29	$C_2(x,g)$	27,28
30	$C_2(x,g)$	$\exists E, 21, 22–29$
31	$\forall a \forall b (K_2(a,b) \leftrightarrow C_2(b,a))$	A4
32	$K_2(g,x) \leftrightarrow C_2(x,g)$	$\forall E, 31$
33	$K_2(g,x)$	\Rightarrow E, 30, 32
34	$K_2(y,x)$	14,33
35		A3
36	$ K_2(y,x) \to N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x)) $	$\forall E, 35$
37	$ N((\exists v(v=y)) \leftrightarrow \exists v(v=x)) $	\Rightarrow E, 34, 36
38		R7, 37
39	$G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x)))$	$\land I, 4, 7, 38$
40	$\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))$	∃I, 39
41	$\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))$	$\exists E, 6, 7-40$
42	$\exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))$	$\exists E, 2, 3-41$
43	$N(\exists v(v=x)) \to \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x))))$	⇒I, 1–42
44	$\forall x (N(\exists v(v=x)) \to \exists g \exists y (G_1(g) \land A_2(y,g) \land N((\exists v(v=y)) \to (\exists v(v=x)))))$	$\forall I, 43$