Scala MNA®-SF (Mini Nutritional Assessment Short-Form)

Strumento di screening rapido validato per la valutazione dello stato nutrizionale del paziente geriatrico.

Nome Paziente: D'Àngelo Zoë

Data: 29/03/2026, 00:30

Peso (kg): —

Altezza (m): —

Operatore: Élodie Παπαδόπουλος

QUESITI DI SCREENING

A. Il paziente ha mostrato una riduzione dell'assunzione di cibo negli ultimi 3 mesi? *(A causa di perdita di appetito, problemi digestivi, difficoltà di masticazione o deglutizione)*	☐ 0 = Grave riduzione dell'assunzione di cibo ☑ 1 = Moderata riduzione dell'assunzione di cibo ☐ 2 = Nessuna riduzione dell'assunzione di cibo	**Punti:** 1
B. Perdita di peso negli ultimi 3 mesi:	☐ 0 = Perdita di peso superiore a 3 kg ☐ 1 = Non sa / Non è sicuro ☑ 2 = Perdita di peso compresa tra 1 e 3 kg ☐ 3 = Nessuna perdita di peso	**Punti:** 2
C. Mobilità:	☐ 0 = Costretto a letto o in sedia a rotelle ☑ 1 = In grado di alzarsi dal letto/sedia ma non esce di casa ☐ 2 = Autonomo negli spostamenti (esce di casa)	**Punti:** 1
D. Il paziente ha sofferto di stress psicologico o malattie acute negli ultimi 3 mesi?	☐ 0 = Sì ☑ 2 = No	**Punti:** 2
E. Problemi neuropsicologici:	☐ 0 = Demenza grave o depressione grave ☑ 1 = Demenza moderata ☐ 2 = Nessun problema psicologico	**Punti:** 1
F1. Indice di Massa Corporea (BMI): [Peso kg / (Altezza m)²] *(In alternativa, se il BMI non è disponibile, utilizzare la domanda F2 sulla circonferenza del polpaccio)*	☐ 0 = BMI inferiore a 19 ☐ 1 = BMI da 19 a meno di 21 ☐ 2 = BMI da 21 a meno di 23 ☐ 3 = BMI uguale o superiore a 23	**Punti:** —
F2. Circonferenza del polpaccio (CC): *(Da usare SOLO se non è possibile calcolare il BMI)*	☑ 0 = Circonferenza polpaccio minore di 31 cm ☐ 3 = Circonferenza polpaccio uguale o maggiore di 31 cm	**Punti:** 0

Circonferenza polpaccio: 29,5 cm

PUNTEGGIO TOTALE (Massimo 14 punti): 7 / 14

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Punteggio	Stato Nutrizionale	Soglia di Intervento
12 - 14 punti	Stato nutrizionale normale	Nessun intervento richiesto. Monitoraggio periodico.
8 - 11 punti	Rischio di malnutrizione	Monitoraggio attento del peso, rivalutazione periodica.
0 - 7 punti	Malnutrito	Necessita di intervento nutrizionale e valutazione medica.