

Scala MNA®-SF (Mini Nutritional Assessment Short-Form)

Strumento di screening rapido validato per la valutazione dello stato nutrizionale del paziente geriatrico.

Nome Paziente: Nanni Miriam

Data: 03/10/2026, 14:57

Peso (kg): 58,5

Altezza (m): —

Operatore: Infermiere 1

QUESITI DI SCREENING

A. Il paziente ha mostrato una riduzione dell'assunzione di cibo negli ultimi 3 mesi? <i>(A causa di perdita di appetito, problemi digestivi, difficoltà di masticazione o deglutizione)</i>	☐ 0 = Grave riduzione dell'assunzione di cibo ☒ 1 = Moderata riduzione dell'assunzione di cibo ☐ 2 = Nessuna riduzione dell'assunzione di cibo	Punti: 1
B. Perdita di peso negli ultimi 3 mesi:	☐ 0 = Perdita di peso superiore a 3 kg ☐ 1 = Non sa / Non è sicuro ☒ 2 = Perdita di peso compresa tra 1 e 3 kg ☐ 3 = Nessuna perdita di peso	Punti: 2
C. Mobilità:	☐ 0 = Costretto a letto o in sedia a rotelle ☒ 1 = In grado di alzarsi dal letto/sedia ma non esce di casa ☐ 2 = Autonomo negli spostamenti (esce di casa)	Punti: 1
D. Il paziente ha sofferto di stress psicologico o malattie acute negli ultimi 3 mesi?	☐ 0 = Sì ☒ 2 = No	Punti: 2
E. Problemi neuropsicologici:	☐ 0 = Demenza grave o depressione grave ☒ 1 = Demenza moderata ☐ 2 = Nessun problema psicologico	Punti: 1
F1. Indice di Massa Corporea (BMI): [Peso kg / (Altezza m)²] <i>(In alternativa, se il BMI non è disponibile, utilizzare la domanda F2 sulla circonferenza del polpaccio)</i>	☐ 0 = BMI inferiore a 19 ☐ 1 = BMI da 19 a meno di 21 ☐ 2 = BMI da 21 a meno di 23 ☐ 3 = BMI uguale o superiore a 23	Punti: —
F2. Circonferenza del polpaccio (CC): <i>(Da usare SOLO se non è possibile calcolare il BMI)</i>	☒ 0 = Circonferenza polpaccio minore di 31 cm ☐ 3 = Circonferenza polpaccio uguale o maggiore di 31 cm	Punti: 0

Circonferenza polpaccio: 29,5 cm

PUNTEGGIO TOTALE (Massimo 14 punti): 7 / 14

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Punteggio	Stato Nutrizionale	Soglia di Intervento
12 - 14 punti	Stato nutrizionale normale	Nessun intervento richiesto. Monitoraggio periodico.
8 - 11 punti	Rischio di malnutrizione	Monitoraggio attento del peso, rivalutazione periodica.
0 - 7 punti	Malnutrito	Necessita di intervento nutrizionale e valutazione medica.