

Scala PAINAD — Scheda di Valutazione

Pain Assessment in Advanced Dementia — Rilevazione del Dolore nel Paziente Non Verbale

ANAGRAFICA PAZIENTE & VALUTAZIONE

Paziente: Nanni Miriam

Data: 03/10/2026, 13:28

Data di Nascita: 12/11/1936

Operatore: Infermiere 1

Reparto/ Stanza: Non assegnata

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONALE

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
1. Respirazione	☒ Normale	☐ Occasionalmente affannosa. Brevi periodi di iperventilazione.	☐ RUMOROSA. Respiro stertoroso. Iperventilazione prolungata.	0
2. Vocalizzazione negativa	☐ Nessuna	☒ Lamenti o gemiti occasionali. Parlare a bassa voce con tono negativo.	☐ Chiamate ripetute a voce alta. Gemiti o lamenti costanti. Pianto.	1
3. Espressione facciale	☐ Sorridente o inespressiva	☒ Triste, spaventata, corrucciata, smorfia occasionale.	☐ Smorfia marcata e costante. Serramento della mascella / denti stretti.	1
4. Linguaggio del corpo	☐ Rilassato	☐ Teso, irrequieto, pacing (camminare avanti e indietro).	☒ Rigido. Pugni chiusi. Ginocchia al petto. Spinge via o colpisce.	2
5. Consolabilità	☐ Non necessaria	☒ Rassicurato o distratto dalla voce o dal contatto fisico.	☐ Impossibile da rassicurare, distrarre o consolare.	1

PUNTEGGIO TOTALE PAINAD (0 - 10):

5 / 10

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

- 0 punti: Nessun dolore rilevato.
- 1 – 3 punti: Dolore lieve.
- 4 – 6 punti: **Dolore moderato (richiede intervento/monitoraggio).**
- 7 – 10 punti: Dolore severo (richiede intervento analgesico e rivalutazione).