

Scala PAINAD — Scheda di Valutazione

Pain Assessment in Advanced Dementia — Rilevazione del Dolore nel Paziente Non Verbale

ANAGRAFICA PAZIENTE & VALUTAZIONE

Paziente:	D'Àngelo Zoë	Data:	29/03/2026, 00:30
Data di Nascita:	02/01/1940	Operatore:	Élodie Παπαδόπουλος
Reparto/ Stanza:	Stanza po10-aa7c4399 · Letto A		

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONALE

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
1. Respirazione	☒ Normale	☐ Occasionalmente affannosa. Brevi periodi di iperventilazione.	☐ RUMOROSA. Respiro stertoroso. Iperventilazione prolungata.	0
2. Vocalizzazione negativa	☒ Nessuna	☐ Lamenti o gemiti occasionali. Parlare a bassa voce con tono negativo.	☐ Chiamate ripetute a voce alta. Gemiti o lamenti costanti. Pianto.	0
3. Espressione facciale	☒ Sorridente o inespressiva	☐ Triste, spaventata, corrucciata, smorfia occasionale.	☐ Smorfia marcata e costante. Serramento della mascella / denti stretti.	0
4. Linguaggio del corpo	☒ Rilassato	☐ Teso, irrequieto, pacing (camminare avanti e indietro).	☐ Rigido. Pugni chiusi. Ginocchia al petto. Spinge via o colpisce.	0
5. Consolabilità	☒ Non necessaria	☐ Rassicurato o distratto dalla voce o dal contatto fisico.	☐ Impossibile da rassicurare, distrarre o consolare.	0

PUNTEGGIO TOTALE PAINAD (0 - 10):

0 / 10

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

- 0 punti: Nessun dolore rilevato.
- 1 – 3 punti: Dolore lieve.
- 4 – 6 punti: Dolore moderato (richiede intervento/monitoraggio).
- 7 – 10 punti: Dolore severo (richiede intervento analgesico e rivalutazione).