Scala PAINAD — Scheda di Valutazione

Pain Assessment in Advanced Dementia — Rilevazione del Dolore nel Paziente Non Verbale

ANAGRAFICA PAZIENTE & VALUTAZIONE

Paziente: D'Àngelo Zoë

Data: 29/03/2026, 00:30

Data di Nascita: 02/01/1940

Operatore: Élodie Παπαδόπουλος

Reparto/ Stanza: Stanza po10-c2365eaf · Letto A

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONALE

Item	Punteggio 0	Punteggio 1	Punteggio 2	Punti
1. Respirazione	☑ Normale	☐ Occasionalmente affannosa. Brevi periodi di iperventilazione.	☐ RUMOROSA. Respiro stertoroso. Iperventilazione prolungata.	**0**
2. Vocalizzazione negativa	☑ Nessuna	☐ Lamenti o gemiti occasionali. Parlare a bassa voce con tono negativo.	☐ Chiamate ripetute a voce alta. Gemiti o lamenti costanti. Pianto.	**0**
3. Espressione facciale	☑ Sorridente o inespressiva	☐ Triste, spaventata, corrucciata, smorfia occasionale.	☐ Smorfia marcata e costante. Serramento della mascella / denti stretti.	**0**
4. Linguaggio del corpo	☑ Rilassato	☐ Teso, irrequieto, pacing (camminare avanti e indietro).	☐ Rigido. Pugni chiusi. Ginocchia al petto. Spinge via o colpisce.	**0**
5. Consolabilità	☑ Non necessaria	☐ Rassicurato o distratto dalla voce o dal contatto fisico.	☐ Impossibile da rassicurare, distrarre o consolare.	**0**

PUNTEGGIO TOTALE PAINAD (0 - 10): **0 / 10**

INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

- **0 punti:** **Nessun dolore rilevato.**
- **1 – 3 punti:** Dolore lieve.
- **4 – 6 punti:** Dolore moderato (richiede intervento/monitoraggio).
- **7 – 10 punti:** Dolore severo (richiede intervento analgesico e rivalutazione).