

1 5. Lineare Gleichungssysteme

Nach [Lemma 1.8] und [Lemma 4.4] definiert jede Matrix $A : K^n \rightarrow K^m$ durch $x \mapsto Ax$.

1.1 Definition 5.1

Ist $A = (a_{ij}) \sim (m, n)$ eine Matrix und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in K^m$, so heißt:

$$Ax = b \iff \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$$

ein **lineares Gleichungssystem** mit m Gleichungen und n Unbekannten.

Ist $b \neq 0$, so heißt das lineare Gleichungssystem **inhomogen**, andernfalls **homogen**. $Ax = 0$ heißt, dass zu dem inhomogenen System gehörende homogene lineare Gleichungssystem.

Die Menge $\mathbb{L}(A, b) = \{x \in K^n | Ax = b\} \subset K^n$ heißt der Lösungsraum des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ ($b = 0$ oder $b \neq 0$).

A heißt die **Koeffizientenmatrix**, die Einträge a_{ij} **Koeffizienten** des linearen Gleichungssystems. Die Matrix $(A|b)$ heißt die **erweiterte Matrix des linearen Gleichungssystems** $Ax = b$.

1.1.1 Bemerkung

Bezeichnet $f : K^n \rightarrow K^m$ mit $f(x) = Ax$ die durch $A \sim (m, n)$ definiertes lineare Abbildung, so gilt:

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(A, b) &= f^{-1}(b) \text{ (Menge der Urbilder von } b \text{ unter } f) \\ \mathbb{L}(A, 0) &= \text{Ker } f \end{aligned}$$

1.1.2 Beispiel

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 - 3x_2 + x_3 & = & 5 \\ -x_1 + 2x_2 + 4x_3 & = & 1 \\ x_1 - x_2 & = & 2 \end{array} \hat{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \text{erweiterte Matrix } (A|b)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Koeffizientenmatrix

1.2 Satz 5.2

Gegeben sei das LGS $A \cdot x = b$, wobei $A \sim (m, n)$. Sei r der Spaltenrang von A , d.h. $r = \dim(SR(A))$. Dann gilt:

- 1) $\mathbb{L}(A, 0) \subseteq K^n$ ist $(n - r)$ -dimensionaler UVR
- 2) $\mathbb{L} = \emptyset$ oder $\mathbb{L}(A, b)$ hat folgende Form:

$$\mathbb{L}(A, b) = v + \mathbb{L}(A, 0), \text{ wobei } v \in \mathbb{L}(A, b) \text{ eine beliebige Lösung ist}$$

1.2.1 Beweis

- (1) Sei $f : K^n \rightarrow K^m$ die durch A definierte lineare Abbildung mit $f(x) = A \cdot x$. Die Spalten von A sind genau die Bilder $f(e_j)$ der Standardbasisvektoren: $f(e_j) = A \cdot e_j = A_{\cdot j}$. Daher sind die Spaltenvektoren von A ein EZS von $\text{Im}(f)$, d.h. es gilt $\text{Im}(f) = SR(A)$. Daraus folgt $\dim(\text{Im}(f)) = r$. Mit der Dimensionsformel (siehe 6.2) folgt:

$$\dim(K^n) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) \iff n = \dim(\text{Ker}(f)) + r$$

Daraus folgt: $\dim(\text{Ker}(f)) = n - r$.

Da $\text{Ker}(f) = \mathbb{L}(A, 0) \subseteq K^n$ ist UVR mit $\dim(\mathbb{L}(A, 0)) = n - r$.

- (2) Sei $w \in \mathbb{L}(A, 0)$ und $v \in \mathbb{L}(A, b)$, d.h. $A \cdot w = 0$ und $A \cdot v = b$.
 $\implies A \cdot (v + w) = A \cdot v + A \cdot w = b + 0 = b \implies v + w \in \mathbb{L}(A, b)$
 $\implies v + \mathbb{L}(A, 0) \subseteq \mathbb{L}(A, b)$
 Sei $v' \in \mathbb{L}(A, b)$ eine weitere Lösung, d.h. $A \cdot v' = b$.
 $\implies A \cdot (v - v') = A \cdot v - A \cdot v' = b - b = 0 \implies v - v' \in \mathbb{L}(A, 0)$
 $\implies v' \in v + \mathbb{L}(A, 0) \implies \mathbb{L}(A, b) \subseteq v + \mathbb{L}(A, 0)$

1.2.2 Bemerkung

- $\mathbb{L}(A, 0) \neq \emptyset$, da $0 \in \mathbb{L}(A, 0)$
- 0 heißt die triviale Lösung des homogenen Systems.
- Ein inhomogenes System hat nicht immer Lösungen.

1.3 Satz 5.3

Für ein inhomogenes LGS $A \cdot x = b$ mit $A \sim (m, n)$ gilt:

$$\mathbb{L}(A, b) \neq \emptyset \iff \text{Spaltenrang}(A) = \text{Spaltenrang}((A|b))$$

1.3.1 Beweis

Definiere: $\text{Spaltenrang}(A) = \text{Rg}(A)$, $\text{Spaltenrang}((A|b)) = \text{Rg}((A|b))$

Mit $\text{Rg}(A) = r$ gilt: $r \leq \text{Rg}((A|b)) \leq r + 1$.

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(A, b) \neq \emptyset &\iff \exists v \in K^n \text{ mit } A \cdot v = b \\ &\iff v_1 \cdot A_{\bullet 1} + \dots + v_n \cdot A_{\bullet n} = b \\ &\iff b \text{ ist Linearkombination der Spalten von } A \\ &\iff b \text{ ist Linearkombination der } r \text{ linear unabhängigen Spalten von } A \\ &\iff \text{Rg}((A|b)) = r \end{aligned}$$

1.4 Lemma 5.4

Sei $A \cdot x = b$ ein LGS und die Koeffizientenmatrix A in Zeilenstufenform, Pivots in den ersten r Spalten sitzen, $a_{11} \neq 0, \dots, a_{rr} \neq 0, r \leq m$ und $r \leq n$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & & & & b_1 \\ & a_{22} & & & b_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & a_{rr} & b_r \\ & 0 & & & b_{r+1} \\ & & & & \vdots \\ & & & & b_m \end{array} \right)$$

Dann gilt:

- (1) Ist $b_i \neq 0$ für ein i mit $r + 1 \leq i \leq m$, so hat das LGS keine Lösung, da $0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n = b_i \neq 0$ durch kein n -Tuple (x_1, \dots, x_n) erfüllbar ist.

- (2) Seien $b_{r+1} = \dots = b_m = 0$. Dann hat das LGS Lösungen, die man wie folgt erhält:

Wir setzen $k = n - r$ und wählen für die Unbekannten x_{r+1}, \dots, x_n Parameter $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, d.h. setze $x_{r+1} = \lambda_1, \dots, x_n = \lambda_k$.