

Заняття 12. Атом водню в квантово-механічному розгляді.

Аудиторне заняття

1. Електрон в атомі водню знаходиться в основному стані, що описується хвильовою функцією $\psi = A \exp(-r / r_1)$. Знайти а) нормувальний коефіцієнт A ; б) енергію E електрона та величину r_1 (за допомогою рівняння Шрьодінгера). (~№2.47)
2. Для $1s$ -електрона в атомі водню визначити найбільшу ймовірну відстань від $r_{\text{ім}}$ та ймовірність P знаходження електрону в області $r < r_{\text{ім}}$.
3. Для $1s$ -електрону в атомі водню визначити середнє значення його відстані від ядра $\langle r \rangle$.

Домашнє завдання

1. Знайти для $2p$ - та $3d$ -електронів в атомі водню найбільш ймовірну відстань від ядра. (№2.49а)
2. Визначити для $1s$ -електрона в атомі водню середні значення його квадрата відстані від ядра $\langle r^2 \rangle$ та квадрата середнього відхилення $\langle (r - \langle r \rangle)^2 \rangle$. (№2.48)
3. Частинка масою m перебуває в основному стані у потенціальному полі $U = k x^2 / 2$, а її хвильова функція має вигляд $\psi(x) = A \exp(-\alpha x^2)$, де A – коефіцієнт нормування, α - додатна стала. За допомогою рівняння Шрьодінгера знайти величину α та енергію частинки у цьому стані. (№2.46)